

# Analisi 1

Mattia Marini

12.09.22

## Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>2</b>
1.1	Argomenti corso . . . . .	2
1.2	Argomenti esercitazioni . . . . .	2
1.3	Moodle . . . . .	2
1.4	Libri di testo . . . . .	2
1.5	Esami . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Insiemistica</b>	<b>2</b>
2.1	Simboli . . . . .	3
2.1.1	Appartiene . . . . .	3
2.1.2	Contenuto . . . . .	3
2.1.3	Strettamente contenuto . . . . .	3
2.1.4	Unione . . . . .	3
2.1.5	Intersezione . . . . .	3
2.1.6	Differenza . . . . .	3
2.1.7	Differenza simmetrica . . . . .	3
2.2	Insieme delle parti . . . . .	4
2.3	Prodotto cartesiano . . . . .	4
2.4	Funzioni fra insiemi . . . . .	4
2.5	Proprietà delle funzioni . . . . .	4
2.5.1	Iniettive . . . . .	4
2.5.2	Surgettive . . . . .	5
2.5.3	Bigettive . . . . .	5
2.5.4	Invertibili . . . . .	5
2.6	Insiemi numerici . . . . .	5
2.7	Esempi funzioni . . . . .	5
2.8	Immagine e controimmagine . . . . .	6
2.9	Esteremi superiori ed inferiori di un insieme . . . . .	6
2.10	Caratterizzare i sup e gli inf . . . . .	6
2.11	Intervalli . . . . .	7
<b>3</b>	<b>Principio di induzione</b>	<b>7</b>
3.1	Dimostrazione 1 . . . . .	8
3.2	Dimostrazione 2 . . . . .	9
3.3	Dimostrazione 3 . . . . .	9

3.4	Dimostrazione 4 . . . . .	9
3.5	Disuguaglianza di bernulli . . . . .	10
<b>4</b>	<b>Proprietà dei numeri reali</b>	<b>10</b>
4.1	Proprietà algebriche somma . . . . .	10
4.2	Proprietà algebriche prodotto . . . . .	10
4.3	Proprietà ordinamento . . . . .	10
4.4	Assioma di continuità . . . . .	11
<b>5</b>	<b>Polinomi</b>	<b>12</b>
5.1	Operazioni polinomi . . . . .	12
5.1.1	Somma Polinomi . . . . .	12
5.1.2	Moltiplicazione . . . . .	12
5.1.3	Moltiplicazione fra polinomi . . . . .	12
5.2	Divisione fra polinomi . . . . .	13
5.2.1	Algoritmo standard divisione . . . . .	13
5.2.2	Algoritmo di ruffini . . . . .	13
5.3	Dimostrazione teorema fondamentale dell'algebra . . . . .	14
5.4	Polinomio irriducibile . . . . .	15
<b>6</b>	<b>Funzioni e grafici</b>	<b>15</b>
6.1	Grafico di una funzione . . . . .	15
6.2	Definizione operative . . . . .	15
6.2.1	Iniettività . . . . .	15
6.2.2	Surgettività . . . . .	15
6.2.3	Esempi . . . . .	16
6.3	Operazioni sui grafici . . . . .	17
6.4	Risoluzione di equazioni per via grafica . . . . .	17
<b>7</b>	<b>Potenze, esponenziali, funzioni trigonometriche</b>	<b>18</b>
7.1	Potenze pari . . . . .	18
7.2	Potenze dispari . . . . .	19
7.3	Esponenziale e logaritmo . . . . .	19
7.4	Funzioni trigonometriche . . . . .	20
7.4.1	Inverso il seno . . . . .	21
7.5	Funzioni iperboliche . . . . .	21
7.6	Formule trigonometria iperbolica . . . . .	22
<b>8</b>	<b>Esercizi</b>	<b>22</b>
8.1	Esercizio 1 . . . . .	22
8.2	Esercizio 2 . . . . .	23
8.3	Esercizio 3 . . . . .	24
<b>9</b>	<b>Numeri complessi</b>	<b>25</b>
9.1	Forma cartesiana . . . . .	25
9.2	Somme e differenze . . . . .	25
9.3	Prodotto . . . . .	25
9.4	Reciproco . . . . .	26
9.5	Divisione . . . . .	26

9.6	Definizioni . . . . .	26
<b>10</b>	<b>Rappresentazione trigonometrica</b>	<b>26</b>
10.1	Argomento di un numero complesso . . . . .	27
10.1.1	Prodotto in forma trigonometrica . . . . .	27
10.1.2	reciproco in forma trigonometrica . . . . .	27
10.1.3	Divisione in forma trigonometrica . . . . .	27
10.2	Forma esponenziale . . . . .	27
10.3	Potenza di un numero complesso . . . . .	27
10.3.1	Esempio potenza . . . . .	27
10.4	Radici dei numeri complessi . . . . .	28
<b>11</b>	<b>Il teorema fondamentale dell'algebra</b>	<b>29</b>
<b>12</b>	<b>Successione numeri reali</b>	<b>30</b>
12.1	Frequenza variabili . . . . .	30
12.2	Successione di numeri naturali . . . . .	31
12.3	Rappresentazione di successioni . . . . .	31
12.4	Limite di una successione . . . . .	32
12.4.1	Errori comuni . . . . .	33
12.5	Esempi . . . . .	33
12.6	Unicità del limite . . . . .	34
12.7	Teoremi sui limiti . . . . .	34
12.8	Errori comuni . . . . .	34
12.9	Retta reale estesa . . . . .	35
12.10	Forma indeterminata . . . . .	35
12.11	Implicazione importante disuguaglianza di bernoulli . . . . .	36
<b>13</b>	<b>Fattoriali e combinatoria</b>	<b>37</b>
13.1	Proprietà dei fattoriali . . . . .	38
13.2	Il triangolo di tartaglia . . . . .	38
<b>14</b>	<b>3 criteri: rapporto, radice, rapporto-radice</b>	<b>39</b>
14.1	Criterio della radice . . . . .	39
14.2	Criterio del rapporto . . . . .	39
14.3	Criterio rapporto $\rightarrow$ radice . . . . .	40
14.4	Dimostrazioni . . . . .	40
14.4.1	Dimostrazione criterio radice . . . . .	40
14.5	Numero di nepero . . . . .	41
14.6	Esempio forme indeterminate . . . . .	41
<b>15</b>	<b>Limiti di funzioni</b>	<b>41</b>
15.1	Continuità . . . . .	43
15.2	Limiti notevoli . . . . .	43
15.3	Cambio di variabile . . . . .	43
15.4	Ordini di infiniti . . . . .	44
15.5	Dimostrazione $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$ . . . . .	45
15.6	Altri esempi . . . . .	45
15.7	Dimostrare non esistenza di un limite . . . . .	46

<b>16 Numero di nepero</b>	<b>46</b>
16.1 Dimostrazione definizione numero di nepero . . . . .	47
<b>17 O-piccolo</b>	<b>49</b>
17.1 Proprietà o-piccolo . . . . .	49
17.2 Sviluppi al primo ordine . . . . .	50
<b>18 Derivate</b>	<b>51</b>
18.1 Regole derivazione . . . . .	51
18.1.1 Dimostrazione regole di derivazione . . . . .	52
18.2 Derivate elementari . . . . .	52
18.2.1 Dimostrazione di derivate elemenrari tramite o-piccolo . . . . .	52
<b>19 De l'Hopital e Taylor: pilastri della matematica</b>	<b>53</b>
19.1 De l'hopital . . . . .	53
19.2 Esempi limiti . . . . .	53
19.3 Taylor . . . . .	54
19.3.1 Dimostrazione . . . . .	54
19.4 Tabella sviluppi di Taylor . . . . .	55
19.5 Sviluppo con Taylor $\neq 0$ . . . . .	55
<b>20 Teoremi continuità e derivabilità</b>	<b>56</b>
20.1 Teoremi studio locale funzione . . . . .	56
20.2 Proprietà sviluppi taylor . . . . .	62
20.2.1 Somma . . . . .	62
20.2.2 Prodotto . . . . .	62
20.3 Composta . . . . .	62
20.3.1 Esempi di sviluppi . . . . .	63
<b>21 Convessità</b>	<b>63</b>
21.1 Convessità e derivata . . . . .	64
<b>22 Teoria di integrazione</b>	<b>64</b>
22.1 Come si indicano . . . . .	64
22.2 Significato geometrico . . . . .	65
22.3 Definizione formale . . . . .	65
22.4 Teoremi integrabilità . . . . .	66
22.5 Proprietà integrali . . . . .	67
<b>23 Calcolo di integrali e integrazione impropria</b>	<b>67</b>
23.1 Teoremi e definizioni . . . . .	67
23.2 Integrazione di funzioni razionali . . . . .	69
23.3 Trucchetti integrazione . . . . .	71
23.4 Integrali impropri . . . . .	73
23.5 Teorema del confronto . . . . .	75
23.6 Trucco dell'integrazione per parti . . . . .	78
<b>24 Equazioni differenziali</b>	<b>79</b>
24.1 Definizioni . . . . .	79
24.2 Problemi di Cauchy . . . . .	80

24.3	Edo a variabili separabili . . . . .	82
24.4	Tempo di vita ed esempi . . . . .	82
24.5	Equazioni differenziali lineari . . . . .	86
<b>25</b>	<b>Tecniche risolutive equazioni differenziali</b>	<b>86</b>
25.1	Edo lineari di primo ordine . . . . .	86
25.2	Edo lineari di secondo ordine . . . . .	87
25.3	Equazioni lineari omogenee di ordine $m$ . . . . .	89
25.4	Equazioni lineari non omogenee . . . . .	90
25.5	Metodo di variazione delle costanti . . . . .	91
<b>26</b>	<b>Altri metodi risolutivi equazioni diff particolari</b>	<b>92</b>

## Teoremi e Assiomi

1	Esistenza estremo superiore . . . . .	6
2	Assioma di continuità . . . . .	11
3	Divisione fra polinomi . . . . .	13
4	Divisione per polinomio di grado 1 . . . . .	14
5	Irriducibilità dei polinomi . . . . .	15
6	Insiemi limitati . . . . .	22
7	Teorema fondamentale dell'algebra . . . . .	29
8	Radici complesse coniugate . . . . .	30
9	Permanenza del segno . . . . .	34
10	Teorema del confronto a 2 . . . . .	34
11	Teorema del confronto a 3 (dei due carabinieri) . . . . .	34
12	Somma, prodotto e divisione limiti . . . . .	35
13	Esistenza di un limite di una successione . . . . .	46
14	Limiti successioni crescenti . . . . .	47
15	Corollario al teorema precedente . . . . .	47
16	Formula di Taylor . . . . .	54
17	Teorema derivate di primo e secondo ordine . . . . .	54
18	Esistenza degli zeri . . . . .	56
19	Teorema del valore intermedi . . . . .	56
20	Criterio di monotonia 1 . . . . .	56
21	Criterio delle derivate successive . . . . .	57
22	Teorema di Weierstrass . . . . .	58
23	Teorema di Rolle . . . . .	59
24	Teorema di Cauchy . . . . .	59
25	Teorema di Lagrange . . . . .	60
26	Teorema monotonia 2 . . . . .	60
27	Teorema monotonia 3 . . . . .	61
28	Continuità e lipschizianità . . . . .	62
29	Continuità e lipschizianità 2 . . . . .	62
30	Integrità funzione . . . . .	66
31	Teorema della media integrale . . . . .	68
32	Teorema fondamentale del calcolo integrale . . . . .	68
33	Criterio del confronto . . . . .	77

34	Teorema del confronto asintotico . . . . .	77
35	Assoluta integrabilità . . . . .	77
36	Teorema di esistenza . . . . .	81
37	Teorema di unicità . . . . .	81
38	Spazio soluzioni equazione differenziale lineare . . . . .	86
39	Soluzione equazioni differenziali non omogenee . . . . .	86

## Formule

1	Disuguaglianza di Bernoulli . . . . .	10
---	---------------------------------------	----

## Incomprensioni

1	09:43:11 . . . . .	6
2	11.22.37 . . . . .	28
3	09:48:11 . . . . .	30
4	10:00:29 . . . . .	30
5	10:45:02 . . . . .	55

## Definizioni

1	Estremi superiori e inferiori . . . . .	6
2	Grafico di una funzione . . . . .	7
3	Densità degli insiemi . . . . .	11
4	Maggiorante e minorante . . . . .	11
5	Insiemi limitati superiormente/inferiormente . . . . .	11
6	Massimo/minimo insieme . . . . .	12
7	Radice di un polinomio . . . . .	14
8	Numeri coniugati . . . . .	26
9	Modulo numero complesso . . . . .	26
10	Radici dei numeri complessi . . . . .	28
11	Radice di un polinomio . . . . .	29
12	Molteplicità radice . . . . .	29
13	Frequentemente . . . . .	30
14	Definitivamente . . . . .	30
15	Successione di numeri naturali . . . . .	31
16	Successione di numeri reali accomodante . . . . .	31
17	Limite infinito . . . . .	33
18	Limite se tenda a numero finito . . . . .	33
19	Fattoriale di un numero . . . . .	37
20	Coefficiente binomiale . . . . .	37
21	Limite di funzione . . . . .	42
22	Continuità . . . . .	43
23	Sottosuccessione . . . . .	46
24	Crescenza/decrecenza di una successione . . . . .	46
25	O-piccolo definizione 1 . . . . .	49
26	O-piccolo definizione 2 . . . . .	49
27	Derivata con rapporto incrementale . . . . .	51

28	Derivata con o piccolo . . . . .	51
29	Taylor con centro in $x_0$ . . . . .	55
30	Punto stazionario . . . . .	56
31	Lipschizzianità . . . . .	61
32	Convessità/concavità sottoinsiemi . . . . .	63
33	Convessità geometrica . . . . .	64
34	Convessità algebrica . . . . .	64
35	Primitiva di una funzione . . . . .	67
36	Funzione integrale . . . . .	67
37	Equazione differenziale . . . . .	79
38	Problema di Cauchy . . . . .	81
39	Tempo di vita . . . . .	83

## 1 Introduzione

Romeo Brunetti(progessore): *romeo.brunetti@unitn.it*

Valentino Abram(esercitatore): *valentino.abram@unitn.it*

### 1.1 Argomenti corso

- Continuità
- Derivabilità
- Integrabilità

### 1.2 Argomenti esercitazioni

- Esercizi per casa
- Esercizi Ddi autovalutazione

### 1.3 Moodle

Tutto ciò che viene affrontato sta sul sito **moodle**. Ci si arriva da esse3

### 1.4 Libri di testo


- Canuto e Tabacco - Pearson - Analisi 1

### 1.5 Esami

- Solo scritti
- 2 esami preliminari (5 novembre, 21 dicembre) + 5 scritti annuali
- Se si passa primo preliminare non si passa NON si può fare il secondo
- Se entrambi i preliminari vanno bene si può decidere di accettare un voto che è media pesata fra questi due anziche fare i 5 esami canonici
- 15 domande a risposta multipla con 2 ore di tempo
- Ogni esercizio vale 2 punti, **risposta errata = -0.4**
- Portare **carta di identità**
- Scrivere nome cognome e matricola su foglio di bella
- Sono concessi **talvolta** i formulari: 1 foglio A4 con tips

## 2 Insiemistica

Per dare una definizione di insieme rigorosa serve matematica molto complessa. Noi useremo definizione "ingenua"





Per elenco:

$$A = \{b, \beta, A, Brunetti\}$$

OSS: le ripetizioni non contano:  $\{a, a, a, b, b, b\} = \{a, b\}$

Per proprietà:

$$A = \{\text{tutti gli studenti mancini}\}$$

## 2.1 Simboli

### 2.1.1 Appartiene

A sinistra va l'elemento, a destra l'insieme

$$\underbrace{b}_{\text{elemento}} \in \underbrace{A}_{\text{insieme}}$$

### 2.1.2 Contenuto

B è contenuto o uguale a A

$$B \subseteq A$$

### 2.1.3 Strettamente contenuto

A è contenuto ma diverso da B

$$A \subsetneq B$$

### 2.1.4 Unione

$$A \cup B = \left\{ x \underbrace{:}_{\text{tale che}} x \in A \text{ oppure } x \in B \right\}$$

### 2.1.5 Intersezione

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ e } x \in B\}$$

### 2.1.6 Differenza

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ e } x \notin B\}$$

### 2.1.7 Differenza simmetrica

$$\begin{aligned} A \Delta B &= A \cup B \\ &= \{x : x \in A \text{ XOR } x \in B\} \\ &= (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \end{aligned}$$

## 2.2 Insieme delle parti

Dato un insieme  $A$  si indica con  $P(A)$  l'insieme costituito da tutti i sottoinsiemi di  $A$  (compresi l'insieme vuoto e  $A$  stesso)

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$P(A) = \{\{1, 2, 3\}, \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}\}$$

OSS: L'insieme vuoto è contenuto in ogni insieme

OSS: Se un elemento di un insieme è un insieme, questo va trattato come insieme

## 2.3 Prodotto cartesiano

Si dice prodotto cartesiano e si indica con  $A \times B$  l'insieme delle coppie  $(a, b)$  in cui  $a \in A$  e  $b \in B$  ordinate

Esempio:

$$A = \{1, 2\} \quad B = \{3, 4\}$$

$$A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\}$$

## 2.4 Funzioni fra insiemi

Consiste di 3 elementi:

- Insieme di partenza  $A$
- Insieme di arrivo  $B$
- Legge che ad ogni elemento dell'insieme di partenza  $A$  associ un unico elemento dell'insieme di arrivo  $B$

$$f : A \rightarrow B \quad f \left( \underbrace{a}_{\text{elemento di } A} \right)$$

Elemento di B

NB: Affinchè  $f$  possa essere definita una funzione, devono essere collegati tutti gli elementi di  $A$  e lo stesso elemento in  $A$  non può collegarne due diversi in  $B$

## 2.5 Proprietà delle funzioni

### 2.5.1 Iniettive

$f : A \rightarrow B$  è iniettiva se ad ogni coppia di elementi distinti di  $A$  associo una coppia di elementi distinti di  $B$

$$a_1, a_2 \in A \quad a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$$

Stringi stringi *non esistono elementi distinti che "puntano" allo stesso*

### 2.5.2 Surgettive

$f : A \rightarrow B$  è surgettiva se ad ogni elemento di  $B$  ne è associato almeno uno in  $A$

$$\forall b \in B \exists a \in A : f(a) = b$$

Stringi stringi *ogni elemento di  $B$  deve essere puntato da almeno un elemento di  $A$*

### 2.5.3 Bigettive

$f : A \rightarrow B$  è bigettiva (o corrispondenza biunivoca) se è sia surgettiva che iniettiva

NB: Se  $f$  è bigettiva allora  $|A| = |B|$

### 2.5.4 Invertibili

$f : A \rightarrow B$  è invertibile se esiste una funzione  $g : B \rightarrow A$  tale che

$$g(f(a)) = a \quad \forall a \in A$$

oppure

$$f(g(b)) = b \quad \forall b \in B$$

NB:  $f : A \rightarrow B$  è invertibile se e solo se  $f$  è bigettiva

## 2.6 Insiemi numerici

- $\mathbb{N}$  numeri naturali  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$
- $\mathbb{Z}$  numeri interi  $\{0, +1, -1, +2, -2\}$
- $\mathbb{Q}$  numeri razionali  $\{\frac{1}{2}, -\frac{3}{5}\} \quad \frac{m}{q} \quad \text{con } q \neq 0$
- $\mathbb{R}$  numeri reali  $\{\sqrt{2}, \}$
- $\mathbb{C}$  numeri complessi

## 2.7 Esempi funzioni

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad f(n) = n + 3$$

Iniettiva ma non biettiva (0,1,2 non vengono usati)

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad f(n) = n + 3$$

Iniettiva biettiva e dunque invertibile

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad f(n) = n^2$$

Iniettiva ma non suriettiva

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad f(n) = n^2$$

## 2.8 Immagine e controimmagine

L'immagine di un sottoinsieme  $C$  di  $A$  è l'insieme dei punti di  $B$  collegati da una funzione  $f: A \rightarrow B$

$$I_B = \{f(a) : a \in A\}$$

La controimmagine di un sottoinsieme  $D$  di  $B$  è l'insieme dei punti di  $A$  le cui frecce arrivano in  $D$

$$I_A^{-1} = \{a \in A : f(a) \in B\}$$

## 2.9 Estermi superiori ed inferiori di un insieme

### Definizione 1: *Estermi superiori e inferiori*

Sia  $A \in \mathbb{R}$ ,  $A \neq \emptyset$ . L'estremo superiore di  $A$  si indica con  $\sup A$  e vale:

- $+\infty$  se  $A$  non è limitato superiormente
- Il minimo dei maggioranti di  $A$  se è limitato superiormente

NB:  $\sup A$  e  $\inf A$  esistono sempre! Esempi:

- $(3, 7]$      $\sup=7$      $\inf=3$      $\min$  non esiste     $\max=7$

*Incomprensione - 09:43:11*

### Teorema 1: *Esistenza estremo superiore*

Se  $A \subset \mathbb{R} \neq \emptyset$  allora  $\sup A$  esiste.

Dimostrazione:

- Se  $A$  non è limitato superiormente allora per definizione  $\sup A = +\infty$
- Se  $A$  è superiormente limitato l'insieme  $B$  dei suoi maggioranti non è vuoto
- Visto che  $B$  è "tutto a destra" di  $a$  allora esiste un elemento  $C$  separatore (assioma di continuità)
- 

$$a \leq c \forall a \in A \quad (c \text{ è maggiorante}) \rightarrow c \in B$$

$$c \leq b \forall b \in B \quad (c \text{ è minorante di } B)$$

## 2.10 Caratterizzare i sup e gli inf

- $\sup A = +\infty$  se  $\exists a \in A$  t.c.  $a \geq M \quad \forall M \in \mathbb{R}$
- $\inf A = -\infty$  se  $\exists a \in A$  t.c.  $a \leq M \quad \forall M \in \mathbb{R}$

- $\sup A = L \in \mathbb{R}$  se:
  - $a$  è maggiorante
  - $\forall \epsilon > 0 \quad \exists a \in A$  t.c.  $a \geq L - \epsilon$   
(se spostato di una quantità infinitesimale  $L$  verso  $A$ , trovo un elemento di  $A$  che è maggiore di  $L$ )

Esempi:

- $A = [0, 1] \cup (2, 3) \cup \{4\}$ 
  - $\inf A = \min A = 0$
  - $\sup A = \max A = 4$

### Definizione 2: Grafico di una funzione

Si dice grafico di  $f$  è il sottoinsieme del prodotto  $A \times B$

$$\text{graf}(f) = \{(a, b) \in A \times B : f(a) = b\} \quad \text{per proprietà}$$

$$\text{graf}(f) = \{(a, f(a)) : a \in A\} \quad \text{per elenco}$$

## 2.11 Intervalli

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$$

Limitato con massimo e minimo

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$$

Limitato con minimo ma senza massimo

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$$

Limitato ma senza massimo e minimo

## 3 Principio di induzione

*Principio che non si può dimostrare e necessita di due ingredienti*

- Insieme dei numeri naturali  $\mathbb{N}$
- $P_n$  = affermazione che contenga al suo interno un parametron  $n \in \mathbb{N}$  che sia vera o falsa

Esempi:

- $n^2 = n + 6 \rightarrow$  vera solo per  $n = 3$
- $2^n \geq n + 6 \rightarrow$  vera per  $n \geq 4 \rightarrow$  necessita principio di induzione

- Se A contiene n elementi allora  $P(a)$  contiene  $2^n$  elementi

Principio di induzione consiste in due passi fondamentali:

- *Passo base* Supponiamo che l'affermazione  $P_0$  sia vera
- *Passo intuitivo* Per qualsiasi  $n \in \mathbb{N}$  Se  $P_n$  è vera, allora  $P_{n+1}$  è vera
- Allora  $P_n$  è vera  $\forall n \in \mathbb{N}$

NB: il punto di partenza **conta**

- *Passo base* Supponiamo che l'affermazione  $P_{2022}$  sia vera
- *Passo intuitivo* Per qualsiasi  $n \in \mathbb{N}$  Se  $P_n$  è vera, allora  $P_{n+1}$  è vera
- Allora  $P_n$  è vera  $\forall n \in [2022, \infty]$ . Devo controllare manualmente che sia vera anche per  $[0, 2022]$

NB: la dimostrazione procede come cascata del domino

- *Passo base* Supponiamo che l'affermazione  $P_{2022}$  sia vera
- *Passo intuitivo* Per qualsiasi  $n \in \mathbb{N}$  Se  $P_n$  è vera, allora  $P_{n+1}$  è vera  $\forall n \geq 1$
- Dimostrazione non procede perchè passo base non vale per  $n=0$

### 3.1 Dimostrazione 1

Dimostrazione che  $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$

- *Passo base* Verifico che  $P_0$  è vera  $\rightarrow$  basta sostituire  $0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$
- Visto che  $P_n$  è vera per *hp* scrivo che

$$\underbrace{[0 + 1 + 2 + 3 \dots + n] + (n + 1)}_{\text{somma dei primi } n+1 \text{ numeri}} = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1)$$

- Raccolgo a destra e ottengo

$$\sum_{k=0}^{n+1} k = \frac{(n+2)(n+1)}{2}$$

In alternativa posso usare il metodo di gauss per verificare questa hp. (Divido i numeri da 0 a n in due e li sovrappongo al contrario)

### 3.2 Dimostrazione 2

Dimostrazione che  $\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

◦ *Passo base*  $\sum_{k=0}^0 k^2 = \frac{0 \cdot 1 \cdot 1}{6} = 0$

◦

$$\underbrace{[0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 \dots n^2]}_{\text{Ho dimostrato quanto vale in passo base}} (n+1)^2 = \underbrace{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}} + (n+1)^2$$

$$f(n) = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$f(n+1) = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

$$f(n+1) = f(n) + (n+1)^2$$

$$\frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} = \frac{(n+1)(n(2n+1) + 6(n+1))}{6}$$

$$(n+1)(2n^2 + 7n + 6) = (n+1)(2n^2 + 7n + 6)$$

◦ Applico algebra e dimostro che

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

### 3.3 Dimostrazione 3

Dimostrazione che  $\sum_{k=1}^n a^k = \frac{a^{n+1}-1}{a-1}$

◦ *Passo base*  $1 = \frac{a-1}{a-1}$

◦

$$[1 + a + a^2 \dots a^{k+1}] = \frac{a^{n+1} - 1}{a - 1} + (a)^{n+1}$$

### 3.4 Dimostrazione 4

Dimostrazione che  $2^n \geq n \quad \forall n \in \mathbb{N}$

◦ *Passo base verificato*  $2^0 \geq 0$

◦

$$2^{n+1} \geq n+1 \rightarrow 2 \cdot \underbrace{2^n}_{\geq n} \geq n+1$$

$$2 \cdot 2^n \geq 2n \text{ dato che } 2^n \geq n \text{ per hp}$$

◦ Verifico che  $2n \geq n+1 \quad \forall n \in [1, \infty]$  i

### 3.5 Disuguaglianza di bernulli

Formula 1: *Disuguaglianza di Bernoulli*

$$(1+x)^n \geq 1+nx \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad x > -1$$

◦ *Passo base verificato*

◦ *Passo induttivo*

$$\underbrace{(1+x)^{n+1}}_{(1+x)^n(1+x)} \geq 1+x(n+1)$$

## 4 Proprietà dei numeri reali

- Proprietà algebriche
- Proprietà ordinamento
- Assioma di continuità

### 4.1 Proprietà algebriche somma

- Proprietà commutativa  $a+b=b+a \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$
- Proprietà associativa  $(a+b)+c=a+(b+c) \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}$
- Esistenza elemento neutro  $\exists 0 \in \mathbb{R} \text{ t.c. } a+0=a$
- Esistenza elemento opposto  $\forall a \in \mathbb{R} \exists b \in \mathbb{R} \text{ t.c. } a+b=0$

### 4.2 Proprietà algebriche prodotto

- Proprietà commutativa  $a \cdot b = b \cdot a \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$
- Proprietà associativa  $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}$
- Esistenza elemento neutro  $\exists 1 \in \mathbb{R} \text{ t.c. } a \cdot 1 = a$
- Esistenza elemento opposto  $\forall a \in \mathbb{R} - \{0\} \quad \exists b \in \mathbb{R} \text{ t.c. } a \cdot b = 0$
- Proprietà distributiva  $a(b+c) = ab+bc$

### 4.3 Proprietà ordinamento

- Riflessiva se  $x \leq x$
- Antisimmetrica se  $x \leq y$  e  $x \geq y$  allora  $x = y$
- Transitiva se  $x \leq y$  e  $y \leq z$  allora  $x \leq z$
- se  $y \leq x$  allora  $zy \leq zx \quad \forall z \in \mathbb{R}^+$



## 4.4 Assioma di continuità

### Assioma 2: *Assioma di continuità*

Siano  $A$  e  $B$  due sottoinsiemi non vuoti dei numeri reali. Supponiamo che ogni elemento di  $A$  sia minore o uguale a  $B$ . Per quando i due insiemi siano vicini esiste almeno un numero reale che stia fra  $a$  e  $b$  ossia:

$$\exists c \in \mathbb{R} \text{ t.c. } a \leq c \leq b \quad \forall a \in A, b \in B$$

Se  $C$  appartiene sia ad  $A$  che a  $B$  questo elemento è unico NB: l'assioma di continuità vale per i numeri reali  $\mathbb{R}$  ma non vale per i razionali  $\mathbb{Q}$  ad esempio con i due insiemi seguenti

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 0, x^2 < 2\} \quad (1)$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0, x^2 > 2\} \quad (2)$$

Unico elemento separatore è  $\sqrt{2}$ , numero che è reale

NB:  $c$  può essere unico nel caso di insiemi che hanno come intersezione  $c$  stesso ma anche in insiemi con intersezione vuota: es  $\mathbb{R}^-$  e  $\mathbb{R}^+$

### Definizione 3: *Densità degli insiemi*

Siano  $A$  e  $B$  insiemi non vuoti. Si dice che  $A$  è denso in  $B$  se per ogni elemento  $b_1, b_2 \in B$  esiste un elemento in  $A$  tale che  $b_1 \leq a \leq b_2$

### Definizione 4: *Maggiorante e minorante*

Si dice che un numero  $k$  reale è un maggiorante del sottoinsieme  $A$  se  $k \geq a \forall a \in A$   
Si dice che un numero  $k$  reale è un minorante del sottoinsieme  $A$  se  $k \leq a \forall a \in A$

NB: maggioranti e minoranti non devono esistere necessariamente ad esempio in  $\mathbb{R}^+$  o in  $\mathbb{N}$  non esiste maggiorante

NB: se esistono, maggioranti e minoranti non sono unici

### Definizione 5: *Insiemi limitati superiormente/inferiormente*

Dato un insieme  $A$  non vuoto questo si dice limitato superiormente se esiste un suo maggiorante

Dato un insieme  $A$  non vuoto questo si dice limitato inferiormente se esiste un suo minorante

Dato un insieme  $A$  non vuoto questo si dice limitato se esiste un suo maggiorante e un suo minorante

$$A \in \mathbb{R} \quad A \neq \emptyset \text{ è limitato se e solo se } \exists k \in \mathbb{R} \text{ t.c. } |a| \leq k \forall a \in A$$

### Definizione 6: Massimo/minimo insieme

Sia  $A \in \mathbb{R}$  non vuoto si dice che  $M \in \mathbb{R}$  è massimo di A e si indica con  $M = \max(A)$  se:

- $a \leq M \quad \forall a \in A$  ossia M è un maggiorante
- $M \in A$

NB: se un insieme ha massimo o minimo, questi sono necessariamente unici

## 5 Polinomi

$P(x)$  nella variabile x di grado k è un oggetto del tipo

$$p(x) = a_0 + \sum_{k=1}^n a_k x^k$$

### 5.1 Operazioni polinomi

#### 5.1.1 Somma Polinomi

Considero  $P(x)$  e  $Q(x)$ , rispettivamente di grado  $n$  e  $m$  con  $n \leq m$

- Completo  $P(x)$  i modo tale che abbia esponenti fino a m

$$P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + \sum_{k=n+1}^m a_k x^k$$

- Somma è uguale a:

$$(p+q)(x) = \sum_{k=0}^n (a_k + b_k) x^k$$

$$Q(x) = b_0 + \sum_{k=1}^n a_k x^k$$

#### 5.1.2 Moltiplicazione

Dato un polinomio  $P(x)$  e un fattore  $k \in \mathbb{R}$

#### 5.1.3 Moltiplicazione fra polinomi

Praticamente applico proprietà distributiva

## 5.2 Divisione fra polinomi

Dato  $P(x)$  e  $Q(x)$  con  $Q(x) \neq 0$

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

### Teorema 3: Divisione fra polinomi

Dati due polinomi  $P_1(x), P_2(x)$  di grado  $n$  e  $m$  con  $n \geq m$  esistono 2 polinomi  $Q(x)$  e  $R(x)$  tali che

$$P_1(x) = P_2(x)Q(x) + R(x)$$

Il grado di  $R$  è strettamente minore del grado di  $P_2$

### 5.2.1 Algoritmo standard divisione

- Scrivo polinomio completo (  $12x^3 + 0x^2 + x + 6$  )
- Divido grado massimo di ( $P(x)$ ) per grado massimo di  $Q(x)$
- Moltiplico risultato ottenuto e sottraggo con ultimo polinomio ottenuto a sx

Tabella 1: Divisione fra polinomi

$x^5 + 0x^4 + 2x^3 + 0x^2 + x + 3$	$x^3 + 3x$
$x^5 + 0x^4 + 3x^3 + 0x^2 + 0$	$\underbrace{x^2}_{\text{Step 1}} \quad \underbrace{-1}_{\text{Step 2}}$
$0 + 0 - x^3 + 0 + x - 3$	
$0 + 0 - x^3 + 0 + -3x + 0$	
$0 + 0 + 0 + 0 + 4x + 3$ <span style="display: block; text-align: center; font-size: small;">Resto <math>R(0)</math></span>	

### 5.2.2 Algoritmo di ruffini

Algoritmo utilizzabile solo se il divisore è di grado 1, nella forma  $D(x) = ax + c$  con  $a \neq 0$

- Scrivo polinomio da dividere completo in alto
- Scrivo opposto termine noto divisore in basso a sinistra
- Riporto il primo termine del polinomio da dividere
- Moltiplico fila in basso per termine a sinistra
- Sommo fila 1 con fila due
- Resto è cella in basso a destra

Tabella 2: Teorema di ruffini

	1	0	4	1
$\underbrace{1}_{\text{opposto termine noto divisore}}$		1	1	5
	$\underbrace{1}_{\text{riporto}}$	1	5	6

$$\frac{x^3 + 4x + 1}{(x - 1)} = (x^2 + x + 5) + \frac{6}{(x - 1)}$$

Teoremi utili:


**Teorema 4:** *Divisione per polinomio di grado 1*

Dati due polinomi  $P(x)$  e  $Q(x) = x - c$  condizione necessaria e sufficiente affinché  $P(x)$  sia divisibile per  $Q(x)$  è che  $P(c) = 0$ , in quanto posso scrivere  $P(x)$  come  $(x - c) \cdot (\dots)$

**Definizione 7:** *Radice di un polinomio*

Definizione: Se  $a$  è tale per cui  $P(a) = 0$ ,  $a$  viene detto **radice** del polinomio  $P(x)$

Esempio 2  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$



- Non è iniettiva
- Non è surgettiva

### 5.3 Dimostrazione teorema fondamentale dell'algebra

Dato un polinomio  $P(x)$  di grado  $n$ , questo ammette al massimo  $n$  radici distinte

- Passo base:  $n = 0$  quindi  $P(x) = k$  con  $k \neq 0$
- Passo induttivo: Supponiamo che il polinomio  $P(x)$  di grado  $(n + 1)$  sia divisibile per  $(x - a)$ .  $P(x)$  sarà del tipo:

$$P(x) = \underbrace{(x - a)}_{\text{Soluzione 1}} \underbrace{Q(x)}_{\text{Grado n per hp}}$$

- $P(x)$  ha dunque  $n+1$  soluzioni

## 5.4 Polinomio irriducibile

### Teorema 5: Irriducibilità dei polinomi

Un polinomio  $P$  a coefficienti reali di grado  $x \geq 1$  è detto irriducibile se non esiste un polinomio  $D$  di grado  $n$  con  $0 < m < n$  che divida esattamente  $P$

NB: nei numeri reali i soli polinomi irriducibili sono quelli di grado 1 o di grado 2 con  $\Delta$  negativo

NB: se i coefficienti del polinomio  $p(x)$  sono numeri interi, le sue radici vanno cercate fra i sottomultipli interi del termine noto di  $P(x)$ .

## 6 Funzioni e grafici

### 6.1 Grafico di una funzione

NB: Cartesio era un bastardo e bullizzava Fermat

### 6.2 Definizione operative

#### 6.2.1 Iniettività

Una funzione  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  è iniettiva se e solo se:

- $\forall \lambda \in \mathbb{R}$  l'equazione  $f(x) = \lambda$  ha al massimo una soluzione
- In modo equivalente,  $f$  è iniettiva se il suo grafico incontra ogni retta parallela all'asse delle  $x$  al più in un punto


#### 6.2.2 Surgettività

Una funzione  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  è surgettiva se e solo se:

- $\forall \lambda \in \mathbb{R}$   $f(x) = \lambda$  ha almeno una soluzione
- In modo equivalente,  $f$  è surgettiva se ogni retta parallela all'asse delle  $x$  incontra il suo grafico in almeno un punto


### 6.2.3 Esempi

Esempio 2  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$




- Non è iniettiva
- Non è surgettiva

Esempio 2  $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$




- Non è iniettiva
- E' suriettiva

Esempio 3:  $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$



- E' iniettiva
- Non è surgettiva

Esempio 3:  $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$




- E' iniettiva
- E' surgettiva

### 6.3 Operazioni sui grafici

- $f(x) \rightarrow f(x) + c$  traslazione in verticale (se  $c$  è positivo verso l'alto)
- $f(x) \rightarrow f(x + c)$  traslazione in orizzontale (se  $c$  è positivo verso sinistra)
- $f(x) \rightarrow -f(x)$  diventa speculare rispetto ad asse  $x$
- $f(x) \rightarrow f(-x)$  diventa speculare rispetto all'asse  $y$
- $f(x) \rightarrow |f(x)|$  ogni parte negativa diventa ribaltata verso l'alto
- $f(x) \rightarrow f(|x|)$  la parte del grafico con  $x \geq 0$  viene riflessa rispetto all'asse  $y$



GRAFICO:




### 6.4 Risoluzione di equazioni per via grafica

Esempio 1:

$$||x| - 1| = \frac{1}{2}$$







Esercizio: determinare al variare di  $\lambda \in \mathbb{R}$  quali sono le soluzioni dell'equazione

$$|(x+3)^3 - 2| = \lambda$$


## 7 Potenze, esponenziali, funzioni trigonometriche

### 7.1 Potenze pari







## 7.2 Potenze dispari






OSS: se una funzione  $f(x)$  è iniettiva e  $a = b$  allora  $f(a) = f(b)$ . Se  $a > b$  allora  $f(x) > f(b)$  se  $f$  è crescente

## 7.3 Esponenziale e logaritmo



$$e^x + e^y = e^{x+y} \quad (e^x)^y = e^{xy}$$

## 7.4 Funzioni trigonometriche




### 7.4.1 Inverto il seno

Il seno non è né iniettivo né surgettivo a meno che non lo consideri come:

$$f : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$$

Il coseno non è né iniettivo né surgettivo a meno che non lo si consideri come:

$$f : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$$





### 7.5 Funzioni iperboliche

$$\cosh = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \rightarrow \text{pari}$$

$$\sinh = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \rightarrow \text{dispari}$$

$$\tanh = \frac{\sinh}{\cosh} \rightarrow \text{dispari}$$





## 7.6 Formule trigonometria iperbolica

Queste formule sono molto simili alle formule della trigonometria tradizionale

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$$

$$\sinh(2x) = \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{2} = \frac{(e^x)^2 - (e^{-x})^2}{2} = \frac{(e^x - e^{-x})(e^x + e^{-x})}{2} = 2 \sinh(x) \cosh(x)$$

Formula fondamentale della trigonometria

$$\sinh^2 x = \left( \frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2 = \frac{e^2 + e^{2x} - 2}{4}$$

$$\cosh^2 x = \left( \frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 = \frac{e^2 + e^{2x} + 2}{4}$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

## 8 Esercizi

### 8.1 Esercizio 1

#### Teorema 6: *Insiemi limitati*

Se un insieme  $S \neq \emptyset$  è limitato superiormente/inferiormente esso ammette estremo superiore/inferiore

Dato un un insieme  $S$  limitato inferiormente ma non superiormente e un insieme  $L$  costituito da tutti i minoranti di  $S$  allora

$$\sup L \text{ esiste e } \sup L = \inf A$$

- L'insieme  $S$  denota tutti i maggioranti di  $L$

$$y \geq x \quad \forall y \in S, x \in L$$

- Visto che  $L$  ammette maggioranti, esso è limitato superiormente e per il teorema 8.1 ammette estremo superiore  $\sup L = \beta$

- Visto che l'insieme  $S$  denota i maggioranti di  $L$ , allora

$$\text{se } x < \beta \rightarrow x \text{ non è maggiorante} \rightarrow x \notin S$$

al contrario, tuttavia

$$\text{se } x \in S \rightarrow x \geq \beta \rightarrow \beta \text{ è minorante di } S$$

- Se prendo  $\epsilon > \beta$  so che questa non appartiene a  $L$  in quanto è più grande di un suo maggiorante, dunque

$$\text{se } \epsilon > \beta \rightarrow \epsilon \notin L \rightarrow \text{non è minorante di } S$$

- Dunque  $\beta$ :

1. È minorante di  $S$
2. Se  $\epsilon > \beta \rightarrow \epsilon$  non è minorante di  $S$

$\beta$  è dunque estremo inferiore di  $S$

$$\sup L = \inf S = \beta$$

## 8.2 Esercizio 2

Dato l'insieme

$$A = \left\{ a_n = \frac{\cos(\pi n)}{n^2 + 1}, \quad n \in \mathbb{N} \right\}$$

si determini limite superiore, inferiore, massimo e minimo se presenti.

- Scrivo qualche termine

$$a_0 = 1, a_1 = -\frac{1}{2}, a_2 = \frac{1}{5}, a_3 = -\frac{1}{10}, a_4 = \frac{1}{17}$$

- Osservo che

$$|a_n| > |a_{n+1}| \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

- $|a_n| = \left| \frac{\cos(\pi n)}{n^2 + 1} \right| = \frac{1}{n^2 + 1}$  in quanto  $\cos(\pi n)$  è sempre uguale a  $\pm 1$

- Risolvo disequazione  $\rightarrow$  è vera  $\forall n \in \mathbb{N}$

$$\frac{1}{n^2 + 1} \geq \frac{1}{(n+1)^2 + 1}$$

- Visto che la successione decresce in valore assoluto posso affermare che

Estremo superiore	1
Estremo inferiore	$-\frac{1}{2}$
Massimo	1
Minimo	$-\frac{1}{2}$

### 8.3 Esercizio 3

Dato l'insieme

$$A = \left\{ a_n = \frac{n^2 - 5}{n^2 + 2}, \quad n \in \mathbb{N} \right\}$$

si determini limite superiore, inferiore, massimo e minimo se presenti.

- Scrivo qualche termine

$$a_0 = \frac{5}{2}, a_1 = -\frac{4}{3}, a_2 = -\frac{1}{6}, a_3 = \frac{4}{11}$$

- Noto che termini sono crescenti e lo verifico risolvendo la disequazione:

$$\frac{(n+1)^2 - 5}{(n+1)^2 + 2} > \frac{n^2 - 5}{n^2 + 2}$$

$$\frac{14n + 7}{(n^2 + 2)((n+1)^2 + 2)} > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

- Noto che  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 5}{n^2 + 2} = 1$  dunque è probabile che 1 costituisca l'estremo superiore. Verifico che ciò è vero nel seguente modo:

- Ricordo definizione estremo:  $\beta$  è estremo superiore se:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists x \in A \text{ t.c. } x > \beta - \varepsilon$$

- Se la disequazione seguente ha soluzione per almeno un  $n \in \mathbb{N}$ , allora vuol dire che esiste un  $n \in A$  t.c.  $a_n > \beta - \varepsilon$

$$1 - \varepsilon < \frac{n^2 - 5}{n^2 + 2}$$

$$n > \left( \text{int} \right) \sqrt{\frac{7}{\varepsilon} - 2} + 1$$

- La disequazione ha soluzioni per ogni valore positivo di  $\varepsilon$  e  $\beta$  è un estremo superiore

Estremo superiore	1
Estremo inferiore	$-\frac{5}{2}$
Massimo	no
Minimo	$-\frac{5}{2}$

## 9

Numeri complessi


## 9.1

Forma cartesiana

Un numero complesso è un oggetto del tipo

$$\underbrace{a}_{\text{Parte reale}} + \underbrace{b}_{\text{Parte immaginaria}} i$$

dove  $a$  e  $b$  sono numeri reali e  $i$  è un numero tale che  $i^2 = -1$



- L'asse y è detta asse immaginaria
- Un numero con parte immaginaria nulla è detto puro

## 9.2

Somme e differenze

Dati  $z = a + bi$ ,  $w = c + di \in \mathbb{C}$  la loro somma è data da:

$$(a + c) + (b + d) i$$

## 9.3

Prodotto

Si usa la proprietà distributiva per il fatto che  $i^2 = -1$

$$z * w = (a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bd \underbrace{i^2}_{=-1}$$

## 9.4 Reciproco

Dato un numero  $z \in \mathbb{C}$ , al fine di calcolarne il reciproco  $\frac{1}{z}$  posso razionalizzare, in modo da ottenere un numero in forma cartesiana

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{a+bi} = \frac{1}{a+bi} \frac{a-bi}{a-bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$$

## 9.5 Divisione

Per effettuare una divisione fra numeri complessi trovo il reciproco del divisore e effettuo la divisione

$$\frac{c+di}{a+bi} = \frac{(ca+bd)}{a^2+b^2} + \frac{ad-b^3}{a^2+b^2}i$$

## 9.6 Definizioni

### Definizione 8: Numeri coniugati

Dato  $z = a + bi$  si dice coniugato di  $z$  e si indica con  $\bar{z}$  un numero uguale a

$$a - bi$$

◦  $z * \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2 = |z|^2$  quindi ho come conseguenza che  $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$

◦

### Definizione 9: Modulo numero complesso

Dato  $z = a + bi$  si dice il modulo di  $z$  il numero

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

## 10 Rappresentazione trigonometrica

Posso rappresentare il numero complesso  $z = a + bi$  tramite coordinate polari, ossia angolo e distanza dall'origine

Ad esempio, per un  $z \in \mathbb{C}$  che dista  $\rho$  dall'origine e con l'asse x crea un angolo di  $\theta$  so che questo numero avrà coordinate cartesiane

$$\rho \cos \theta + \rho \sin \theta$$

Se invece ho un  $z \in \mathbb{C}$  di coordinate polari  $\rho \cos \theta + \rho \sin \theta$  la rappresentazione cartesiana è

$$\begin{cases} \arctan\left(\frac{b}{a}\right) & \text{se } -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi & \text{se } \theta < -\frac{\pi}{2} \text{ o } \theta > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$



## 10.1 Argomento di un numero complesso

L'argomento di un numero complesso è l'angolo che questo formerebbe con l'asse x se rappresentato in coordinate polari

### 10.1.1 Prodotto in forma trigonometrica

$$z = \rho (\cos \theta + i \sin \theta) \quad w = r (\cos \alpha + i \sin \alpha) \\ zw = \rho r (\cos (\theta + \alpha) + i \sin (\theta + \alpha))$$

### 10.1.2 reciproco in forma trigonometrica

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{\rho (\cos (-\theta) + i \sin (-\theta))}{\rho^2} =$$

### 10.1.3 Divisione in forma trigonometrica

$$\frac{z}{w} = z * \frac{1}{w} = \dots = \frac{\rho}{r} [\cos (\theta - \alpha) + i \sin (\theta - \alpha)]$$

## 10.2 Forma esponenziale

Un numero complesso di coordinate polari  $(\rho, \theta)$  è espresso nel seguente modo:

$$z = \rho e^{i\theta}$$

Formula di passaggio fra forma trigonometrica e esponenziale:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

## 10.3 Potenza di un numero complesso

Se  $z = \rho (\cos \theta + i \sin \theta)$

$$z^n = \rho^n (\cos (n\theta) + i \sin (n\theta))$$

Se  $z = \rho e^{i\theta}$

$$z^n = \rho^n e^{in\theta}$$

**Dimostrazione per induzione**

$$z^{n+1} = z \cdot z^n = z (\rho^n (\cos (n\theta) + i \sin (n\theta))) = \rho^{n+1} \{\cos [(n+1)\theta] + i \sin [(n+1)\theta]\}$$

### 10.3.1 Esempio potenza

$$(1+i)^6$$

- Metodo 1 - faccio binomio di Newton - roba da matti

- Metodo 2 - passo a forma esponenziale  $\rho = \sqrt{2}$ ,  $\theta = \frac{\pi}{4}$

$$z = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$$

$$(1+i)^6 = \sqrt{2}^6 e^{i\frac{\pi}{4}6} = \sqrt{2}^6 e^{i\frac{3}{2}\pi} = 8e^{i\frac{3}{2}\pi} = -8i$$

$$(1+i)^{6000} = 2^{3000} e^{i\frac{\pi}{4}6000} = 2^{3000}$$

## 10.4 Radici dei numeri complessi

### Definizione 10: *Radici dei numeri complessi*

Dato un numero complesso  $a \in \mathbb{C}$ , le radici complesse n-esime sono tutti i numeri complessi  $z \in \mathbb{C}$  tali che  $z^n = a$

NB: se  $a \neq 0$  esistono sempre  $n$  numeri complessi  $z$  che verificano l'equazione  $z^n = a$ . Questi numeri coincidono con i vertici di un poligono regolare di  $n$  lati con centro nell'origine

Supponiamo che  $a = re^{i\phi}$  e  $z = \rho e^{i\theta}$ .

$$z^n = a \rightarrow \rho^n e^{in\theta} = re^{i\phi}$$

Per soddisfare uguaglianza devo avere:

- Stesso modulo  $\rho^n = r$
- Stesso argomento  $n\theta = \phi + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$

ossia rispettivamente

- $\rho = \sqrt[n]{r}$
- $\theta = \frac{\phi}{n} + 2\pi\frac{k}{n}$

NB: ottengo valori diversi solo per  $k \in [0, n-1]$

---

*Incomprensione - 11.22.37*

---


**Esercizio** Trova le radici seste di  $-i$

- Ciò corrisponde a risolvere l'equazione

$$z^n = -i$$

- $-i = 1e^{i\frac{3}{2}\pi}$
- Le soluzioni sono:

$$\begin{cases} \rho = 1 \\ 6\phi = (\frac{3}{2}\pi + 2k\pi) \end{cases}$$



## 11 Il teorema fondamentale dell'algebra

Per polinomi a coefficienti reali  $P(x)$  sapevamo che:

$P(x) = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} \dots + c_1 x^1 + c_0 \quad c_n \in \mathbb{R}$  polinomio di grado  $n$  a coefficienti reali. Ha al massimo  $n$  soluzioni.

### Definizione 11: Radice di un polinomio

Dato un polinomio a coefficienti complessi  $\alpha \in \mathbb{C}$  si dice radice di  $P(z)$  se  $P(\alpha) = 0$

### Definizione 12: Molteplicità radice

Si dice che  $\alpha \in \mathbb{C}$  è una radice di  $P(x)$  di molteplicità  $\mu \in \mathbb{N}$  se è divisibile per  $(x - \alpha)^\mu$

Per un polinomio a coefficienti complessi devi ridefinire il teorema fondamentale dell'algebra:

$P(x) = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} \dots + c_1 x^1 + c_0 \quad c_n \in \mathbb{C}$  polinomio di grado  $n$  a coefficienti complessi. Ha esattamente  $n$  soluzioni

quindi

### Teorema 7: Teorema fondamentale dell'algebra

Ogni polinomio  $p(x)$  di grado  $n$  a coefficienti complessi ha esattamente  $n$  radici complesse eventualmente contando le rispettive molteplicità

Ogni polinomio a coefficienti complessi può essere scritto come prodotto di fattori di grado 1

$$P(z) = a_k x^k \dots a_1 x + a_0 = a_n (z - \alpha_1)^{\mu_1} (z - \alpha_2)^{\mu_2}$$

dove  $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_n$  sono radici  $\in \mathbb{C}$  di  $P(z)$

#### Teorema 8: Radici complesse coniugate

Sia  $P(z)$  polinomio a coefficienti reali. Se  $z \in \mathbb{C}$  è radice di  $P(z)$  allora anche  $\bar{z}$  è radice di  $P(z)$

- Se  $\alpha \in \mathbb{C}$  è radice di  $P$  anche  $\bar{\alpha}$  è radice di  $P$
- Se  $\alpha \in \mathbb{C}$  è radice di  $P$  con molteplicità  $\mu \in \mathbb{N}$  allora  $\bar{\alpha} \in \mathbb{C}$  è radice di  $P$  con molteplicità  $\mu$

Dimostrazione:

- $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$   $P(\alpha) = 0$  per hp.
- $P(\alpha) = \sum_{k=0}^n a_k \alpha^k = 0$  i

*Incomprensione - 09:48:11*

Ogni polinomio reale di grado  $n$  è prodotto di fattori di grado 1 e di fattori irriducibili di grado 2

- I fattori di grado due rappresentano coppie di radici complesse coniugate eventualmente con molteplicità

*Incomprensione - 10:00:29*

## 12 Successione numeri reali

### 12.1 Frequenza variabili

#### Definizione 13: Frequentemente

Si dice che una variabile  $P_n$  + vera (o falsa) frequentemente se + vera per infiniti valori di  $n \in \mathbb{N}$

#### Definizione 14: Definitivamente

Si dice che una variabile  $P_n$  è definitivamente se

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } P_n \text{ vera } \forall n \geq n_0$$

NB: se una variabile è vera definitivamente lo è anche frequentemente. Ma non vale il contrario:

$$(-2)^2 \geq 7$$

- Vera frequentemente
- Falsa frequentemente
- Non è né vera né falsa definitivamente

## 12.2 Successione di numeri naturali

### Definizione 15: *Successione di numeri naturali*

E' una funzione in cui l'insieme iniziale sono i numeri naturali e l'insieme finale sono i numeri reali

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

il termine n-esimo della successione si indica con  $f_n$

NB: la seguente non è una successione:

$$a_n = \frac{1}{n - 2022}$$

in quanto per  $n = 2022$  risulta  $\frac{1}{0}$  che non è definito, per questo usiamo una definizione più accomodante

### Definizione 16: *Successione di numeri reali accomodante*

Consideriamo successione di numeri reali quelle che sono vere almeno definitivamente, ossia che siano definite da un determinato indice  $n_0$  in poi

Esempi:



- $a_n = \frac{1}{n+5}$  vera in senso classico
- $b_n = \frac{1}{n-5}$  vera in senso accomodante per  $n \geq 6$
- $c_n = \sqrt{n - 2022}$  vera in senso accomodante per  $n \geq 2022$
- $b_n = \sqrt{2022 - n}$  non è una successione  $\rightarrow \nexists n_0$  t.c.  $b_n$  vera  $\forall n \geq n_0$

## 12.3 Rappresentazione di successioni

Posso rappresentare successioni come normali funzioni, quindi traite grafico

- Tramite grafico  $(n, f(n))$

$$f(n) = a_n = \frac{1}{n}$$



- Sulla retta dei numeri reali:
- Rappresentazione dinamica: immagino di accendere una lampadina ogni tot secondi e in corrispondenza dell'accensione segno il valore della funzione

## 12.4 Limite di una successione

Una successione ha 4 possibilità:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \mathbb{R}$  ossia  $a_n \rightarrow l$ 
  - $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l^+$  ossia ha  $a_n \geq l$  definitivamente
  - $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l^-$  ossia  $a_n \leq l$  definitivamente
  - $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$  oscillando intorno al valore
- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$  ossia  $a_n \rightarrow \infty$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$  ossia  $a_n \rightarrow -\infty$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  NON esiste ossia  $a_n$  non ha limite

Definizione formale di limite

### Definizione 17: Limite infinito

Si dice che  $a_n \rightarrow +\infty$  se

$$\forall M \in \mathbb{R} \exists a_m \text{ t.c. } a_m \geq M$$

ossia  $a_m \geq M$  definitivamente

Si dice che  $a_n \rightarrow -\infty$  se

$$\forall M \in \mathbb{R} \exists a_m \leq M$$

ossia  $a_m \leq M$

**Definizione 18:** *Limite se tenda a numero finito*

Si dice che  $a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$

$$\forall \epsilon \geq 0 \quad l - \epsilon \leq a_n \leq l + \epsilon$$

ossia

$$|a_n - l| \leq \epsilon \quad \text{definitivamente}$$

**12.4.1** Errori comuni

- Se  $a_n \rightarrow \infty$  allora è definitivamente crescente. NO: potrei avere una successione che somma 2 e scende di 1 all'infinito
- Se  $a_n \rightarrow 0$  allora tende o a  $0^+$  o a  $0^-$ . NO: vedi  $\frac{(-1)^n}{n}$
- Se  $a_n$  non è limitata superiormente allora  $a_n \rightarrow \infty$ . NO: vedi  $(-2)^n$

**12.5** EsempiEsempio 1

$$a_n = n^2$$

Dimostriamo che  $a_n \rightarrow \infty$  2 casi:

- Se  $M \leq 0 \rightarrow n^2 \geq M$  sempre
- Se  $M \geq 0 \rightarrow n^2 \geq M \Leftrightarrow n \geq \sqrt{M}$

Esempio 2

$$a_n = \sqrt{n}$$

Dimostriamo che  $a_n \rightarrow \infty$  2 casi:

- Se  $M \leq 0 \rightarrow \sqrt{n} \geq M$  sempre
- Se  $M \geq 0 \rightarrow \sqrt{n} \geq M \Leftrightarrow n \geq M^2$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^a = \infty \quad \forall a \geq 0$$

Esempio 3

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0^+$$

Devo verificare che

$$\forall \epsilon > 0 \quad 0 < \frac{1}{n} \leq \epsilon$$

- $a < \frac{1}{n}$  definitivamente in quanto  $n$  è naturale
- $\frac{1}{n} \leq \epsilon \Leftrightarrow \frac{1}{\epsilon} \leq n$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha = 0 \quad \forall \alpha \leq 0$$

### Teorema 9: *Permanenza del segno*

Se  $a_n \rightarrow l > 0$  allora  $a_n > 0$  definitivamente  
 Se  $a_n \rightarrow l < 0$  allora  $a_n < 0$  definitivamente

### Dimostrazione

### 12.6 Unicità del limite

Una successione ha sempre solo uno dei comportamenti descritti in subsec 12.4 Dimostrazione

- Supponiamo che uno stesso limite tenda a due cose diverse  $a_n \rightarrow l_1$  e  $a_n \rightarrow l_2$  con  $l_1 \neq l_2$
- Per la definizione di limite il valore del limite deve ricadere in un intorno di  $l_1$  e  $l_2$ . Se questi due intervalli sono sufficientemente piccoli e dunque non hanno punti in comune dovrei avere un punto che sta in due parti contemporaneamente. Ne concludiamo che l'ipotesi sia falsa

### 12.7 Teoremi sui limiti

### Teorema 10: *Teorema del confronto a 2*

Siano  $a_n$  e  $b_n$  successioni. Supponiamo che  $a_n \geq b_n$  almeno definitivamente

- Se  $b_n \rightarrow \infty$  allora  $a_n \rightarrow \infty$
- Se  $a_n \rightarrow -\infty$  allora  $b_n \rightarrow -\infty$

### Teorema 11: *Teorema del confronto a 3 (dei due carabinieri)*

Siano  $a_n, b_n, c_n$  successioni tali che  $a_n \leq b_n \leq c_n$  almeno definitivamente. Supponiamo che  $a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$  e  $c_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$  allora  $b_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$

### 12.8 Errori comuni

- Supponiamo che a  $a_n > b_n$  e  $a_n \rightarrow l_1, b_n \rightarrow l_2$ . Allora

$$l_1 > l_2$$

- Falso in quanto al limite non si conserva l'uguale. Vedi ad esempio:

$$a_n = \frac{2}{n} \quad b_n = \frac{1}{n}$$

nonostante i termini di  $a_n$  siano sempre il doppio di quelli di  $b_n$  il loro limite è lo stesso e vale 0. Posso in caso affermare che se  $a_n > b_n$  allora  $l_1 \geq l_2$



## 12.9 Retta reale estesa

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$$

### Teorema 12: *Somma, prodotto e divisione limiti*

Siano  $a_n$  e  $b_n$  successioni reali.

$$a_n \rightarrow l_1 \in \mathbb{R} \text{ e } b_n \rightarrow l_2 \in \mathbb{R}$$

allora

$$a_n + b_n \rightarrow l_1 + l_2$$

$$a_n - b_n \rightarrow l_1 - l_2$$

$$a_n b_n \rightarrow l_1 l_2$$

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{l_1}{l_2}$$

$$a_n^{b_n} \rightarrow l_1^{l_2}$$

A meno che non si cada in uno di questi 7 casi speciali:

$$\begin{array}{ccc} +\infty - \infty & 0 \cdot (\pm\infty) & \frac{0}{0} \quad \frac{\pm\infty}{\pm\infty} \\ 0^0 & (+\infty)^0 & 1^{\pm\infty} \end{array}$$

NB: nel caso della successione di tipo  $\frac{a_n}{b_n}$  devo stare attento al modo in cui  $b_n$  tende a zero: può tendere a  $a^+$ ,  $0^-$  o a 0

## 12.10 Forma indeterminata

**Esempio 1**

$$a_n = \underbrace{n^3}_{+\infty} + \underbrace{n^2}_{+\infty} \rightarrow +\infty$$

**Esempio 2**

$$a_n = \underbrace{n^3}_{+\infty} - \underbrace{n^2}_{+\infty} = \underbrace{n^2}_{\infty} \underbrace{(n-1)}_{+\infty-1} \rightarrow +\infty$$

**Esempio 3**

$$a_n = \underbrace{\sqrt{n}}_{+\infty} - \underbrace{\frac{1}{n^3}}_0 \rightarrow +\infty$$

**Esempio 4**

$$a_n = 2^n$$

Dimostro con disuguaglianza di Bernoulli(sub 3.5):

$$2^n \geq n + 1$$

dunque visto che  $n + 1 \rightarrow \infty$  allora anche  $2^n \rightarrow \infty$  per teorema del confronto a 2(teo 12.7)

### Esempio 5

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\arctan(2^n + n!)}{n^2 + 3} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(n)}{n} = 0$$

in quanto al numeratore ho valori finiti e al denominatore valori infiniti. Posso applicare teorema dei due carabinieri:

$$\circ 0 \leq \arctan(2^n + n!) \leq \pi$$

$$\circ \text{Diviso per } n^2 + 3$$

$$0 \leq \frac{\arctan(2^n + n!)}{\underbrace{n^2 + 3}_{\rightarrow 0}} \leq \frac{\pi}{\underbrace{n^2 + 3}_{\rightarrow 0}}$$

Il mio limite deve essere compreso fra 0 e 0, quindi è = 0 per il teorema del confronto a tre (teo 12.7)

### Esempio 6

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} - \sqrt[3]{n}}{n + 10^{23}} = \frac{n^{\frac{1}{2}}(1 - n^{-6})}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}}(1 - n^{-6}) \rightarrow 0$$

## 12.11 Implicazione importante disuguaglianza di bernoulli

Dimostro che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = +\infty \quad \forall a > 1$$

◦ Noto che

$$a^n = (1 + (a - 1))^n$$

◦ questa quantità per il teorema di bernoulli è maggiore di:

$$(1 + (a - 1))^n \geq 1 + n(a - 1)$$

$$\circ \text{ Se } a > 1 \lim_{n \rightarrow \infty} n(a - 1) = +\infty$$

Se invece ho  $a \in (0, 1)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^n \quad \text{con } a \in (0, 1)$$

Visto che  $a \in (0, 1)$  posso supporre che  $a = \frac{1}{b}$  con  $b > 1$

$$a^n = \left(\frac{1}{b}\right)^n = \frac{1}{b^n} \rightarrow 0$$

## 13 Fattoriali e combinatoria

### Definizione 19: Fattoriale di un numero

Il fattoriale di un numero è definito nel seguente modo:

$$0! = 1$$

$$(n+1)! = (n+1) \cdot n!$$

in numeri  $n!$  rappresentanza il numero di modi in cui posso ordinare  $n$  oggetti

Per scegliere  $n$  persone posso pensare che

- La prima persona la posso scegliere in  $n$  modi
- La seconda in  $n - 1$
- La terza in  $n - 2$
- ... la  $k$  esima in  $n - k + 1$

quindi

n	n-1	n-2	...	n-k+1
---	-----	-----	-----	-------

### Definizione 20: Coefficiente binomiale

Dati 2 interi  $n, k$   $0 \leq k \leq n$ , posto

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Immagino di avere un esercito di  $n$  soldati e ne devo estrarre  $k$ . Non conta l'ordine con cui gli estraggo

- Il primo soldato lo posso scegliere in  $n$  modi
- Il secondo in  $n - 1$
- Il terzo in  $n - 2$
- ... il  $k$  esimo in  $n - k + 1$
- Devo poi dividere per il le permutazioni possibili visto che l'ordine non conta

$$\text{numero modi di estrarre} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!} = \binom{n}{k}$$

- Perché diviso? Pensa al fatto che ogni squadra estratta può essere disposta in  $k!$  modi, quindi  $k!$  modi vanno considerati come la stessa squadra

### 13.1 Proprietà dei fattoriali

- Scontate:

$$\begin{aligned} \binom{n}{0} &= \frac{n!}{0!n!} = 1 & \binom{n}{n} &= \frac{n!}{n!0!} = 1 \\ \binom{n}{1} &= \frac{n!}{1!(n-1)!} = \frac{n(n-1)!}{(n-1)!} = n & \binom{n}{n-1} &= \frac{n!}{(n-1)!1!} = \frac{n(n-1)!}{(n-1)!} = n \end{aligned}$$

- Simmetrica: prendere  $k$  persona da squadra di  $n$  è la stessa cosa che lasciarne fuori  $n - k$  :

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

- Generazione ricorsiva binomiale:

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$$

Dimostrazione

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k+1)(n-k-1)!} \\ &= \frac{n!}{k! \underbrace{(n-k)!}_{(n-k)(n-k-1)!}} + \frac{n!}{\underbrace{(k+1)(n-k-1)!}_{(k+1)k!}} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k-1)!} \frac{k+1+n-k}{(n-k)(k+1)} \end{aligned}$$

A livello combinatorio

- Prendo un gruppo di  $n$  persone e tengo separatamente 1
- Per formare un gruppo grande  $k+1$  posso:
  1. Creare un gruppo grande  $n$  e poi aggiungerci il nuovo arrivato
  2. Creare un gruppo grande  $n+1$  che non contenga il nuovo arrivato
- Nel primo caso posso creare  $\binom{n}{k}$  gruppi
- nel secondo caso posso create  $\binom{n}{k+1}$  gruppi

### 13.2 Il triangolo di tartaglia

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & & & \\ & & & & 1 & & 1 & & \\ & & & 1 & & 2 & & 1 & \\ & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\ 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \end{array}$$

Ogni valore è dato dalla somma dei valori dei termini sopra di esso a sinistra e a destra

Il coefficiente alla riga  $n$  nella posizione  $k$  è dato da

$$\binom{n}{k}$$

visto che il coefficiente nella posizione  $n+1, k+1$  è uguale al coefficiente nella posizione  $n, k$  e  $n, k+1$  noto che questo triangolo verifica la generazione ricorsiva binomiale:

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$$

Nello sviluppo di un binomio del tipo  $(x+y)^n$  il monomio  $x^k y^{n-k}$  ha coefficiente  $\binom{n}{k}$  ossia:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

La somma dei coefficienti alla riga  $n$  è uguale a

$$2^n$$

Dimostrazione:

- Applico sviluppo del binomio  $(x+y)^n$  con  $x=y=1$
- In questo caso so che

$$(1+1)^n = 2^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

## 14 3 criteri: rapporto, radice, rapporto-radice

### 14.1 Criterio della radice

- Sia  $a_n$  una successione tale che  $a_n \geq 0$  definitivamente
- Supponiamo che se  $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow l \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$  allora ho 3 possibilità:
  - se  $l > 1$ , allora  $a_n \rightarrow +\infty$
  - se  $l < 1$ , allora  $a_n \rightarrow 0$
  - se  $l = 1$  il criterio non fornisce informazioni

### 14.2 Criterio del rapporto

- Sia  $a_n$  una successione tale che  $a_n > 0$  definitivamente
- Supponiamo che  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$  allora ho 3 possibilità:
  - se  $l > 1$ , allora  $a_n \rightarrow +\infty$
  - se  $l < 1$ , allora  $a_n \rightarrow 0$
  - se  $l = 1$  il criterio non fornisce informazioni

### 14.3 Criterio rapporto $\rightarrow$ radice


- Sia  $a_n$  una successione tale che  $a_n > 0$  definitivamente
- Supponiamo che  $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow l \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$  allora

$$\sqrt[n]{a_n} \rightarrow l$$

ossia  $\frac{a_{n+1}}{a_n}$  e  $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow l$  tendono allo stesso  $l \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$

### 14.4 Dimostrazioni

#### 14.4.1 Dimostrazione criterio radice

- Prendo punto a metà fra 1 e  $l$  
- Visto che  $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow l$  necessariamente

$$\sqrt[n]{a_n} \geq \frac{l+1}{2}$$


- Ho quantità positive sia a sinistra che a destra, posso elevare alla  $n$  da entrambe le parti, ottenendo:

$$a_n \geq \left(\frac{l+1}{2}\right)^n$$

- Se  $l > 1$   $\left(\frac{l+1}{2}\right)^n \rightarrow \infty$

---

se invece  $l < 1$  agisco nello stesso modo:

- Prendo punto a metà fra  $l$  e 1 
- Visto che  $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow l$  necessariamente

$$\sqrt[n]{a_n} \leq \frac{l+1}{2}$$

- Ho quantità positive sia a sinistra che a destra, posso elevare alla  $n$  da entrambe le parti, ottenendo:

$$a_n \leq \left(\frac{l+1}{2}\right)^n$$

- Se  $l < 1$   $\left(\frac{l+1}{2}\right)^n \rightarrow 0$
- Siccome  $a_n \geq 0$  per ipotesi allora

$$0 \leq a_n \leq \left(\frac{l+1}{2}\right)^n$$

ossia  $a_n \rightarrow 0$  per teorema del confronto a tre

## 14.5 Numero di nepero

Il numero di nepero è definito dal seguente limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

## 14.6 Esempio forme indeterminate

### Esempio 1

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{n!} = +\infty$$

Criterio del rapporto:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^n}$$

### Esempio 2

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n^2}}{n!} = +\infty$$

Criterio del rapporto:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3^{(n+1)^2}}{(n+1)!}$$

### Esempio 3

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} =$$

Criterio rapporto radice

$$\frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}}$$

## 15 Limiti di funzioni

**Definizione 21:** *Limite di funzione*

Data una funzione  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$   $A \subseteq \mathbb{R}$  abbiamo tre tipologie di limite:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

**Primo tipo:**

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \begin{cases} l \in \mathbb{R} \\ +\infty \\ -\infty \\ \text{non esiste} \end{cases}$$

se  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$ :

$$\forall M \in \mathbb{R} \quad \exists k \in \mathbb{R} \text{ t.c. } f(x) \geq M \forall x \geq k$$

se  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$ :

$$\forall M \in \mathbb{R} \quad \exists k \in \mathbb{R} \text{ t.c. } f(x) \leq M \forall x \geq k$$

se  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$ :

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists k \in \mathbb{R} \text{ t.c. } l - \epsilon \leq f(x) \leq l + \epsilon \quad \forall x \geq k$$

ossia

$$|f(x) - l| \leq \epsilon$$

se  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l^+$ :

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists k \in \mathbb{R} \text{ t.c. } l < f(x) \leq l + \epsilon \quad \forall x \geq k$$

se  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l^-$ :

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists k \in \mathbb{R} \text{ t.c. } l - \epsilon \leq f(x) \leq l \quad \forall x \geq k$$

**Secondo tipo:** molto simile a primo, semplicemente speculare

**Terzo tipo:**

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \begin{cases} l \in \mathbb{R} \\ +\infty \\ -\infty \text{ non esiste} \end{cases}$$

se  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ :

$$\forall M \in \mathbb{R} \quad \exists \delta > 0 \text{ t.c. } f(x) \geq M \quad \forall x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \setminus \{x_0\}$$

se  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R}$ :

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \text{ t.c. } |f(x) - l| \leq \epsilon \text{ se } x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \setminus \{x_0\}$$



## 15.1 Continuità

### Definizione 22: *Continuità*

Una funzione  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  con  $A \subseteq \mathbb{R}$  si dice continua in un punto  $x_0 \in A$  se:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

OSS:

- Si dice che  $f$  è continua in  $A$  se essa è continua in ogni punto di  $A$
- Le funzioni elementari sono sempre continue sul loro dominio
- Se faccio operazioni algebriche su funzioni continue ottengo funzioni continue
- La composizione di funzioni continue è continua

## 15.2 Limiti notevoli

Limiti "nonni"

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1 \quad (3)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \quad (4)$$

Limiti "di seconda generazione"

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \log(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \log(a)$$

## 15.3 Cambio di variabile

**Esempio 1**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{x^2}$$

pongo  $y = x^2$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{x^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin(y)}{y} = 1$$

**Esempio 2**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin(x)} - 1}{\sin(x)}$$

pongo  $y = \sin(x)$  ; se  $x \rightarrow 0 \Rightarrow \sin(x) \rightarrow 0 \Rightarrow y \rightarrow 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin(x)} - 1}{\sin(x)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y}$$

### Esempio 3

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\log(1 + \sin(x))}{\sin(x)}$$

pongo  $y = \sin(x)$  ; se  $x \rightarrow \pi \Rightarrow \sin(x) \rightarrow 0 \Rightarrow y \rightarrow 0$

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\log(1 + \sin(x))}{\sin(x)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\log(1 + y)}{y}$$

### Esempio 4

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$$

moltiplico e divido per  $1 + \cos(x)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1 - \cos(x)}{x^2} \cdot \frac{1 + \cos(x)}{1 + \cos(x)} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2(x)}{x^2} \cdot \frac{1}{1 + \cos(x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin(x)}{x} \right)^2 \cdot \frac{1}{1 + \cos(x)} = 1 \cdot \frac{1}{2} \end{aligned}$$

### Limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$$

pongo  $x = \log(y + 1)$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\log(1 + y)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\underbrace{\log(1 + y)}_y}$$

limite notevole

### Limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$$

pongo  $a^x = x \log(a)$

$$\frac{e^{x \log(a)}}{x}.$$

## 15.4

### Ordini di infiniti

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\log(x))^a}{x^b} = 0 \quad \forall e > 0, b > 0$$

dimostro facendo cambi di variabile (impongo  $y = \log(x)$ )

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \log(x) = 0$$

pongo  $y = \frac{1}{x}$

### 15.5 Dimostrazione $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$

- Sappiamo che vale la seguente disuguaglianza:

$$\sin(x) \leq x \leq \tan(x)$$

- Divido per  $\sin(x)$

$$1 \leq \frac{x}{\sin(x)} \leq \frac{1}{\cos(x)}$$

### 15.6 Altri esempi

#### Esempio 1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(\cos(x))}{x^2}$$

◦

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(\cos(x))}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(\cos(x) + 1 - 1)}{x^2}$$

- Moltiplico e divido per  $\cos(x) - 1$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 + (\cos(x) - 1))}{\cos(x) - 1} \cdot \frac{\cos(x) - 1}{x^2}$$

- Ottengo due limiti notevoli

#### Esempio 2

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos(x))^{\frac{1}{x^2}}$$

- Ricordo che  $A^B = e^{B \log A}$

◦

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos(x))^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x^2} \log(\cos(x))}$$

#### Esempio 3

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan(x)} - \cos(x) + \arctan(2x)}{x}$$

- Sommo e sottraggo 1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan(x)} - 1 + 1 - \cos(x) + \arctan(2x)}{x}$$

- Quindi ottengo limiti notevoli:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan(x)} - 1}{x} + \frac{1 - \cos(x)}{x} + \frac{\arctan(2x)}{x}$$

- Moltiplico e divido numeratori e demonimatori per ottenere limiti notevoli

#### Esempio 4

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(1 + 2^x)}{x}$$

- Se  $x \rightarrow +\infty$  l'uno diventa insignificante. Quindi:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(1 + 2^x)}{x} = \frac{\log(2^x)}{x} = \frac{x \log(2)}{x} = \log(2)$$

- Rigorosamente potrei raccogliere a fattor comune il  $2^x$

## 15.7 Dimostrare non esistenza di un limite

### Definizione 23: *Sottosuccessione*

Data una successione  $a_n$  una sottosuccessione è composta da tutti i termini con indice crescente selezionati secondo una data regola

### Teorema 13: *Esistenza di un limite di una successione*

Sia  $a_n$  una successione di numeri reali e sia  $a_{k_n}$  la regola che descrive come scelgo la sottosuccessione. Supponiamo che  $a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$  allora

$$a_{k_n} \rightarrow l$$

se  $a_n$  non ha limite non posso dire nulla riguardo a  $a_{n_k}$

Esempio: se voglio dimostrare che una successione non ha limite posso cercare due sottosuccessioni che non convergono verso lo stesso limite

$$e_n = (-)^n \rightarrow \text{non ha limite}$$

$$a_{2n} = (-1)^{2n} \rightarrow 1, 1, 1, 1, 1 \rightarrow 1$$

$$a_{2n+1} = (-1)^{2n+1} = -1, -1, -1, -1, -1 \rightarrow -1$$

per questo motivo visto che  $l_1 \neq l_2$ ,  $a_n$  non ha limite

$$a_n = \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)$$

$$a_{2n} = \sin(n\pi) = 0, 0, 0, 0, 0 \rightarrow$$

## 16 Numero di nepero

Per dimostrare che la successione  $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  converge al numero di nepero servono dei prerequisiti e dei teoremi

### Definizione 24: *Crescenza/decrecenza di una successione*

Una successione  $a_n$  si dice:

- Debolmente crescente se  $a_{n+1} \geq a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$
- Strettamente crescente se  $a_{n+1} > a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$

La stessa cosa vale per la decrecenza

OSS: una funzione è debolmente crescente se e solo se per ogni  $m > n$  anche  $a_m \geq a_n$   
Consideriamo la successione  $e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

**Teorema 14:** *Limiti successioni crescenti*

Sia  $a_n$  una successione debolmente crescente. Allora abbiamo 2 possibili limiti:

- $a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$
- $a_n \rightarrow +\infty$

In ogni caso il limite della successione è il  $\sup(a_n)$

**Teorema 15:** *Corollario al teorema precedente*

Sia  $a_n$  una successione

- Debolemente crescente
- Limitata superiormente

Allora

$$a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$$

NB: non necessariamente  $l = k$

**16.1** Dimostrazione definizione numero di nepero

La dimostrazione si basa su 3 proprietà della successione  $e_n$

- $E'$  sempre  $\geq 2 \forall n$
- $E'$  debolmente crescente
- $E' \leq 3 \forall n$

se so che  $e_n$  è limitata e crescente allora posso affermare che

$$e_n \rightarrow l \in [2, 3]$$

Dimostro un passo alla volta

$E'$  sempre  $\geq 2 \forall n$

- Uso disuguaglianza di Bernoulli ossia

$$(1+x)^n \geq 1+nx$$

- Pongo  $x = \frac{1}{n}$  ossia

$$e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 1 + n \frac{1}{n} \geq 2$$

$E'$  debolmente crescente

- 

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1}$$

○

$$\left(\frac{n+1}{n}\right)^n \geq \left(\frac{n}{n-1}\right)^{n-1}$$

$$\frac{(n+1)^n}{n^n} \geq \frac{n^{n-1}}{(n-1)^{n-1}}$$

○ Moltiplico e divido per  $n$  e per  $n-1$  il membro di destra

$$\frac{(n+1)^n}{n^n} \geq \frac{n^{n-1}}{(n-1)^{n-1}} \cdot \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n-1}$$

ottengo quindi

$$\frac{(n+1)^n}{n^n} \geq \frac{n^n}{(n-1)^n} \cdot \frac{n-1}{n}$$

$$\frac{(n+1)^n (n-1)^n}{n^{2n}} \geq \frac{n-1}{n}$$

○ Noto la somma per differenza al numeratore del primo menmbro

$$\frac{(n^2-1)^n}{(n^2)^n} = \left(\frac{n^2-1}{n^2}\right)^n = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \geq \frac{n-1}{n} = 1 - \frac{1}{n}$$

$$\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \geq 1 - \frac{1}{n}$$

○ Pongo  $x = -\frac{1}{n^2}$  e moltiplicando e dividendo per  $n$  a destra ottengo che

$$\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \geq 1 - \frac{1}{n} = (1+x)^n \geq 1 + nx$$

La crescita è quindi stata verificata per la disuguaglianza di bernoulli

$E' \leq 3\forall n$

○ Utilizzo binomio di Newton:

$$(x+y)^n = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

○ Pongo  $x = 1$  e  $y = \frac{1}{n}$  :

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} \frac{1}{n^k} = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k}$$

○ Sviluppando la sommatoria mi accordo di alcune cose:

$$\binom{n}{0} \frac{1}{n^0} \binom{n}{1} \frac{1}{n} + \binom{n}{2} \frac{1}{n^2} \dots$$

$$= 1 + 1 + \frac{n(n-1)}{2!} \frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \frac{1}{n^3} \dots$$

- Noto che la quantità  $\frac{n(n-1)}{n^2}$  è maggiorata da 1. Posso affermare quindi che l'uguaglianza è maggiorata dalla seguente:

$$1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots + \frac{1}{n!}$$

- Visto che si può dimostrare per induzione che  $n! \geq 2^n \forall n \in \mathbb{N}$  quest'ultima somma sarà a sua volta maggiorata dalla seguente:

$$1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n}$$

- Si può dimostrare poi per induzione che  $1 + a + a^2 + a^3 + \dots + a^{n-1} = \frac{1-a^n}{1-a}$ , quindi nel nostro caso sappiamo che:

$$1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2}} = 3$$

- Quindi  $a_n \leq 3$

Ho dimostrato dunque che

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = l \in (2, 3)$$

## 17 O-piccolo

### Definizione 25: *O-piccolo definizione 1*

Una funzione  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  è o-piccolo per  $x \rightarrow x_0$  se esiste una funzione  $\omega : A \rightarrow \mathbb{R}$  tale che

$$f(x) = g(x) \omega(x) \text{ e } \lim_{x \rightarrow x_0} \omega = 0$$

Si scrive che  $f(x) = o(g(x))$

### Definizione 26: *O-piccolo definizione 2*

Supponiamo di poter dividere per  $g(x)$ . Assumiamo quindi  $g(x) \neq 0$  tranne tutt'al più in  $x_0$  allora  $f(x) = o(g(x))$  se e solo se:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

## 17.1 Proprietà o-piccolo

### Somma e differenza di o piccoli

$$o(g) + o(g) = o(g) \quad x \rightarrow x_0$$

$$o(g) - o(g) = o(g) \quad x \rightarrow x_0$$

Dimostrazione:

Date due funzioni  $f_1(x) = o(g(x)) \quad x \rightarrow x_0$  e  $f_2(x) = o(g(x)) \quad x \rightarrow x_0$

$$\circ f_2(x) = g(x) \omega_2(x)$$

$$\circ f_1(x) + f_2(x) = g(x) \underbrace{(\omega_1(x) + \omega_2(x))}_{\omega_3 \rightarrow 0}$$

**Moltiplicazione per scalare**

$$ko(g) = o(g) \quad x \rightarrow x_0$$

$$\circ f_1(x) = g(x) \omega_1(x)$$

$$\circ kf_1(x) = g(x) \cdot k\omega(x) = g(x) \omega(x)$$

**Prodotto di o-piccoli**

$$o(g) o(g) = o(g^2) \quad x \rightarrow x_0$$

$$\circ o(g) o(g) = f(x) f(x) \omega(x) \omega(x) = (f(x))^2 \omega(x)^2$$

$$\circ = g^2 \omega(x) = o(g^2)$$

**Transitività o-piccolo**

$$f(x) = o(g(x)) \quad x \rightarrow x_0$$

$$g(x) = o(h(x)) \quad x \rightarrow x_0$$

allora

$$f(x) = o(h(x)) \quad x \rightarrow x_0$$

**Prodotto per scalare dell'argomento**

$$\text{se } f(x) = o(g(x)) \quad x \rightarrow 0$$

allora

$$f(kx) = o(g(kx))$$

## 17.2 Sviluppi al primo ordine

Mentre faccio un limite per  $x \rightarrow 0$  posso usare gli sviluppi al primo ordine per rendere tutto molto più semplice:

$$\sin(x) = x + o(x)$$

$$e^x = 1 + x + o(x)$$

$$\cos(x) = 1 + o(x)$$

$$\log(1+x) = x + o(x)$$

$$\cos(x) = 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\arctan(x) = x + o(x)$$

$$\tan(x) = x + o(x)$$

$$\arcsin(x) = x + o(x)$$

Posso dimostrarli tutti isolando il  $o(x)$  e facendo il limite per  $x \rightarrow 0$  di  $\frac{f(x)}{f(x)}$



**Definizione 27:** *Derivata con rapporto incrementale*

In un punto  $x_0$  di una funzione la derivata è definita tramite il rapporto incrementale:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$f(x)$  è derivabile in  $x_0$  se il limite esiste ed è finito

**Definizione 28:** *Derivata con o piccolo*

Dire che esiste la derivata  $f'(x_0)$  è equivalente a dire che è soddisfatta la seguente relazione:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + o(h) \quad \text{con } h \rightarrow 0$$

Dimostrazione fra le due definizioni:

- Supponiamo vera la relazione con l'o piccolo e inseriamola all'interno del rapporto incrementale:

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{f'(x_0)h + o(h)}{h} = f'(x_0) + \underbrace{\frac{o(h)}{h}}_{\rightarrow 0} = f'(x_0)$$

- Viceversa: supponiamo vero il limite del rapporto incrementale. Dimostro che

$$o(h) = f(x_0 + h) - f(x_0) - f'(x_0)h$$

- Calcolo  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{o(h)}{h}$

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - f'(x_0)h}{h} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) = f'(x_0) - f'(x_0) = 0$$

Quindi le due relazioni sono reciprocamente implicate

$$(f \pm g)' = f' \pm g'$$

$$(fg)' = f'g + fg'$$

$$(f(g(x)))' = f'(g)g'$$

$$(\lambda f)' = \lambda f'$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - g'f}{g^2}$$

### 18.1.1 Dimostrazione regole di derivazione

$$(fg)' = f'g + fg'$$

- Per definizione la derivata è il limite del rapporto incrementale:

$$f'(f(x)g(x)) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)g(x_0+h) - f(x_0)g(x_0)}{h}$$

- Aggiungo e sottraggo  $f(x_0+h)g(x_0)$

$$\frac{f(x_0+h) - \underbrace{f(x_0+h)g(x_0) + g(x_0+h)g(x_0)}_{f(x_0)g(x_0)} - f(x_0)}{h}$$

- Raccolgo primo con secondo e terzo con quarto:

$$f(x_0+h) \frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h} + g(x_0) \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

- tutto questo è uguale a:

$$f(x_0)g'(x_0) + g(x_0)f'(x_0)$$

Questo in quanto  $f$  è continua

$$(f(g(x)))' = f'(g)g'$$

- i

### 18.2 Derivate elementari

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + (\tan x)^2$$

$$(\arctan)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\arcsin)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arccos)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(a^x)' = a^x \cdot \log a$$

#### 18.2.1 Dimostrazione di derivate elementari tramite o-piccolo

$$d[e^x] = e^x$$

- $f(x_0+h) = e^{x_0+h} = e^{x_0}e^h$

- Applico sviluppi al primo ordine:

$$e^{x_0}e^h = e^{x_0}(1+h+o(h)) = e^{x_0} + e^{x_0}h + e^{x_0}o(h)$$

- Noto che

$$\underbrace{e^{x_0}}_{f(x_0)} + \underbrace{e^{x_0}}_{f'(x_0)}h + \underbrace{e^{x_0}o(h)}_{=o(h)}$$

$$\boxed{d[\sin(x)]}$$

◦  $f(x_0 + h) = \sin(x_0 + h)$

◦ Applico formula somma di seni:

$$\sin(x_0 + h) = \sin(x_0) \cos(h) + \cos(x_0) \sin(h)$$

◦ Applico sviluppo al primo ordine di  $\sin(h)$  e  $\cos(h)$

$$\sin(x_0)(1 + o(h)) + \cos(x_0)(h + o(h))$$

$$\boxed{d[\log(x_0 + h)]}$$

◦  $f(x_0 + h) = \log(x_0 + h)$

◦ Raccolgo  $x_0$  :

$$\log\left(x_0\left(1 + \frac{h}{x_0}\right)\right)$$

◦ Proprietà dei logaritmi:

$$\log(x_0) + \log\left(1 + \frac{1}{x_0}\right)$$

◦ Sviluppo al primo ordine di  $\log\left(1 + \frac{h}{x_0}\right)$  :

$$\log(x_0) + \frac{h}{x_0} + o\left(\frac{h}{x_0}\right)$$

◦ Per proprietà degli o piccoli  $o\left(\frac{h}{x_0}\right) = o(h)$

$$\underbrace{\log(x_0)}_{f(x_0)} + \underbrace{\frac{1}{x_0}h}_{f'(x_0)} + o(h)$$

19

## De l'Hopital e Taylor: pilastri della matematica

19.1

### De l'hopital

19.2

### Esempi limiti

$$\frac{x - \sin(x) + x^5}{x^3}$$

Applico de l'Hopital derivando 3 volte

$$\begin{aligned}\frac{x - \sin(x) + x^5}{x^3} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin(x) + x^5}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x) + 5x^4}{3x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) + 20x^3}{6x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x + 60x^2)}{6}\end{aligned}$$

### 19.3 Taylor

#### Teorema 16: *Formula di Taylor*

Sia  $f$  una funzione e sia  $n \in \mathbb{N}$ . Sotto opportune ipotesi esiste un polinomio di grado  $\leq n$ ,  $P_n(x)$  tale che

$$f(x) = P_n(x) + o(x^n) \quad x \rightarrow 0$$

Il polinomio  $P_n(x)$  è dato dalla seguente formula:

$$P_n(x) = \frac{f(x)}{0!} + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^n(0)}{n!}x^n$$

ossia

$$\sum_{k=0}^n \frac{f^k(0)}{k!} x^k$$

#### 19.3.1 Dimostrazione

Teorema necessario ai fini della Dimostrazione:

#### Teorema 17: *Teorema derivate di primo e secondo ordine*

Sia  $\phi$  una funzione per cui

$$\phi(0) = \phi'(0) + \phi''(0) + \dots + \phi^n(0) = 0$$

Allora

$$\phi(x) = o(x^n) \quad x \rightarrow 0$$

Dimostrazione:

- Applico definizione quasi equivalente per il caso  $n = 3$  (ovvero di fare infinite derivate):


$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\phi(x)}{x^3} \underset{\text{de l'hopital}}{=} \frac{\phi'(x)}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\phi'''(x)}{6} = 0$$

## 19.4 Tabella sviluppi di Taylor

$$\begin{aligned}
 e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots & \log(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \\
 \sin(x) &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots & \cos(x) &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots \\
 \sinh(x) &= x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \dots & \cosh(x) &= 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots \\
 \arctan(x) &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots & (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \dots + \binom{\alpha}{n}x^n + \dots
 \end{aligned}$$

Questi sviluppi si possono dimostrare applicando la definizione e calcolando la derivata, trovando la regola che detta quando questa si annulla

GRAFICO: Approssimazione seno con taylor



## 19.5 Sviluppo con Taylor $\neq 0$

**Definizione 29:** Taylor con centro in  $x_0$

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^n(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

NB: questa formula è equivalente alla formula di Taylor per  $x \rightarrow 0$  applicata su una funzione traslata orizzontalmente verso destra di  $x_0$

*Incomprensione - 10:45:02*

Come cazzo si dimostra?

- Calcolando la derivata in  $x_0$  ottengo l'approssimazione locale in  $x_0$
- Moltiplicando la derivata per  $(x - x_0)$  traslo il polinomio ottenuto verso destra di  $x_0$

**Teorema 18:** *Esistenza degli zeri*

Sia  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione continua. Supponiamo che  $f(a) \cdot f(b) < 0$  (ossia che  $a$  e  $b$  hanno segno discorde). Allora

$$\exists c \in (a, b) \text{ t.c. } f(c) = 0$$

NB: posso applicare una variante del teorema. Se  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  è continua e  $f(a) < \lambda$  e  $f(b) > \lambda$  o viceversa, allora

$$\exists x_0 \text{ t.c. } f(x_0) = \lambda$$

Posso generalizzare ulteriormente tramite il teorema dei valori intermedi:

**Teorema 19:** *Teorema del valore intermedio*

Sia  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione continua. Sia

$$L = \sup \{f(x) : x \in (a, b)\} \text{ e } l = \inf \{f(x) : x \in (a, b)\}$$

Sia  $\lambda \in \mathbb{R}$  tale che  $l < \lambda < L$ . Allora

$$\exists c \in (a, b) \text{ t.c. } f(c) = \lambda$$

Questo equivale a dire che una funzione continua in un intervallo  $[a, b]$  assume tutti i valori compresi fra il suo massimo e il suo minimo. NB: da questo teorema posso ricavare il fatto generale che se:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty \text{ e } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

oppure viceversa, allora  $f(x)$  è surgettiva

## 20.1

## Teoremi studio locale funzione

**Teorema 20:** *Criterio di monotonia 1*

Sia  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  e  $x_0 \in A$ . Supponiamo che  $f'(x) > 0$ . Allora esiste  $\delta > 0$  tale che:

- $f(x) > f(x_0) \quad \forall x \in (x_0, x_0 + \delta)$
- $f(x) < f(x_0) \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0)$

NB: l'affermazione si limita allo studio locale di una funzione. La funzione è quindi crescente ma solo localmente

**Definizione 30:** *Punto stazionario*


Sia  $f$  derivabile in  $x_0$ . Se  $f'(x_0) = 0$  allora il punto  $x_0$  è detto punto stazionario

NB: ho 5 possibili punti stazionari:

- Punto di massimo
- Punto di minimo
- Flesso a tangenza orizzontale ascendente
- Flesso a tangenza orizzontale discendente
- Funzioni patologiche che oscillano in a fucked-up fashion

Esempio di quest'ultimo caso:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$




Questa funzione oscilla sempre più avvicinandosi all'origine, ma la derivata in 0 esiste ed è nulla

#### Teorema 21: Criterio delle derivate successive

Immagino di cercare la prima derivata che non si annulla in un punto  $x_0$ . Supponiamo che questa derivata sia di ordine  $k$ :

$$f'(x_0) = f''(x_0) = f'''(x_0) = \dots = f^{(k-1)}(x_0) = 0$$

ho 4 opzioni:



Dimostrazione: la dimostrazione è interessante e usa lo sviluppo di Taylor

- Calcolo sviluppo di Taylor in  $x_0$  in modo tale da approssimare concavità della funzione (vedi *sezione 19.5*)

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + o((x - x_0)^k) \quad \text{per } x \rightarrow x_0$$

- Per un valore di  $h$  molto piccolo posso calcolare il polinomio in  $x_0 + h$ , visto che non mi distaccherei troppo dall'intorno in cui il polinomio è approssimato bene:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \dots + \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}h^k + o(h^k)$$

- Noto che per ipotesi le derivate di ordine  $1, \dots, k - 1$  sono tutte nulle, quindi lo sviluppo di Taylor è il seguente:

$$f(x_0 + h) = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}h^k + o(h^k)$$

- Dividendo per  $h^k$  elimino l'o-piccolo per definizione e ottengo:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h^k} = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$$

- Noto che ho a destra la derivata  $k$ -esima di  $f$ . Riprendendo le affermazioni riguardo segno della derivata e parità di  $k$  posso osservare che, ad esempio, se  $f(x_0 + h) > f(x_0)$   $x_0$  è un punto di minimo locale. Le stesse affermazioni si possono fare per i flessi e i massimi

### Teorema 22: Teorema di Weierstrass

Sia  $f : [a, b]$  una funzione continua nell'intervallo  $[a, b]$ . Allora esistono almeno un massimo e un minimo assoluto in  $[a, b]$

Varianti Weierstrass:

- Sia  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  continua e periodica. Allora esistono MAX e MIN
- Sia  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  continua. Supponiamo che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \pm\infty$$

allora esiste MIN/MAX (rispettivamente per  $+\infty / -\infty$ )

### Teorema 23: Teorema di Rolle

Sian  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Supponiamo che

- $f$  è continua in  $[a, b]$
- $f$  è derivabile in  $(a, b)$
- $f(a) = f(b)$

allora

$$\exists x_0 \in (a, b) \text{ t.c. } f'(x_0) = 0$$



**Teorema 24: Teorema di Cauchy**

Siano  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Supponiamo che

- $f$  e  $g$  sono continue in  $[a, b]$
- $f$  e  $g$  sono derivabili in  $(a, b)$

Allora  $\exists x_0 \in (a, b)$  tale che

$$(f(b) - f(a)) g'(x_0) = (g(b) - g(a)) f'(x_0)$$

se inoltre

- $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b)$

allora  $g(b) \neq g(a)$  e dividendo per  $g'(x_0)$  ottengo

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$$

NB: se penso a teorema di Lagrange, noto che il rapporto fra le derivate è esattamente il rapporto fra i  $\Delta y$  che la funzione assume agli estremi:

$$f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad g'(x_0) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a}$$

Facendo il rapporto  $b - a$  si annulla e ottengo esattamente quanto espresso da teorema di Cauchy

Dimostrazione:

- Uso Rolle su una nuova funzione definita nel seguente modo:

$$\phi(x) = (f(b) - f(a)) g(x) - (g(b) - g(a)) f(x)$$

- Noto che

- $\phi$  è continua in  $[a, b]$  in quanto *combinazione lineare* di funzioni derivabili
- $\phi$  è derivabile in  $(a, b)$  in quanto *combinazione lineare* di funzioni derivabili
- $\phi(a) = \phi(b)$ . Basta verificare inserendo  $a$  e  $b$

- La funzione soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle ossia:

$$\phi'(x) = (f(b) - f(a)) g'(x) - (g(b) - g(a)) f'(x) = 0$$

ottengo quindi l'ipotesi 1 del teorema

**Teorema 25:** *Teorema di Lagrange*

Sia  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Supponiamo che

- $f$  è continua in  $[a, b]$
- $f$  è derivabile in  $(a, b)$

Allora  $\exists x_0 \in (a, b)$  t.c.

$$f(b) - f(a) = f'(x_0)(b - a)$$

Dimostrazione:

- Uso teorema di Cauchy con  $g(x) = x$

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(x_0)$$

**Teorema 26:** *Teorema monotonia 2*

Sia  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Supponiamo

- $f$  continuo in  $[a, b]$
- $f$  derivabile in  $(a, b)$

allora

- Se  $f'(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b) \Rightarrow f$  è strettamente crescente
- Se  $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in (a, b) \Rightarrow f$  è debolmente crescente
- Se  $f$  è strettamente crescente allora  $f_0(x) \geq 0 \quad \forall x \in (a, b)$
- Se  $f$  è debolmente crescente allora  $f_0(x) \geq 0 \quad \forall x \in (a, b)$

Dimostrazione:

- Per ipotesi  $f$  è debolmente crescente. Prendo  $x_0 \in (a, b)$

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

- Se  $f$  è crescente allora il denominatore del rapporto incrementale è positivo. Il limite per  $h \rightarrow 0^+$  è quindi positivo.

- 
- Per ipotesi  $f_0(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$
  - Applico Lagrange a  $[c, d] \subseteq [a, b]$  e ottengo:

$$f(d) - f(c) = f'(x_0)(d - c)$$

- Siccome  $f'(x) > 0$  per ipotesi e  $(d - c) > 0$  allora  $f(d) - f(c) > 0$
- Vista l'arbitrarietà nella scelta di  $d$  e  $c$  posso affermare che  $f$  è crescente

### Teorema 27: Teorema monotonia 3

Sia  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Supponiamo che

- $f$  è continua in  $[a, b]$
- $f$  è derivabile in  $(a, b)$
- $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in (a, b)$
- Non esiste alcun intervallo contenuto in  $(a, b)$  in cui  $f'$  è sempre  $= 0$ . E' possibile tuttavia che  $f'(x) = 0$  in punti isolati (*sporadicamente*)

allora

$f$  è strettamente crescente in  $(a, b)$

Dimostrazione:



- Per ipotesi  $f$  è debolmente crescente: se non fosse strettamente crescente vorrebbe dire che c'è un intervallo in cui  $f$  è costante. Questo però viola la condizione 4 per cui  $f$  è strettamente crescente

### Definizione 31: Lipschizzianità

Sia  $A \in \mathbb{R}$  e sia  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ . si dice che  $f$  è lipschizziana in  $A$  se esiste  $L \in \mathbb{R}$  tale che  $\forall x, y \in A$  si ha

$$|f(x) - f(y)| \leq L |x - y|$$

Esempi:



No, se  $x \rightarrow \infty$  la pendenza è infinita. Sì se No, se  $x \rightarrow 0$  la pendenza è infinita. Sì se considero intervallo  $[-1, 1]$  considero intervallo  $[1, +\infty)$

### Teorema 28: *Continuità e lipschizianità*

Sia  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  lipschizziana. Allora

$$f \text{ continua in } A$$

### Teorema 29: *Continuità e lipschizianità 2*

Sia  $F: A \rightarrow \mathbb{R}$  con  $A$  convesso. Allora

$$f \text{ è lipschizziana in } A \Leftrightarrow |f'(x)| \text{ è limitato}$$

in più, in quest'ultimo caso si ha che

$$L = \sup (|f'(x)| : x \in [0, 1])$$

NB:

Posso sfruttare quest'ultimo teorema per ottenere importanti disuguaglianze.

Se trovo la minima costante di lipschiz posso applicare la definizione per ottenere la disuguaglianza

## 20.2 Proprietà sviluppi taylor

### 20.2.1 Somma

Dati due sviluppi di taylor

$$f(x) = P_1(x) + o(x^n) \quad g(x) = P_2(x) + o(x^n)$$

allora lo sviluppo della somma di  $f(x)$  e  $g(x)$  è

$$P_1(x) + P_2(x) + o(x^n)$$

### 20.2.2 Prodotto

Dati due sviluppi di taylor

$$f(x) = P_1(x) + o(x^n) \quad g(x) = P_2(x) + o(x^n)$$

allora lo sviluppo del prodotto di  $f(x)$  e  $g(x)$  è

$$P_1(x) \cdot P_2(x) + o(x^n)$$

NB: quando si moltiplica  $P_1$  con  $P_2$  tutti i termini di grado  $> n$  vengono inglobati all'interno di  $o(x^n)$ , non serve quindi calcolarli

## 20.3 Composta

Dati due sviluppi di taylor

$$f(x) = P_1(x) + o(x^n) \quad g(x) = P_2(x) + o(x^n)$$

allora lo sviluppo della funzione composta  $f(g(x))$

$$P_1(x) \cdot P_2(x) + o(x^n)$$

### 20.3.1 Esempi di sviluppi

#### Esempio 1

$$\cos x + 2 \sin x$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$$

$$\begin{aligned}\cos x + 2 \sin x &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + 2x - \frac{x^3}{3} + o(x^4) \\ &= 1 + 2x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\end{aligned}$$

#### Esempio 2

$$\arctan x + \sinh x$$

$$\begin{aligned}\arctan x \cdot \sinh x &= \left( x - \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{5} + o(x^5) \right) \left( x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5) \right) \\ &= x^2 - \frac{1}{6}x^4 + o(x^5)\end{aligned}$$

NB: se venisse chiesto (come è purtroppo già accaduto) di dire quanto vale, ad esempio  $f^{(4)}(0)$  non è conveniente derivare, ci si incasina. Bisogna invece

- Calcolare lo sviluppo di Taylor con  $n = 4$
- Realizzare che il coefficiente del termine di grado 4 è uguale a  $\frac{f^{(4)}(0)}{4!}$

## 21 Convessità

### Definizione 32: Convessità/concavità sottoinsiemi

Un sottoinsieme  $A \subseteq \mathbb{R}$  si dice convesso se per ogni coppia di punti  $x, y \in A$  allora

$$[x, y] \subseteq A$$

NB: ciò accade per 3 tipi di insiemi:

- $A \cong \mathbb{R}$
- Ogni semiretta:  $(-\infty, a)$   $(-\infty, a]$   $[a, +\infty)$   $(a, +\infty)$
- Gli intervalli:  $(a, b)$   $[a, b)$   $(a, b]$   $[a, b]$

### Definizione 33: Convessità geometrica

Sia  $A \subseteq \mathbb{R}$  convesso. Una funzione  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  si dice convessa se per ogni coppia di punti  $P, Q$  nel grafico di  $f$  tutto il segmento  $PQ$  sta sopra il grafico

### Definizione 34: Convessità algebrica

Sia  $A \subseteq \mathbb{R}$ . Una funzione  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  si dice convessa se  $\forall a, b \in A \quad \forall \lambda \in [0, 1]$

$$f(\lambda a + (1 - \lambda)b) \leq \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b)$$

Interpretazione geometrica:

- la quantità  $\lambda a + (1 - \lambda)b$  con  $\lambda \in [0, 1]$  posso esprimere ogni punto compreso fra  $a$  e  $b$ :
  - $\lambda = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{a+b}{2}$
  - $\lambda = 1 \rightarrow a$
  - $\lambda = 0 \rightarrow b$
- 
- Allo stesso modo la quantità  $\lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b)$  esprime un punto compreso fra  $f(a)$  e  $f(b)$
- Per ogni valore di  $\lambda$  ottengo a sinistra  $f(c)$  mentre a destra ottengo  $g(c)$  dove  $g$  è la retta passante per  $a(f(a)), (b, f(b))$  con  $c \in [a, b]$

#### 21.1 Convessità e derivata

Sia  $A \subseteq \mathbb{R}$  convesso e sia  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ . Sappiamo che  $f''(x)$  esiste  $\forall x \in A$ . Posso affermare con certezza che:

- se  $f''(x) > 0 \forall x \in A \rightarrow f$  è strettamente crescente
- se  $f''(x) \geq 0 \forall x \in A \rightarrow f$  è debolmente crescente
- $f$  è debolmente crescente  $\Rightarrow f''(x) \geq 0 \forall x \in A$

NB: è falso affermare che

- se  $f$  è strettamente crescente  $\Rightarrow f''(x) > 0$

basti pensare alla funzione  $x^4$ . Pur essendo strettamente concava la sua derivata si annulla in 0


## 22 Teoria di integrazione

### 22.1 Come si indicano

$$\int_a^b f(x) dx$$

- $[a, b]$  zona di integrazione, cioè l'insieme in cui integriamo
- $f : [a, b]$  la funzione che si integra (integrand)
- $dx$  simbolo che indica la variabile di integrazione
- la funzione  $f$  è limitata in  $[a, b]$

## 22.2 Significato geometrico



Come in figura, l'integrale rappresenta l'area sottesa al grafico della funzione fra  $a$  e  $b$ . In questo caso è:

$$\int_a^b f(x) \, dx$$

## 22.3 Definizione formale

- Caso banale  $\rightarrow$  funzioni costanti
- Caso semi-banale  $\rightarrow$  funzioni a gradino
- Caso generale

### Caso 1:

$$f(x) = \lambda \in \mathbb{R} \quad \forall x \in [a, b]$$

In questo caso l'area è chiaramente l'area del rettangolo contenuto sotto  $f(x)$

$$\int_a^b f(x) \, dx = (b - a) \lambda$$

### Caso 2:

La funzione è costante su determinati sotto intervalli di  $[a, b]$

L'area in questo caso è chiaramente la somma dell'area di ogni rettangolo creato da ogni sotto intervallo costante di  $f(x)$

$$\int_a^b f(x) \, dx = \sum_{k=1}^n (b - a) \lambda_k$$

### Caso 3

La funzione non è né costante né a scalini ma limitata

In questo caso procedo nel seguente modo:

- Provo ad approssimare l'area del grafico sotteso alla funzione tramite funzione a scalini
- Considero rispettivamente la funzione a gradini che stima l'area dal sopra e dal sotto
- Sia  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  limitata. Si dice integrale superiore di  $f$  in  $[a, b]$

$$I^+(f, [a, b]) = \inf \left\{ \int_a^b p(x) \, dx : p : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ f. a gradino t.c. } p(x) \geq f(x) \right\}$$

Analogamente si definisce l'integrale inferiore:

$$I^-(f, [a, b]) = \sup \left\{ \int_a^b p(x) \, dx : p : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ f. a gradino t.c. } p(x) \leq f(x) \right\}$$

Fatto generale molto intuitivo:

$$I^+(f, [a, b]) \geq I^-(f, [a, b])$$

- Se accade che  $I^+(f, [a, b]) = I^-(f, [a, b])$  allora si dice che  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  è integrabile su  $[a, b]$  e il valore ottenuto si indica con in simbolo

$$\int_a^b f(x) \, dx$$

## 22.4 Teoremi integrabilità

### Teorema 30: Integrabilità funzione


I seguenti tipi di funzione sono integrabili:

- Tutte le funzioni monotone (anche non continue)
- Tutte le funzioni continue
- Tutte le funzione che hanno un numero finito di punti di discontinuità nei quali i limini destro e sinistro esistono

Dimostrazione per funzioni monotone:

- Se per un dato  $\epsilon > 0$  trovo una somma di Riemann superiore e una inferiore la cui differenza è  $< \epsilon$  sono a cavallo
- Divido il grafico di  $f(x)$  in  $n$  parti uguali e creo somma di Riemann dall'alto:
  - La somma di Riemann superiore prenderà come altezza di ogni intervallo il valore della funzione di destra
  - La somma di Riemann inferiore prenderà come altezza di ogni intervallo il valore della funzione di sinistra





## 22.5 Proprietà integrali

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx$$

$$\int_a^b \lambda f(x) \, dx = \lambda \int_a^b f(x) \, dx$$

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx$$

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx \text{ con } c \in [a, b]$$

$$\text{Se } f(x) \geq g(x) \, \forall x \in [a, b] \text{ allora } \int_a^b f(x) \, dx \geq \int_a^b g(x) \, dx$$

## 23 Calcolo di integrali e integrazione impropria

### 23.1 Teoremi e definizioni

#### Definizione 35: Primitiva di una funzione

Sia  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua. Si dice primitiva di  $f$  una qualunque funzione  $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  tale che  $F$  è derivabile in  $[a, b]$  e vale

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

#### Definizione 36: Funzione integrale

Sia  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua. Si dice funzione integrale la funzione:

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$

NB: la funzione integrale gode delle seguenti proprietà:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \Phi(b) = [\Phi(x)]_a^b$$

$$\int_c^d f(x) \, dx = \Phi(d) - \Phi(c)$$

**Teorema 31:** *Teorema della media integrale*

Sia  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua. Allora esiste almeno un punto  $c \in [a, b]$  tale che:

$$\int_a^b f(x) \, dx = f(c) (b - a)$$

**Teorema 32:** *Teorema fondamentale del calcolo integrale*

Sia  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua. Sia  $\Phi$  la sua funzione integrale. Allora

$$\Phi'(x) = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

ossia  $\Phi$  è primitiva di  $f$

Dimostrazione:

- Calcolo il rapporto incrementale di  $\Phi$  per  $h > 0$

$$\frac{\Phi(x+h) - \Phi(x)}{h} = \frac{1}{h} \left[ \int_x^{x+h} f(t) \, dt - \int_a^x f(t) \, dt \right]$$

- Noto che per addizione di integrali posso riscrivere il membro di destra come

$$\frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) \, dt$$

- Per il teorema dei valori intermedi so che esiste un punto  $c \in [x, x+h]$  tale che  $f(c) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(x) \, dx$  quindi:

$$\frac{1}{h} \cdot h \cdot f(c)$$

- Noto che se  $h \rightarrow 0$  allora  $c \rightarrow x$ , per cui  $f(c) \rightarrow f(x)$ . Questa affermazione posso farla in quanto  $f(x)$  è continua
- Se applico il limite per  $h \rightarrow 0$  al rapporto incrementale ottengo che

$$\Phi'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Phi(x+h) - \Phi(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} f(c) = f(x)$$

ho quindi dimostrato che  $\Phi$  è derivabile e che  $\Phi'(x) = f(x)$  ossia che  $\Phi$  è una primitiva di  $f$

## 23.2 Integrazione di funzioni razionali

Una funzione razionale è una funzione del tipo

$$\frac{P(x)}{q(x)}$$

Per integrare una cosa di questo tipo devo seguire 4 passaggi:

- Divisione
- Fattorizzazione del denominatore
- Risolvere sistema lineare
- Integrazione

### 23.2.0 Divisione

Se il grado di  $P$  è  $<$  del grado di  $Q$  si passa al punto 2, altrimenti divido  $P(x)$  per  $Q(x)$  ottenendo:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = A(x) + \frac{R(x)}{P(x)}$$

nota che avendo diviso, la funzione  $\frac{R(x)}{P(x)}$  ha il grado del numeratore  $<$  del grado del denominatore

**Fattorizzazione:** Scomporre il numeratore in prodotto di polinomi di primo e secondo grado con i termini di secondo grado che non sono ulteriormente scomponibili. Esempio bello:

$$x^4 + 1 = x^4 + 1 + 2x^2 - 2x^2 = (x^2 + 1)^2 - (\sqrt{2}x)^2 = (x^2 + 1 + \sqrt{2}x)(x^2 + 1 - \sqrt{2}x)$$

### 23.2.0 Fattorizzazione e sistema lineare

L'obiettivo è riscrivere la funzione razionale come somma di funzioni razionali. In generale posso avere i seguenti casi:

- Al denominatore ho solo termini di grado 1. La somma sarà del tipo

$$\frac{A}{P_1(x)} + \frac{B}{P_2(x)}$$

- Al denominatore ho dei termini di grado 2 non scomponibili. In questo caso, al di sopra di questi termini dovrò avere un polinomio generico di grado 1:

$$\frac{A}{P_1(x)} + \frac{Bx + C}{P_2(x)}$$

- Se ho fattori con molteplicità  $> 1$  devo seguire un metodo particolare spiegato dopo. In generale, ottengo qualcosa del tipo:

$$\frac{A}{P_1(x)} + \frac{Bx + C}{P_2(x)} + \frac{d}{dx} \left[ \frac{Fx^{n-1} \dots + Mx + N}{(P_1(x))^2 (P_2(x))^3} \right]$$

### 23.2.0 Esempio caso 1

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{x}{x^2 - 1} = \frac{x}{(x-1)(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}$$

Devo cercare  $A$  e  $B$  in modo tale che venga soddisfatta l'uguaglianza fra i numeratori dei polinomi:

$$x = A(x+1) + B(x-1)$$

Svolgo i conti a destra e raccolgo:

$$A(x+1) + B(x-1) = Ax + A + Bx - B = (A+B)x + A - B$$

quindi ottengo il seguente sistema lineare eguagliando i coefficienti:

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ A - B = 0 \end{cases} \rightarrow A = \frac{1}{2} \quad B = \frac{1}{2}$$

---

### 23.2.0 Esempio caso 2

Se al denominatore ho fattori di grado  $\neq 1$ , dovrò trovare il valore di 3 costanti  $A, B, C$ .  
Es:

$$\frac{2x^2 + 3}{x^3 - 1} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx + C}{x^2 + x + 1}$$

eseguendo i conti e raccogliendo:

$$\frac{(A+B)x^2 + (A-B+C)x + A-C}{(x-1)(x^2+x+1)}$$

e ottengo il sistema lineare a 3 incognite:

$$\begin{cases} A + B = 2 \\ A - B + C = 0 \\ A - C = 3 \end{cases} \rightarrow A = \frac{5}{3} \quad B = \frac{1}{3} \quad C = -\frac{4}{3}$$

Quindi, in generale, dove al denominatore ho un polinomio di grado 1 sopra avrò una costante, mentre se al denominatore ho un polinomio di grado 2, al numeratore ho un polinomio generico di grado 1:

$$\frac{x^3 + 5}{(2x+1)(x-3)(x-8)(x^2+1)(x^2+x+1)} = \frac{A}{2x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x-8} + \frac{Dx+E}{x^2+1} + \frac{Fx+G}{x^2+x+1}$$

quindi ottengo un sistema in tante incognite quanto è il grado del denominatore

---

### 23.2.0 Eempio caso 3

Se i fattori al denominatore hanno molteplicità  $> 1$  procedo nel seguente modo:

$$\frac{P(x)}{(x+1)^4(x+5)^2(x+7)(x^2+1)^3} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+5} + \frac{C}{x+7} + \frac{Dx+E}{x^2+1} + \frac{d}{dx} \left[ \frac{Fx^7 + Gx^6 + Hx^5 + Jx^4 + Kx^3 + Lx^2 + Mx + N}{(x+1)^3(x+5)(x^2+1)^2} \right]$$

Ossia:

- Scrivo fattorizzazione del denominatore e la scrivo come somma, ignorando la molteplicità di ogni termine (occhio però a non trascurare il fatto che al numeratore del termini di secondo grado andrà un polinomio di primo)
- A questo aggiungo la derivata di un polinomio in cui ho:
  - Al denominatore il prodotto dei polinomi che avevo originariamente al denominatore abbassati di un grado
  - Al numeratore la somma di  $n-1$  polinomi generici di grado  $0, \dots, n-1$  dove  $n$  è il grado del denominatore

### 23.2.0 Integrazione

Svolti i passaggi spiegati precedentemente posso ritrovarmi 3 tipi di funzioni da integrare:

- Funzioni del tipo  $\frac{k}{ax+c}$ , integrate, diventano semplici logaritmi
- Funzioni del tipo  $\frac{P_1(x)}{P_2(x)}$  dove  $p_1$  è di grado 1 e  $P_2$  è grado 2 non scomponibile, integrate, diventano arcotangenti. Devo usare completamento del quadrato al denominatore

## 23.3 Trucchetti integrazione

### 23.3.0 Integrazione radici di polinomi di secondo grado

$$\int \sqrt{1-x^2}$$

Metodo trigonometrico

- Sostituzione  $x = \sin(y)$
- Uso formule trigonometriche tenendo conto che  $1 - \sin^2(y) = \cos^2 y$

Metodo della sostituzione

- Scrivo come somma per differenza
- Sostituisco l'intera radice con uno dei due termini  $= y$  e l'altro rimane invariato. Es  $\sqrt{x^2-1} = \sqrt{(x+1)(x-1)} = y(x-1)$  i

Più in generale, se ho un polinomio con due radici reali  $\lambda, \rho$ , allora posso applicare la sostituzione:

$$\sqrt{\text{polinomio}} = y(x - \lambda) \quad \text{oppure} \quad \sqrt{\text{polinomio}} = y(x - \rho)$$

$$\boxed{\int \sqrt{x^2 + 1}}$$

Metodo trigonometrico

- Sostituzione  $x = \sinh y$
- Uso formule trigonometriche tenendo conto che  $\sinh^2 + 1 = \cosh^2$
- Posso integrare  $\sinh^2 y$  in 3 modi:
  - Scrivendo esplicitamente il  $\sinh$  tramite esponenziale
  - Scrivendo la formula di duplicazione  $\sinh(2x)$
  - Utilizzo la formula per parti in maniera ciclica

Metodo della sostituzione

- Sostituzione  $\sqrt{x^2 + 1} = y + x$
- Noto che così facendo  $x^2$  sparisce e dunque posso ricavare  $x$  in funzione di  $y$

Nota che se il coefficiente di  $x^2$  non è 1, la sostituzione da fare è diversa, ad esempio

$$\int \sqrt{ax^2 + bx + c} \, dx \rightarrow \sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a}x + y$$

in modo tale che eseguendo il quadrato si elimini il termine di secondo grado

### 23.3.0 Sostituzioni parametriche

Possa "convertire" un seno o un coseno in un polinomio tramite le formule parametriche:

$$\sin x = \frac{2y}{y^2 + 1} \quad \cos x = \frac{1 - y^2}{y^2 + 1}$$

ponendo

$$y = \tan \frac{x}{2}$$

Inserendo  $\tan \frac{x}{2}$  all'interno delle due formule parametriche si può verificare che l'uguaglianza è verificata. L'integrale di  $\frac{1}{\sin(x)}$  può essere risolto in due modi:

- Formule parametriche
- Moltiplicando e dividendo per seno, ricordando che  $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$  e ponendo  $y = \cos x$

NB: i casi in cui le sostituzioni parametriche semplificano il tutto sono molto rari, quindi generalmente queste si usano come ultima spiaggia

$$\frac{1}{\cos^3(x) \sin^3(x)}$$

- Sostituzioni parametriche (troppo complicati i conti)
- Uso formula di duplicazione:  $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin(2x)$ .
  - Se la potenza ottenuta è dispari moltiplico e diviso per  $\sin(2x)$ , ottenendo potenza pari al denominatore
  - La riscrivo usando che  $\sin^2(2x) = 1 - \cos^2(2x)$
  - Integro funzione razionale con molteplicità
- Scrivo  $1 = \sin^2(x) + \cos^2(x)$

## 23.4 Integrali impropri

Ho due tipi di integrali impropri:


- Integrali calcolati su intervallo non limitato:

$$\int_a^\infty f(x) dx \quad \int_{-\infty}^a f(x) dx$$

- Integrali calcolati su intervallo limitato  $[a, b]$  in cui la funzione non è limitata in  $x = a$  o  $x = b$

Se l'integrale non ricade in nessuna di queste due categorie, posso ricondurlo ad una di esse spezzandolo in più parti.

### 23.4.0 Esempio 1




Per calcolare l'integrale seguente posso spezzarlo in due parti

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \int_{-\infty}^a e^{-x^2} dx + \int_a^{\infty} e^{-x^2} dx$$

in questo caso  $a$  deve essere necessariamente 0 in quanto in 0 la funzione non è definita

#### 23.4.0 Esempio 2



Per calcolare l'integrale


$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^4 - 1} dx$$

devo spezzarlo nei punti  $(-\infty, -3)$ ,  $(-3, -1)$ ,  $(-1, 0)$ ,  $(0, 1)$ ,  $(1, 3)$ ,  $(3, +\infty)$ :

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^4 - 1} dx = \int_{-\infty}^{-3} dx + \int_{-3}^{-1} dx + \int_{-1}^0 dx + \int_0^1 dx + \int_1^3 dx + \int_3^{+\infty} dx$$




### 23.4.0 Esempio 3



$$\int_0^5 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0} \int_a^5 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

### 23.4.0 Esempio 4



$$\int_0^5 \log(x) dx = \lim_{a \rightarrow 0} \int_a^5 \log(x) dx$$

NB: un integrale improprio, essendo per definizione un limite, può non esistere. Ad esempio  $\int_0^{+\infty} \sin(x) dx$  non esiste in quanto oscilla infinitamente

### 23.5 Teorema del confronto

Spesso, vogliamo determinare se un integrale improprio converge o meno, ma non sappiamo calcolarne una primitiva. In questi casi torna utile il teorema del confronto. L'idea è la seguente

- Determino se funzioni campione delle quali so calcolare la primitiva convergono o meno
- Utilizzo queste funzioni, confrontandole con quella di cui devo determinare la convergenza

In particolare, le funzione "campione" che useremo saranno funzioni del tipo

$$\frac{1}{x^\alpha}$$

in particolare queste funzioni vengono dette gli infiniti campione.

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx$$


- Converge se  $\alpha > 1$
- Diverge se  $\alpha \leq 1$

Se invece considero l'integrale sull'intervallo  $(0, 1)$  ho che:

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx$$

- Converge se  $\alpha < 1$
- Diverge se  $\alpha \geq 1$

Ciò risulta chiaro se osserviamo i grafici delle funzioni



**Teorema 33: Criterio del confronto**

Sia  $f(x)$  una funzione integranda, della quale voglio determinare l'ipotetica convergenza, su intervallo limitato o non. Sia  $g(x)$  un infinito campione del tipo  $\frac{1}{x^\alpha}$ . Se  $0 \leq f(x) \leq g(x)$  almeno in un intorno del problema (estremi intervallo integrazione,  $+\infty, -\infty$ ), allora:

$$\text{se } \int_E g(x) \, dx \text{ converge} \Rightarrow \int_E f(x) \, dx \text{ converge}$$

$$\text{se } \int_E f(x) \, dx \text{ diverge} \Rightarrow \int_E g(x) \, dx \text{ diverge}$$

**Teorema 34: Teorema del confronto asintotico**

Supponiamo che  $f(x) \geq 0$  e  $g(x) > 0$ . Allora se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \neq 0, \infty$$

allora l'integrale delle due funzioni si comporta nello stesso modo (convergenza/divergenza è uguale)

Se  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$

- Se  $\int_E g(x) \, dx$  converge allora  $\int_E f(x) \, dx$  converge
- Altrimenti non so dire nulla

Se  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$

- Se  $\int_E g(x) \, dx$  diverge allora  $\int_E f(x) \, dx$  diverge
- Altrimenti non so dire nulla

**23.5.0 Assoluta integrabilità**

Questo teorema può essere utile per applicare il teorema del confronto su funzioni che non sono sempre  $\geq 0$  o  $\leq 0$ .

**Teorema 35: Assoluta integrabilità**

$$\text{Se } \int_E |f(x)| \, dx \text{ converge} \Rightarrow \int_E f(x) \, dx \text{ converge}$$

$$\text{Se } \int_E |f(x)| \, dx \text{ diverge} \rightarrow \text{non posso affermare nulla}$$

Ad esempio:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x^2)}{x^3} \, dx$$

non posso utilizzare il teorema del confronto asintotico perchè il seno non è sempre positivo. Posso tuttavia analizzare la funzione

$$\int_0^{+\infty} \frac{|\sin(x^2)|}{x^3} dx$$

- Considero che la funzione integranda è maggiorata dalla funzione  $\frac{2}{x^3}$

$$\frac{|\sin(x^2)|}{x^3} \leq \frac{2}{x^3}$$

- Siccome la funzione  $\frac{2}{x^3}$  converge, allora anche  $\frac{|\sin(x^2)|}{x^3}$  converge.
- Se  $\frac{|\sin(x^2)|}{x^3}$  converge, per il teorema della assoluta integrabilità, anche  $\frac{\sin(x^2)}{x^3}$

### 23.6 Trucco dell'integrazione per parti

Se devo decretare la convergenza/divergenza di un integrale improprio posso utilizzare il metodo dell'integrazione per parti. Consideriamo il seguente esempio:

#### 23.6.0 Esempio 1

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

non posso applicare il teorema del confronto in quanto ogni funzione  $\frac{1}{x^\alpha}$  con  $\alpha \geq 1$  è definitivamente minore di  $\frac{\sin x}{x}$  e converge. Contrariamente,  $\frac{1}{x}$  è definitivamente maggiore, però diverge per  $x \rightarrow \infty$  e non posso dunque affermare nulla. Se integro per parti tuttavia:

$$\int \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{x} (-\cos x) - \int -\frac{1}{x^2} (-\cos x)$$

applicando il limite posso decretare che l'integrale converge

#### 23.6.0 Esempio 2

$$\int_0^{+\infty} \cos(x^2) dx$$

stranamente, questo integrale converge ad un numero reale. Non posso applicare assoluta integrabilità perchè, chiaramente, l'integrale del suo valore assoluto diverge. Provo moltiplicando e dividendo per  $x$  (in modo da ottenere la derivata della composta), per poi integrare per parti:

$$\int \cos(x^2) = \int \frac{1}{x} x \cos(x^2) = \left(-\frac{1}{x^2}\right) \left(\frac{1}{2} \sin(x^2)\right) - \int \left(-\frac{1}{x^2}\right) \frac{1}{2} \sin(x^2)$$

Visto che ogni membro converge, posso affermare che  $\int_0^{+\infty} \cos(x^2) dx$  converge

## 24 Equazioni differenziali

### 24.1 Definizioni

#### Definizione 37: Equazione differenziale

Con il termine equazione differenziale si intende una relazione tra una funzione incognita e le sue derivate. Posso interpretarla come una funzione di più variabili:

$$F(t, u(t), u'(t), \dots, u^{(k)}(t)) = 0$$

dove  $t, u(t), \dots, u^{(k)}(t)$  sono le incognite dell'equazione differenziale

La soluzione di un'equazione differenziale è un'equazione che risolve l'uguaglianza specificata

- **Ordine:** l'ordine di un'equazione differenziale è uguale al massimo ordine di derivazione presente nell'equazione
- **Eq. diff. in forma normale:** una eq. diff. si dice in forma normale se si può "isolare" la derivata di ordine massimo:

$$u^{(k)} = \Phi(u^{(k-1)}, \dots, u(t), t)$$

- **Eq. diff. autonoma:** se la incognita  $t$  compare solo come incognita della funzione incognita (e non come coefficiente):

$$u^{(k)} + u^{(k-1)} + \dots + u' + u = 0$$

- **Eq. diff. a variabili separabili:** se è del primo ordine, scritta in forma normale e si può scrivere nella seguente forma:

$$u' = f(t)g(u)$$

- **Eq. diff. lineare:** se la funzione  $u$  e le sue derivate non sono presenti all'interno di funzioni. Ha forma del tipo:

$$a_k(t)u^{(k)} + a_{k-1}(t)u^{(k-1)} + \dots + a_1(t)u' + a_0(t)u = f(t)$$

- $a_0(t), a_1(t), \dots, a_k(t)$  sono detti coefficienti
- $f(t)$  è detto termine noto
- Se  $f(t) = 0$  l'equazione lineare si dice omogenea
- Se  $a_0(t), a_1(t), \dots, a_k(t)$  sono costanti l'equazione è detta a coefficienti costanti

#### 24.1.0 Esempio 1

$$f'(x) = f(x)$$

Quale equazione ha la derivata uguale alla equazione stessa? Esattamente l'esponenziale. Più precisamente le soluzioni di questa equazione sono infinite ed identificate dalla seguente funzione:

$$ke^x$$

### 24.1.0 Esempio 2

$$f'(x) = -f(x)^2$$

una qualsiasi soluzione del seguente tipo risolve la seguente eguaglianza:

$$f(x) = \frac{1}{t+c}$$

### 24.1.0 Esempio 3

$$f''(x) = -f(x)$$

noto che una soluzione è  $n(x) = \cos(x)$ . La famiglia delle soluzioni è  $n(x) = c \cos(t)$ ,  $c \in \mathbb{R}$ . Ancora più in generale, ogni funzione del tipo:

$$f(x) = c_1 \cos t(x) + c_2 \cos(x)$$

soddisfa l'eguaglianza. Nota che il numero di parametri che ottengo dipende dall'ordine dell'equazione

## 24.2 Problemi di Cauchy

Negli esempi precedenti ho ottenuto le cosiddette soluzioni generali delle equazioni differenziali. Se impongo un'ulteriore condizione sulla condizione generale ottengo il valore della costante (o delle costanti) in corrispondenza del quale è risolto il problema di Cauchy.

### 24.2.0 Esempio 1

$$\begin{cases} u'(t) = u(t) \\ u(0) = 5 \end{cases}$$

- Condizione dell'equazione differenziale:  $ce^t$
- Condizione iniziale:  $u(0) = ce^0 \rightarrow c = 5$

Quindi la soluzione è  $5e^t$

### 24.2.0 Esempio 2

$$\begin{cases} u' = -u^2 \\ u(5) = 7 \end{cases}$$

- Soluzione dell'equazione differenziale:  $\frac{1}{t+c}$
- Condizione iniziale:  $u(5) = 7$

---

Nota che le condizioni delle equazioni differenziali ordinarie devono essere tante quanto è l'ordine dell'equazione differenziale: ottengo infatti un sistema in cui devo trovare il valore a tutte le costanti ottenute trovando la soluzione generale

24.2.0 Esempio 3

$$\begin{cases} u'' + 3u' = u^2 + t^2 \\ u(5) = 7 \\ u'(5) = 22 \end{cases}$$

è un problema di Cauchy.

$$\begin{cases} u'' + 3u' = u^2 + t^2 \\ u(5) = 7 \\ u'(6) = 22 \end{cases} \quad \begin{cases} u'' + 3u' = u^2 + t^2 \\ u(5) = 7 \\ u''(5) = 22 \end{cases}$$

non sono problemi di Cauchy. Più in generale

**Definizione 38:** *Problema di Cauchy*

Data un'equazione differenziale ordinaria di ordine  $n$ , un problema di Cauchy associato deve:

- Specificare le condizioni iniziali in uno stesso punto
- Specificare le condizioni iniziali per le derivate di ordine  $0, 1, \dots, n-1$

**Teorema 36:** *Teorema di esistenza*

Consideriamo il problema di Cauchy per una equazione differenziale ordinaria. Definiamo la funzione:

$$u^{(k)} = \Phi(u, u', u'', \dots, u^{(k-1)}, t)$$

Se  $\Phi$  è continua in ogni variabile allora esiste sempre almeno una soluzione

la funzione  $\Phi$  è una funzione a più variabili. La sua continuità o la sua derivabilità si decreta "congelando" tutte le variabili meno che una e studiandone continuità/derivabilità

**Teorema 37:** *Teorema di unicità*

Consideriamo il problema di Cauchy per una equazione differenziale ordinaria. Definiamo la funzione:

$$u^{(k)} = \Phi(u, u', u'', \dots, u^{(k-1)}, t)$$

Se  $\Phi$  è derivabile in tutte le variabili, allora la soluzione è unica

il cosiddetto "pennello" di Peano è un problema di Cauchy che presenta infinite soluzioni:

$$\begin{cases} u' = 3|u|^{\frac{2}{3}} \\ u(0) = 0 \end{cases}$$

La funzione  $3|u|^{\frac{2}{3}}$  non è derivabile, quindi la soluzione non è unica. Nota che sia  $u = 0$  che  $u = t^3$  sono soluzioni del problema. Il problema presenta più di una soluzione

### 24.3 Edo a variabili separabili

$$u' = f(t) g(u)$$

Per trovare la soluzione ci sono 3 passaggi:

- Separazione
- Integrazione
- Ricavare

Esempio:

$$u' = t^3 u^2$$

- Separo le variabili: metto tutto ciò che dipende da  $u$  a sinistra e tutto ciò che dipende da  $t$  a destra, usando questo trucchetto bovino:

$$\frac{du}{dt} = t^3 u^2 \rightarrow \frac{du}{u^2} = t^3 dt$$

- Integro da entrambe le parti:

$$\int \frac{du}{u^2} = \int t^3 dt \rightarrow -\frac{1}{u} = \frac{1}{4} t^4 + c$$

- Ricavo  $u$  in funzione di  $t$ :

$$u(t) = \frac{-4}{t^4 + c} \quad c \in \mathbb{R}$$

---

Se all'edo è associato un problema di Cauchy è necessario studiare la soluzione: il dominio della soluzione varia in base al valore di  $c$  trovato. Per questa ragione devo restringere il dominio della funzione trovata.

Devo restringere il dominio della funzione trovata al massimo insieme di definizione che contiene il punto indicato nella condizione iniziale

### 24.4 Tempo di vita ed esempi



### Definizione 39: Tempo di vita

Trovata la funzione  $u(t)$  soluzione di un problema di Cauchy, si dice tempo di vita l'estremo superiore dell'insieme di definizione contenente il punto  $t_0$  che esprime la condizione di esistenza.

- Se  $T = +\infty$  si dice che  $f(t)$  ha esistenza globale nel futuro
- Se  $T < +\infty$  ci sono due casi:
  - Se  $\lim_{x \rightarrow T^-} f(t) = \pm\infty \rightarrow$  blow up
  - Se non c'è blow up ma  $u(t)$  esce dal dominio di una o più funzioni presenti nell'equazione differenziale  $\rightarrow$  break down. In genere (ma non sempre) questo si traduce nella seguente condizione

$$\lim_{x \rightarrow T^-} f'(t) = \pm\infty$$

#### 24.4.0 Esempio Cauchy 1

$$\begin{cases} u' = t^3 u^2 \\ u(0) = -5 \end{cases}$$

L'edo ha soluzione

$$u(t) = \frac{-4}{t^4 + c}$$

- Determino  $c$  :

$$u(0) = -\frac{4}{c} \rightarrow c = \frac{4}{5}$$

quindi il problema di Cauchy ha soluzione  $u(t) = -\frac{4}{t^4 + \frac{4}{5}}$

- Il massimo dominio di definizione contenente  $0 \in \mathbb{R}$ , quindi  $u(t)$  ha esistenza globale sia nel passato che nel futuro

#### 24.4.0 Esempio Cauchy 2

$$\begin{cases} u' = t^3 u^2 \\ u(0) = 0 \end{cases}$$

L'edo ha soluzione

$$u(t) = \frac{-4}{t^4 + c}$$

- Determino  $c$  :

$$u(0) = -\frac{4}{c} = 0$$

Cosa faccio? Non posso risolvere l'equazione ottenuta.

In questo caso il problema di Cauchy ha una soluzione. Tale soluzione si ottiene risolvendo la condizione iniziale:

$$u(t) = 0$$

in questo modo soddisfa sia la condizione iniziale  $u(0) = 0$  e l'equazione differenziale in quanto  $u' = t^3 u^2$

#### 24.4.0 Esempio Cauchy 3

$$\begin{cases} u' = u^3 t^2 \\ u(0) = 5 \end{cases}$$

La soluzione dell'equazione differenziale è:

$$u(t) = \pm \sqrt{\frac{3}{c - 2t^3}}$$

Devo scegliere la radice positiva in quanto la condizione iniziale impone  $u(0) = 5$ . Impongo la condizione iniziale e ottengo

$$\sqrt{\frac{3}{c}} \rightarrow c = \frac{3}{25}$$

Quindi il problema di Cauchy ha soluzione

$$u(t) = \sqrt{\frac{3}{\frac{3}{25} - 2t^3}} = \sqrt{\frac{75}{3 - 50t^3}}$$

Posso procedere ora studiando la soluzione:

$$3 - 50t^3 > 0 \rightarrow t < \sqrt[3]{\frac{3}{50}}$$

La funzione è quindi definita su  $(-\infty, \sqrt[3]{\frac{3}{50}})$ . Posso dunque affermare che il tempo di vita della funzione è  $T = \sqrt[3]{\frac{3}{50}}$ . Visto che  $\lim_{t \rightarrow \sqrt[3]{\frac{3}{50}}^-} u(t) = +\infty$  la funzione ha un blow up

#### 24.4.0 Esempio Cauchy 4 parametrico

$$\begin{cases} u' = u^3 t^2 \\ u(0) = \alpha \end{cases}$$

Per quali valori di  $\alpha$  ho esistenza globale nel futuro?

Eseguo tutti i passi fatti per trovare le soluzioni del problema di Cauchy rispetto al parametro  $\alpha$  e ottengo:

$$u(t) = \pm \sqrt{\frac{3}{-2t^3 + \frac{3}{\alpha^2}}}$$

#### 24.4.0 Esempio Cauchy 4

$$\begin{cases} u' = u \sin(t) \\ u(0) = -2 \end{cases}$$

◦ Separo:

$$\frac{du}{u} = \sin(t) dt$$

- Integro:

$$\int \frac{du}{u} = \int \sin(t) dt \rightarrow \log |u| = -\cos t(t) + c$$

- Ricavo (tolgo il valore assoluto introducendo  $\pm$ ):

$$u(t) = \pm e^{-\cos(t)+c} = ce^{-\cos(t)}$$

- Determino  $c$

$$u(0) = -2 \rightarrow c = -2e$$

La soluzione al problema di Cauchy è quindi:

$$u(t) = -2e \cdot e^{-\cos(t)}$$

#### 24.4.0 Esempio 6 Cauchy

$$\begin{cases} u' = -\frac{1}{u} \\ u(0) = 4 \end{cases}$$

- Separo:

$$\frac{du}{dt} = -\frac{1}{u} \rightarrow udu = -dt$$

- Integro e ricavo:

$$u(t) = \pm \sqrt{c - 2t}$$

- Determino  $c$

$$u(0) = \pm \sqrt{c} = 4 \rightarrow c = 16 \Rightarrow c = 16$$

La soluzione al problema di Cauchy è quindi:

$$u(t) = \sqrt{16 - 2t}$$

Studio la soluzione

- La soluzione è definita se  $16 - 2t \geq 0 \rightarrow t \leq 8$
- L'intervallo massimale di esistenza del problema di Cauchy è  $(-\infty, 8)$
- Il tempo di vita è  $T = 8$
- Visto che  $\lim_{t \rightarrow T^-} u(t) = 0$ , non c'è blow-up, ma c'è break-down, infatti  $-\frac{1}{u} = -\frac{1}{\sqrt{16-2t}}$  ha dominio  $(-\infty, 8]$ , mentre la funzione soluzione, ossia  $\sqrt{16-2t}$  ha dominio  $(-\infty, 8)$ , ossia esce da dominio di definizione. Posso anche verificare con la derivata in questo caso:

$$\lim_{t \rightarrow 8^-} u(t) = 0$$

## 24.5 Equazioni differenziali lineari

Fatto generale importante: se tutti i coefficienti dell'equazione sono funzioni continue in un intervallo  $(a, b)$ , allora esiste una soluzione almeno nell'intervallo  $(a, b)$

### Teorema 38: *Spazio soluzioni equazione differenziale lineare*

L'insieme di tutte le soluzioni di una equazione differenziale lineare di ordine  $n$  omogenea ( $f(t) = 0$ ) è uno spazio vettoriale di ordine  $n$ . La soluzione dell'equazione si può dunque esprimere come combinazione lineare fra gli elementi di una sua qualsiasi base

Stringi stringe questo equivale a dire che mi ritrovo tante costanti  $c_0, c_1, \dots, c_{k-1}, c_k$  quante l'ordine della suddetta equazione

### Teorema 39: *Soluzione equazioni differenziali non omogenee*

Una equazione differenziale lineare non omogenea ha una soluzione che si può scrivere nella seguente forma:

$$u(t) = c_1 u_1(t) + c_2 u_2(t) + \dots + c_n u_n(t) + \bar{u}(t)$$

dove

- $u_1(t), \dots, u_n(t)$  sono gli elementi di una base qualsiasi dell'insieme soluzioni dell'equazione omogenea associata (ottenuta mettendo  $f(t) = 0$ )
- $\bar{u}(t)$  è una soluzione qualsiasi del sistema non omogeneo

La funzione  $\bar{u}(t)$  può essere trovata adoperando alcuni stratagemmi. In realtà però non abbiamo un metodo che ci garantisca di trovarla. Dobbiamo tendenzialmente procedere "a tentoni"

## 25 Tecniche risolutive equazioni differenziali

### 25.1 Edo lineari di primo ordine

#### 25.1.0 Equazioni a variabili separabili

La risoluzione di equazioni lineari a coefficienti costanti omogenee è immediata e si vede ad occhio:

$$au' + bu = 0 \rightarrow u' = -\frac{b}{a}u$$

l'esponenziale fornisce una soluzione a questa equazione, in particolare

$$ce^{-\frac{b}{a}t}$$

è la famiglia di soluzioni dell'equazione differenziale

### 25.1.0 Equazioni lineari non omogenee di primo ordine

Per risolvere un'equazione lineare non necessariamente autonoma del primo ordine con la seguente forma

$$u'(t) + a(t)u(t) = b(t)$$

posso utilizzare la tecnica del fattore integrante

- Trovo una primitiva qualsiasi di  $a(t)$

$$A'(t) = a(t)$$

- Moltiplico entrambi i membri dell'equazione per  $e^{A(t)}$
- Ottengo la derivata di un prodotto di funzioni a sinistra

$$u'(t)e^{A(t)} + a(t)u(t)e^{A(t)} = b(t)e^{A(t)}$$

$$d[ue^{A(t)}] = b(t)e^{A(t)}$$

- Integro da entrambe le parti e ricavo  $u(t)$

### 25.2 Edo lineari di secondo ordine

- Scrivo polinomio associato a equazione lineare
- Trovo zeri del polinomio associato
- Seguo le soluzioni in base ai seguenti casi in base al discriminante del polinomio

In particolare, avrò 3 casi a seconda del  $\Delta$  del polinomio

- $\Delta > 0$

- Ho due radici reali distinte:  $\lambda, \mu \quad \lambda \neq \mu$
- La base dell'insieme soluzione è costituita da

$$e^{\lambda t}, \quad e^{\mu t}$$

- La funzione soluzione è quindi costituita da:

$$c_1 e^{\lambda t} + c_2 e^{\mu t}$$

- $\Delta = 0$

- Ho una radice con molteplicità doppia  $\lambda$
- La base dell'insieme soluzione è costituita da:

$$e^{\lambda t}, \quad t e^{\lambda t}$$

- La funzione soluzione è quindi costituita da:

$$c_1 e^{\lambda t} + c_2 t e^{\lambda t}$$

◦  $\Delta < 0$

- Il polinomio ha due radici complesse coniugate di forma  $\alpha \pm i\beta$   $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$
- La base dell'insieme soluzione è costituita da:

$$e^{\alpha t} \cos(\beta t), \quad e^{\alpha t} \sin(\beta t)$$

- La funzione soluzione è quindi costituita da:

$$c_1 e^{\alpha t} \cos(\beta t) + c_2 e^{\alpha t} \sin(\beta t)$$

## 25.2 Esempi equazioni lineari

### 25.2.0 Esempio 1

$$u'' + 3u' - 4u = 0$$

ha polinomio associato

$$x^2 + 3x - 4 \rightarrow (x + 4)(x - 1)$$

quindi ho base

$$e^{-4t}, e^t$$

### 25.2.0 Esempio 2

$$u'' - 6u' + 9u = 0 \rightarrow x^2 - 6x + 9 = 0 \rightarrow (x - 3)^2 = 0$$

che ha quindi base

$$e^{3t}, te^{3t}$$

### 25.2.0 Esempio 3

$$u'' + 8u' + 17u = 0 \rightarrow x^2 + 8x + 17 = 0$$

trova radici

$$x_{1/2} = -4 \pm \sqrt{16 - 17} = -4 \pm i$$

quindi ho radici complesse con  $\alpha = -4$  e  $\beta = 1$ . La base sarà:

$$e^{-4t} \cos(t), e^{-4t} \sin(t)$$

### 25.2.0 Esempio 4

$$u'' - 4u' = 0 \rightarrow x^2 - 4x = 0 \rightarrow x(x - 4)$$

Quindi ho base associata

$$e^{0t} = 1, e^{4t}$$

### 25.2.0 Esempio 5

$$u'' - 4u = 0 \rightarrow x^2 - 4 = 0 \rightarrow (x - 2)(x + 2) = 0$$

Quindi ho base associata

$$e^{2t}, e^{-2t}$$

NB: se la base è del tipo  $e^{\alpha t}, e^{-\alpha t}$ , allora un'altra base può essere ottenuta dividendo i componenti della base per 2:

$$\frac{e^{2t} + e^{-2t}}{2} = \cosh(2t), \quad \frac{e^{2t} - e^{-2t}}{2} = \sinh(2t)$$

### 25.2.0 Esempio 6

$$u'' + 4u = 0 \rightarrow x^2 + 4 = 0$$

il polinomio associato ha due radici complesse coniugate  $x_{1/2} = \pm 2i$ . Quindi  $\alpha = 0$  e  $\beta = 2$  e la base sarà

$$e^{0t} \cos(2t) = \cos(2t), e^{0t} \sin(2t) = \sin(2t)$$

## 25.3 Equazioni lineari omogenee di ordine $m$

Generalizzando quanto detto nella *sezione 25.1* e *25.2* posso ragionare cercando gli elementi della base della famiglia delle soluzioni seguendo le seguenti regole.

Innanzitutto, per il teorema fondamentale dell'algebra, un polinomio di grado  $n$  ha sempre  $n$  radici complesse

- Una radice reale  $\lambda$  di molteplicità 1 produce un elemento di forma

$$e^{\lambda t}$$

- Una radice reale  $\lambda$  di molteplicità  $m$  produce  $m$  elementi della seguente forma:

$$e^{\lambda t}, te^{\lambda t}, t^2 e^{\lambda t}, \dots, t^{m-1} e^{\lambda t}$$

- Una coppia di radici complesse coniugate di forma  $\alpha \pm i\beta$  con molteplicità 1 produce 2 elementi di base:

$$e^{\alpha t} \cos(\beta t), e^{\alpha t} \sin(\beta t)$$

- Una coppia di radici complesse coniugate di forma  $\alpha \pm i\beta$  con molteplicità  $m$  produce  $2m$  elementi di base con forma:

$$e^{\alpha t} \cos(\beta t), e^{\alpha t} \sin(\beta t), te^{\alpha t} \cos(\beta t), te^{\alpha t} \sin(\beta t), \dots, t^{m-1} e^{\alpha t} \cos(\beta t), t^{m-1} e^{\alpha t} \sin(\beta t)$$

## 25.4 Equazioni lineari non omogenee

### 25.4.0 Tipo esponenziale

Per risolvere equazioni differenziali non omogenee del tipo

$$au'' + bu' + cu = e^{\lambda_1 t}$$

bisogna procedere a tentoni, prendendo come funzione (che tipo di funzioni, tramite loro combinazioni lineari, possono darmi una funzione del tipo  $\lambda_0 e^{\lambda_1 t}$ ):

$$\bar{u}(t) = \lambda e^{\lambda_1 t}$$

- Prendo funzione  $\bar{u}(t)$  del tipo  $\lambda e^{\lambda_1 t}$
- Vedo se esiste un valore di  $\lambda$  che soddisfi l'equazione
- Ho due casi:
  - Se  $\bar{u}(t)$  non è soluzione dell'equazione omogenea associata (ossia  $au'' + bu' + cu = 0$ ). Allora posso trovare un valore di  $\lambda$  che risolva l'equazione
  - Se  $\bar{u}(t)$  è soluzione dell'equazione omogenea associata allora è impossibile trovare un valore di  $\lambda$  che soddisfi l'equazione. Devo provare con  $\bar{u}(t) = \lambda t e^{\lambda_1 t}$
  - Se non funziona nemmeno con questo devo provare con  $\bar{u}(t) = \lambda t^2 e^{\lambda_1 t}$  e così via per ogni potenza di  $t$

### 25.4.0 Tipo trigonometrico

Per risolvere equazioni differenziali non omogenee del tipo

$$au'' + bu' + cu = \sin(at) \quad au'' + bu' + cu = \cos(at)$$

devo procedere a tentoni prendendo come funzione  $\bar{u}$

$$\bar{u}(t) = \lambda \cos(at) + \mu \sin(at)$$

Alla fine otterrò una somma di seni e coseni sia a destra che a sinistra. Posso trovare i valori di  $\lambda$  e  $\mu$  risolvendo un sistema

NB: se la funzione  $\bar{u}(t)$  è soluzione del sistema omogeneo associato, devo provare moltiplicando per le potenze di  $t$ , come in *sottosezione 25.4*

### 25.4.0 Tipo polinomiale

Per risolvere equazioni differenziali non omogenee del tipo

$$au'' + bu' + cu = p(t)$$

devo procedere a tentoni prendendo come funzione  $\bar{u}$

$$\bar{u}(t) = k_1 t^n + k_2 t^{n-1} + \dots + k_{n-1} t + k_n$$

ossia il polinomio generico completo di grado  $n$ , dove  $n$  è il grado del polinomio  $p(t)$



NB: questo tentativo non funziona quando 0 è tra le radici del polinomio dell'omogenea associata

---

Se il termine noto dell'equazione differenziale è dato dalla somma di diversi tipi (esponenziale, trigonometrico, polinomiale) la soluzione sarà data dalla somma delle soluzioni. Es

Esempio:

$$u'' + 3u' - 4u = \cos(2t) + t^3 + e^{5t} + e^{-4t}$$

risolvo le equazioni differenziali non omogenee:

$$u'' + 3u' - 4u = \cos(2t)$$

$$u'' + 3u' - 4u = t^3$$

$$u'' + 3u' - 4u = e^{5t}$$

$$u'' + 3u' - 4u = e^{-4t}$$

la soluzione dell'equazione differenziale originaria è data dalla somma delle soluzioni trovate, per via della linearità

### 25.5 Metodo di variazione delle costanti

Per risolvere equazioni diff. lineari non omogenee posso utilizzare anche questo metodo oltre che il metodo "a tentoni" spiegato in *sezione 25.4*. Esempio:

$$u'' - 3u' + 2u = t$$

#### 25.5.0 Risoluzione tramite metodo "a tentoni"

○ Trovo basi soluzione omogenea

$$- x^2 - 3x + 2 = 0 \rightarrow (x - 1)(x - 2) = 0$$

$$- \text{Trovo } \lambda = 2 \text{ e } \mu = 1$$

$$- \text{La base è } e^t, e^{2t}$$

○ Trovo soluzione particolare

$$- \text{Provo con polinomio completo di primo grado } \bar{u}(t) = at + b$$

$$- 0 - 3a + 2at + 2b = t$$

$$- \text{Ottengo sistema}$$

$$\begin{cases} 2a = 1 \\ 2b - 3a = 0 \end{cases}$$

#### 25.5.0 Risoluzione tramite metodo di variazione delle costanti

Noi sappiamo quali sono le soluzioni generali dell'equazione omogenea associata. Il metodo della variazione di costanti cerca una soluzione al sistema non omogeneo variando i coefficienti della base ottenuta, rendendoli funzioni di  $t$ . Se le basi sono

$$u(t) = ae^t + be^{2t}$$

allora la funzione diventerà

$$\bar{u}(t) = a(t)e^t + b(t)e^{2t}$$

Quindi il procedimento sarà il seguente

- Trovo  $\bar{u}(t)$
- Calcolo la derivata prima  $\bar{u}'(t)$
- Impongo che la somma dei termini contenenti le derivate di  $a'(t)$  e  $b'(t)$  si annullino
- Calcolo la derivata seconda  $\bar{u}''(t)$  (ricorda di aver imposto che la somma di alcuni termini sia 0, risparmiando alcuni conti)
- Alla fine inserisco le funzioni  $\bar{u}(t)$ ,  $\bar{u}'(t)$ ,  $\bar{u}''(t)$  nell'equazione diff.
- Tutti i termini contenenti i coefficienti  $a(t)$  e  $b(t)$  si devono cancellare, in quanto sono soluzioni dell'equazione omogenea
- Ciò che rimane è un'equazione del tipo

$$a'(t)e^t + 2b'(t)e^{2t} = t$$

che metterò a sistema con l'equazione trovata ottenuta dal calcolo della derivata, imponendo che la somma dei termini contenenti le derivate  $a'(t)$  e  $b'(t)$  si annullasse

- Risolvo il sistema e trovo  $a'(t)$  e  $b'(t)$
- Integro per trovare  $a(t)$  e  $b(t)$

26

## Altri metodi risolutivi equazioni diff particolari

26.0.0

### Tecnica della riduzione di ordine

Un'equazione in cui manca il termine  $u$ , che contiene quindi solo le sue derivate, posso eseguire una sostituzione e ridurre l'ordine della edo. Esempio:

$$u'' = \frac{t}{t^2 + 1} u'$$

se sostituisco  $u' = v(t)$  ottengo un'equazione del primo ordine:

$$v'(t) = \frac{t}{t^2 + 1} v(t)$$

risolvo l'equazione diff. trovo la famiglia delle soluzioni  $v(t)$  e posso trovare  $u(t)$  integrando. In questo caso trovo che

$$v(t) = \frac{2}{2 - \log(t^2 + 1)}$$

Nota bene che la funzione non è definita per  $t = \pm\sqrt{e^2 - 1}$ . Se avessi un problema di Cauchy dovrei restringere la soluzione a uno di questi tre intervalli:  $(-\infty, -\sqrt{e^2 - 1})$ ,  $(-\sqrt{e^2 - 1}, \sqrt{e^2 - 1})$ ,  $(\sqrt{e^2 - 1}, \infty)$

$$u(t) = \int_0^t v(s) ds = \int_0^t \frac{2}{2 - \log(s^2 + 1)} ds$$

### 26.0.0 Metodo di d'Alembert

Vediamo un esempio applicato alle equazioni di Legiam

$$(1 - t^2) u'' - 2tu' + \left( n(n+1) - \frac{m}{1-t^2} \right) u = 0$$

con  $n = 1$  e  $m = 0$  ottengo:

$$(1 - t^2) u'' - 2tu' + 2u = 0 \quad \text{con } t \in (-1, 1)$$

Noto che  $u(t) = t$  è soluzione

$$0 - 2t + 2t = 0$$

### 26.0.0 Cambiamento di variabili

Ci sono delle equazioni conosciute (ad esempio quelle di eulero) del secondo ordine che si studiano per tempi positivi ad esempio:

$$t^2 u'' + btu' + cu = g(t) \quad \text{con } t > 0$$

il trucco sta nel cambiare variabile con  $t = e^s$ . Se  $u$  è soluzione allora

$$e^{2s} u''(e^s) + be^s u'(e^s) + cu(e^s) = g(e^s)$$

### 26.0 Bestiario delle edo di primo ordine

#### 26.0.0 Equazioni differenziali esatte

Si chiamano così per via di qualche cosa a me oscura che ha a che vedere con il differenziale. Faccio finta di aver capito

$$u'(t) = -\frac{P(t, u)}{Q(t, u)}$$

La soluzione in forma implicita di questo tipo di edo è data dalle soluzioni di :

$$F(t, u) = \int_{t_0}^t P(s, u) ds + \int_{u_0}^u Q(t_0, s) ds = 0$$

Esempio:

$$\begin{cases} u'(t) = -\frac{t+u}{t-3u} \\ u(0) = 1 \end{cases}$$

◦ Calcolo  $F(t, u)$ :

$$F(t, u) = \int_0^t (s+u) ds + \int_1^u (0-3s) ds$$

◦ Esegui gli integrali. Tieno ben presente che  $u$  va trattata come una costante quando integri

$$\begin{aligned} \int_0^t s ds + \int_0^t u ds + \int_1^u -3s ds &= \left[ \frac{s^2}{2} \right]_0^t + [us]_0^t - \left[ -\frac{3}{2} \right]_1^u \\ &= \frac{t^2}{2} + ut - \frac{3}{2}u^2 + \frac{3}{2} \end{aligned}$$

- Impongo  $F(t, u) = 0$

$$u_{1/2} = \frac{t \pm \sqrt{t^2 + 3(t^2 + 3)}}{3}$$

- Visto che  $u_{1/2}(0) = \pm 1$  devo scegliere la soluzione con il  $+$  visto che in caso contrario non soddisferebbe la condizione iniziale

#### 26.0.0 Equazione di bernoulli

$$u'(t) = P(t)u + Q(t)u^\alpha \quad \alpha \neq 0, 1$$

notiamo che una soluzione banale di questa equazione è  $u = 0$ . Per trovare le altre soluzioni l'idea è la seguente:

- Moltiplico ambo i membro dell'equazione per  $u^{-\alpha}$  e ottengo

$$u^{-\alpha}u'(t) = P(t)u^{1-\alpha} + Q(t)$$

- Definisco una funzione ausiliaria  $\phi = u^{1-\alpha}$ . Noto che quando derivo la funzione  $\phi$  ottengo:

$$\phi'(t) = (1 - \alpha)u^{-\alpha}u'(t) \quad \rightarrow \quad \frac{\phi'(t)}{(1 - \alpha)} = u^{-\alpha}u'(t)$$

- Sostituisco  $\phi(t)$  nel membro destro dell'equazione originaria, e  $\phi'(t)$  nel membro sinistro

$$\frac{\phi'(t)}{1 - \alpha} = P(t)\phi(t) + Q(t)$$

- Ottengo quindi un'equazione lineare che posso risolvere tramite il metodo del fattore integrante

$$\phi'(t) = (1 - \alpha)P(t)\phi(t) + (1 - \alpha)Q(t)$$