Отчет по лабораторной реботе по теме: "Численные методы решения уравнения переноса"

Латарцев Павел Б05-9026 группа 2023

1 Условие

Шаблон № 6, начальное условие «полуэллипс», $\sigma = 0.25$




Рис. 1: Схема шаблона

Начальное условие «полуэллипс»:

$$\varphi(x) = \begin{cases} \sqrt{1-100\cdot(x-0.5)^2} & \text{при } 0.4 \leqslant x \leqslant 0.6\\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$

2 Теоритическая часть

$$\alpha_{-1}^{0} - \text{ось x}, \quad \alpha_{0}^{0} - \text{ось y}$$

2.1 Система

$$\varphi(x) = \begin{cases} \alpha_{-1}^{1} \left(1 + \sigma \right) + \alpha_{-1}^{0} - \alpha_{0}^{-1} \sigma = \sigma \\ \alpha_{-1}^{1} + \alpha_{-1}^{0} + \alpha_{0}^{0} + \alpha_{0}^{-1} = 1 \\ \alpha_{-1}^{1} \left(1 + 2\sigma + \sigma^{2} \right) + \alpha_{-1}^{0} + \alpha_{0}^{-1} \sigma^{2} = \sigma^{2} \\ \alpha_{-1}^{1} \left(1 + 3\sigma + 3\sigma^{2} + \sigma^{3} \right) - \alpha_{-1}^{0} + \alpha_{0}^{-1} \sigma^{3} = -\sigma^{3} \end{cases}$$

2.2 Область монотонности положительных по Фридрихсу $\alpha_{\mu}^{\nu}\geqslant 0$ схем

$$\begin{cases} \alpha_{-1}^{0} \geqslant 0 \\ \alpha_{0}^{0} \geqslant 0 \\ \alpha_{0}^{-1} = \frac{1}{1+2\sigma} - \frac{\sigma}{1+2\sigma} \alpha_{-1}^{0} - \frac{1+\sigma}{1+2\sigma} \alpha_{0}^{0} \geqslant 0 \\ \alpha_{-1}^{1} = \frac{2\sigma}{1+2\sigma} - \frac{1+\sigma}{1+2\sigma} \alpha_{-1}^{0} - \frac{\sigma}{1+2\sigma} \alpha_{0}^{0} \geqslant 0 \end{cases}$$

2.3 Однопараметрическое множество схем 2-го порядка аппроксимации

$$\alpha_{-1}^0 = \frac{-\sigma - 1}{\sigma + 1}\alpha_0^0 + \frac{2}{\sigma + 1}$$

2.4 Единственная схема 3-го порядка аппроксимации

$$\alpha_{-1}^0 = \frac{2\sigma}{\sigma+1}, \ \alpha_0^0 = \frac{2(\sigma-1)}{\sigma+1}, \ \alpha_0^{-1} = \frac{\sigma-1}{2\sigma^2+3\sigma+1}, \ \alpha_{-1}^1 = \frac{2\sigma(\sigma-1)}{(\sigma+1)(2\sigma+1)}$$

- 2.5 Схема 2-го порядка аппроксимации наиболее близкая к множеству положительных по Фридрихсу схем
- 2.6 Рисунок для заданного шаблона и числа Куранта




Рис. 2: Рисунок для заданного шаблона и числа Куранта $\sigma = 0.25$

3 Практическая часть

3.1 Четыре вершины области монотонных схем первого порядка аппроксимации




Рис. 3: Схема: $u_m^{n+1} = 0 \cdot u_{m-1}^{n+1} + 0.25 \cdot u_{m-1}^{n} + 0.75 \cdot u_m^{n} + 0 \cdot u_m^{n-1}$




Рис. 4: Схема: $u_m^{n+1} = 0 \cdot u_{m-1}^{n+1} + 0.4 \cdot u_{m-1}^n + 0 \cdot u_m^n + 0.6 \cdot u_m^{n-1}$




Рис. 5: Схема: $u_m^{n+1} = 0.2 \cdot u_{m-1}^{n+1} + 0 \cdot u_{m-1}^n + 0.8 \cdot u_m^n + 0 \cdot u_m^{n-1}$




Рис. 6: Схема: $u_m^{n+1} = \frac{1}{3} \cdot u_{m-1}^{n+1} + 0 \cdot u_{m-1}^n + 0 \cdot u_m^n + \frac{2}{3} \cdot u_m^{n-1}$

3.2 Наименее осциллирующая на разрывных решениях схема 2-го порядка аппроксимации из (5т) (Наиболее близкая ко множеству положительных по Фридрихсу схем)




Рис. 7: Схема: $u_m^{n+1} = -0, 3 \cdot u_{m-1}^{n+1} + 0.55 \cdot u_{m-1}^{n} + 1.05 \cdot u_m^{n} + -0.3 \cdot u_m^{n-1}$

3.3 Две схемы 2-го порядка аппроксимации, лежащие на прямой – однопараметрическом множестве схем 2-го порядка аппроксимации – по разные стороны от схемы из (5т)




Рис. 8: Схема: $u_m^{n+1} = 0 \cdot u_{m-1}^{n+1} + 0.1 \cdot u_{m-1}^n + 1.5 \cdot u_m^n + -0.6 \cdot u_m^{n-1}$




Рис. 9: Схема: $u_m^{n+1} = -0, 6 \cdot u_{m-1}^{n+1} + 1 \cdot u_{m-1}^n + 0.6 \cdot u_m^n + 0 \cdot u_m^{n-1}$

3.4 Схема 3-го порядка аппроксимации




Рис. 10: Схема: $u_m^{n+1} = -0, 2 \cdot u_{m-1}^{n+1} + 0.4 \cdot u_{m-1}^{n} + 1.2 \cdot u_m^{n} + -0.4 \cdot u_m^{n-1}$