

## Clave para algunos de los Géneros del Phylum Ochrophyta en Venezuela

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 1a. Estructura interna filamentosa, uniseriada o multiseriada -----  | 2                     |
| 1b. Estructura interna pseudotisular o tisular -----   | 3                     |
| 2a. Filamentos uniseriados, con estructuras reproductivas agrupadas en filamentos especiales uniloculares o pluriloculares ----- | <b>Hincksia</b>       |
| 2b. Filamentos multiseriados, con estructuras rep. agrupadas en propágulos ---   | <b>Sphacelaria</b>    |
| 3a. Estructura interna pseudotisular, con presencia de mucílagos-----  | <b>Cladosiphon</b>    |
| 3b. Estructura interna tisular, sin presencia de mucílagos -----   | 4                     |
| 4a. Talo folioso, con presencia de filoides y criptostomas -----   | 5                     |
| 4b. Talo no folioso, sin presencia de filoides y criptostomas -----  | 6                     |
| 5a. Filoides planos -----  | <b>Sargassum</b>      |
| 5b. Filoides piramidales -----   | <b>Turbinaria</b>     |
| 6a. Hábito postrado -----  | 7                     |
| 6b. Hábito erecto -----  | 9                     |
| 7a. Talo de forma costrosa -----   | <b>Neoralfsia</b>     |
| 7b. Talo de forma globosa -----  | 8                     |
| 8a. Superficie del talo con perforaciones -----  | <b>Hydroclathrus</b>  |
| 8b. Superficie del talo sin perforaciones -----  | <b>Colpomenia</b>     |
| 9a. Talo terete o ligeramente complanado -----   | 10                    |
| 9b. Talo laminar -----   | 11                    |
| 10a. Estructura interna hueca (tubular) -----  | <b>Rosenvingeia</b>   |
| 10b. Estructura interna compacta -----   | <b>Chnoospora</b>     |
| 11a. Lámina orbicular-----   | 12                    |
| 11b. Lámina cintiforme -----   | 14                    |
| 12a. Lámina con líneas concéntricas -----  | 13                    |
| 12b. Lámina sin líneas concéntricas -----  | <b>Lobophora</b>      |
| 13a. Lámina con margen revoluto -----  | <b>Padina</b>         |
| 13b. Lámina con margen recto -----   | <b>Taonia</b>         |
| 14a. Lámina con costilla central -----   | <b>Dictyopteris</b>   |
| 14b. Lámina sin costilla central -----   | 15                    |
| 15a. Tetrasporangios con células acompañantes -----  | <b>Canistrocarpus</b> |
| 15b. Tetrasporangios sin células acompañantes -----  | <b>Dictyota</b>       |

# Árbol Taxonómico

