

Práctica 1: Lenguajes

2do cuatri 2024 - si encontrás algún error mi tg es @kztqz

Ejercicio 1

Sea $\Sigma = \{a, b\}$ un alfabeto. Hallar:

$$\Sigma^0, \quad \Sigma^1, \quad \Sigma^2, \quad \Sigma^*, \quad \Sigma^+, \quad |\Sigma|, \quad |\Sigma^0|$$

- $\Sigma^0 = \{\lambda\}$
- $\Sigma^1 = \Sigma = \{a, b\}$
- $\Sigma^2 = \{aa, ab, ba, bb\}$
- $\Sigma^* = \bigcup_{i \geq 0} \Sigma^i = \{\lambda, a, b, aa, ab, ba, bb\}$
- $\Sigma^+ = \bigcup_{i \geq 1} \Sigma^i = \{a, b, aa, ab, ba, bb\}$
- $|\Sigma| = 2$
- $|\Sigma^0| = 1$

Ejercicio 2

Decidir si, dado $\Sigma = \{a, b\}$ vale:

$$\lambda \in \Sigma, \quad \lambda \subseteq \Sigma, \quad \lambda \in \Sigma^+, \quad \lambda \in \Sigma^*, \quad \Sigma^0 = \lambda, \quad \Sigma^0 = \{\lambda\}$$

- $\lambda \in \Sigma \rightarrow \text{Falso}$
- $\lambda \subseteq \Sigma \rightarrow \text{Falso}$
- $\lambda \in \Sigma^+ \rightarrow \text{Falso}$
- $\lambda \in \Sigma^* \rightarrow \text{Verdadero}$
- $\Sigma^0 = \lambda \rightarrow \text{Falso}$
- $\Sigma^0 = \{\lambda\} \rightarrow \text{Verdadero}$

Ejercicio 3

Sea $\alpha = abb$ una cadena. Calcular:

$$\alpha^0, \quad \alpha^1, \quad \alpha^2, \quad \alpha^3, \quad \prod_{k=0, \dots, 3} \alpha^k = \alpha^0 \cdot \alpha^1 \cdot \alpha^2 \cdot \alpha^3, \quad \alpha^r$$

- $\alpha^0 = \lambda$
- $\alpha^1 = abb$

- $\alpha^2 = abb.abb$
- $\alpha^3 = abb.abb.abb = abbabbabb$
- $\prod_{k=0,\dots,3} \alpha^k = \alpha^0.\alpha^1.\alpha^2.\alpha^3 = \lambda.abb.abbabb.abbabbabb = abbabbabbabbabbabb$
- $\alpha^r = (abb)^r = bba$

Ejercicio 4

Sean las cadenas $\alpha = abb$ y $\beta = acb$. Calcular:

$$\alpha\beta, \quad (\alpha\beta)^r, \quad \beta^r, \quad \beta^r\alpha^r, \quad \lambda\alpha, \quad \lambda\beta, \quad \alpha\lambda\beta, \quad \alpha^2\lambda^3\beta^2$$

- $\alpha\beta = abbacb$
- $(\alpha\beta)^r = (abbacb)^r = bcabba$
- $\beta^r = (acb)^r = bca$
- $\beta^r\alpha^r = (acb)^r(abb)^r = bcabba$
- $\lambda\alpha = \alpha = abb$
- $\lambda\beta = \beta = acb$
- $\alpha\lambda\beta = \alpha\beta = abbacb$
- $\alpha^2\lambda^3\beta^2 = \alpha^2\beta^2 = abbabbacbacb$

Ejercicio 5

Dado un alfabeto Σ , sean $x, y \in \Sigma$ y $\alpha, \beta \in \Sigma^*$. Demostrar que:

- $|x.(y.\alpha)| = 2 + |\alpha|$
- $|\alpha^r| = |\alpha|$
- $|\alpha x \beta| = |x \alpha \beta|$
- $|\alpha.\alpha| = 2|\alpha|$
- $(\alpha.\beta)^r = \beta^r.\alpha^r$
- $(\alpha^r)^r = \alpha$
- $(\alpha^r)^n = (\alpha^n)^r$

($|\alpha|$ indica la longitud de la cadena α).

Para resolver estos ejercicios va a ser útil tener a mano estas def / demos:

- (1) Definición recursiva de la longitud:

$$|\lambda| = 0$$

$$|x.\alpha| = 1 + |\alpha|$$

- (2) Propiedad: $|\alpha + \beta| = |\alpha| + |\beta|$. Demo por inducción estructural sobre α :

1. Si $\alpha = \lambda$:

$$|\lambda.\beta| = |\beta| = 0 + |\beta| = |\lambda| + |\beta|$$

2. Si $\alpha = x.\alpha'$, suponemos que vale para α' , y:

$$\begin{aligned}
|(x.\alpha').\beta| &= |x.(\alpha'.\beta)| \quad (\text{def. } \alpha') \\
&= 1 + |\alpha'.\beta| \quad (\text{def. longitud}) \\
&= 1 + |\alpha'| + |\beta| \quad (\text{hip. ind}) \\
&= |x.\alpha'| + |\beta| \quad (\text{def. longitud}) \\
&= |\alpha| + |\beta| \quad (\text{def. } \alpha')
\end{aligned}$$

(3) Definición recursiva de la reversa:

$$\begin{aligned}
\lambda^r &= \lambda \\
(x.\alpha)^r &= \alpha^r.x
\end{aligned}$$

a. Quiero demostrar que $|x.(y.\alpha)| = 2 + |\alpha|$.

Como $x \in \Sigma$, por la definición recursiva de longitud, puedo sacarlo de la operación longitud de la cadena y sumar un 1. Lo mismo hago para $y \in \Sigma$.

$$|x.(y.\alpha)| \stackrel{(1)}{=} 1 + |y.a| \stackrel{(1)}{=} 1 + 1 + |\alpha| = 2 + |\alpha|$$

b. Quiero demostrar que $|\alpha^r| = |\alpha|$. Pruebo por inducción:

1. Caso base (si $\alpha = \lambda$):

$$|\lambda|^r \stackrel{(3)}{=} |\lambda|$$

...

continuará

Ejercicio 6

Dar ejemplos de cadenas que pertenezcan a los siguientes lenguajes:

- a. $\mathcal{L} = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$
- b. $\mathcal{L} = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$
- c. $\mathcal{L} = \{a^n b^m \mid n \geq 1 \wedge m \geq 1\}$
- d. $\mathcal{L} = \{a^n b^m \mid n \geq 1 \wedge m \geq 0\}$
- e. $\mathcal{L} = \{a^n (ac)^p (bab)^q \mid n \geq 0 \wedge q = p + 2 \wedge p \geq 1\}$
- f. $\mathcal{L} = \{a, b\}^3 \cap \Lambda$
- g. $\mathcal{L} = \{\alpha \alpha^r \mid \alpha \in \{a, b\}^+\}$
- h. $\mathcal{L} = \{\alpha \in \{a, b\}^+ \mid \alpha = \alpha^r\}$

- a. $\mathcal{L} = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$

Def. por comprensión: todas las cadenas de \mathcal{L} tienen la misma cantidad de a y b y $\lambda \in \mathcal{L}$.

Ejemplos: $\{\lambda, ab, aabb, aaabbb\}$

b. $\mathcal{L} = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$

Def. por comprensión: las cadenas de \mathcal{L} tienen al menos una a y una b (por lo tanto, $\lambda \notin \mathcal{L}$) y la cantidad de apariciones de a es igual a la cantidad de apariciones de b .

Ejemplos: $\{ab, aabb, aaabbb\}$

c. $\mathcal{L} = \{a^n b^m \mid n \geq 1 \wedge m \geq 1\}$

Def. por comprensión: las cadenas de \mathcal{L} tienen al menos una a y una b (por lo tanto, $\lambda \notin \mathcal{L}$) y la cantidad de apariciones de a no es necesariamente igual a la cantidad de apariciones de b .

Ejemplos: $\{a, b, ab, aa, bb, baa, aba\}$

d. $\mathcal{L} = \{a^n b^m \mid n \geq 1 \wedge m \geq 0\}$

Def. por comprensión: las cadenas de \mathcal{L} tienen al menos una a (por lo tanto, $\lambda \notin \mathcal{L}$) y la cantidad de apariciones de a no es necesariamente igual a la cantidad de apariciones de b .

Ejemplos: $\{a, ab, aab, aaa, abab\}$

e. $\mathcal{L} = \{a^n (ac)^p (bab)^q \mid n \geq 0 \wedge q = p + 2 \wedge p \geq 1\}$

Def. por comprensión: como $p \geq 1$, las cadenas de \mathcal{L} tienen al menos una aparición de ac . Además, como $q = p + 2$, tengo que $q \geq 3$, todas las cadenas de \mathcal{L} tienen al menos tres apariciones de bab . La cantidad de apariciones de bab depende de la cantidad de apariciones de ac . Las cadenas de \mathcal{L} pueden no tener apariciones de a y estas no dependen ni de p ni de q .

Ejemplos: $\{acbabbabbab, acacbabbabbabbab, aacbabbabbab\}$