

# L'intelligence du regard : comment le cerveau reconstruit la vision à partir d'une image déformée

*This manuscript ([permalink](#)) was automatically generated from [laurentperrinet/2026-07\\_intelligence-regard@54f6eaa](#) on August 31, 2026.*

Published: July 8, 2026

## Auteur

---

- **Laurent U Perrinet**

 [0000-0002-9536-010X](#) ·  [laurentperrinet](#) ·  [@laurentperrinet@neuromatch.social](mailto:@laurentperrinet@neuromatch.social)

Institut de Neurosciences de la Timone, CNRS / Aix-Marseille Université

✉ — Correspondence possible via [GitHub Issues](#)


## Résumé

---

*En général, notre monde visuel est net et coloré, il se déploie continuellement devant nous comme un écran de cinéma panoramique. Pourtant, l'image captée par la rétine n'est pas uniforme : ultra-précise au centre, plus floue et moins riche en couleurs en périphérie. Comprendre ce processus permet de mieux comprendre et diagnostiquer certaines pathologies visuelles et inspire des approches plus sobres en intelligence artificielle.*

Et si votre cerveau remodelait l'espace qui vous entoure à votre insu ? Intuitivement, nous pensons que notre vision reflète fidèlement le monde. Pourtant, l'image formée sur la rétine est loin d'être uniforme ! Au centre, la précision est maximale. En périphérie, la vision devient floue et moins sensible aux couleurs. Comment le cerveau parvient-il alors à reconstruire la scène cohérente et apparemment uniforme que nous percevons ?

Comprendre ce mécanisme est un enjeu majeur. Il éclaire sur le fonctionnement de la vision. Il aide aussi à mieux diagnostiquer certaines maladies oculaires. Il inspire enfin des systèmes d'intelligence artificielle plus sobres en énergie. En tant que chercheur en neurosciences computationnelles, j'étudie comment le cerveau assemble des informations visuelles partielles pour produire une perception cohérente. Voici ce que les recherches récentes révèlent sur le rôle décisif de l'organisation spatiale de la rétine.



**Figure 1: L'œil voit différemment dans et hors la fovéa.** Ces différents points semblent similaires pourtant celui sur lequel on pose son œil a une couleur différente, qui s'évanouit lorsque l'on regarde ailleurs. Cet effet dépend des [paramètres réglant la couleur des points et du fond](#) et auxquelles la fovéa est particulièrement plus sensible par rapport à la périphérie.


## Ce que la rétine voit vraiment

---

La vision semble si naturelle. Il suffit d'ouvrir les yeux pour percevoir le monde. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se cache un mécanisme d'une grande complexité qui intrigue les scientifiques depuis des siècles. Dès le XI<sup>e</sup> siècle, Ibn al-Haytham, aussi appelé Alhazen, pose les bases d'une théorie moderne de l'optique. Il montre comment la lumière traverse l'œil pour former une image sur la rétine. Plus tard, [Léonard de Vinci](#) s'inspirera de ces travaux pour ses propres recherches sur la vision. Le processus visuel commence dans une fine couche de cellules au fond de l'œil : la rétine. Elle capte la lumière focalisée par l'œil. En quelques millisecondes, elle la transforme en signaux nerveux que le cerveau peut interpréter. Une propriété remarquable du système visuel est la conservation de cette organisation spatiale dans plusieurs aires cérébrales. Dans le cerveau, les neurones voisins traitent des zones voisines de ce que nous voyons. Cette correspondance entre le cerveau et le champ visuel, appelée *rétinotopie*, est une clé de notre perception.

La rétine ne traite cependant pas toute l'image de manière uniforme. En ce moment même, vos yeux se déplacent pour fixer ces mots l'un après l'autre. Selon l'endroit où vous regardez, certaines informations deviennent visibles, tandis que d'autres disparaissent (voir Figure 1). La vision privilégie une petite zone centrale, la fovéa, située dans la macula. Pour donner un ordre de grandeur, la macula couvre un angle visuel proche de celui d'un pouce tendu à bout de bras. Bien qu'elle ne représente qu'une petite portion du champ visuel qui est lui large comme un hémicycle, elle mobilise pourtant environ un quart des fibres du nerf optique (voir Figure 2). Cette concentration de ressources explique la précision des détails et des couleurs autour du point de fixation. Cette différence s'explique simplement : la macula contient surtout des cônes, des cellules sensibles aux couleurs. La périphérie rétinienne contient surtout des bâtonnets, plus efficaces en faible lumière mais moins sensibles aux couleurs. Un paradoxe apparaît alors : si la périphérie distingue mal les couleurs, pourquoi notre perception du monde paraît-elle globalement uniforme et colorée ?

Explorons la rétinotopie dans d'autres espèces. En effet, cette spécialisation centrale de la rétine n'est pas propre à l'humain. On la retrouve chez de nombreux mammifères, avec des adaptations spécifiques [1]. Chez le chat, les photorécepteurs sont fortement concentrés le long de l'axe horizontal ; cette organisation favorise des mouvements oculaires latéraux rapides, indispensables pour suivre des proies qui filent. Chez le lapin ou la souris, la répartition des cellules photoréceptrices est plus homogène, ce qui soutient une exploration continue du champ périphérique et recentrer le regard sur des objets en mouvement comme des prédateurs et fuir pour échapper au chat ! Certaines espèces ont poussé cette spécialisation encore plus loin : le faucon et certains dauphins possèdent deux fovéas par œil, l'une dédiée à une vision frontale très précise et l'autre à une perception latérale optimisée. Cette double fovéa permet d'intercaler, à chaque instant, un point de fixation détaillé et un balayage latéral du champ par un mouvement des yeux. Elle reflète les exigences de leurs niches écologiques et le besoin constant de réorienter le regard.



**Figure 2: Le système visuel déforme l'image.** Une image est captée par l'œil différemment autour du point de fixation. En effet elle est projetée sur la rétine (dont on voit ici une vue médicale qui souligne en particulier la vasculature et le fovéa), avant d'être conduite dans le cerveau vers les aires visuelles. Là, l'image y est représentée de façon déformée avec plus de détails les parties de l'image proches du point de fixation, comme illustré sur cette modélisation de la transformation de l'image du chat. À noter que chaque hémichamp (représenté en bleu pour la partie gauche de la scène et rouge pour la partie droite) est traité dans un hémisphère différent.

## Pourquoi comprendre la rétinotopie est cruciale en clinique

En quoi est-il utile d'étudier la géométrie de la rétine ? Comprendre cette organisation précise chez l'humain permet d'éclairer de nombreuses pathologies visuelles. La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est l'un des exemples les plus marquants. Elle affecte gravement la macula décrite plus haut. Avec le vieillissement de la population, elle est devenue la première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans. Son effet est particulièrement délétère. Elle rend flous ou illisibles les objets placés au centre du regard, comme les visages ou les lettres. La vie quotidienne peut alors être fortement perturbée. Avec le Dr Kevin Mairot, à l'AP-HM, nous utilisons des outils d'intelligence artificielle pour détecter des formes rares de DMLA. Dans certains contextes, et selon les données disponibles, ces outils peuvent atteindre une efficacité comparable, voire supérieure, à celle de spécialistes [2].

L'objectif n'est pas de remplacer le praticien, mais de l'épauler dans son diagnostic, en complément de l'ensemble des informations sur le patient.

D'autres pathologies visuelles existent. Elles sont nombreuses, diverses et souvent méconnues. Cette méconnaissance peut entraîner une errance médicale et retarder la prise en charge. Par exemple, certaines formes relativement rares de la maladie d'Alzheimer touchent spécifiquement les voies visuelles. L'atteinte peut s'étendre de la rétine jusqu'aux zones du cerveau responsables de la perception visuelle. Ces atteintes peuvent, par exemple, rendre difficile la reconnaissance d'un visage familier ou l'interprétation des expressions faciales. Les conséquences sociales sont souvent sévères. Certaines formes affectent surtout le champ périphérique. La vision se rétrécit alors autour du point de fixation, comme si l'on regardait à travers un tube : on ne voit plus que le centre et tout le reste disparaît. C'est ce qu'on appelle l'« effet tunnel ». Le Dr Lejla Koric, à l'AP-HM, mène des études novatrices pour diagnostiquer précocement ces formes à partir de réponses comportementales visuelles, afin de traiter ces troubles mieux et plus tôt [3].

Les pathologies rétiniennes n'affectent pas seulement la perception. Elles peuvent aussi dégrader le contrôle des mouvements oculaires. La rétinopathie humaine concentre de grandes ressources autour de la macula et du point de fixation, lui-même piloté par le regard. Quand cette zone dégénère, la capacité à diriger son regard peut être altérée. On peut observer des saccades involontaires ou un mauvais suivi d'objets en mouvement. Ces troubles compliquent la lecture et la reconnaissance des visages. Ces troubles peuvent avoir un retentissement majeur sur la vie quotidienne. Heureusement, des solutions thérapeutiques innovantes voient le jour. Elles combinent, par exemple, casques de réalité virtuelle et capteurs de position du regard. Ces dispositifs peuvent soutenir une rééducation du contrôle oculomoteur [4].


## Ce que la modélisation et l'IA permettent de tester

---

Pour comprendre le rôle de la rétinopathie dans la vision, la modélisation est un outil clé. Le principe est le suivant : nous construisons un système visuel artificiel qui reproduit au mieux les caractéristiques humaines. Nous modifions ensuite certains éléments pour observer leur rôle dans l'ensemble.

En pratique, nous avons utilisé un modèle appelé ConvNeXt, un modèle de référence actuel en vision par ordinateur et dont les propriétés se rapprochent du système visuel humain. Ce réseau peut reconnaître et classer des images variées dans des catégories, comme « poisson rouge » ou « clavier ». Nous avons comparé ses performances sur des images classiques et sur des images transformées par la rétinopathie humaine. Un résultat notable apparaît. Le réseau conserve un niveau de performance élevé avec ces images comprimées et déformées [5]. Il montre aussi de nouvelles capacités, comme la détection d'un animal camouflé dans une scène visuelle (cf ??).

Cette capacité à localiser des objets ouvre de nouvelles perspectives, tant en IA qu'en neurosciences. En effet, l'usage des capteurs visuels augmente de façon exponentielle, des téléphones intelligents aux voitures connectées. Chaque capteur impose des traitements de plus en plus complexes. Les coûts énergétiques augmentent donc fortement. En se concentrant sur les pixels autour d'une zone d'intérêt, on peut réduire significativement les coûts de traitement. Cette approche est particulièrement utile pour les systèmes embarqués, comme les voitures autonomes. Ces approches peuvent aussi accélérer la réponse des systèmes, ce qui est crucial pour cette nouvelle génération de voitures.



**Figure 3: L'œil agit pour voir les objets.** Notre modèle propose d'apprendre à anticiper les localisations dans l'image qui sont importantes pour réussir une tâche donnée. Il consiste en un modèle "Où?" qui prend une image naturelle et traite sa périphérie depuis un point de fixation central. Localisant la cible, il dirige son regard pour actionner le modèle "Quoi?" qui permet de détecter le léopard caché dans les herbes.

Cette voie de recherche ouvre aussi un nouvel axe en neurosciences de la vision. Notre perception paraît uniforme. Pourtant, elle est concentrée autour du point de fixation. En périphérie, les sensations sont plus floues et moins colorées. Comment détecter, dans cette zone floue, un point d'intérêt justifiant un déplacement du regard ? Cette question toujours en suspens révèle le lien étroit entre ce que voit la rétine et le système qui contrôle les mouvements des yeux. Elle encourage une nouvelle génération de modèles. Ces modèles ne doivent pas seulement les analyser passivement, mais pouvoir agir sur leur environnement. Or, cette capacité reste encore largement sous-exploitée dans l'IA actuelle.

## Ce que cela change pour comprendre l'intelligence du regard

Nous avons vu que la géométrie de la rétine n'est pas celle de notre perception. Loin de fragiliser notre compréhension, ce décalage la rend au contraire plus précise. En révélant ce « miroir déformant » — où la rétine capte une image inégale mais le cerveau en fait une perception uniforme — nous progressons dans l'analyse d'un système particulièrement complexe.

Nos travaux mettent en lumière un point clé : cette spécialisation centrale de la rétine semble pleinement efficace lorsque le regard explore activement la scène visuelle. La perception et les mouvements des yeux apparaissent donc étroitement liés. C'est dans ce couplage entre perception et action que se situent probablement les prochaines avancées, comme le développement de prothèses visuelles intelligentes ou de robots capables de voir comme nous. De nouvelles avancées passionnantes sont attendues dans ce domaine.

## References

---

1. **Thalamocortical Circuits and Functional Architecture**  
Jens Kremkow, Jose-Manuel Alonso  
*Annual Review of Vision Science* (2018-09-15) <https://doi.org/gn4rws>  
DOI: [10.1146/annurev-vision-091517-034122](https://doi.org/10.1146/annurev-vision-091517-034122) · PMID: [29856937](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29856937/) · PMCID: [PMC7525828](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC7525828/)
2. **Deep Learning for Diagnosis of Choroideremia and USH2A-Associated Rod–Cone Dystrophy Using Macular Optical Coherence Tomography Volumes**  
Kevin Mairot, Isabelle Meunier, Béatrice Bocquet, Natacha Stolowy, Prithvi Ramtohum, Xavier Zanlonghi, Danièle Denis, Thierry David, Frederic Matonti, Laurent Udo Perrinet  
*Ophthalmology Science* (2026-08) <https://doi.org/hcgpk8>  
DOI: [10.1016/j.xops.2026.101378](https://doi.org/10.1016/j.xops.2026.101378)
3. **Enhancing atypical Alzheimer's disease phenotyping through the oculomotor window in posterior cortical atrophy**  
Lejla Koric, Helene Mourre, Caroline Trompette, Lucile Brillant, Myrtille Favre, Laure Trinquet, Mathieu Ceccaldi, Olivier Felician  
*Journal of Alzheimer's Disease* (2026-03-26) <https://doi.org/hcgpmc>  
DOI: [10.1177/13872877261435137](https://doi.org/10.1177/13872877261435137) · PMID: [41883283](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41883283/)
4. **Beneficial influence of in-context predictability when young adults read with a simulated central scotoma**  
Eole Lapeyre, Núria Gala, Aurélie Calabrèse  
*Journal of Vision* (2025-06-17) <https://doi.org/hcgpmb>  
DOI: [10.1167/jov.25.7.8](https://doi.org/10.1167/jov.25.7.8) · PMID: [40525906](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40525906/) · PMCID: [PMC12178433](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC12178433/)
5. **Foveated Retinotopy Improves Classification and Localization in Convolutional Neural Networks**  
Jean-Nicolas Jérémie, Emmanuel Dauce, Laurent U Perrinet  
*Vision* (2026-03-30) <https://doi.org/hcgpk9>  
DOI: [10.3390/vision10020017](https://doi.org/10.3390/vision10020017) · PMID: [42029481](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42029481/) · PMCID: [PMC13108125](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC13108125/)