

## Antalgiques (paracétamol, ibuprofène)

### Paracétamol :

- Dose maximale : 4g/jour chez l'adulte (1g toutes les 4-6h minimum)
- Attention au **risque de surdosage** : vérifier qu'il n'y en a pas dans d'autres médicaments (anti-rhume, anti-grippe)
- Respecter les doses chez l'enfant (poids, pas âge)
- Toxicité hépatique en cas de surdosage

### AINS (ibuprofène, kétoprofène) :

- Toujours prendre **pendant ou après les repas**
- Durée maximale : **3-5 jours** sans avis médical
- Contre-indiqués : ulcère, grossesse (surtout 3e trimestre), insuffisance rénale
- Attention aux interactions (anticoagulants, autres AINS, aspirine) / Risque cardiovasculaire et rénal
- Bien **s'hydrater**

## Anti-acides et troubles digestifs

### IPP (oméprazole, pantoprazole) :

- Prendre **le matin à jeun**, 30 min avant le repas
- Traitement court en automédication (max 2-4 semaines)
- Si symptômes persistent : consulter

### Antiacides locaux :

- À distance des autres médicaments (2h avant / après)

## Antihistaminiques

- Certains provoquent de la **somnolence** (attention conduite)
- Les nouvelles générations (cétirizine, loratadine) sont moins sédatifs
- Éviter l'alcool

## Médicaments contre le rhume

- **Attention à la composition** : souvent plusieurs principes actifs
- Vérifier les **vasoconstricteurs** (pseudoéphédrine) :
  - Durée max : 5 jours
  - Contre-indiqués : HTA non contrôlée, coronaropathie, glaucome
  - Ne pas associer plusieurs vasoconstricteurs
- Risque de surdosage en paracétamol si associé

## Laxatifs

- **Ne pas utiliser en cas de douleurs abdominales** non diagnostiquées
- Traitement ponctuel uniquement / Bien s'hydrater / Privilégier d'abord les mesures hygiéno-diététiques

## Anti-diarrhéiques (lopéramide)

- **Jamais en cas de fièvre ou sang dans les selles**
- Pas chez l'enfant de moins de 12 ans en automédication / Bien s'hydrater (solution de réhydratation orale) / Consulter si persistance > 2-3 jours

## Collyres

- **Durée de conservation après ouverture** : généralement 28 jours (noter la date)
- Usage personnel (ne pas partager) / Vérifier la compatibilité avec les lentilles de contact

## Sprays nasaux décongestionnants

- **Maximum 5 jours** d'utilisation
- Risque de **rhinite de rebond** si usage prolongé / Contre-indications similaires aux vasoconstricteurs oraux

## Contraception d'urgence

- Le plus tôt possible après le rapport
- Pas de protection pour les rapports suivants
- Test de grossesse si retard de règles

# Probiotiques

- À distance des antibiotiques (si pris ensemble)
- Conservation au frais selon les produits

## Conseils généraux cruciaux

### Durée de traitement :

- En automédication : **3-5 jours maximum** pour la plupart des symptômes
- Consulter si pas d'amélioration ou aggravation

### Interactions :

- Toujours demander les traitements en cours
- Attention aux associations dangereuses

### Populations à risque :

- **Femme enceinte** : très peu de médicaments autorisés en automédication
- **Enfant** : respecter l'âge minimum et calculer selon le poids
- **Personne âgée** : risque accru d'effets indésirables et d'interactions
- **Insuffisance rénale/hépatique** : adapter les doses

### Signes d'alerte nécessitant une consultation :

- Fièvre persistante ou élevée
- Symptômes qui s'aggravent
- Douleurs intenses
- Saignements
- Difficultés respiratoires
- Réaction allergique

### Lecture de la notice :

- Toujours encourager à lire la notice
- Vérifier les contre-indications et interactions

### Pas de banalisation :

- Un médicament sans ordonnance n'est pas sans risque
- L'automédication a ses limites