

(a) Uma repetição ($\ell = 1$): $K = 10$ dobras
π_1 divide $\mathcal{D}$ em K subconjuntos disjuntos e estratificados
subconj. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
$j = 1$ Te $\Delta_{1,1}$
$j = 2$ Te $\Delta_{1,2}$
$j = 3$ Te $\Delta_{1,3}$
$j = 4$ Te $\Delta_{1,4}$
$j = 5$ Te $\Delta_{1,5}$
$j = 6$ Te $\Delta_{1,6}$
$j = 7$ Te $\Delta_{1,7}$
$j = 8$ Te $\Delta_{1,8}$
$j = 9$ Te $\Delta_{1,9}$
$j = 10$ Te $\Delta_{1,10}$
Dobra j: treina nos $K - 1$ subconjuntos de treino, em azul ($n_{\text{tr}} = \frac{K-1}{K} n$) e testa no subconjunto $\mathcal{F}_{1,j}$ ($n_{\text{te}} = n/K$).
Testes disjuntos; dois treinos compartilham $\frac{K-2}{K-1} = \frac{8}{9}$ dos seus exemplos.
(b) $R = 10$ repetições $\times$ $K = 10$ dobras
cada linha usa uma nova permutação π_ℓ; cada célula é uma diferença $\Delta_{\ell j}$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dobra j
$\ell = 1$
$\ell = 2$
$\ell = 3$
$\ell = 4$
$\ell = 5$
$\ell = 6$
$\ell = 7$
$\ell = 8$
$\ell = 9$
$\ell = 10$
$RK = 100$ diferenças pareadas $\{\Delta_{\ell j}\}$
$\Rightarrow \bar{\Delta}$ e $\hat{\sigma}^2 \Rightarrow t$ reamostrado corrigido,
variância $\left(\frac{1}{RK} + \frac{n_{\text{te}}}{n_{\text{tr}}}\right)\hat{\sigma}^2$, referência t_{RK-1}
Por algoritmo: $RK = 100$ treinamentos com $0{,}9\,n$ exemplos cada; entre repetições, testes e treinos se sobrepõem. Os dois algoritmos usam as mesmas π_ℓ e as mesmas dobras.
treino
teste (Te)