

Notas de aula de Matemática Discreta*

As notas de aula são apenas uma parte do conteúdo necessário para o entendimento dos assuntos abordados em aula, aqui se apresenta um resumo do conteúdo do livro Fundamentos matemáticos para Ciência da Computação com comentários e informações de entendimento do professor. Para informações mais precisas e elaboradas, sugiro utilizarem os livros base da disciplina como fonte de informação.

1. Conjuntos

Definições são importantes em qualquer ciência porque contribuem para a comunicação precisa. No entanto, se procurarmos uma palavra em um dicionário, a definição é expressa usando-se outras palavras, que são definidas usando-se ainda outras palavras, e assim por diante. Desse modo, temos que ter um ponto de partida para as definições onde o significado fique claro; nosso ponto de partida nessa discussão é a noção de conjunto, um termo que não definiremos formalmente. Ao invés disso, usaremos simplesmente a ideia intuitiva de que um conjunto é uma coleção de objetos. Em alguns casos, podemos dizer que elementos dos conjuntos possuem alguma propriedade em comum, além de pertencerem ao mesmo conjunto; assim qualquer objeto que possua esta propriedade pertence ao conjunto específico e todo objeto que não possui a mesma propriedade não pertence a tal conjunto.

1.1. Notação

Usaremos letras maiúsculas para denotar conjuntos e o símbolo \in para denotar pertinência em um conjunto. Assim, $a \in A$ significa que o objeto a **pertence** ao conjunto A , ou também que a é um elemento de A ; e $b \notin A$ significa que o objeto b **não pertence** ao conjunto A (ou simplesmente que b não é um elemento de A).

Se $A = \{\text{violeta, verde, castanho}\}$, então $\text{verde} \in A$ e $\text{magenta} \notin A$.

Os elementos em um conjunto não têm nenhuma ordem, de modo que $\{\text{violeta, verde, castanho}\}$ é o mesmo que $\{\text{violeta, castanho, verde}\}$. Além disso, cada elemento do conjunto é listado apenas uma vez. Dois conjuntos são **iguais** se contêm os mesmos elementos.

$$A = B \text{ significa } (\forall x)[(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \rightarrow x \in A)]$$

Um conjunto que não possui elementos é chamado de **conjunto vazio**, e é representado por \emptyset ou simplesmente por $\{\}$.

Os conjuntos podem ser representados de diversas maneiras analíticas e gráficas. Em geral a representação de um conjunto é suficiente para identificar quais elementos pertencem ou não pertencem ao conjunto em questão.

1.1.1. Representação por Descrição

A representação por descrição é uma representação baseada em linguagem natural, por exemplo: “O conjunto A possui todos os números pares maiores que 5 e menores que 10”, assim sabemos que o conjunto A possui os elementos 6 e 8.

1.1.2. Representação por Lista

A representação por listagem consiste em elencar todos os elementos, por exemplo: $A = \{6, 8\}$.

*“Never. I’ll never turn to the dark side.”, Luke Skywalker

1.1.3. Representação por Predicados

A representação por predicados consiste em descrever através de propriedades predicativas, por exemplo: $P(x)$ é um predicado verdadeiro sempre que x é um número ímpar positivo, então $B = \{x \mid P(x)\}$ é o conjunto que contém os números ímpares, $B = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$.

Podemos entender que a formulação por predicados é uma forma de representação por uma fórmula lógica, sempre que o predicado for verdadeiro para algum elemento, então aquele elemento pertence ao conjunto.

Exemplo:

- a) $P(x)$: x é um número ímpar;
- b) $Q(x)$: x é um número par;
- c) $R(x)$: x é um número positivo;
- d) $S(x)$: x é um número negativo.

$C = \{x \mid P(x) \wedge R(x)\}$, também pode ser representado por $C = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$.

$D = \{x \mid P(x) \wedge Q(x)\}$, também pode ser representado por $D = \{\} = \emptyset$.

1.1.4. Representação por Recorrência

A representação por recorrência consiste em estabelecer regras de formação para o conjunto. Essas regras são divididas em dois grupos: 1) Regras base, que estabelecem quais os elementos que pertencem diretamente ao conjunto; e 2) Regras de formação, estabelece iterações sobre os elementos do conjunto para encontrar novos elementos.

Exemplo:

- 1) $2 \in E$;
- 2) Se $n \in E$, então $(n + 2) \in E$.

Portanto: $E = \{2, 4, 6, \dots\}$.

1.1.5. Diagramas Gráficos

1.2. Cardinalidade

Dado um conjunto S a **cardinalidade**, representada por $|S|$, de um conjunto refere-se a quantidade de elementos que o conjunto possui, nesse contexto dizemos que o conjunto pode ser finito ou infinito. O conjunto será finito quando a sua cardinalidade for um número natural, ou seja se $|S| \in \mathbb{N}$, por outro lado, dizemos que S é um conjunto infinito quando ele for tão grande quanto se queira (o conjunto E é um exemplo de conjunto infinito). O conjunto vazio possui cardinalidade zero: $|\emptyset| = 0$.

1.3. Subconjuntos

Sejam $F = \{2, 3, 5, 12\}$ e $G = \{2, 3, 4, 5, 9, 12\}$ dois conjuntos, podemos perceber que todo elemento que está em F também está em G , portanto dizemos que F é um **subconjunto** de G . Uma definição mais formal seria: dados dois conjuntos S e T , dizemos que S é subconjunto de T se:

$$(\forall x)(x \in S \rightarrow x \in T)$$

Se um conjunto S for subconjunto de um conjunto T , escreveremos $S \subseteq T$, mas se existe pelo menos um elemento de S que não está em T dizemos que S é um **subconjunto próprio** de T e podemos escrever como $S \subset T$.

Observe que com a definição de subconjuntos, podemos entender que dois conjuntos S e T são iguais se, e somente se, $S \subseteq T$ e $T \subseteq S$.

1.4. Conjunto das Partes

Observe que inicialmente utilizamos os objetos como elementos básicos dentro do universo que estamos trabalhando. Porém esta ideia inicial é equivocada, pois podemos ter conjuntos como elementos de outros conjuntos e é onde costumamos encontrar alguns problemas de interpretação. Por exemplo, sejam $H = \{1, 2, \{3\}\}$ e $I = \{\{1, 2\}, 3\}$, temos:

$$\begin{aligned}1 &\in H, 1 \notin I \\3 &\notin H, 3 \in I \\ \{3\} &\in H, \{3\} \subseteq I \\ \{1, 2\} &\subset H, \{1, 2\} \in I \\ |H| &= 3, |I| = 2\end{aligned}$$

Dito isso, dado um conjunto S , o **conjunto das partes** de S ($\mathcal{P}(S)$) é um conjunto formado por todos os subconjuntos de S .

Exemplo: seja $J = \{1, 2, 3\}$, então $\mathcal{P}(J) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$.

Uma maneira intuitiva de pensarmos o conjunto das partes é lembrar que ele contém todos os subconjuntos de cardinalidade zero (0), contém também os de cardinalidade 2, 3, assim por diante até o conjunto inteiro (que é subconjunto dele mesmo).

É importante perceber que para qualquer conjunto S , a cardinalidade do conjunto das partes de S é sempre maior que a cardinalidade do conjunto inicial.

$$|\mathcal{P}(S)| > |S|$$

1.5. Operações em Conjuntos

Dado um conjunto \mathcal{U} que possui todos objetos em que podemos trabalhar, chamaremos este conjunto de **Universo**.

1.5.1. União

Sejam dois conjuntos S e T , o conjunto resultante V da **união** dos conjuntos S e T , denotada por $V = S \cup T$, contém todos os elementos de S e T .

$$V = S \cup T = \{x \mid x \in S \vee x \in T\}$$

1.5.2. Interseção

Sejam dois conjuntos S e T , o conjunto resultante V da **interseção** dos conjuntos S e T , denotada por $V = S \cap T$, contém os elementos que estão em S e T ao mesmo tempo.

$$V = S \cap T = \{x \mid x \in S \wedge x \in T\}$$

1.5.3. Diferença

Sejam dois conjuntos S e T , o conjunto resultante V da **diferença** dos conjuntos S e T , denotada por $V = S - T$, contém os elementos que estão em S e não estão em T .

$$V = S - T = \{x \mid x \in S \wedge x \notin T\}$$

1.5.4. Complemento

Seja um conjunto S o complemento de S , denotado por \overline{S} , contém todos os elementos de \mathcal{U} que não estão em S .

$$\overline{S} = \mathcal{U} - S = \{x \mid x \in \mathcal{U} \wedge x \notin S\}$$

1.5.5. Produto Cartesiano

Sejam a e b objetos do nosso universo, podemos formar um novo objeto (a, b) , denominado **par ordenado**. Diferentemente dos conjuntos, a ordem dos elementos nos pares ordenados é importante e faz com que, a for diferente de b , então $(a, b) \neq (b, a)$.

Sejam dois conjuntos S e T , o **produto cartesiano** $V = S \times T$ consiste em todos os pares ordenados (x, y) tais que $x \in S$ e $y \in T$.

$$V = S \times T = \{(x, y) \mid x \in S \wedge y \in T\}$$

2. Relações

Dado um conjunto S uma **relação binária** (ou simplesmente relação) em S é um subconjunto de $S \times S$ (um conjunto de pares ordenados de elementos de S).

Da mesma maneira, uma relação entre dois conjuntos diferentes S e T , uma relação de S para T , é um subconjunto do produto cartesiano $S \times T$.

Analogamente, podemos pensar em relações envolvendo muitos conjuntos (S_1, S_2, \dots, S_n) , uma relação n -ária é um subconjunto do produto cartesiano $S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$.

Assim, normalmente uma relação ρ de S em T ($\rho : S \rightarrow T$) consiste em escolher pares ordenados que satisfazem alguma regra que irá relacionar elementos de S aos elementos de T .

Por exemplo, sejam $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{6, 7, 8, 9, 10\}$.

Uma relação $R : A \rightarrow B$ que relacione um número com o seu dobro, assim $R = \{(3, 6), (4, 8), (5, 10)\}$.

Uma relação $S : A \rightarrow B$ que relacione um número com todos os valores maiores que o seu triplo, assim $R = \{(1, 6), (1, 7), (1, 8), (1, 9), (1, 10), (2, 7), (2, 8), (2, 9), (2, 10), (3, 10)\}$.

As relações podem ser definidas como regras arbitrárias que relacionam os elementos dos dois conjuntos,

2.1. Propriedades

Dado um conjunto S e uma relação binária ρ de S em S , de acordo com os elementos que estão em ρ dizemos que esta relação possui ou não possui alguma propriedade, abaixo relaciona-se algumas propriedades que as relações podem possuir.

2.1.1. Reflexiva

A propriedade reflexiva estabelece que se o elemento x pertence ao conjunto S , então o par ordenado (x, x) está na relação ρ .

$$(\forall x)(x \in S \rightarrow (x, x) \in \rho)$$

2.1.2. Simétrica

A propriedade simétrica estabelece que se o par ordenado (x, y) está na relação ρ , então o par ordenado (y, x) também deve estar.

$$(\forall x)(\forall y)((x, y) \in \rho \rightarrow (y, x) \in \rho)$$

2.1.3. Transitiva

A propriedade transitiva estabelece que se os pares ordenados (x, y) e (y, z) pertencem a relação ρ , então o par ordenado (x, z) também deve estar.

$$(\forall x)(\forall y)(\forall z)((x, y) \in \rho \wedge (y, z) \in \rho \rightarrow (x, z) \in \rho)$$

2.1.4. Anti-Simétrica

A propriedade anti-simétrica estabelece que se os pares ordenados (x, y) e (y, x) pertencem a relação ρ , então x deve ser igual a y .

$$(\forall x)(\forall y)((x, y) \in \rho \wedge (y, x) \in \rho \rightarrow x = y)$$

2.2. Fecho de Relação

Dado uma relação ρ em um conjunto S , o fecho de uma relação (ρ^*) em relação a uma propriedade P é o conjunto minimal tal que $\rho \subset \rho^*$ e ρ^* possui a propriedade P .

3. Funções