SAÚDE CONECTADA



Ansiedade

Por Priscila Antunes
Médica
Nutricionista
Terapeuta Ayurveda

Priscila Antunes Pereira Medicina Nutrição Estilo
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38
COMUNIDADE
Saúde Conectada



Medicamentos

Os ansiolíticos são fármacos utilizados para o tratamento da ansiedade.
Dentre esses, os benzodiazepínicos são a principal classe, como rivotril ou alprazolam. Eles são relativamente seguros e mais eficazes comparados a outros. Entretanto, causam efeitos adversos, como prejuízo na realização de tarefas do dia a dia e aumentam a chance de doenças como Alzheimer.

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
094.644.737-38
COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Além disso, seu uso prolongado pode provocar dependência. Quem faz uso contínuo de rivotril, por exemplo, não pode parar de tomá-lo repentinamente, necessita de “desmame”.
O sono induzido por esse tipo de fármaco não é totalmente reparador, porque diminui a entrada do sono REM, fase em que mais descansamos.

A coordenação motora também costuma ser prejudicada por eles.



Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38
COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Os benzodiazepínicos funcionam interagindo com o neurotransmissor **GABA**, cuja presença diminui a agitação, coloca em estado de calma e viabiliza o sono.
Para que o GABA funcione, sua molécula precisa se ligar a um receptor na membrana celular. Os benzodiazepínicos facilitam a ligaçãodo GABA com seu receptor, induzindo ao estado de sedação, diminuindo a euforia e provocando sonolência.

O problema é que, com o tempo, o organismo se adapta, causando necessidade de maiores concentrações para alcançar o mesmo efeito.

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38
COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Como alternativa temos diversos fitoterápicos que vêm ganhando destaque por possuírem princípios bioativos ansiolíticos, muitas vezes agindo da mesma maneira.

OBS: NÃO DESCONTINUE SUA MEDICAÇÃO SEM AVALIAÇÃO MÉDICA

Passiflora incarnata: também conhecido por Maracugina, fitoterápico com longa história de uso na medicina tradicional e popular. Sua função na diminuição da ansiedade por melhorar a resposta do GABA é bem documentada em modelos animais. Há estudos em humanos que estarão nas referências do curso.



Recomenda-se o uso de doses de 200 a 600 mg. Doses mais altas são indicadas para casos agudos, pois o paciente sentirá bastante sono. Em uma crise de ansiedade, pode ser uma alternativa; no dia a dia, porém, é melhor usar doses mais baixas (fracionar 600 mg em três doses de 200 mg ao longo do dia, por exemplo).

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutriçã
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38
COMUNIDADE
Saúde Conectada

Melissa officinalis: mais conhecida como erva cidreira (não confundir com capim cidreira). Usada na medicina tradicional em forma de chá para diminuição de estresse e ansiedade, além de melhora na qualidade do sono. Além da afinidade com o receptor do GABA, outra hipótese para sua eficácia é a diminuição de sua degradação.



Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eireli
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38
COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Na prática clínica, é preferível prescrever Melissa à noite, como indutora de sono, por sua característica mais pontual e sedativa; e Passiflora distribuída ao longo do dia. Recomendam-se doses de 300 a 600 mg, seguindo as mesmas prescrições da Passiflora, com a ressalva de que o efeito sedativo da Melissa é maior. Uma dose alta só faz sentido em quadros de insônia grave, crise de ansiedade ou de pânico fortes.



Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.73738
COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Kava-kava: planta tradicionalmente utilizada como bebida recreativa por tribos indígenas do Pacífico Sul. Não temos conhecimento preciso de seu mecanismo; ela parece agir um pouco via GABA, mas também em outros neurotransmissores.
É a opção menos sedativa, por isso tem a conveniência do uso pela manhã. É um dos suplementos mais estudados em seres humanos, sendo o mais estudado dos três aqui citados. As revisões recomendam doses de Kava-kava de 210 a 240 mg. Em doses menores, o efeito é pequeno e em doses mais altas não há maiores benefícios.



Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38
COMUNIDADE
Saúde Conectada

Magnésio

O magnésio é importante para a regulação do glutamato e do GABA, neurotransmissores que estimulam a inibição e a excitabilidade do sistema nervoso.

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38
COMUNIDADE
Saúde Conectada

É difícil identificar sua deficiência, pois a dosagem padrão ouro é a quantidade intracelular (assim como a vitamina B12). Existe também dificuldade de medir com precisão a quantidade de magnésio ingerida, pois apesar de se saber que está em alimentos de cor verde escura (como couve e brócolis), a quantidade presente varia. Parece um beco sem saída, mas na verdade é fácil de resolver.

Observar sintomas :

- Alteração glicose
- Perda de apetite
- Sonolência
- Naúsea
- Vômito
- Cansaço
- Fraqueza muscular
- Tremores, espasmo muscular, cãibras e formigamento
- Depressão, nervosismo
- Insônia
- Hiopertensão, batimentos cardíacos acelerados

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38
COMUNIDADE
Saúde Conectada

Recomendações de uso:

A deficiência de magnésio causa agitação mental, dificuldade de concentração e no sono. Para quem tem insônia ou ansiedade, é fundamental garantir a ingestão mínima, o que deve ser feito por suplementação. Na verdade, não se trata de suplementação, pois não é um consumo em maior quantidade. Como a dose varia de 260 a 350 mg, fazemos a média de 300 mg.

Recomenda-se o uso do magnésio dimalato (magnésio e ácido málico), que segundo a hipótese favorece a produção de energia, ou magnésio quelato (magnésio e o aminoácido glicina), que segundo a hipótese favorece a indução de sono. O importante é evitar a deficiência, não importando tanto qual o tipo. Outro tipo de magnésio é o L-treonato. Estudos apontam o seu bom funcionamento, já que parece ter maior absorção não somente no intestino, mas também no sistema nervoso.

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
094.644.737-38
COMUNIDADE
Saúde
Conectada

O cloreto de magnésio, o citrato de magnésio e o óxido de magnésio são sais. Sua absorção é pior e, por um processo osmótico, comumente provocam diarreia no paciente com menor tolerância. O leite de magnésia é um laxante, não tem relação alguma com o magnésio de que estamos tratando.

Na prática clínica, não se substitui um medicamento subitamente. A retirada de algum benzodiazepínico deve ser progressiva, e o fitoterápico pode ser ingerido simultaneamente, contribuindo com o processo.

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38
COMPARTILHE
Saúde Conectada

Além disso, há a impressão de que os fitoterápicos não fazem mal algum, mas todos têm certo risco. Por isso, antes de recomendar, vale a pena fazer um exame de enzima hepática. Se estiver tudo bem, pode-se prescrever e repetir o exame a cada três meses.

L-teanina


Diminui a ansiedade também
via glutamato e GABA, sem induzir
sedação. Favorece a cognição e a
atenção.



Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

COMUNIDADE

Saúde
Conectada
















Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38
COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

COMUNIDADE

Saúde Conectada