# ENDOMETRIOSE

Comunidade Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Endometriose é uma doença ginecológica crônica, benigna, **estrogênio**-dependente e de natureza multifatorial que acomete principalmente mulheres em idade reprodutiva. Pode ser definida pela presença de tecido que se assemelha à glândula e/ou ao estroma endometrial fora do útero, com predomínio, mas não exclusivo, na pelve feminina.

Comissão Nacional Especializada em Endometriose, PROTOCOLO 2021

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Essas células podem aparecer nos ovários (endometrioma), trompas de Falópio, intestino, bexiga, tecido peritoneal, ligamentos ou outras estruturas da cavidade abdominal, e raramente podem ocorrer em outros locais.




COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

O tecido endometrial deslocado responde a mudanças hormonais cíclicas, proliferando e descamando fora do útero.
O sagramento é acompanhado por INFLAMAÇÃO causada por irritação dos tecidos locais, como o peritônio. A inflamação recorrente pode causar cicatrizes e aderências que podem causar dor e disfunção de outros locais afetados.
Pode ser sintomática ou assintomática.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

# ENDOMETRIOSE

COMUNIDADE

x

Saúde Conectada

É uma doença inflamatória

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Review > Front Biosci (Landmark Ed). 2016 Jun 1;21(5):941-8. doi: 10.2741/4431.

# Inflammation and endometriosis

Lingli Jiang [1], Yan Yan [2], Zhou Liu [3], Ying Wang [1]

Affiliations + expand

PMID: 27100482 DOI: 10.2741/4431

COMUNIDADE Saúde Conectada

Editorial > Int J Mol Sci. 2022 Jan 28;23(3):1518. doi: 10.3390/ijms23031518.

# Endometriosis: An Inflammatory Disease That Requires New Therapeutic Options

Jacques Donnez [1 2], Luciana Cacciottola [3]

Affiliations + expand

PMID: 35163463 PMCID: PMC8836207 DOI: 10.3390/ijms23031518

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Review > Lancet. 2021 Feb 27;397(10276):839-852. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00389-5.

# Endometriosis is a chronic systemic disease: clinical challenges and novel innovations

Hugh S Taylor [1], Alexander M Kotlyar [2], Valerie A Flores [2]




*Figure 1:* **Circulating factors involved in the pathogenesis of endometriosis**
TNFα=tumour necrosis factor alpha. BMDCs=bone marrow-derived cells. MSCs=mesenchymal stem cells.

COMUNIDADE Saúde Conectada

ENDOMETRIOSE É UMA DOENÇA INFLAMATÓRIA SISTÊMICA

...afeta o metabolismo no fígado e no tecido adiposo, leva à inflamação sistêmica e altera a expressão gênica no cérebro que causa sensibilização a dor e transtornos do humor"

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Review > J Neuroinflammation. 2020 Mar 7;17(1):80. doi: 10.1186/s12974-020-01752-1.

# Autonomic nervous system and inflammation interaction in endometriosis-associated pain

Yajing Wei [1], Yanchun Liang [1], Haishan Lin [2], Yujing Dai [2], Shuzhong Yao [3]

COMUNIDADE Saúde Conectada

Maior prevalência de doenças sistêmicas em pacientes com endometriose.
Alterações cardiovasculares, neurológicas, metabólicas e imunológicas.
Manifestações neurológicas são comuns em mulheres com endometriose e incluem ansiedade e depressão.
Mulheres com endometriose também são frequentemente hipersensíveis à dor.
A fadiga é outro sintoma comum, ocorrendo em 50–87% das mulheres com endometriose.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

# FATORES DE RISCO

Menarca precoce (antes dos 12 anos)
Sangramentos intensos > 7 dias
Uso de dispositivos intrauterino (DIU)
História de dilatação e curetagem
História familiar
Alto estresse, especialmente ligado aos relacionamentos ou sexualidade
Alta ingestão de gordura de má qualidade, especialmente gorduras aquecidas e frituras

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

# FATORES REDUTORES DE RISCO

Gravidez a termo

Aleitamento materno

Evitar cafeína e álcool

Exercício

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

# SINTOMAS

Isolados ou em conjunto

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

1. Dismenorreia (cólicas menstruais)
2. Dor pré menstrual, articular, pelve
3. Dispareunia (dor na relação sexual)
4. Dor pélvica (durante o ciclo, após a relação sexual ou constante)
5. Dor anal no período menstrual
6. Defecação dolorosa
7. Disúria (dor e queimação ao urinar)
8. Alterações intestinais (distensãoa bdominal, diarréia, constipação)
9. Infertilidade
10. Dor lombar
11. Náuseas, vômitos
12. Exaustão, fadiga
13. Problemas de bexiga, infecções frequentes
14. Síndrome do intestino irritável
15. Tontura
16. Sangramento urinário, nasal, fezes
17. Tosse com sangue
18. Ca de ovário - 50% - CA 125

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40




**Figure 1.** Aetiology and pathogenesis of endometriosis.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

# DIAGNÓSTICO



História clínica
Exame ginecológico
Ultrassom pélvico e transvaginal
RessonânciaMagnéticaPélvica
Colonoscopia
Videolaparoscopia

Tempo médio - 7 anos

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

# TRATAMENTO



COMUNIDADE Saúde Conectada

Terapêutica hormonal
- anticoncepcional ?
- DIU hormonal
- Gestrinona (via oral, via vaginal, implante)

Cirurgia;

Tratamentos alternativos;

Remédios para a dor;

Uma combinação dos tratamentos listados acima.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

## Tratamento clínico

O uso de progestagênios de forma contínua resulta em bloqueio ovulatório e tem efetividade no tratamento da dor pélvica decorrente da endometriose.[8,10] Medicações orais que podem ser utilizadas de forma contínua são:[10,11] acetato de norentindrona, desogestrel e dienogeste. Outras formas de apresentação são o acetato de medroxiprogesterona de depósito que deve ser aplicado na dose de 150 mg, via intramuscular, a cada três meses,[8] e anticoncepcionais de longa duração, como dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel e implante de etonogestrel.[8,12] Os efeitos colaterais dos progestagênios incluem ganho de peso, alterações de humor, perda de massa óssea, associado esse último, principalmente, a acetato de medroxiprogesterona de depósito.[8]

Saúde Conectada

Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO). Endometriose. São Paulo: FEBRASGO, 2021 (Protocolo FEBRASGO-Ginecologia, n. 78/Comissão Nacional Especializada em Endometriose).

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

# INTESTINO

O Centro da Saúde



COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Review > Int J Mol Sci. 2021 May 26;22(11):5644. doi: 10.3390/ijms22115644.

# Intricate Connections between the Microbiota and Endometriosis

Irene Jiang [1], Paul J Yong [1], Catherine Allaire [1], Mohamed A Bedaiwy [1]




(B)

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

**Table 1.** Dysregulation of peritoneal innate and adaptive immunity creates environment conducive to endometriosis onset and progression.

| | Macrophages | Neutrophils | NK Cells | T Cells | B Cells |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | |  | |
| **Immune Dysregulation** | • High numbers in PF and endometriotic lesions<br>• ↓ phagocytosis<br>• ↑ cytokine secretion (TNF-α, IL-6, IL-1β, NF-κB, VEGF)<br>• Altered phenotype: more proinflammatory | • Elevated numbers in PF<br>• Preconditioned by bacterial presence<br>• Recruited to lesions by IL-8 | • Impaired by aberrant immune environment (IL-6, TGF-β)<br>• Altered activating/ inhibitory receptor pattern | • Altered subset proportions<br>• ↑ $T_H2$ ↑ $T_H17$<br>• Increased IL-17 secretion | • Produce anti-endometrial autoantibodies<br>• ↑ IL-6 ↑ IL-17 |
| **Implications on Endometriosis** | • ↓ ability to eliminate refluxed endometrial tissue<br>• Promote further immune activation and inflammation<br>• Lesion growth & vascularization | • Involved in early lesion formation<br>• Promote angiogenesis | • Reduced cytotoxic capacity = ↓ immunosurveil-lance<br>• Lesion survival | • Suppressed cell-mediated immunity = ↓ immunosurveil-lance<br>• Stimulate production of proinflammatory cytokines and pro-angiogenic factors<br>• Endometriosis progression | • Contribute to inflammation, disease progression<br>• Role is unclear |

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

# ESTRATÉGIAS

Conectadas

Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

# PROTOCOLO DE DESINFLAMAÇÃO

Review > Reprod Biomed Online. 2013 Apr;26(4):323-36. doi: 10.1016/j.rbmo.2012.12.011. Epub 2013 Jan 21.

## Diet and endometriosis risk: a literature review

Fabio Parazzini [1], Paola Viganò, Massimo Candiani, Luigi Fedele

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Protocolo:

- Excesso de estrogênio
- Deficiência de progesterona
- Deficiência de magnésio
- Estresse elevado
- Desequilíbrio hormonal além da relação progesterona / estrogênio
- Exclusão de gatilhos: excesso de álcool / cafeína

A atenção a esses fatores pode ajudar algumas mulheres na redução dos sintomas e regressão do tamanho e infiltração do tecido endometriótico.

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Protocolo:

- Reduzir consumo de carne vermelha
- Consumo de peixe pelo menos 3 x por semana
- Dieta vegetariana 1 x por semana
- Cuidado com excesso de ovos - 3 x na semana
- Evitar laticínios e glúten: a retirada do glúten alivia em até 75 % dos sintomas da endometriose
- Dieta LowFodMaop e cuidar da microbiota
- Pelo menos 2 meses sem bebida alcoólica
- Aumentar consumo de frutas vermelhas

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

# Dietary supplements for treatment of endometriosis: A review

*Pınar Yalçin Bahat*[1], *Isil Ayhan*[2], *Eda Ureyen Ozdemir*[3], *Ümit Inceboz*[4], *Engin Oral*[5]

[1]Department of Obstetrics and Gynecology, Health Sciences University, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey; [2]Department of Obstetrics and Gynecology, Health Sciences University, Zeynep Kamil Women and Children's Diseases Training and Research Hospital; [3]Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey; [4] IRENBE Obstetrics&Gynecology and IVF Center, Izmir, Turkey; [5]Turkish Endometriosis&Adenomyosis Society, Founding President, Istanbul, Turkey

Saúde Conectada

**Abstract.** As search for optimal therapy continues for endometriosis, aid of dietary supplements is gaining attention. Supplements can be used for their anti-inflammatory, anti-oxidant, anti-proliferative and immune modulatory charactheristics. We reviewed the literature, evaluated and synthesized effects of vitamin D, zinc, magnesium, omega 3, propolis, quercetin, curcumin, N-acetylcysteine, probiotics, resveratrol, alpha lipoic acid, vitamin C, vitamin E, selenium and epigallocatechin-3-gallate. Based on results of in vitro, animal and human studies, it might be safe to say that dietary supplements can be used as a complementary treatment for endometriosis. (www.actabiomedica.it)

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Biomark Med. 2022 May;16(7):549-557. doi: 10.2217/bmm-2021-0076. Epub 2022 Mar 25.

# Folate metabolism abnormalities in infertile patients with endometriosis

Tarciana Guedes [1], Aline A Santos [1], Felipe H Vieira-Neto [1], Bianca Bianco [2 3], Caio P Barbosa [2 3], Denise M Christofolini [2 3]

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

1. Vitamina D
2. Zinco
3. Magnésio
4. Ômega 3
5. Própolis
6. Quercetina
7. NAC: 600 mg. dia em até 3 x ao dia
8. Curcumina no mínimo 400 mg / dia + cúrcuma na alimentação
9. Resveratrol: entre 100 e 400 mg/dia.
10. Ac. R alfa lipóico
11. Vitamina C
12. Vitamina E
13. Selênio - 100 mcg/dia
14. Epigalatocatequina (chá verde)
15. Crocus sativus
16. Melatonina: 10 mg reduz dor pélvica crônica
17. Picnogenol: 30 mg  x ao dia por 1 ano

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

18. Vitaminas Complexo B e correção da metilação (5TMHF)
19. Probióticos contendo lactobacillus gasseri (10bi) reduz significativamente as dores em apenas 12 semanas
20. Berberina: ação na modulação da microbiota

Como fazer?

1. Escolher as vitaminas individualmente
2. Escolher de 2 a 3 anti-oxidantes
3. Tomar por 3 meses e depois, rotacionar com ativos diferentes,

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Review > Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020 Feb:245:7-12.
doi: 10.1016/j.ejogrb.2019.11.019. Epub 2019 Nov 21.

# Natural products: Potential lead compounds for the treatment of endometriosis

Nikolaos Machairiotis [1], Sofia Vasilakaki [2], Paraskevi Kouroutou [3]

**Table 1.** Overview of the natural products reviewed and their pharmaceutical activity in endometriosis.

| Natural compounds | Main effect on endometriosis |
|---|---|
| Curcumin | Reduction of cytokines and chemokines expression, inhibition of STAT3 and JNK phosphorylation [22] |
| Ginsenoside Rf | Downregulation of inflammatory cytokines and nerve growth factors [29] |
| Gyejibokryeong-hwan and Bogol-gongjindan (modified) | Reduction of the endometrioma, alleviation of pelvic pain [31] |
| Alpha-lipoic acid mixture | Improvement of pelvic pain, dyspareunia and dysmenorrhea symptoms [38] |
| Melatonin | Inhibition of estradiol-induced cell proliferation [43] |
| Omega-3 fatty acids | Analgesic effect [49] |
| Scutellarin | Reduction of the lesion's size , suppression of the platelet aggregation, inhibition of cellular proliferation and angiogenesis/fibrogenesis process [55] |
| Crocin | Inhibition of endothelial cells proliferation, decrement of inflammatory cytokines levels [60] |
| 6-Shogaol | Reduction of the endometriotic implant volume, lower levels of pro-inflammatory cytokines (IL-1β and IL-6) and $PGE_2$ [67] |
| Daidzein-rich isoflavone aglycones | Inhibition of cell proliferation, reduction of inflammatory cytokines (IL-6 and IL-8), COX-2 and $PGE_2$ [72] |
| Genistein | Downregulation of TNF-α, IL-6, VEGF and HIF-1a [86] |
| Vitamin D receptor and resveratrol | Inhibition of proliferation and inflammation [87,88] |

COMUNIDADE Saúde Conectada
Journal Pre-proof
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

> Int J Environ Res Public Health. 2023 Mar 7;20(6):4686. doi: 10.3390/ijerph20064686.

# Efficacy of N-Acetylcysteine on Endometriosis-Related Pain, Size Reduction of Ovarian Endometriomas, and Fertility Outcomes

Emanuela Anastasi [1], Sara Scaramuzzino [2], Maria Federica Viscardi [2], Valentina Viggiani [3], Maria Grazia Piccioni [2], Laura Cacciamani [2], Lucia Merlino [2], Antonio Angeloni [1], Ludovico Muzii [2], Maria Grazia Porpora [2]

Review > Nutrients. 2021 Apr 18;13(4):1347. doi: 10.3390/nu13041347.

# Polyphenols as a Diet Therapy Concept for Endometriosis-Current Opinion and Future Perspectives

Agata Gołąbek [1], Katarzyna Kowalska [1], Anna Olejnik [1]

Review > Reprod Biol Endocrinol. 2022 Dec 28;20(1):176. doi: 10.1186/s12958-022-01051-9.

# Effects of vitamin D supplementation in endometriosis: a systematic review

Comunidade Saúde Conectada

Dimitrios Rafail Kalaitzopoulos [1 2], Nicolas Samartzis [3], Angelos Daniilidis [4], Brigitte Leeners [5], Sofia Makieva [5], Konstantinos Nirgianakis [6], Ioannis Dedes [7], Julian Matthias Metzler [7], Patrick Imesch [7], Ioannis G Lempesis [8 9 10]

Randomized Controlled Trial > Pain Res Manag. 2021 May 26:2021:5529741. doi: 10.1155/2021/5529741. eCollection 2021.

# The Effect of Combined Vitamin C and Vitamin E Supplementation on Oxidative Stress Markers in Women with Endometriosis: A Randomized, Triple-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

A endometriose está associada a disfunção do sistema imunológico, angiogênese, inflamação sistêmica e estresse oxidativo. A angiogênese é o desenvolvimento de novos vasos sanguíneos. Como resultado, é uma etapa essencial para que focos de endometriose e endometriomas sejam capazes de se formar, proliferar e sobreviver dentro do corpo.

O resveratrol é um polifenol derivado de plantas encontrado em muitos alimentos. Tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antiangiogênicas. Alguns estudos mostraram que o resveratrol inibe o crescimento celular, diminui a síntese de óxido nítrico e promove genes apoptóticos de maneira dose-dependente em culturas de células endometriais.

Dose Usual – 50 mg Dose Máxima – 200 mg

COMUNIDADE

Saúde Conectada

A curcumina é um potente agente anti-inflamatório e antioxidante, extraído da raiz de Curcuma longa L. (açafrão). Demonstrou suprimir o crescimento das células endometriais e reduzir a inflamação associada a endometriose, também reduziu a dor. A dose usual do extrato seco padronizado (95%) varia de 300 a 500mg 3x ao dia, administrados com alimentos.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

**COENZIMA Q10** **ÔMEGA 3 SUPER DHA**

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

A Quercetina é um flavonoide antioxidante, que está presente nos alimentos na forma de glicosídeos natural pode ser verificado nos vegetais, frutas e sucos. Várias propriedades terapêuticas dos flavonoides, principalmente da Quercetina, têm sido estudadas nas últimas décadas, destacando-se o potencial antioxidante, anticarcinogênico e seus efeitos protetores aos sistemas renal, cardiovascular e hepático. É também um poderoso antioxidante e antirradicais livres, reduzindo o risco de morte por doenças das coronárias e diminuindo a incidência de enfarte do miocárdio. Apresenta-se sob a forma de um pó de coloração amarelo-ouro.

**Recomendação de uso**
É recomendado o uso de 400 a 500mg por via oral, três vezes ao dia.

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE

Saúde Conectada

N-ACETIL CISTEÍNA

É um aminoácido capaz de aumentar as defesas antioxidantes do corpo e que demonstrou reduzir o diâmetro e o volume de endometriomas e a dor associada à endometriose. NAC aumenta a produção de GLUTATIONA (um potente antioxidante endógeno). A suplementação oral direta com glutationa é ineficiente, uma vez que ela não é bem absorvida pelo trato digestivo humano. O que é possível, e extremamente recomendado, é fornecer ao organismo os 3 aminoácidos precursores da glutationa, ou seja, a matéria-prima que o corpo utiliza para fabricar a glutationa.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

**Nome científico:** *Phellodendron amurense.*

## Dosagem e Modo de Usar

**- Extrato seco (97%):** 300 - 500 mg, duas vezes ao dia.

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde Conectada

O Ácido Alfa Lipóico, que é sintetizado naturalmente no organismo, foi inicialmente utilizado por administração oral no tratamento de disfunções hepáticas e como antídoto ao envenenamento causado pelo fungo Amanita phalloides. No entanto, com a evolução da pesquisa científica sobre esta substância, descobriu-se que o Ácido Alfa Lipóico possui propriedades antioxidantes potentes e de amplo espectro, sendo, portanto um inibidor significativo de radicais livres.
Ações
Antiaging, Hepatoprotetor.
Recomendação de uso
Como hepatoprotetor é indicado na dosagem de 10 a 30mg ao dia. Para diabetes, a dose é de 800mg ao dia.
Como antioxidante, usado nas dosagens de 100 a 600mg ao dia.
Para uso tópico, a concentração de uso é de 0,5 à 5,0%.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde Conectada

## Dosagem e Modo de Usar

**-Extrato seco padronizado 0,3%:** 90 mg, 2 vezes ao dia.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Melhora a Produção de Progesterona
Indicada para amenizar os sintomas da menopausa
Regulador menstrual, controla sintomas de TPM e enxaqueca menstrual
Pode ser usado no tratamento de cistos ovarianos, fibromas uterinos, infertilidade feminina e endometriose
DOSE: 30 a 300mg por dia (extrato seco padronizado a 0,5%).
Seu uso está contraindicado em casos de pacientes em tratamento com outras terapias endócrinas (reposição hormonal, anticoncepcionais orais, hormônios sexuais); gravidez e lactação.



COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

## Botanical Treatment Strategies for Endometriosis

| Therapeutic Goal | Therapeutic Activity | Botanical Name | Common Name |
|---|---|---|---|
| Pain relief | Analgesics<br>Anodynes<br>Sedatives | *Anemone pulsatilla*<br>*Angelica sinensis*<br>*Actaea racemosa*<br>*Corydalis ambigua*<br>*Eschscholzia californica*<br>*Matricaria recutita*<br>*Paeonia lactiflora*<br>*Piper methysticum*<br>*Piscidia piscipula* | Pulsatilla<br>Dong quai<br>Black cohosh<br>Corydalis<br>California poppy<br>Chamomile<br>White peony<br>Kava kava<br>Jamaican dogwood |
| Pain relief | Antiinflammatory | *Angelica sinensis*<br>*Calendula officinalis*<br>*Camellia sinensis*<br>*Echinacea* spp.<br>*Glycyrrhiza glabra*<br>*Hypericum perforatum*<br>*Matricaria recutita*<br>*Oenothera biennis*<br>*Paeonia lactiflora*<br>*Prunus cerasus*<br>*Rehmannia glutinosa*<br>*Tanacetum parthenium*<br>*Zanthoxylum officinale* | Dong quai<br>Calendula<br>Green tea<br>Echinacea<br>Licorice<br>St. John's wort<br>Chamomile<br>Evening primrose<br>White peony<br>Cherry<br>Rehmannia<br>Feverfew<br>Ginger |
| Pain relief | Antispasmodics | *Actaea racemosa*<br>*Dioscorea villosa*<br>*Matricaria recutita*<br>*Valeriana officinalis*<br>*Viburnum prunifolium*<br>*Zanthoxylum officinale* | Black cohosh<br>Wild yam<br>Chamomile<br>White peony<br>Crampbark<br>Black haw<br>Ginger |
| Immunologic support; reduction in fatigue, depression, and concomitant psychoemotional symptoms | Immunostimulants<br>Adaptogens | *Astragalus membranaceus*<br>*Calendula officinalis*<br>*Cordyceps sinensis*<br>*Echinacea* spp.<br>*Eleutherococcus senticosus*<br>*Panax ginseng*<br>*Panax quinquefolius*<br>*Picrorhiza kurroa*<br>*Rhaponticum carthamoides*<br>*Rhodiola rosea*<br>*Schisandra chinensis*<br>*Thuja arbor-vitae*<br>*Withania somnifera* | Astragalus<br>Calendula<br>Cordyceps<br>Echinacea<br>Eleuthero<br>Ginseng<br>American ginseng<br>Picrorhiza<br>Rhaponticum<br>Rhodiola<br>Schisandra<br>Thuja<br>Ashwagandha |
| Improve pelvic circulation and tone; reduce size and extent of endometriotic tissue | Emmenagogues<br>Uterotonics | *Achillea millefolium*<br>*Alchemilla vulgaris*<br>*Caulophyllum thalictroides* | Yarrow<br>Lady's mantle<br>Blue cohosh |
| Hormonal regulation: Indirect via enhanced clearance of estrogen by liver and bowel, improved hormone metabolism by liver, and improvement of healthy hepatic function | Hepatic trophorestoratives<br>Aperients<br>Cholagogues<br>Hepatics | *Calendula officinalis*<br>*Chionanthus virginicus*<br>*Curcuma longa*<br>*Rosmarinus officinalis*<br>*Schisandra chinensis*<br>*Silybum marianum*<br>*Taraxacum officinale* | Calendula<br>Fringe tree<br>Tumeric<br>Rosemary<br>Schisandra<br>Milk thistle<br>Dandelion |
| Hormonal regulation: Direct via known or putative hormonal actions | Hormonal regulators | *Gossypium herbaceum*<br>*Verbena officinalis*<br>*Vitex agnus-castus* | Cotton root<br>Blue vervain<br>Chaste tree |
| Improve pelvic and abdominal lymphatic circulation; enhance immunologic function | Lymphatics | *Calendula officinalis* | Calendula |
| Stress relief | Nervines | *Leonurus cardiaca*<br>*Verbena officinalis* | Motherwort<br>Blue vervain |

COMUNIDADE Saúde Conectada

**FIGURE 11-3** Blue vervain *(Verbena officinalis).* (Photo by Martin Wall.)

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Conexão de ervas que reduzem dor / inflamação (ervas antiespasmódicas) + ervas de regulação hormonal + ervas adaptógenas (redução do estresse)

- Vitex agnus castus
- Peonia branca: alivia espasmos
- Unha de gato
- Chá verde
- Gengibre
- Fucus vesiculosus (Kelp)
- Uxi amarelo
- Angelica sinensis
- Erva baleeira + mil folhas: efeito analgésico
- Alecrim

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Desempenha um papel importante na regulação do sistema imunológico e atenuando a inflamação, dois fatores muito importantes no tratamento da endometriose.
NÍVEIS IDEAIS: 96 – 115 mcg/dL
Dose Usual – 15 mg
Dose Mínima – 7 mg Dose Máxima – 30 mg

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Mulheres com endometriose tendem ter níveis mais baixos de vitamina D, o que demonstrou aumentar a gravidade da doença. Pela sua importante ação no sistema imune, a correção da deficiência de vitamina D pode controlar a doença, aliviar a dor e melhorar as taxas de implantação entre mulheres com endometriose que desejam engravidar. NIVEIS IDEAIS: 40 – 60 ng/dl.
Dose de manutenção: 2000ui por dia ou 14000ui por semana.

Comunidade Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

# ADENOMIOSE

COMUNIDADE

Saúde Conectada

É uma doença inflamatória

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



É um tipo diferente de crescimento anormal na parede uterina. É semelhante aos miomas uterinos e, até recentemente, costumava ser confundido com miomas.

Procure um diagnóstico preciso.

Os tratamentos convencionais podem ser muito diferentes.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40




Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

# SINTOMAS

Distensão abdominal, dor pélvica e menstruação muito intensa. É mais comum após os 35 anos, mas pode acomenter em qualquer idade.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

# TRATAMENTO

COMUNIDADE Saúde Conectada

Terapêutica hormonal
- Anticoncepcional
- DIU hormonal

Cirurgia;
- Histerectomia

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

# ESTRATÉGIAS

Conectadas

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Combinação das mesmas estratégias para endometriose + estratégia para redução do fluxo sanguíneo intenso:

1. Dar suporte a progesterona: com nutrientes, suplementos, fiteterápicos para isso.
2. Metabolizar bem o estrogênio: focando na detoxficação pelo fígado e cuidando da saúde intestinal, especialmente do estrobolôma. Predominância estrogênica
3. Reduzir a inflamação: deve começar o quanto antes , com chás, shots e suplementos de acordo com suas questões individuais.
4. Cuidar da comunicação entre cérebro - ovários - adrenal - tireoide: sono de qualidade e de adaptógenos para minimizar o estresse

Sangramento excessivo

É importante consultar o médico para descartar outras patologias
Vitex agnus

Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

# VÍCIOS EMOCIONAIS

Saúde Conectada

Roda de Mentalidade

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

## Fisioterapia pélvica e Endometriose

A fisioterapia pélvica e os exercícios de pompoarismo são importantes no tratamento das mulheres com endometriose, mas principalmente, quando os sintomas dolorosos já foram resolvidos. É muito comum que mulheres com endometriose tenham dor de profundidade durante as relações sexuais e algumas vezes acabam desenvolvendo dores miofaciais e vaginismo.

O vaginismo é uma contração involuntária dos músculos da vagina, que causa dor na entrada, durante as penetrações. Os exercícios de fisioterapia pélvica e os exercícios de pompoarismo fazem com que a mulher aprenda a relaxar a musculatura e com isso ocorre a melhora do vaginismo.
Diversas pesquisas têm demonstrado que mulheres com endometriose têm maior chance de apresentarem alterações sexuais, como menor lubrificação, menor desejo sexual e dificuldades para o orgasmo.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Observational Study > Psychiatr Danub. 2021 Spring-Summer;33(Suppl 4):632-636.

# Endometriosis, Pain and Mental Health

Bernarda Škegro [1], Sarah Bjedov, Mislav Mikuš, Filip Mustač, Joško Lešin, Valentina Matijević, Mario Ćorić, Vesna Elveđi Gašparović, Filip Medić, Vesna Sokol Karadjole

> J Eval Clin Pract. 2024 Feb 18. doi: 10.1111/jep.13974. Online ahead of print.

# Emotions of endometriosis in clinical encounters: An analysis of women's experiences of health care

Julia M Abraham [1], Rajasekaran V [1]

COMUNIDADE Saúde Conectada

> JAMA Netw Open. 2023 Jan 3;6(1):e2251214. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.51214.

# Epidemiologic and Genetic Associations of Endometriosis With Depression, Anxiety, and Eating Disorders

Dora Koller [1 2 3], Gita A Pathak [1 2], Frank R Wendt [1 2], Daniel S Tylee [1 2], Daniel F Levey [1 2], Cassie Overstreet [1 2], Joel Gelernter [1 2], Hugh S Taylor [4], Renato Polimanti [1 2]

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Como a endometriose é uma doença psicossomática por afetar tanto o físico como o emocional, os aspectos psicológicos encontrados nas mulheres são: baixa autoestima, imagem corporal alterada, comportamentos agressivos, isolamento social, depressão e ansiedade. Tudo isso é muito prejudicial porque pode resultar em sérias consequências, a saber, perdas do emprego, do (a) companheiro (a), estudos e planos futuros.

Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

“Olhando para a endometriose, a conexão emocional pode ser encontrada em algo muito comum a muitas mulheres: cuidar mais do outro do que de si mesma. O útero parece espelhar o comportamento, fazendo o material do útero – o endométrio, que é o primeiro acolhimento maternal que o embrião recebe – crescer fora dele, tentando maternar a mulher que não está se maternando”.

O endométrio é o primeiro tecido que acolhe o feto. Quando você só faz pelo outro, como se o corpo quisesse te acolher, acolhimento maternal.

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Olhar mais para si !!

Precisa estar bem para se doar !!

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40