COMUNIDADE
Saúde Conectada

INFECÇÃO URINÁRIA

Comunidade Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Infecção urinária é qualquer infecção por micro-organismos que acometa o trato urinário. Dependendo da estrutura acometida, a infecção tem nomes diferentes: uretrite (uretra), cistite (bexiga) ou pielonefrite (rins). Embora vários micro-organismos possam causar o problema, geralmente a responsável é a bactéria Escherichia coli, presente naturalmente no intestino e importante para a digestão, mas patogênica para o aparelho urinário.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE

Saúde Conectada

CAUSAS

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Homens, mulheres e crianças estão sujeitos à infecção, mas ela é mais prevalente em **mulheres** porque suas características anatômicas as tornam mais vulneráveis. A uretra da mulher, além de muito mais curta do que a do homem, está mais próxima do ânus, o que favorece a passagem de micro-organismos para a região.

Pessoas com **diabetes** descontrolado também têm risco aumentado, devido às alterações causadas pelas altas taxas de açúcar no organismo que caracterizam a doença. Nos homens, depois dos 50 anos, o crescimento da próstata e consequente retenção de urina na bexiga podem causar o problema.

O risco de contrair uma infecção é maior após uma **relação sexual**, provavelmente porque a uretra sofre microtraumas — normais durante o sexo — e torna-se vulnerável à instalação de bactérias.

É mais comum também na **menopausa**, quando diminuem as taxas de estrógeno, hormônio que protege o trato urinário.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

SINAIS E SINTOMAS

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

- Necessidade urgente de urinar com frequência;
- Escassa eliminação de urina em cada micção;
- Ardor ao urinar;
- Dores na bexiga, nas costas e no baixo ventre;
- Febre;
- Sangue na urina nos casos mais graves.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

DIAGNÓSTICO

COMUNIDADE Saúde Conectada

- Levantamento da história clínica do paciente e de seus sintomas;
- Exame de urina tipo I;
- Urocultura com antibiograma (para identificar o agente infeccioso e orientar o tratamento).

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- Especialmente nas mulheres, as recidivas podem ser frequentes e mais graves, mas se o tratamento for seguido à risca, a probabilidade de cura é grande. Lembre-se de tomar os medicamentos respeitando o tempo recomendado pelo médico mesmo que os sintomas tenham desaparecido já nas primeiras doses.

- Ainda assim, algumas mulheres podem ter infecção urinária com muita frequência. Se você tiver **3 ou mais episódios** em um período de 12 meses, consulte um ginecologista e relate essa recorrência, pois nesses casos pode ser necessário um tratamento mais prolongado.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Recomendações para evitar infecção urinária

- Beba muita água. O líquido ajuda a expelir as bactérias da uretra e da bexiga;
- Urine com frequência. Reter a urina na bexiga por longos períodos é uma contraindicação importante.
- Urinar depois das relações sexuais favorece a eliminação das bactérias que se encontram no trato urinário;
- Redobre os cuidados com a higiene pessoal. Mantenha limpas a região da vulva e do ânus. Depois de evacuar, passe o papel higiênico de frente para trás;

SEXUALIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde Conectada

- Sempre que possível, lave-se com água e sabão. Ainda assim, não exagere, pois a lavagem em excesso pode prejudicar o equilíbrio da flora genital, importante para a proteção do nosso organismo;
- Evite roupas íntimas muito justas ou que retenham calor e umidade, porque facilitam a proliferação das bactérias;
- Suspenda o consumo de tabaco, álcool, temperos fortes e cafeína. Essas substâncias irritam o trato urinário;
- Troque os absorventes higiênicos com frequência para evitar o proliferação bacteriana.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

TRATAMENTO

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE

Saúde Conectada

Às vezes, o próprio organismo dá conta de eliminar as bactérias. Em certos casos, o tratamento requer o uso de antibióticos que serão escolhidos de acordo com o tipo de bactéria encontrada no exame laboratorial de urina.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Não existe atalho!



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- Água
- Dieta
- Redução de açúcar (60 dias)
- Tratar o intestino (Protocolo 6r's)

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Alimentos prebióticos - Reduz E. Coli

Aspargos, aveia, mel, gérmen de trigo, alho poró, banana verde, farinha de uva, cebola roxa, alho, goma acácia, inulina, FOS, etc.

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE Saúde Conectada

Quercetina

A Quercetina apresenta propriedades anti-inflamatórias, anticarcinogênica, atua no sistema imunológico, tem atividade antiviral, reduz o efeito da formação de cataratas nos diabéticos, é hepatoprotetora e gastroprotetora. Há inúmeras aplicações na medicina principalmente nos tratamentos de problemas circulatórios e capilares, incluindo inflamações de qualquer tipo.

- Extrato seco (95%): 400 a 500mg por via oral, três vezes ao dia.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

BENEFÍCIOS

- Fortalece a barreira do intestino
- Melhora a imunidade
- Diminui a inflamação do intestino
- Melhora a relação cintura x quadril
- Aumento da saciedade
- Contribui para a metabolização e absorção de nutrientes

- DOSAGEM USUAL
- 250 mg/dia a 500 mg/dia.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Chás:

- Hibiscus
- Cabelo de milho
- Uva ursina
- Hidraste
- Dente de leao
- Hortelã
- Cúrcuma
- Sálvia
- Alecrim
- Cavalinha

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

> Mol Cell Biochem. 2007 Mar;297(1-2):131-8. doi: 10.1007/s11010-006-9337-x. Epub 2006 Oct 19.

Caffeic acid phenethyl ester suppresses oxidative stress in Escherichia coli–induced pyelonephritis in rats

COMUNIDADE Saúde Conectada

Abstract

Although oxidative damage is known to be involved in inflammatory-mediated tissue destruction, modulation of oxygen free radical production represents a new approach to the treatment of inflammatory diseases. Caffeic acid phenethyl ester (CAPE), an active component of propolis from honeybee hives, has antioxidant, anti-inflammatory and antibacterial properties. For that reason, we aimed to investigate the efficiency of CAPE administration in preventing oxidative damage in pyelonephritis (PYN) caused by Escherichia coli. In this study, 35 Wistar rats were grouped as follows: control, PYN 24 h, PYN 48 h, PYN 72 h, CAPE 24 h, CAPE 48 h and CAPE 72 h. E. coli (1 x 10(9) c.f.u.) were inoculated into the rats in both PYN and CAPE groups via urethral catheterization. Ten microM/kg-body weight CAPE was injected to the rats in all CAPE groups 24 h before E. coli infection, and injections were repeated at 24-h intervals. Rats were sacrificed 24 h, 48 h and 72 h after infection in both PYN and CAPE groups. Malondialdehyde (MDA) and nitric oxide (NO) levels were significantly increased in kidneys of PYN groups. The activities of the antioxidant enzymes, catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GSH-Px), and xanthine oxidase (XO) were also elevated by E. coli. However, CAPE administration reduced MDA and NO levels, as well as XO activity, although it increased SOD and GSH-Px activities. Histopathological examination showed that CAPE reduced the inflammation grade induced by E. coli. In conclusion, CAPE administrations decrease the oxidative damage occurring in PYN and therefore could be used for medical management of bacterial nephropathy.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Review > Molecules. 2022 Feb 23;27(5):1503. doi: 10.3390/molecules27051503.
Free full text at PubMed Central

Cranberry: Chemical Composition, Antioxidant Activity and Impact on Human Health: Overview

Boris V Nemzer [1] [2], Fadwa Al-Taher [1], Alexander Yashin [3], Igor Revelsky [4], Yakov Yashin [3]



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

> Evid Based Complement Alternat Med. 2021 Jun 23:2021:9976299. doi: 10.1155/2021/9976299. eCollection 2021.

Pycnogenol® Supplementation Prevents Recurrent Urinary Tract Infections/Inflammation and Interstitial Cystitis

A Ledda [1], S Hu [1], M R Cesarone [1], G Belcaro [1], M Dugall [1], B Feragalli [1], R Cotellese [1], M Hosoi [1], E Ippolito [1], M Corsi [1], R Luzzi [1]

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE Saúde Conectada

3 lactobacilos + 1 bifidum

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Mariana Martins - 874.232.516-49
Saúde Conectada COMUNIDADE

Randomized Controlled Trial > Complement Ther Med. 2019 Feb:42:429-437.
doi: 10.1016/j.ctim.2018.12.007. Epub 2018 Dec 12.

Vitamin A supplementation is effective for improving the clinical symptoms of urinary tract infections and reducing renal scarring in girls with acute pyelonephritis: a randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical trial study

COMUNIDADE Saúde Conectada

Randomized Controlled Trial > Infect Dis (Lond). 2016 Nov-Dec;48(11-12):823-8.
doi: 10.1080/23744235.2016.1201853. Epub 2016 Jun 30.

Prevention of urinary tract infections with vitamin D supplementation 20,000 IU per week for five years. Results from an RCT including 511 subjects

Rolf Jorde [1 2], Stina T Sollid [1 2], Johan Svartberg [1 2], Ragnar M Joakimsen [1 2], Guri Grimnes [1 2], Moira Y S Hutchinson [3]

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Observational Study > J Altern Complement Med. 2017 Jun;23(6):471-478.
doi: 10.1089/acm.2016.0312. Epub 2017 Apr 17.

Effect of a Food Supplement Containing L-Methionine on Urinary Tract Infections in Pregnancy: A Prospective, Multicenter Observational Study

Mario Passaro [1], Giampaolo Mainini [2], Francesco Ambrosio [1], Raimondo Sgambato [3], Giancarlo Balbi [4]

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Review > Antibiotics (Basel). 2021 Dec 23;11(1):14. doi: 10.3390/antibiotics11010014.

Xyloglucan, Hibiscus and Propolis in the Management of Uncomplicated Lower Urinary Tract Infections: A Systematic Review and Meta-Analysis

Tommaso Cai [1 2], Umberto Anceschi [3], Irene Tamanini [1], Serena Migno [4], Michele Rizzo [5], Giovanni Liguori [5], Alejandro Garcia-Larrosa [6], Alessandro Palmieri [7], Paolo Verze [8], Vincenzo Mirone [7], Truls E Bjerklund Johansen [2 9 10]

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Clinical Trial > Arch Ital Urol Androl. 2018 Jun 30;90(2):97-100. doi: 10.4081/aiua.2018.2.97.

L-Methionine associated with Hibiscus sabdariffa and Boswellia serrata extracts are not inferior to antibiotic treatment for symptoms relief in patients affected by recurrent uncomplicated urinary tract infections: Focus on antibiotic-sparing approach

Tommaso Cai [1], Andrea Cocci, Daniele Tiscione, Marco Puglisi, Fabrizio Di Maida, Gianni Malossini, Paolo Verze, Alessandro Palmieri, Vincenzo Mirone, Truls E Bjerklund Johansen

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Review > Nutr J. 2022 Mar 22;21(1):18. doi: 10.1186/s12937-022-00769-x.

Role of D-mannose in urinary tract infections - a narrative review

Reeta Ala-Jaakkola [1], Arja Laitila [1], Arthur C Ouwehand [2], Liisa Lehtoranta [1]

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE

Saúde Conectada

Braz J Microbiol. 2013 Dec 17;44(3):829-34. doi: 10.1590/S1517-83822013005000061. eCollection 2013.

Evaluation of the antibacterial potential of Petroselinum crispum and Rosmarinus officinalis against bacteria that cause urinary tract infections

Fernanda Villas Boas Petrolini [1], Rodrigo Lucarini [1], Maria Gorete Mendes de Souza [1], Regina Helena Pires [1], Wilson Roberto Cunha [2], Carlos Henrique Gomes Martins [1]

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Review > Curr Urol Rep. 2018 Oct 18;19(12):97. doi: 10.1007/s11934-018-0849-1.

Patient Distress in Women with Recurrent Urinary Tract Infections: How Can Physicians Better Meet Patients Needs?

Dena Moskowitz [1], Una Lee [2]

Affiliations expand

PMID: 30338431 DOI: 10.1007/s11934-018-0849-1

Abstract

Purpose of review: Recurrent urinary tract infections are a common condition that can impact patients' quality of life. The purpose of this review is to summarize and analyze the literature regarding the distress that these infections can cause to patients and provide guidance to clinicians on how to improve care of these patients.

Recent findings: The current literature on patient perspectives in urinary tract infections shows an emotional symptom experience that is not consistent with the typical symptoms expected by clinicians. The infections can impact all aspects of quality of life, including social, emotional, and financial domains. Women with recurrent urinary tract infections experience a significant amount of distress. They have a strong desire for validation of their experiences by their physicians. Clinicians can best serve these patients by understanding the true impact of their condition and creating treatment strategies that include shared decision making to meet patients' goals.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Randomized Controlled Trial > Chin J Integr Med. 2011 Nov;17(11):860-3.
doi: 10.1007/s11655-011-0800-6. Epub 2011 Aug 1.

Clinical observation on the acupuncture treatment in patients with urinary retention after radical hysterectomy

Wei-Min Yi [1], Ai-Zhen Pan, Jian-Jun Li, Dan-Feng Luo, Qi-Hui Huang

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Rotina Diária

Chás
Melissa
Passiflora
Mulungu
Capim limão
Erva cidreira
Valeriana

Suplementos
Própolis
L theanina

Imersão Saúde Mental + Roda

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

> Expert Opin Drug Saf. 2023 Nov 27:1-6. doi: 10.1080/14740338.2023.2288897.
Online ahead of print.

Urinary tract infections and genital mycotic infections associated with SGLT-2 inhibitors: an analysis of the FDA Adverse Event Reporting System

Ting Yang [1], Ying Zhou [1], Yimin Cui [1 2]

Affiliations + expand

PMID: 38009230 DOI: 10.1080/14740338.2023.2288897

COMUNIDADE Saúde Conectada

Abstract

Background: Sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT-2) inhibitors are a class of antihyperglycemic agents, including canagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin, and ertugliflozin. Risk of urinary tract infections (UTIs) and genital mycotic infections (GMIs) associated with SGLT-2 inhibitors is of great clinical significance. The study aimed to assess the association between SGLT-2 inhibitors and occurrences of UTIs and GMIs using the FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) database.

Methods: We used OpenVigil 2.1-MedDRA-v24 to query the FAERS database. Disproportionality analysis was performed to detect adverse event signals. Reporting Odds Ratio (ROR) and Proportional Reporting Ratio (PRR) were calculated to measure the disproportionality.

Results: A total of 45,256 reports related to the use of SGLT-2 inhibitors, including 1,714 UTI cases and 438 GMI cases, were retrieved. Potential positive signals for UTIs and GMIs were identified for canagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin, and ertugliflozin in adult patients of all ages and both sexes.

Conclusions: Data mining in the FAERS database suggests strong association between SGLT-2 inhibitors and UTIs/GMIs. These findings provide real-world evidence on the potential risk of UTIs/GMIs related to SGLT-2 inhibitors.

TABLE 2 Overview of Available SGLT2i

SGLT2i	Selectivity of SGLT2 Over SGLT1	Approval for T2DM
Empagliflozin	2,700	U.S., Europe, most of Asia
Canagliflozin	250	U.S., Europe, most of Asia
Dapagliflozin*	1,200	U.S., Europe, most of Asia
Ertugliflozin	2,200	U.S., Europe, most of Asia
Sotagliflozin*	20	–
Ipragliflozin	360	Japan
Tofogliflozin	2,900	Japan
Luseogliflozin	1,770	Japan

*Approved for treatment of type 1 diabetes mellitus in Europe.
SGLT1 = sodium glucose cotransporter 1; other abbreviations as in Table 1.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE

Saúde Conectada

PREVENÇÃO

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Banho de assento

- 1 vez por semana para prevenção e manutenção do equilíbrio do microbioma vaginal. A depender de algumas variações, ou diariamente próximo ao período menstrual (1 semana antes de menstruar), já que a mudança do pH vaginal pode ser um ambiente para a proliferação de fungos e surgimento de candidíase ou infecção.

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

A forma de preparo é semelhante ao do chá: infusão ou decocção dependendo da parte da planta utilizada, sendo que a quantidade da erva é maior por causa da quantidade de água. Para cada litro de água, colocar duas colheres de sopa da erva. Coar, colocar na bacia e acrescentar água fria para amornar. A quantidade de água vai depender do tamanho da bacia. É necessário apenas que ao sentar-se na bacia a água cubra a região da vulva. Ficar até a água esfriar ou o quanto sentir-se bem, pelo menos 15-20 minutos.

- 1 a 2 gotas de óleo essencial de melaleuca
- 1 col. de sopa de azeite
- 100 ml de água
- Dilua o óleo na água e realize o banho de assento uma vez ao dia, por 20 minutos.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- Sopa de folha de espinafre + 1 cenoura. Beber 2 vezes ao dia
- 200 ml de água + 2 col. de chá de vinagre de maçã + 1 col. de chá de mel. Beber 3 vezes ao dia
- Água da noite com 1 punhado de cranberry + 1 col. de chá limão. Tomar 3 a 4 vezes ao dia
- Banho de assento de bicarbonato de sódio

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Ducha vaginal

COMUNIDADE Saúde Conectada

- 1 col. de chá de aloe e vera com água morna
- 1 col. de chá de vinagre branco

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE

Saúde Conectada

Cistite pode revelar emoções inflamadas

A infecção urinária, ocorre quando tentamos conter as emoções.

Fisicamente, a bexiga é o órgão responsável por reter e filtrar a água do corpo, eliminando o que não serve e dando de volta o que ainda pode ser usufruído.

Metaforicamente, isso tem a ver com sua capacidade de filtrar as emoções e eliminar (ou não) as emoções.

Afinal, a água simboliza as emoções. Quando seguramos as lágrimas, também seguramos as mágoas, impedindo que essas águas/emoções fluam pelo seu corpo.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Dicas para o problema

Para prevenir a infecção urinária, deixe ir o que não lhe pertence mais, livre-se de emoções reprimidas, abandone as mágoas, não segure mais suas emoções, chore. Também não segure a urina, coloque-se em primeiro lugar, o trabalho ou qualquer outra responsabilidade pode esperar.

Quando a infecção aparece, a pessoa sente dor ao urinar. Esse desconforto físico pode ser comparado à dor de deixar ir embora aquilo que não você quer perder, ou ao medo de seguir adiante.

Se já está sofrendo de cistite, a dica é: quando for urinar, sente-se no assento e relaxe. Preste atenção no seu períneo (região entre a vagina – ou o saco escrotal – e o ânus), que também deve estar bem relaxado.

Depois que urinar tudo, conte até três e force novamente para sair o resto da urina. É esse resto de urina que normalmente leva à cistite – caracterizada por uma tensão muscular, que nada mais é do que um reflexo no corpo, do ato de segurar aquilo que precisamos deixar ir.

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40