

水培植物养护卡

罗汉松·红颜（如意皇后类观叶植物）
容器：玻璃瓶 + 木盖 + 带槽内胆 + 岩棉固定

核心一条：水位没过根系一半，泡棉不接触水面

0 先确认你的两株是什么

名称	品种确认	习性要点
水培罗汉松	罗汉松（针叶灌木，木质根）	喜明亮散射光，可略多光；木质根怕长期缺氧，水位取低；生长慢，勿重剪
水培红颜	天南星科观叶植物（如意皇后类，粉绿斑纹叶）	耐阴、忌阳光直射；斑纹要鲜艳需明亮散射光；汁液微毒，勿让宠物啃食

1 水位线定在哪里（决定成败）

水位示意（从上到下）：

植物 → 岩棉/泡棉（必须干燥） → 根的上半截（在空气中） → —— 水位线 —— → 根的下半截（泡在水里） → 瓶底留 2~4 cm 水

项目	标准做法
瓶内水量	加水 2~4 cm 深（约瓶高的 1/5 ~ 1/4），最高不超过内胆高度的 1/3
罗汉松水位	再低一档：水面刚好碰到内胆底部，只让最下面一撮根吸到水
红颜水位	到标准线上限即可，同样不能碰到泡棉
绝对禁止	水淹到泡棉或根颈 → 茎基腐烂；根全部泡水 → 缺氧烂根
判断口诀	根分两截：下半截在水里，上半截和泡棉在空气里

2 补水（加水）——看水位，不看日历

项目	做法
检查频率	夏季每 2~3 天看一眼；秋季（当前）每 3~5 天；冬季每 7~10 天
什么时候补	水位降到「泡不到一半根」时，补回标准水位线
用什么水	晾过 1~2 天的自来水，或纯净水；水温必须接近室温
关键规则	补水只加水，绝不加营养液
上限	连续补水 2 次后，第 3 次必须整瓶换水（蒸发只走水，盐分废物全留在瓶里）

3 换水（整瓶换）——看日历，更要看水质

现在是 10 月（秋季生长期）：罗汉松 7~10 天一次，红颜 7 天左右一次。

阶段 / 季节	罗汉松	红颜（如意皇后）
刚买回的头 2~3 周	3~5 天一次（只用清水）	3~5 天一次（只用清水）
秋季（当前）	7~10 天	7 天左右
春季	7~10 天	5~10 天
夏季（>28℃）	5~7 天	5 天左右
冬季	15~20 天	10~15 天

出现以下任一情况，别等日历，立刻换：水变浑/发黄、有臭味、摸起来滑腻、瓶壁长绿藻、根部发黑发软。

4 换水 7 步（照做即可）

- 提前 1~2 天接一盆自来水放着散氯（或备好纯净水）。
- 把内胆从瓶中轻轻提出，倒掉旧水。
- 用室温清水冲洗根部，把黏液和绿藻冲掉；根太密可用手轻轻拨开冲。
- 剪烂根：发黑、发软、一拉就断、有臭味的剪掉；伤口大就先只放清水养 1~2 周。
- 洗净瓶内壁（软布擦掉藻和褐色沉淀，不要留洗洁精残留）。
- 加新水到标准水位线（罗汉松偏低、红颜到线），水温别比瓶温低太多。
- 只在这一次加营养液（如该加），然后放回原位。

5 营养液：要不要加、什么时候加

阶段	做法
刚买回的前 2~3 周（缓苗期）	只用清水，绝对不加肥。根系未适应水生环境，加肥必烧根
开始加的信号	从内胆缝隙看到新长出的白色/淡黄色嫩根，说明已经服盆
服盆后·春秋生长期	每次整瓶换水时加一次，浓度为说明书标称的 1/2（保守可取 1/3）
夏季 >30℃	减半或停肥
冬季 <15℃	停肥，或一个月一次极稀的
室内有暖气、正常生长	保持每 2 周一次

用量：买液体通用观叶型水培营养液（勿把土培颗粒复合肥丢进水里，会烧根、发臭、爆藻）。第一次按 1 升水加 0.5~1 ml，宁淡勿浓；罗汉松生长慢，取更低一档。

判读	表现	怎么处理
缺肥	新叶变小、颜色整体淡黄、生长停滞、老叶发黄脱落	换水时按 1/2 浓度补肥
肥害	叶尖叶缘焦黑、根变褐、水面起泡有异味	立刻换成纯清水，停肥 2~3 周

想让红颜的斑纹鲜艳，光（明亮散射光）比肥更关键；猛加肥反而会返绿徒长。

6 症状速查表

症状	多半原因	处理
叶发黄、发软，水有臭味	烂根 / 缺氧	剪烂根、降低水位、勤换水、加强通风
新叶小、色淡、不长	缺肥，或光太弱	加 1/2 浓度营养液，移到明亮散射光处
叶片焦边发白	阳光直射暴晒	移到散射光处（红颜尤其怕晒）
水快速变绿	光照强 + 水中养分多	遮光、减营养液、勤换水
突然大量落叶	温差大 / 冷风 / 换水太猛	稳定温度、避开风口，换水用室温水
泡棉处发黑发软	水位过高，泡棉长期泡水	立即降水、剪除腐烂部分、换清水

7 日常检查清单（每次看的时候过一遍）

- ☐ 水位是否还在「泡住一半根」的线上？
- ☐ 泡棉/岩棉是不是干的？（湿了就是水位太高）
- ☐ 水浑不浑、有没有味、摸起来滑不滑？瓶壁有没有长绿藻？
- ☐ 有没有发黑发软的烂根要剪？
- ☐ 距上次整瓶换水几天了？到期了吗？
- ☐ 这次是「换水」还是「补水」？（补水不加肥）
- ☐ 位置有没有被阳光直射、被空调/暖气吹？

8 环境与日常要点

项目	罗汉松	红颜（如意皇后）
光照	明亮散射光，可略多光；长期阴暗会黄叶掉叶	明亮散射光，忌直射；太暗斑纹会返绿
温度	15 ~ 28 ℃ 最佳；冬季最好 10 ℃ 以上	5 ℃ 以上能活，20 ℃ 左右最理想
通风	必须通风，夏季闷热是烂根主因	同左，避开空调风口直吹
湿度	可偶尔向叶面喷雾（保持通风）	可偶尔喷雾，别让水积在叶心
施肥倾向	偏氮，薄肥，浓度取低	通用观叶型即可
其他	生长慢，修剪少量多次；注意介壳虫、红蜘蛛	汁液微毒，修剪后洗手；宠物/小孩注意

9 换水打卡表（打印后可手写）

日期	补水 ✓	换水 ✓	加肥 ✓	水位是否过高	根/水状态备注