

ANÁLISIS NUMÉRICO II — Práctico N°6 - 2026
Autovalores

1. Sea A una matriz simétrica y, $Ax = \lambda x$ y $Ay = \alpha y$ con λ y α números reales. Mostrar que:
 - a) $y^T Ax = \lambda y^T x$,
 - b) $x^T Ay = \alpha x^T y$,
 - c) $y^T Ax = x^T Ay$,
 - d) $y^T x = 0$, si $\lambda \neq \alpha$.
2. Demuestre que si A es simétrica y $Av = \lambda v$, entonces $\hat{A} = A - \lambda vv^T$ es simétrica y tiene los mismos autovalores de A salvo λ .
3. **Implemente** una función llamada `autjacobi`, que utilice el método de Jacobi para hallar los autovalores de una matriz simétrica A . La función debe tener como entrada A , una tolerancia ϵ y una cantidad máxima de iteraciones m (por defecto, $\epsilon = 10^{-10}$ y $m = 500$).
4. **Implemente** una función llamada `dvsingulares` que utilice la función del ejercicio 3 y la descomposición QR con permutación de columnas para obtener la descomposición en valores singulares de una matriz A . Debe retornar U , Σ y V .
5. **Implemente** la siguientes funciones para encontrar un autovalor ρ con su autovector q utilizando método de las potencias. Deben tener como entrada una matriz A , un vector inicial q^0 , una tolerancia ϵ y una cantidad máxima de iteraciones m (por defecto, $\epsilon = 10^{-10}$ y $m = 500$).
 - a) `autpotenciasinf` que utilice norma infinito.
 - b) `autpotencias2` que utilice norma 2.
 - c) `autrayleigh` que utilice la iteración del cociente de Rayleigh.
6. **Dinámica Poblacional.** Sea n_i^t la cantidad de individuos en la faja etaria i al final del año t , s_i la porción de individuos de la faja i que pasan anualmente a la faja $i + 1$ y f_i la tasa de fecundidad per cápita de la faja i . Entonces la dinámica de la población cumple con las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} n_1^{t+1} &= f_1 n_1^t + \dots + f_p n_p^t \\ n_i^{t+1} &= s_i n_{i-1}^t \quad \text{para } i = 2, \dots, p. \end{aligned}$$

De manera vectorial esta dinámica puede escribirse como $n^{t+1} = Ln^t$ donde L es llamada matriz de Leslie. Con el autovalor dominante λ_1 de esta matriz se obtiene que si $\lambda_1 < 1$ la población decrece exponencialmente, $\lambda_1 > 1$ la población crece exponencialmente y $\lambda_1 = 1$ la población es estable e igual al autovector asociado.

Determine el comportamiento de la población de esta especie:

edad	0-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14
f_i	0.0	0.2	0.9	0.9	0.9	0.8	0.3
s_i	0.3	0.7	0.9	0.9	0.9	0.6	0.0
n_i^0	10	2	8	5	12	0	1

7. Sea p un polinomio tal que $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$. Demuestre que las raíces de p son los autovalores de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 & -a_0 \\ 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 1 & \end{bmatrix}.$$

8. Sea H Hessenberg superior tal que $H = Q^T A Q$. Demuestre que si A es simétrica entonces H es tridiagonal.
9. **Implemente** una función llamada `fhess` que retorne la forma de Hessenberg de una matriz. Debe tener como entrada una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y un string `met` para usar un método: `hholder` para reflexiones de Householder o `givens` para rotaciones de Givens. La salida debe ser Q ortogonal y H Hessenberg superior tal que $H = Q^T A Q$.
10. **Implemente** una función llamada `autqr_hess`, que ejecute el método de iteraciones QR para hallar los autovalores de $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, comenzando con una reducción en su forma de Hessenberg y utilizando luego rotaciones de Givens. Debe tener como entrada una matriz A y una cantidad máxima de iteraciones m (por defecto $m = 500$). Testear el algoritmo con la siguiente matriz:

$$A = \begin{bmatrix} B & -I & 0 \\ -I & B & -I \\ 0 & -I & B \end{bmatrix}, \text{ con } B = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}.$$