Análisis Numérico II / Álgebra Lineal Numérica

Clase 17: GMRES Revisitado



Marco General de los Métodos de Proyección

Para resolver el sistema lineal $Ax = b$ con $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ no singular y solución exacta x^*:

- Se construye $\{x^k\}$ proyectando x^* sobre $\mathcal{M}_k \subseteq \mathbb{R}^n$.
- Las variedades afines son $z + \mathcal{K} = \{z + v \mid v \in \mathcal{K}\}$, donde $\mathcal{K} \subseteq \mathbb{R}^n$ es un subespacio vectorial y $z \in \mathbb{R}^n$.
- No se conoce x^*, entonces se plantea minimizar $f(x) = \frac{1}{2} x^T Q x + x^T q + c$ con $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simétrica semidefinida positiva, $q \in \mathbb{R}^n$ y $c \in \mathbb{R}$.
- El esquema iterativo es:
  i. Si $\|\nabla f(x^k)\| = 0$, detener.
  ii. Obtener x^{k+1} como la solución de minimizar $f(x)$ sobre $\mathcal{M}_k$.
  iii. Definir $\mathcal{M}_{k+1}$, hacer $k \leftarrow k + 1$ y repetir.

Teorema: Minimización sobre Variedades Afines

Sea $z \in \mathbb{R}^n$, $\mathcal{K} \subseteq \mathbb{R}^n$ un subespacio vectorial, y $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definida anteriormente. El vector $\bar{x}$ es solución del problema de minimización:

$$\min_{x \in z+\mathcal{K}} f(x)$$

si y solo si $\bar{x} \in z + \mathcal{K}$ y satisface la condición de ortogonalidad:

$$\nabla f(\bar{x})^T v = 0, \quad \forall v \in \mathcal{K}$$

Demostración: Necesidad ($\Rightarrow$)

Sea $\bar{x}$ solución de $\min_{x \in z+\mathcal{K}} f(x)$, de modo que existe $\bar{v} \in \mathcal{K}$ con $\bar{x} = z + \bar{v}$.

- Dado $v \in \mathcal{K}$ arbitrario y $t \in \mathbb{R}$, como $\mathcal{K}$ es subespacio, el vector perturbado pertenece a la variedad afín: $\bar{x} + tv = z + (\bar{v} + tv) \in z + \mathcal{K}$.
- Dado que $\bar{x}$ minimiza a f en la variedad, vale $f(\bar{x}) \leq f(\bar{x} + tv)$ para todo $t \in \mathbb{R}$.
- Tomando $t > 0$ y la diferenciabilidad de f:

$$0 \leq \lim_{t \to 0^+} \frac{f(\bar{x} + tv) - f(\bar{x})}{t} = \nabla f(\bar{x})^T v$$

- Repitiendo el argumento para $-v \in \mathcal{K}$, queda $\nabla f(\bar{x})^T (-v) \geq 0$, es decir, $\nabla f(\bar{x})^T v \leq 0$. Por lo tanto, $\nabla f(\bar{x})^T v = 0$ para todo $v \in \mathcal{K}$.

Demostración: Suficiencia ($\Leftarrow$)

Sea $\bar{x} \in z + \mathcal{K}$ tal que $\nabla f(\bar{x})^T v = 0 \, \forall v \in \mathcal{K}$. Entonces $\bar{x} = z + \bar{v}$ con $\bar{v} \in \mathcal{K}$.

- Para cualquier $x \in z + \mathcal{K}$ arbitrario, existe $v \in \mathcal{K}$ tal que $x = z + v$.
- Como $v - \bar{v} \in \mathcal{K}$, se cumple que $\nabla f(\bar{x})^T (v - \bar{v}) = 0$.
- Notando que $x - \bar{x} = v - \bar{v}$, $\nabla^2 f(x) = Q$ es semidefinida positiva y las derivadas de orden superior son nulas, realizamos la expansión exacta de Taylor:

$$f(x) = f(\bar{x}) + \nabla f(\bar{x})^T (x - \bar{x}) + \frac{1}{2} (x - \bar{x})^T \nabla^2 f(\bar{x}) (x - \bar{x})$$

$$f(x) = f(\bar{x}) + \underbrace{\nabla f(\bar{x})^T (v - \bar{v})}_{=0} + \frac{1}{2} \underbrace{(v - \bar{v})^T Q (v - \bar{v})}_{\geq 0} \geq f(\bar{x})$$

- Por lo tanto, $f(x) > f(\bar{x}) \forall x \in z + \mathcal{K}$, y $\bar{x}$ es minimizador global sobre

Caso Matriz General

Cuando $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ no es simétrica ni definida positiva:

- **Función Objetivo:** Se minimiza la norma Euclídea del residuo $\|Ax - b\|_2$, lo que equivale a considerar la norma $\|x - x^*\|_{A^T A}^2 = \|Ax - b\|_2^2$.
- **Formulación:** Se minimiza la función cuadrática:

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T A^T A x - x^T A^T b$$

- **Corolario** Dado $z \in \mathbb{R}^n$ y $V \in \mathbb{R}^{n \times p}$, el vector $\bar{x} = z + V\bar{\alpha}$ minimiza $f(x)$ sobre $z + \mathrm{Im}(V)$ si y solo si $\bar{\alpha}$ satisface el sistema:

$$(V^T A^T A V)\bar{\alpha} = V^T A^T r, \quad \text{con } r = b - Az$$

Método de Arnoldi: Construcción de la Base

Para evitar problemas numéricos, el método de Arnoldi construye iterativamente una base ortonormal $V = [v_1 \dots v_p]$ tal que $H = V^T AV$ sea Hessenberg superior:

- Partiendo de $v_1 = v/\|v\|_2$, se exige $AV = VH$ con

$$Av_j = \sum_{i=1}^{j+1} h_{ij} v_i = \sum_{i=1}^{j} h_{ij} v_i + h_{j+1,j} v_{j+1}$$

  donde $h_{lj} = v_l^T A v_j$ para $l = 1, \dots, j$, y $h_{j+1,j} v_{j+1} = Av_j - \sum_{i=1}^{j} h_{ij} v_i$.
- **Teorema:** Si el método de Arnoldi no se detiene antes del paso m ($h_{j+1,j} \neq 0$), los vectores $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ forman una **base ortonormal** del subespacio $\mathcal{K}_m(A, v)$.

Algoritmo (Método de Arnoldi)

Entradas: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $v \in \mathbb{R}^n$, $m \leq n$.
Salidas: $H \in \mathbb{R}^{(m+1) \times m}$ Hessenberg superior y base ortonormal $V \in \mathbb{R}^{n \times m}$.

1. Si $\|v\|_2 = 0$, definir $H = 0$, $V = 0$ y terminar.
2. Para $j = 1, \ldots, m$:
   i. $V_{*,j} = v / \|v\|_2$, $v = AV_{*,j}$.
   ii. Para $i = 1, \ldots, j$:

$$H_{ij} = v^T V_{*,i}, \quad v \leftarrow v - H_{ij} V_{*,i}$$

   iii. Si $\|v\|_2 = 0$, terminar. Sino, definir $H_{j+1,j} = \|v\|_2$.
3. Retornar H y V.

Propiedades Matriciales y la Relación de Arnoldi

Al agrupar los m pasos del algoritmo se deduce la identidad del subespacio de Krylov:

Proposición Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y suponga que Arnoldi realiza m pasos ($m \leq n$). Sea $\bar{H}_m \in \mathbb{R}^{(m+1) \times m}$ la matriz generada, y $H_m \in \mathbb{R}^{m \times m}$ $\bar{H}_m$ sin la última fila.

- **Demostración:** se genera la *Identidad de Arnoldi*:

$$AV_m = V_m H_m + h_{m+1,m} v^{m+1} (e^m)^T = V_{m+1} \bar{H}_m$$

  donde $e^m = [0, \ldots, 0, 1]^T \in \mathbb{R}^m$.
- Multiplicando por $(V_m)^T$ a izquierda y utilizando que $(V_m)^T V_m = I_m$ y $(V_m)^T v^{m+1} = 0$, se obtiene H_m, la *Proyección de Galerkin* de A sobre $\mathcal{K}_m(A, v)$:

$$(V_m)^T A V_m = H_m$$

El Método GMRES

Se resuelve el problema de minimización del residuo sobre $\mathcal{K}_m(A, r_0)$ reduciéndolo a un problema equivalente de cuadrados mínimos de dimensión pequeña.

Teorema: Para $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, el vector $\bar{x}$ es solución del problema de minimización:

$$\min_{x \in x_0 + \mathcal{K}_m(A, r_0)} \|Ax - b\|_2$$

si y solo si $\bar{x} = x_0 + V_m \bar{\alpha}$, donde $\bar{\alpha} \in \mathbb{R}^m$ es la solución del problema de cuadrados mínimos reducido:

$$\min_{\alpha \in \mathbb{R}^m} \|\bar{H}_m \alpha - \sigma e_1\|_2$$

donde $\sigma = \|r_0\|_2$, $e_1 = [1, 0, \ldots, 0]^T \in \mathbb{R}^{m+1}$, y $\bar{H}_m \in \mathbb{R}^{(m+1)\times m}$, $V_m \in \mathbb{R}^{n\times m}$ son generadas por el método de Arnoldi a partir de $v = r_0$.

Demostración

Dado que $\mathcal{K}_m(A, r_0) = \mathrm{Im}(V_m)$, cualquier vector $x \in x_0 + \mathcal{K}_m(A, r_0)$ se representa como $x = x_0 + V_m\alpha$ para algún $\alpha \in \mathbb{R}^m$.

1. Sustituyendo $AV_m = V_{m+1}\bar{H}_m$ y viendo que $r^0 = \sigma v^1 = \sigma V_{m+1}e^1$:

$$Ax - b = A(x_0 + V_m\alpha) - b = AV_m\alpha - r_0$$

$$Ax - b = V_{m+1}\bar{H}_m\alpha - \sigma V_{m+1}e^1 = V_{m+1}(\bar{H}_m\alpha - \sigma e^1)$$

2. Como las columnas de V_{m+1} son ortonormales, se preserva la norma 2:

$$\|Ax - b\|_2 = \|V_{m+1}(\bar{H}_m\alpha - \sigma e^1)\|_2 = \|\bar{H}_m\alpha - \sigma e^1\|_2$$

3. Minimizar $\|Ax - b\|_2$ sobre $x_0 + \mathcal{K}_m(A, r_0)$ equivale a resolver un problema de cuadrados mínimos de dimensión $(m+1) \times m$ sobre $\mathbb{R}^m$. ■

Algoritmo: Método GMRES

Entradas: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b, x \in \mathbb{R}^n$, $\varepsilon > 0$, $m \in \mathbb{N}$ (máx. iteraciones externas) y $m_A \ll n$ (dimensión del subespacio de Krylov). **Salida:** x^+ aproximación de x^*.

1. Definir $r = b - Ax$ y $\sigma = \|b - Ax\|_2$.
2. Para $k = 1, \ldots, m$: Si $\sigma \leq \varepsilon$, ir al Paso 3.
    - Definir $\bar{H}, V$ aplicando $Arnoldi(A, r, m_A)$.
    - α, σ_+ aplicando $CuadradosMinimosQR(\bar{H}, \sigma e_1)$.
    - $x \leftarrow x + V\alpha$.
    - $r = b - Ax$.
    - $\sigma = \sigma_+$.
3. Retornar $x^+ = x$.

Precondicionamiento

La velocidad de convergencia de los métodos iterativos está fuertemente determinada por las propiedades espectrales de A:

- **Mal Condicionamiento:** Si $\kappa(A) \gg 1$, los métodos iterativos requieren un número prohibitivo de pasos para alcanzar una tolerancia deseada.
- **Autovalores:** Un espectro muy amplio frena drásticamente la convergencia.

Podemos reemplazar el sistema original $Ax = b$ por un sistema equivalente que posea un **número de condición cercano a 1** o un **agrupamiento de autovalores** alrededor de 1.

Formulación Matemática

Buscamos una matriz no singular $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (el **precondicionador**) que aproxime a A:

- **Precondicionamiento por la Izquierda:**

  $$M^{-1}Ax = M^{-1}b$$

  Se modifica el residuo: $\tilde{r} = M^{-1}(b - Ax)$.

- **Precondicionamiento por la Derecha:**

  $$AM^{-1}y = b, \quad \text{con } x = M^{-1}y$$

  Conserva la norma del residuo original: $b - AM^{-1}y = b - Ax$.

- **Precondicionamiento Simétrico (para A SDP):**
  Dado $M = LL^T$, se resuelve $L^{-1}AL^{-T}\hat{x} = L^{-1}b$ con $x = L^{-T}\hat{x}$,

Condiciones de un Buen Precondicionador

La elección de M debe equilibrar eficacia y costo computacional:

1. **Aproximación Espectral ($M \approx A$):**
   - La matriz precondicionada $M^{-1}A$ debe estar bien condicionada: $\kappa(M^{-1}A) \ll \kappa(A)$.
   - Los autovalores de $M^{-1}A$ deben estar agrupados cerca de 1 en $\mathbb{C}$.
2. **Bajo Costo por Iteración:**
   - En cada iteración se debe resolver un sistema auxiliar $Mz = r$.
   - La resolución de $Mz = r$ debe ser muy rápida, costo $\approx O(n)$ o $O(\text{nnz})$.

Precondicionadores Clásicos y Algebraicos

- **Precondicionador de Jacobi (Diagonal):**
  - $M = D = \text{diag}(A)$, eficaz si A es diagonal dominante.
- **Precondicionadores de Relajación (Gauss-Seidel / SSOR):**
  - Utilizan las partes triangulares de A:
    $M_{SSOR} = \frac{1}{\omega(2-\omega)}(D + \omega L)D^{-1}(D + \omega U)$.
- **Factorizaciones Incompletas (ILU / IC):**
  - **ILU(0):** Realiza una factorización LU ignorando todo elemento fuera del patrón de dispersión de A.
  - **Cholesky Incompleto (IC):** Para matrices SDP, calcula $M = R^T R \approx A$ conservando la dispersión original.