
a COPD
M2 r −L
M2 r +L
M2 s −L
M2 s +L
M3 r −L
M3 r +L
M3 s −L
M3 s +L
0.0
0.5
1.0
Interaction: RRR change (%)
b CLRD
M2 r −L
M2 r +L
M2 s −L
M2 s +L
M3 r −L
M3 r +L
M3 s −L
M3 s +L
0.0
0.5
1.0
Interaction: RRR change (%)
c RESP
M2 r −L
M2 r +L
M2 s −L
M2 s +L
M3 r −L
M3 r +L
M3 s −L
M3 s +L
0.0
0.5
1.0
Interaction: RRR change (%)
d CIRC
M2 r −L
M2 r +L
M2 s −L
M2 s +L
M3 r −L
M3 r +L
M3 s −L
M3 s +L
0.0
0.5
1.0
Interaction: RRR change (%)
e IHD
M2 r −L
M2 r +L
M2 s −L
M2 s +L
M3 r −L
M3 r +L
M3 s −L
M3 s +L
0.0
0.5
1.0
Interaction: RRR change (%)
Ordinary 95% confidence intervals
Same saved estimates and scales
30 existing imputations per fit
2009–2020 study window
r / s: relaxed / strict QA
−L / +L: without / with LST