

(a) $T = B \sqcup T'$




$T = \{12, 23\} \sqcup \{34, 45\}$

$\Gamma_1 \setminus T = (\gamma \setminus B) \sqcup ((\Gamma_1 \setminus \gamma) \setminus T') = \{13\} \sqcup \{51\}$

(b) On the face: the island form at λ^γ and the form of Γ/γ





$$\left[e^{-\sum_{e\in\gamma} z_e^{+\dot{a}} y_{e,+\dot{a}}}\left(-d_\gamma^2 y_{13}\right)\right] \quad \wedge \quad \left[e^{-\sum_{e\notin\gamma} z_e^{+\dot{a}} y_{e,+\dot{a}}}\left(-d^2 y_{51}\right)\right]$$

(c) The terms with $d\lambda^\gamma$ drop out

$$\lambda_1^\gamma = \lambda_1 + y_{51}, \quad \lambda_2^\gamma = \lambda_2, \quad \lambda_3^\gamma = \lambda_3 - y_{34}, \qquad y_{34} = y_{51} - \lambda_4 - \lambda_5$$

$$dy_{13} = d_\gamma y_{13} + \sum_v \frac{\partial y_{13}}{\partial \lambda_v^\gamma}\, d\lambda_v^\gamma, \qquad d\lambda_1^\gamma = -d\lambda_3^\gamma = dy_{51}, \quad d\lambda_2^\gamma = 0, \qquad d\lambda_v^\gamma \wedge d^2 y_{51} = 0$$