

Informacija ir entropija

Informacijos kiekis

Informacijos kiekis

Inf.kiekio išraiška

Inf.kiekio vienetai

Sąlyginė informacija

Entropija

Binarinė entropija

Sąlyginė entropija

Jungt.s-mos entropija

Gibbs'o nelygybė

Entropijos įverčiai

Pavyzdys

Tiksl.s-mos entropija

Sąlyg.entrop.pvz.

Tarpus.infor.įvertis

Entropijų sąryšiai

Jungt.s-mos

entrop.įvertis

Entrop.sąr.diag.

Diskr.a.d.entropija

1pvz. (Šenono režis)

2pvz.(Ligos rizika)

Tol.a.d.entropija

Gauso a.d.entropija

Tol.a.d.entrop.įvertis

Tarkime A yra tikimybinės erdvės (Ω, P) atsitiktinis įvykis, kurio tikimybė $P(A) = p$. Įvykio A prigimtis, skaičiuojant **informacijos kiekį** $I(A)$, nėra svarbi. Todėl jį apibrėšime kaip kintamojo p funkciją ir dažnai rašysime $I(A) = I(p)$.

Informacijos kiekis

Informacijos kiekis

Inf.kiekio išraiška

Inf.kiekio vienetai

Sąlyginė informacija

Entropija

Binarinė entropija

Sąlyginė entropija

Jungt.s-mos entropija

Gibbs'o nelygybė

Entropijos įverčiai

Pavyzdys

Tiksl.s-mos entropija

Sąlyg.entrop.pvz.

Tarpus.infor.įvertis

Entropijų sąryšiai

Jungt.s-mos

entrop.įvertis

Entrop.sąr.diag.

Diskr.a.d.entropija

1pvz. (Šenono režis)

2pvz.(Ligos rizika)

Tol.a.d.entropija

Gauso a.d.entropija

Tol.a.d.entrop.įvertis

Reikalavimai informacijos kiekiui:

Informacijos kiekis

Informacijos kiekis

Inf.kiekio išraiška

Inf.kiekio vienetai

Sąlyginė informacija

Entropija

Binarinė entropija

Sąlyginė entropija

Jungt.s-mos entropija

Gibbs'o nelygybė

Entropijos įverčiai

Pavyzdys

Tiksl.s-mos entropija

Sąlyg.entrop.pvz.

Tarpus.infor.įvertis

Entropijų sąryšiai

Jungt.s-mos

entrop.įvertis

Entrop.sąr.diag.

Diskr.a.d.entropija

1pvz. (Šenono režis)

2pvz.(Ligos rizika)

Tol.a.d.entropija

Gauso a.d.entropija

Tol.a.d.entrop.įvertis

Reikalavimai informacijos kiekiui:

1. Informacija turi būti apibrėžta ir neneigiama, t.y. $I(p) \geq 0$, visiems $p \in (0, 1]$.

Informacijos kiekis

Informacijos kiekis

Inf.kiekio išraiška

Inf.kiekio vienetai

Sąlyginė informacija

Entropija

Binarinė entropija

Sąlyginė entropija

Jungt.s-mos entropija

Gibbs'o nelygybė

Entropijos įverčiai

Pavyzdys

Tiksl.s-mos entropija

Sąlyg.entrop.pvz.

Tarpus.infor.įvertis

Entropijų sąryšiai

Jungt.s-mos

entrop.įvertis

Entrop.sąr.diag.

Diskr.a.d.entropija

1pvz. (Šenono režis)

2pvz.(Ligos rizika)

Tol.a.d.entropija

Gauso a.d.entropija

Tol.a.d.entrop.įvertis

Reikalavimai informacijos kiekiui:

1. Informacija turi būti apibrėžta ir neneigiama, t.y. $I(p) \geq 0$, visiems $p \in (0, 1]$.
2. Nežymiai pakitus įvykio tikimybei, informacijos kiekis taip pat turėtų pasikeisti nedaug. Kitaip sakant funkcija $I(p)$ turi būti tolydi.

Informacijos kiekis

Informacijos kiekis

Inf.kiekio išraiška

Inf.kiekio vienetai

Sąlyginė informacija

Entropija

Binarinė entropija

Sąlyginė entropija

Jungt.s-mos entropija

Gibbs'o nelygybė

Entropijos įverčiai

Pavyzdys

Tiksl.s-mos entropija

Sąlyg.entrop.pvz.

Tarpus.infor.įvertis

Entropijų sąryšiai

Jungt.s-mos

entrop.įvertis

Entrop.sąr.diag.

Diskr.a.d.entropija

1pvz. (Šenono režis)

2pvz.(Ligos rizika)

Tol.a.d.entropija

Gauso a.d.entropija

Tol.a.d.entrop.įvertis

Reikalavimai informacijos kiekiui:

1. Informacija turi būti apibrėžta ir neneigiama, t.y. $I(p) \geq 0$, visiems $p \in (0, 1]$.
2. Nežymiai pakitus įvykio tikimybei, informacijos kiekis taip pat turėtų pasikeisti nedaug. Kitaip sakant funkcija $I(p)$ turi būti tolydi.
3. Funkcija $I(p)$ turi būti griežtai monotoniškai mažėjanti, t.y. kuo įvykio tikimybė mažesnė, tuo didesnį informacijos kiekį jam įvykus gauname.

Informacijos kiekis

Informacijos kiekis

Inf.kiekio išraiška

Inf.kiekio vienetai

Sąlyginė informacija

Entropija

Binarinė entropija

Sąlyginė entropija

Jungt.s-mos entropija

Gibbs'o nelygybė

Entropijos įverčiai

Pavyzdys

Tiksl.s-mos entropija

Sąlyg.entrop.pvz.

Tarpus.infor.įvertis

Entropijų sąryšiai

Jungt.s-mos

entrop.įvertis

Entrop.sąr.diag.

Diskr.a.d.entropija

1pvz. (Šenono režis)

2pvz.(Ligos rizika)

Tol.a.d.entropija

Gauso a.d.entropija

Tol.a.d.entrop.įvertis

Reikalavimai informacijos kiekiui:

1. Informacija turi būti apibrėžta ir neneigiama, t.y. $I(p) \geq 0$, visiems $p \in (0, 1]$.
2. Nežymiai pakitus įvykio tikimybei, informacijos kiekis taip pat turėtų pasikeisti nedaug. Kitaip sakant funkcija $I(p)$ turi būti tolydi.
3. Funkcija $I(p)$ turi būti griežtai monotoniškai mažėjanti, t.y. kuo įvykio tikimybė mažesnė, tuo didesnį informacijos kiekį jam įvykus gauname.
4. Įvykus dviem nepriklausomiems įvykiams, gautos informacijos kiekis turėtų būti lygus jų informacijų sumai. Prisiminę, kad dviems nepriklausomiems įvykiams A ir B tikimybė įvykti kartu yra $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, turėsime tokį reikalavimą informacijos kiekio funkcijai: $I(p \cdot q) = I(p) + I(q)$ visiems $p, q \in (0, 1]$.

Informacijos kiekio išraiška

Informacijos kiekis

[Inf.kiekio išraiška](#)

Inf.kiekio vienetai

Sąlyginė informacija

Entropija

Binarinė entropija

Sąlyginė entropija

Jungt.s-mos entropija

Gibbs'o nelygybė

Entropijos įverčiai

Pavyzdys

Tiksl.s-mos entropija

Sąlyg.entrop.pvz.

Tarpus.infor.įvertis

Entropijų sąryšiai

Jungt.s-mos

entrop.įvertis

Entrop.sąr.diag.

Diskr.a.d.entropija

1pvz. (Šenono režis)

2pvz.(Ligos rizika)

Tol.a.d.entropija

Gauso a.d.entropija

Tol.a.d.entrop.įvertis

Teorema. Funkcija $I(p)$ tenkina 1-4 sąlygas tada ir tik tada, kai egzistuoja $b > 1$, jog

$$I(p) = \log_b \frac{1}{p}.$$

Įrodymas. Tegul m ir n bet kokie natūralieji skaičiai. Iš 4 sąlygos išplaukia, kad

$$\begin{aligned} I(p^n) &= I(p \cdot p^{n-1}) = I(p) + I(p^{n-1}) \\ &= I(p) + I(p) + I(p^{n-2}) = \dots = nI(p). \end{aligned}$$

Todėl

$$I(p) = I((p^{1/m})^m) = mI(p^{1/m})$$

ir

$$I(p^{1/m}) = \frac{1}{m} I(p).$$

Informacijos kiekio išraiška

Informacijos kiekis

[Inf.kiekio išraiška](#)

Inf.kiekio vienetai

Sąlyginė informacija

Entropija

Binarinė entropija

Sąlyginė entropija

Jungt.s-mos entropija

Gibbs'o nelygybė

Entropijos įverčiai

Pavyzdys

Tiksl.s-mos entropija

Sąlyg.entrop.pvz.

Tarpus.infor.įvertis

Entropijų sąryšiai

Jungt.s-mos

entrop.įvertis

Entrop.sąr.diag.

Diskr.a.d.entropija

1pvz. (Šenono režis)

2pvz.(Ligos rizika)

Tol.a.d.entropija

Gauso a.d.entropija

Tol.a.d.entrop.įvertis

Taigi, visiems teigiamiems racionaliesiems skaičiams $\frac{n}{m}$

$$I(p^{n/m}) = I((p^{1/m})^n) = \frac{n}{m} I(p).$$

Dėl funkcijos $I(p)$ tolydumo iš čia išplaukia, kad

$$I(p^a) = aI(p)$$

visiems realiesiems $a \geq 0$. Todėl visiems $p \in (0, 1]$

$$\begin{aligned} I(p) &= I\left(\left(\frac{1}{e}\right)^{-\ln p}\right) = -I\left(\frac{1}{e}\right) \ln p \\ &= -\frac{\ln p}{\ln b} = \log_b \frac{1}{p}, \quad b > 1. \end{aligned}$$



Informacijos kiekio vienetai

Informacijos kiekis

Inf.kiekio išraiška

Inf.kiekio vienetai

Sąlyginė informacija

Entropija

Binarinė entropija

Sąlyginė entropija

Jungt.s-mos entropija

Gibbs'o nelygybė

Entropijos įverčiai

Pavyzdys

Tiksl.s-mos entropija

Sąlyg.entrop.pvz.

Tarpus.infor.įvertis

Entropijų sąryšiai

Jungt.s-mos

entrop.įvertis

Entrop.sąr.diag.

Diskr.a.d.entropija

1pvz. (Šenono režis)

2pvz.(Ligos rizika)

Tol.a.d.entropija

Gauso a.d.entropija

Tol.a.d.entrop.įvertis

Apibrėžimas. Informacijos kiekiu, gaunamu įvykus įvykiui A , kurio tikimybė $p > 0$, vadinsime dydį

$$I(A) = I(p) = \log_2 \frac{1}{p},$$

o jo matavimo vienetus - bitais.

Atskiru atveju $I(1) = 0$, $I(0) = \lim_{p \rightarrow 0} I(p) = \infty$.

Kartais naudojami ir kiti informacijos kiekio vienetai.

<i>Log. pagrindas (b)</i>	<i>Inf. kiekio vienetas</i>
2	bitas
3	tritas
e	natas
10	hartlis

$$1 \text{ bitas} = \log_3 2 \text{ trito} = \ln 2 \text{ nato} = \lg 2 \text{ hartlio}.$$

Informacijos kiekio vienetai

Informacijos kiekis

Inf.kiekio išraiška

Inf.kiekio vienetai

Sąlyginė informacija

Entropija

Binarinė entropija

Sąlyginė entropija

Jungt.s-mos entropija

Gibbs'o nelygė

Entropijos įverčiai

Pavyzdys

Tiksl.s-mos entropija

Sąlyg.entrop.pvz.

Tarpus.infor.įvertis

Entropijų sąryšiai

Jungt.s-mos

entrop.įvertis

Entrop.sąr.diag.

Diskr.a.d.entropija

1pvz. (Šenono režis)

2pvz.(Ligos rizika)

Tol.a.d.entropija

Gauso a.d.entropija

Tol.a.d.entrop.įvertis

Pavyzdys. Metame simetrišką monetą. $P(S) = P(H) = 0,5$.

Todėl bet kurios baigties atveju gaunamas

$I(S) = I(H) = \log_2 2 = 1$ bitas informacijos. Jei moneta metama n kartų, tai bet kurią eksperimento baigtį galime nusakyti n dvejetainių skaitmenų, pavyzdžiui

$$\underbrace{011101110 \dots 01101}_n$$

Čia 0 ir 1 žymi įvykius S ir H . Tokios baigties tikimybė yra 2^{-n} , o gaunamas informacijos kiekis

$$I\left(\frac{1}{2^n}\right) = \log_2 2^n = n,$$

t.y. lygiai tiek, kiek bitų užima informacija apie eksperimento rezultatą.

Sąlyginė informacija

Informacijos kiekis

Inf.kiekio išraiška

Inf.kiekio vienetai

Sąlyginė informacija

Entropija

Binarinė entropija

Sąlyginė entropija

Jungt.s-mos entropija

Gibbs'o nelygė

Entropijos įverčiai

Pavyzdys

Tiksl.s-mos entropija

Sąlyg.entrop.pvz.

Tarpus.infor.įvertis

Entropijų sąryšiai

Jungt.s-mos

entrop.įvertis

Entrop.sąr.diag.

Diskr.a.d.entropija

1pvz. (Šenono režis)

2pvz.(Ligos rizika)

Tol.a.d.entropija

Gauso a.d.entropija

Tol.a.d.entrop.įvertis

Apibrėžimas. Tegul A ir B yra tikimybinės erdvės (Ω, P) atsitiktiniai įvykiai ir $P(B) > 0$. Įvykio A su sąlyga B informacija vadinsime dydį

$$I(A|B) = \log_2 \frac{1}{P(A|B)} = -\log_2 \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Pastebėsime, kad $I(A|B) = I(A)$ tada ir tik tada, kai įvykiai A ir B yra nepriklausomi.

Entropija

Informacijos kiekis
Inf.kiekio išraiška
Inf.kiekio vienetai
Sąlyginė informacija
[Entropija](#)
Binarinė entropija
Sąlyginė entropija
Jungt.s-mos entropija
Gibbs'o nelygybė
Entropijos įverčiai
Pavyzdys
Tiksl.s-mos entropija
Sąlyg.entrop.pvz.
Tarpus.infor.įvertis
Entropijų sąryšiai
Jungt.s-mos
entrop.įvertis
Entrop.sąr.diag.
Diskr.a.d.entropija
1pvz. (Šenono režis)
2pvz.(Ligos rizika)
Tol.a.d.entropija
Gauso a.d.entropija
Tol.a.d.entrop.įvertis

Tegul galimos bandymo baigtys yra A_1, A_2, \dots, A_n , o jų tikimybės atitinkamai p_1, p_2, \dots, p_n . Atliekame N tokių nepriklausomų bandymų. Tada vidutinis vieno bandymo informacijos kiekis bus

$$\frac{I_N}{N} \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n N p_i \log_2 \frac{1}{p_i} = \sum_{i=1}^n p_i \log_2 \frac{1}{p_i}.$$

Entropija

Informacijos kiekis
Inf.kiekio išraiška
Inf.kiekio vienetai
Sąlyginė informacija
Entropija
Binarinė entropija
Sąlyginė entropija
Jungt.s-mos entropija
Gibbs'o nelygybė
Entropijos įverčiai
Pavyzdys
Tiksl.s-mos entropija
Sąlyg.entrop.pvz.
Tarpus.infor.įvertis
Entropijų sąryšiai
Jungt.s-mos
entrop.įvertis
Entrop.sąr.diag.
Diskr.a.d.entropija
1pvz. (Šenono režis)
2pvz.(Ligos rizika)
Tol.a.d.entropija
Gauso a.d.entropija
Tol.a.d.entrop.įvertis

Tegul galimos bandymo baigtys yra A_1, A_2, \dots, A_n , o jų tikimybės atitinkamai p_1, p_2, \dots, p_n . Atliekame N tokių nepriklausomų bandymų. Tada vidutinis vieno bandymo informacijos kiekis bus

$$\frac{I_N}{N} \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n N p_i \log_2 \frac{1}{p_i} = \sum_{i=1}^n p_i \log_2 \frac{1}{p_i}.$$

Apibrėžimas. Tegul $\mathcal{A} = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ yra tikimybinės erdvės (Ω, P) įvykių su tikimybėmis $p_i = P(A_i)$ sistema. Įvykių sistemos \mathcal{A} entropija vadiname dydį

$$H(\mathcal{A}) = H(p_1, p_2, \dots, p_n) = \sum_{i=1}^n p_i \log_2 \frac{1}{p_i}.$$

Čia ir toliau visi dėmenys $p_i \log_2 \frac{1}{p_i}$ arba $p_i \log_2 p_i$ yra lygūs 0, kai $p_i = 0$.

Binarinė entropija

Informacijos kiekis

Inf.kiekio išraiška

Inf.kiekio vienetai

Sąlyginė informacija

Entropija

Binarinė entropija

Sąlyginė entropija

Jungt.s-mos entropija

Gibbs'o nelygybė

Entropijos įverčiai

Pavyzdys

Tiksl.s-mos entropija

Sąlyg.entrop.pvz.

Tarpus.infor.įvertis

Entropijų sąryšiai

Jungt.s-mos

entrop.įvertis

Entrop.sąr.diag.

Diskr.a.d.entropija

1pvz. (Šenono režis)

2pvz.(Ligos rizika)


Tol.a.d.entropija

Gauso a.d.entropija

Tol.a.d.entrop.įvertis

Dviejų įvykių su tikimybėmis p ir $1 - p$ sistemos entropija

$$h(p) = H(p, 1 - p) = p \log_2 \frac{1}{p} + (1 - p) \log_2 \frac{1}{1 - p}.$$



Sąlyginė entropija

Informacijos kiekis
Inf.kiekio išraiška
Inf.kiekio vienetai
Sąlyginė informacija
Entropija
Binarinė entropija
Sąlyginė entropija
Jungt.s-mos entropija
Gibbs'o nelygybė
Entropijos įverčiai
Pavyzdys
Tiksl.s-mos entropija
Sąlyg.entrop.pvz.
Tarpus.infor.įvertis
Entropijų sąryšiai
Jungt.s-mos
entrop.įvertis
Entrop.sąr.diag.
Diskr.a.d.entropija
1pvz. (Šenono režis)
2pvz.(Ligos rizika)
Tol.a.d.entropija
Gauso a.d.entropija
Tol.a.d.entrop.įvertis

Įvykus kokiam nors įvykiui B , sistemos \mathcal{A} entropija gali pasikeisti.
Likusio neapibrėžtumo laipsnį nusako sąlyginė entropija

$$H(\mathcal{A}|B) = \sum_{i=1}^n P(A_i|B) I(A_i|B) = \sum_{i=1}^n P(A_i|B) \log_2 \frac{1}{P(A_i|B)}.$$

Tegul $\mathcal{B} = \{B_1, B_2, \dots, B_m\}$ yra kita tos pačios tikimybinės erdvės įvykių sistema.

Apibrėžimas. *Dydį*

$$H(\mathcal{A}|\mathcal{B}) = \sum_{j=1}^m P(B_j) H(\mathcal{A}|B_j)$$

vadinsime sąlygine \mathcal{A} entropija \mathcal{B} atžvilgiu, o entropijos pokytį $I(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = H(\mathcal{A}) - H(\mathcal{A}|\mathcal{B})$ vadinsime sistemų \mathcal{A} ir \mathcal{B} tarpusavio informacija.

Jungtinės sistemos entropija

Informacijos kiekis

Inf.kiekio išraiška

Inf.kiekio vienetai

Sąlyginė informacija

Entropija

Binarinė entropija

Sąlyginė entropija

Jungt.s-mos entropija

Gibbs'o nelygybė

Entropijos įverčiai

Pavyzdys

Tiksl.s-mos entropija

Sąlyg.entrop.pvz.

Tarpus.infor.įvertis

Entropijų sąryšiai

Jungt.s-mos

entrop.įvertis

Entrop.sąr.diag.

Diskr.a.d.entropija

1pvz. (Šenono režis)

2pvz.(Ligos rizika)

Tol.a.d.entropija

Gauso a.d.entropija

Tol.a.d.entrop.įvertis

Sistemų \mathcal{A} ir \mathcal{B} jungtinės sistemos $\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}$ entropiją žymėsime $H(\mathcal{A}, \mathcal{B})$

$$H(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = H(\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m P(A_i \cap B_j) \log_2 \frac{1}{P(A_i \cap B_j)} .$$

Šis apibrėžimas akivaizdžiai apibendrinamas ir didesniai įvykių sistemų skaičiui $k \geq 2$

$$H(\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_k) = H(\mathcal{A}_1 \wedge \mathcal{A}_2 \wedge \dots \wedge \mathcal{A}_k) .$$

Gibbs'o nelygybė

Informacijos kiekis
Inf.kiekio išraiška
Inf.kiekio vienetai
Sąlyginė informacija
Entropija
Binarinė entropija
Sąlyginė entropija
Jungt.s-mos entropija
Gibbs'o nelygybė
Entropijos įverčiai
Pavyzdys
Tiksl.s-mos entropija
Sąlyg.entrop.pvz.
Tarpus.infor.įvertis
Entropijų sąryšiai
Jungt.s-mos
entrop.įvertis
Entrop.sąr.diag.
Diskr.a.d.entropija
1pvz. (Šenono režis)
2pvz.(Ligos rizika)
Tol.a.d.entropija
Gauso a.d.entropija
Tol.a.d.entrop.įvertis

Vektorių (x_1, x_2, \dots, x_n) , sudarytą iš neneigiamų realiųjų skaičių, vadinsime tikimybinio vektoriumi (kitaip: diskrečiuoju skirstiniu), jei

$$\sum_{i=1}^n x_i = 1.$$

Gibbs'o nelygybė. Tegul $b > 1$. Tada bet kokiems tikimybiniam vektoriams (x_1, x_2, \dots, x_n) ir (y_1, y_2, \dots, y_n) teisinga nelygybė

$$\sum_{i=1}^n x_i \log_b \left(\frac{y_i}{x_i} \right) \leq 0.$$

Nelygybė virsta lygybe tada ir tik tada, kai vektoriai (x_1, x_2, \dots, x_n) ir (y_1, y_2, \dots, y_n) sutampa.

Gibbs'o nelygybė

Informacijos kiekis
Inf.kiekio išraiška
Inf.kiekio vienetai
Sąlyginė informacija
Entropija
Binarinė entropija
Sąlyginė entropija
Jungt.s-mos entropija
[Gibbs'o nelygybė](#)
Entropijos įverčiai
Pavyzdys
Tiksl.s-mos entropija
Sąlyg.entrop.pvz.
Tarpus.infor.įvertis
Entropijų sąryšiai
Jungt.s-mos
entrop.įvertis
Entrop.sąr.diag.
Diskr.a.d.entropija
1pvz. (Šenono režis)
2pvz.(Ligos rizika)
Tol.a.d.entropija
Gauso a.d.entropija
Tol.a.d.entrop.įvertis

Įrodymas. Pakanka įrodyti nelygybę

$$\sum_{i=1}^n {}^* x_i \ln \left(\frac{y_i}{x_i} \right) \leq 0.$$

Čia simbolis * prie sumos ženklo reiškia, kad sumuojama tik pagal tas i reikšmes, kurioms $x_i > 0$. Kadangi funkcija $y = \ln x$ yra iškila aukštyn, o jos grafiko liestinė taške $x = 1$ yra tiesė $y = x - 1$, tai $\ln x \leq x - 1$ visiems $x > 0$. Be to, nelygybė virsta lygybe tik, kai $x = 1$. Iš čia išplaukia

$$\sum_{i=1}^n {}^* x_i \ln \left(\frac{y_i}{x_i} \right) \leq \sum_{i=1}^n {}^* x_i \left(\frac{y_i}{x_i} - 1 \right) = \sum_{i=1}^n {}^* y_i - \sum_{i=1}^n {}^* x_i \leq 0.$$

Pastebėsime, kad abi pastarosios nelygybės virsta lygybėmis tik kai $x_i = y_i$ visiems i . □

Entropijos įverčiai

Informacijos kiekis
Inf.kiekio išraiška
Inf.kiekio vienetai
Sąlyginė informacija
Entropija
Binarinė entropija
Sąlyginė entropija
Jungt.s-mos entropija
Gibbs'o nelygė
[Entropijos įverčiai](#)
Pavyzdys
Tiksl.s-mos entropija
Sąlyg.entrop.pvz.
Tarpus.infor.įvertis
Entropijų sąryšiai
Jungt.s-mos
entrop.įvertis
Entrop.sąr.diag.
Diskr.a.d.entropija
1pvz. (Šenono režis)
2pvz.(Ligos rizika)
Tol.a.d.entropija
Gauso a.d.entropija
Tol.a.d.entrop.įvertis

Teorema. Įvykių sistemos $\mathcal{A} = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ entropija tenkina nelygybes

$$0 \leq H(\mathcal{A}) \leq \log_2 n. \quad (1)$$

Mažiausią reikšmę $H(\mathcal{A}) = 0$ ji įgyja tada ir tik tada, kai sistema sudaryta iš įvykių, kurių tikimybės yra 0 arba 1. Didžiausią entropiją $H(\mathcal{A}) = \log_2 n$ turės tos ir tik tos sistemos, kuriose visi įvykiai yra vienodai galimi, t.y. $P(A_i) = \frac{1}{n}$ visiems $i = 1, 2, \dots, n$.
Įrodymas. Pagal apibrėžimą entropija yra neneigiamų dėmenų suma

$$H(\mathcal{A}) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \log_2 \frac{1}{P(A_i)}.$$

Todėl aišku, kad $H(\mathcal{A}) \geq 0$. Be to, tokia suma lygi 0 tada ir tik tada, kai visi dėmenys lygūs 0. Vadinasi, $P(A_i) = 0$ arba $P(A_i) = 1$ visiems $i = 1, 2, \dots, n$. Iš tikrųjų tik viena iš šių tikimybių bus lygi 1, nes sistemą sudarančių įvykių tikimybių suma visada yra 1.

Entropijos įverčiai

Informacijos kiekis
Inf.kiekio išraiška
Inf.kiekio vienetai
Sąlyginė informacija
Entropija
Binarinė entropija
Sąlyginė entropija
Jungt.s-mos entropija
Gibbs'o nelygybė
Entropijos įverčiai
Pavyzdys
Tiksl.s-mos entropija
Sąlyg.entrop.pvz.
Tarpus.infor.įvertis
Entropijų sąryšiai
Jungt.s-mos
entrop.įvertis
Entrop.sąr.diag.
Diskr.a.d.entropija
1pvz. (Šenono režis)
2pvz.(Ligos rizika)
Tol.a.d.entropija
Gauso a.d.entropija
Tol.a.d.entrop.įvertis

Antrąją nelygybę įrodysime skirtumui $H(\mathcal{A}) - \log_2 n$ pritaikę Gibbs'o nelygybę. Gausime

$$\begin{aligned} H(\mathcal{A}) - \log_2 n &= \sum_{i=1}^n P(A_i) \log_2 \frac{1}{P(A_i)} - \sum_{i=1}^n P(A_i) \log_2 n \\ &= \sum_{i=1}^n P(A_i) \log_2 \left(\frac{1/n}{P(A_i)} \right) \leq 0. \end{aligned}$$



Pavyzdys

Informacijos kiekis

Inf.kiekio išraiška

Inf.kiekio vienetai

Sąlyginė informacija

Entropija

Binarinė entropija

Sąlyginė entropija

Jungt.s-mos entropija

Gibbs'o nelygybė

Entropijos įverčiai

Pavyzdys

Tiksl.s-mos entropija

Sąlyg.entrop.pvz.

Tarpus.infor.įvertis

Entropijų sąryšiai

Jungt.s-mos

entrop.įvertis

Entrop.sąr.diag.

Diskr.a.d.entropija

1pvz. (Šenono režis)

2pvz.(Ligos rizika)

Tol.a.d.entropija

Gauso a.d.entropija

Tol.a.d.entrop.įvertis

Tegul $\mathcal{A} = \{A_1, A_2, A_3, A_4\}$, $\mathcal{B} = \{B_1, B_2, B_3, B_4, B_5\}$ ir

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = P(A_4) = \frac{1}{4};$$

$$P(B_1) = P(B_2) = P(B_3) = P(B_4) = \frac{1}{16}, \quad P(B_5) = \frac{3}{4}.$$

Apskaičiuojame sistemų \mathcal{A} ir \mathcal{B} entropijas

$$H(\mathcal{A}) = 4 \cdot \frac{1}{4} \cdot \log_2 4;$$

$$H(\mathcal{B}) = 4 \cdot \frac{1}{16} \cdot \log_2 16 + \frac{3}{4} \cdot \log_2 \frac{4}{3} \approx 1,3113.$$

Kaip matome, $H(\mathcal{A}) > H(\mathcal{B})$. Gautąją nelygybę galime interpretuoti taip: numatyti, kuris iš įvykių įvyks, sistemoje \mathcal{A} yra sunkiau, nei sistemoje \mathcal{B} .

Tikslesnės sistemos entropija

Informacijos kiekis

Inf.kiekio išraiška

Inf.kiekio vienetai

Sąlyginė informacija

Entropija

Binarinė entropija

Sąlyginė entropija

Jungt.s-mos entropija

Gibbs'o nelygybė

Entropijos įverčiai

Pavyzdys

[Tiksl.s-mos entropija](#)

Sąlyg.entrop.pvz.

Tarpus.infor.įvertis

Entropijų sąryšiai

Jungt.s-mos

entrop.įvertis

Entrop.sąr.diag.

Diskr.a.d.entropija

1pvz. (Šenono režis)

2pvz.(Ligos rizika)

Tol.a.d.entropija

Gauso a.d.entropija

Tol.a.d.entrop.įvertis

Teorema. *Jei įvykių sistema $\mathcal{B} = \{B_1, B_2, \dots, B_m\}$ yra tikslesnė už sistemą $\mathcal{A} = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, tai*

$$H(\mathcal{A}) \leq H(\mathcal{B}).$$

Tikslesnės sistemos entropija

Informacijos kiekis
Inf.kiekio išraiška
Inf.kiekio vienetai
Sąlyginė informacija
Entropija
Binarinė entropija
Sąlyginė entropija
Jungt.s-mos entropija
Gibbs'o nelygybė
Entropijos įverčiai
Pavyzdys
[Tiksl.s-mos entropija](#)
Sąlyg.entrop.pvz.
Tarpus.infor.įvertis
Entropijų sąryšiai
Jungt.s-mos
entrop.įvertis
Entrop.sąr.diag.
Diskr.a.d.entropija
1pvz. (Šenono režis)
2pvz.(Ligos rizika)
Tol.a.d.entropija
Gauso a.d.entropija
Tol.a.d.entrop.įvertis

Įrodymas. Kadangi \mathcal{B} yra tikslesnė už \mathcal{A} , tai

$$P(A_i) = \sum_{j=1}^m P(A_i \cap B_j) = \sum_{j \in J_i} P(B_j), \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Čia J_i - poromis nesikertantys aibės $\{1, 2, \dots, m\}$ poaibiai, tenkinantys sąlygą

$$\bigcup_{i=1}^n J_i = \{1, 2, \dots, m\}.$$

Tikslesnės sistemos entropija

Todėl

$$\begin{aligned} H(\mathcal{A}) &= - \sum_{i=1}^n P(A_i) \log_2 P(A_i) \\ &= - \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j \in J_i} P(B_j) \right) \log_2 \left(\sum_{j \in J_i} P(B_j) \right) \\ &\leq - \sum_{i=1}^n \sum_{j \in J_i} P(B_j) \log_2 P(B_j) \\ &= - \sum_{j=1}^m P(B_j) \log_2 P(B_j) = H(\mathcal{B}) \end{aligned}$$

Informacijos kiekis
Inf.kiekio išraiška
Inf.kiekio vienetai
Sąlyginė informacija
Entropija
Binarinė entropija
Sąlyginė entropija
Jungt.s-mos entropija
Gibbs'o nelygė
Entropijos įverčiai
Pavyzdys
[Tiksl.s-mos entropija](#)
Sąlyg.entrop.pvz.
Tarpus.infor.įvertis
Entropijų sąryšiai
Jungt.s-mos
entrop.įvertis
Entrop.sąr.diag.
Diskr.a.d.entropija
1pvz. (Šenono režis)
2pvz.(Ligos rizika)
Tol.a.d.entropija
Gauso a.d.entropija
Tol.a.d.entrop.įvertis



Sąlyginės entropijos pavyzdys

Informacijos kiekis
Inf.kiekio išraiška
Inf.kiekio vienetai
Sąlyginė informacija
Entropija
Binarinė entropija
Sąlyginė entropija
Jungt.s-mos entropija
Gibbs'o nelygybė
Entropijos įverčiai
Pavyzdys
Tiksl.s-mos entropija
[Sąlyg.entrop.pvz.](#)
Tarpus.infor.įvertis
Entropijų sąryšiai
Jungt.s-mos entrop.įvertis
Entrop.sąr.diag.
Diskr.a.d.entropija
1pvz. (Šenono režis)
2pvz.(Ligos rizika)
Tol.a.d.entropija
Gauso a.d.entropija
Tol.a.d.entrop.įvertis

Tegul X ir Y yra atsitiktiniai dydžiai, įgyjantys reikšmes 0 ir 1, o jų bendrasis dvimatis skirstinys nusakytas lentele

$X \backslash Y$	0	1	$P(X = i)$
0	0,25	0,25	0,5
1	0	0,5	0,5
$P(Y = j)$	0,25	0,75	1

Nagrinėsime dvi įvykių sistemas

$$\mathcal{A} = \{ \{X = 0\}, \{X = 1\} \} \quad \text{ir} \quad \mathcal{B} = \{ \{Y = 0\}, \{Y = 1\} \}.$$

Sistemų \mathcal{A} ir \mathcal{B} entropijas žymėsime tiesiog $H(X)$ ir $H(Y)$.

Gausime, kad $H(Y|X = 1) < H(Y) < H(Y|X = 0)$, tačiau $H(Y|X) < H(Y)$.

Tarpusavio informacijos įvertis

Informacijos kiekis
Inf.kiekio išraiška
Inf.kiekio vienetai
Sąlyginė informacija
Entropija
Binarinė entropija
Sąlyginė entropija
Jungt.s-mos entropija
Gibbs'o nelygė
Entropijos įverčiai
Pavyzdys
Tiksl.s-mos entropija
Sąlyg.entrop.pvz.
[Tarpus.infor.įvertis](#)
Entropijų sąryšiai
Jungt.s-mos
entrop.įvertis
Entrop.sąr.diag.
Diskr.a.d.entropija
1pvz. (Šenono režis)
2pvz.(Ligos rizika)
Tol.a.d.entropija
Gauso a.d.entropija
Tol.a.d.entrop.įvertis

Teorema. Visoms įvykių sistemoms $\mathcal{A} = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ ir $\mathcal{B} = \{B_1, B_2, \dots, B_m\}$ jų tarpusavio informacija yra neneigiama:

$$I(\mathcal{A}, \mathcal{B}) \geq 0.$$

Be to, $I(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = 0$ tada ir tik tada, kai sistemos \mathcal{A} ir \mathcal{B} yra nepriklausomos.

Tarpusavio informacijos įvertis

Įrodymas. Pagal apibrėžimą

$$\begin{aligned} H(\mathcal{A}|\mathcal{B}) &= \sum_{j=1}^m P(B_j) H(\mathcal{A}|B_j) \\ &= \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n P(B_j) P(A_i|B_j) \log_2 \frac{1}{P(A_i|B_j)} \\ &= \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n P(A_i \cap B_j) \log_2 \left(\frac{P(B_j)}{P(A_i \cap B_j)} \right) . \end{aligned}$$

Informacijos kiekis

Inf.kiekio išraiška

Inf.kiekio vienetai

Sąlyginė informacija

Entropija

Binarinė entropija

Sąlyginė entropija

Jungt.s-mos entropija

Gibbs'o nelygybė

Entropijos įverčiai

Pavyzdys

Tiksl.s-mos entropija

Sąlyg.entrop.pvz.

[Tarpus.infor.įvertis](#)

Entropijų sąryšiai

Jungt.s-mos

entrop.įvertis

Entrop.sąr.diag.

Diskr.a.d.entropija

1pvz. (Šenono režis)

2pvz.(Ligos rizika)

Tol.a.d.entropija

Gauso a.d.entropija

Tol.a.d.entrop.įvertis

Tarpusavio informacijos įvertis

Informacijos kiekis
Inf.kiekio išraiška
Inf.kiekio vienetai
Sąlyginė informacija
Entropija
Binarinė entropija
Sąlyginė entropija
Jungt.s-mos entropija
Gibbs'o nelygybė
Entropijos įverčiai
Pavyzdys
Tiksl.s-mos entropija
Sąlyg.entrop.pvz.
[Tarpus.infor.įvertis](#)
Entropijų sąryšiai
Jungt.s-mos
entrop.įvertis
Entrop.sąr.diag.
Diskr.a.d.entropija
1pvz. (Šenono režis)
2pvz.(Ligos rizika)
Tol.a.d.entropija
Gauso a.d.entropija
Tol.a.d.entrop.įvertis

Iš įvykių sistemos apibrėžimo išplaukia, kad visiems $i = 1, 2, \dots, n$

$$P(A_i) = \sum_{j=1}^m P(A_i \cap B_j) .$$

Todėl

$$H(\mathcal{A}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m P(A_i \cap B_j) \log_2 \frac{1}{P(A_i)} .$$

Tarpusavio informacijos įvertis

Informacijos kiekis

Inf.kiekio išraiška

Inf.kiekio vienetai

Sąlyginė informacija

Entropija

Binarinė entropija

Sąlyginė entropija

Jungt.s-mos entropija

Gibbs'o nelygybė

Entropijos įverčiai

Pavyzdys

Tiksl.s-mos entropija

Sąlyg.entrop.pvz.

[Tarpus.infor.įvertis](#)

Entropijų sąryšiai

Jungt.s-mos

entrop.įvertis

Entrop.sąr.diag.

Diskr.a.d.entropija

1pvz. (Šenono režis)

2pvz.(Ligos rizika)

Tol.a.d.entropija

Gauso a.d.entropija

Tol.a.d.entrop.įvertis

Įstatę gautas išraiškas, turėsime

$$\begin{aligned} -I(\mathcal{A}, \mathcal{B}) &= H(\mathcal{A}|\mathcal{B}) - H(\mathcal{A}) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m P(A_i \cap B_j) \log_2 \left(\frac{P(A_i)P(B_j)}{P(A_i \cap B_j)} \right) \leq 0. \end{aligned}$$

Pastaroji nelygybė išplaukia iš Gibbs'o nelygybės, pritaikius ją tikimybiniam vektoriams, kurių komponentės yra

$$P(A_i \cap B_j) \text{ ir } P(A_i)P(B_j), \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad j = 1, 2, \dots, m.$$

Pagal tą pačią lemą gauname, kad nelygybė virsta lygybe tada ir tik tada, kai $P(A_i \cap B_j) = P(A_i)P(B_j)$, visiems i ir j . T.y., kai sistemos \mathcal{A} ir \mathcal{B} yra nepriklausomos.



Entropijų sąryšiai

Informacijos kiekis
Inf.kiekio išraiška
Inf.kiekio vienetai
Sąlyginė informacija
Entropija
Binarinė entropija
Sąlyginė entropija
Jungt.s-mos entropija
Gibbs'o nelygybė
Entropijos įverčiai
Pavyzdys
Tiksl.s-mos entropija
Sąlyg.entrop.pvz.
Tarpus.infor.įvertis
[Entropijų sąryšiai](#)
Jungt.s-mos
entrop.įvertis
Entrop.sąr.diag.
Diskr.a.d.entropija
1pvz. (Šenono režis)
2pvz.(Ligos rizika)
Tol.a.d.entropija
Gauso a.d.entropija
Tol.a.d.entrop.įvertis

Teorema. Įvykių sistemoms \mathcal{A} ir \mathcal{B} teisingi sąryšiai

$$H(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = H(\mathcal{B}) + H(\mathcal{A}|\mathcal{B}), \quad (1)$$

$$H(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = H(\mathcal{A}) + H(\mathcal{B}) - I(\mathcal{A}, \mathcal{B}). \quad (2)$$

Įrodymas.

$$\begin{aligned} H(\mathcal{A}|\mathcal{B}) &= \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n P(A_i \cap B_j) \log_2 \left(\frac{1}{P(A_i \cap B_j)} \right) \\ &- \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n P(A_i \cap B_j) \right) \log_2 \left(\frac{1}{P(B_j)} \right) \\ &= H(\mathcal{A}, \mathcal{B}) - H(\mathcal{B}). \end{aligned}$$

(2) gauname iš (1), nes $H(\mathcal{A}|\mathcal{B}) = H(\mathcal{A}) - I(\mathcal{A}, \mathcal{B})$.

□

Jungtinės sistemos entropijos įvertis

Informacijos kiekis

Inf.kiekio išraiška

Inf.kiekio vienetai

Sąlyginė informacija

Entropija

Binarinė entropija

Sąlyginė entropija

Jungt.s-mos entropija

Gibbs'o nelygybė

Entropijos įverčiai

Pavyzdys

Tiksl.s-mos entropija

Sąlyg.entrop.pvz.

Tarpus.infor.įvertis

Entropijų sąryšiai

Jungt.s-mos

entrop.įvertis

Entrop.sąr.diag.

Diskr.a.d.entropija

1pvz. (Šenono režis)

2pvz.(Ligos rizika)

Tol.a.d.entropija

Gauso a.d.entropija

Tol.a.d.entrop.įvertis

Kadangi $I(\mathcal{A}, \mathcal{B}) \geq 0$, tai

$$H(\mathcal{A}, \mathcal{B}) \leq H(\mathcal{A}) + H(\mathcal{B}).$$

Pritaikius indukciją, pastarąją nelygybę nesudėtinga apibendrinti didesniame įvykių sistemų skaičiui.


Teorema. *Jei $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_k$ yra tos pačios diskrečiosios tikimybinės erdvės įvykių sistemos, tai*

$$H(\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_k) \leq H(\mathcal{A}_1) + H(\mathcal{A}_2) + \dots + H(\mathcal{A}_k).$$

Ši nelygybė virsta lygybe tada ir tik tada, kai $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_k$ yra nepriklausomos sistemos.

Entropijų sąryšių diagrama

Dviejų sistemų entropijų, sąlyginių entropijų bei tarpusavio informacijos sąryšius vaizduojanti diagrama.



Informacijos kiekis
Inf.kiekio išraiška
Inf.kiekio vienetai
Sąlyginė informacija
Entropija
Binarinė entropija
Sąlyginė entropija
Jungt.s-mos entropija
Gibbs'o nelygybė
Entropijos įverčiai
Pavyzdys
Tiksl.s-mos entropija
Sąlyg.entrop.pvz.
Tarpus.infor.įvertis
Entropijų sąryšiai
Jungt.s-mos
entrop.įvertis
[Entrop.sąr.diag.](#)
Diskr.a.d.entropija
1pvz. (Šenono režis)
2pvz.(Ligos rizika)
Tol.a.d.entropija
Gauso a.d.entropija
Tol.a.d.entrop.įvertis

Diskrečiojo a. d. entropija

Informacijos kiekis
Inf.kiekio išraiška
Inf.kiekio vienetai
Sąlyginė informacija
Entropija
Binarinė entropija
Sąlyginė entropija
Jungt.s-mos entropija
Gibbs'o nelygybė
Entropijos įverčiai
Pavyzdys
Tiksl.s-mos entropija
Sąlyg.entrop.pvz.
Tarpus.infor.įvertis
Entropijų sąryšiai
Jungt.s-mos
entrop.įvertis
Entrop.sąr.diag.
[Diskr.a.d.entropija](#)
1pvz. (Šenono režis)
2pvz.(Ligos rizika)
Tol.a.d.entropija
Gauso a.d.entropija
Tol.a.d.entrop.įvertis

Apibrėžimas. *Diskrečiojo atsitiktinio dydžio X , įgyjančio reikšmes x_1, x_2, \dots , entropija $H(X)$ yra lygi įvykių sistemos, sudarytos iš įvykių $A_i = \{X = x_i\}$, $i = 1, 2, \dots$, entropijai, t.y.,*

$$H(X) = \sum_i P(A_i) \log_2 \frac{1}{P(A_i)} .$$

1pvz. (Šenono režis)

Informacijos kiekis
Inf.kiekio išraiška
Inf.kiekio vienetai
Sąlyginė informacija
Entropija
Binarinė entropija
Sąlyginė entropija
Jungt.s-mos entropija
Gibbs'o nelygybė
Entropijos įverčiai
Pavyzdys
Tiksl.s-mos entropija
Sąlyg.entrop.pvz.
Tarpus.infor.įvertis
Entropijų sąryšiai
Jungt.s-mos
entrop.įvertis
Entrop.sąr.diag.
Diskr.a.d.entropija
1pvz. (Šenono režis)
2pvz.(Ligos rizika)
Tol.a.d.entropija
Gauso a.d.entropija
Tol.a.d.entrop.įvertis

Tegul T yra koks nors tekstas. Pavyzdžiui, $T = abrakadabra$
A. d. X reiškia atsitiktinai pasirinktą T raidę.

X	a	b	d	k	r
P	5/11	2/11	1/11	1/11	2/11

$$H(X) = \frac{5}{11} \log_2 \frac{11}{5} + 2 \cdot \frac{2}{11} \log_2 \frac{11}{2} + 2 \cdot \frac{1}{11} \log_2 11 \approx 2,0404.$$

Tai yra vadinamasis **Šenono režis** vidutiniam vienos raidės kodo bitų skaičiui. Kitaip sakant, nėra tokio vienareikšmiškai dekoduojamo kodo, kuriuo tekstą T atvaizduotume trumpesne nei $11 \cdot H(X) \approx 22,44$ bitų seka. Tačiau ne visiems tekstams Šenono režis yra pasiekiamas. Geriausio T kodo ilgis 23 bitai, pvz.
 $a \mapsto 0, b \mapsto 100, d \mapsto 110, k \mapsto 111, r \mapsto 101.$

Pasiūlymas: panagrinėkite tekstą $T' = abrakadabrakaada.$

2pvz. (Ligos rizikos faktoriai)

Informacijos kiekis
Inf.kiekio išraiška
Inf.kiekio vienetai
Sąlyginė informacija
Entropija
Binarinė entropija
Sąlyginė entropija
Jungt.s-mos entropija
Gibbs'o nelygybė
Entropijos įverčiai
Pavyzdys
Tiksl.s-mos entropija
Sąlyg.entrop.pvz.
Tarpus.infor.įvertis
Entropijų sąryšiai
Jungt.s-mos
entrop.įvertis
Entrop.sąr.diag.
Diskr.a.d.entropija
1pvz. (Šenono režis)
2pvz.(Ligos rizika)
Tol.a.d.entropija
Gauso a.d.entropija
Tol.a.d.entrop.įvertis

Atliekamas tyrimas, siekiant nustatyti kokie faktoriai įtakoja galimybę susirgti tam tikra liga. Ligos požymį žymėsime kintamuoju Y , įgyjančiu reikšmes S ir N (serga, neserga). Nagrinėjami trys faktoriai:

X_1 — paciento lytis, galimos reikšmės $\{M, V\}$;

X_2 — rūkymas, galimos reikšmės $\{taip, ne\}$;

X_3 — kraujospūdis, galimos reikšmės $\{mažas, normalus, didelis\}$.

Kuris faktorius labiausiai įtakoja polinkį susirgti? Norėdami atsakyti į šį klausimą, turime išsiaiškinti, kaip pasikeičia Y entropija, vieno ar kito požymio atžvilgiu. Kitaip sakant, turime palyginti tris tarpusavio informacijas

$$I(Y, X_i) = H(Y) - H(Y|X_i), \quad i = 1, 2, 3.$$

100 pacientų tyrimo duomenys pateikti lentelėje.

2pvz. (Ligos rizikos faktoriai)

Informacijos kiekis
 Inf.kiekio išraiška
 Inf.kiekio vienetai
 Sąlyginė informacija
 Entropija
 Binarinė entropija
 Sąlyginė entropija
 Jungt.s-mos entropija
 Gibbs'o nelygybė
 Entropijos įverčiai
 Pavyzdys
 Tiksl.s-mos entropija
 Sąlyg.entrop.pvz.
 Tarpus.infor.įvertis
 Entropijų sąryšiai
 Jungt.s-mos
 entrop.įvertis
 Entrop.sąr.diag.
 Diskr.a.d.entropija
 1pvz. (Šenono režis)
 2pvz.(Ligos rizika)
 Tol.a.d.entropija
 Gauso a.d.entropija
 Tol.a.d.entrop.įvertis

<i>Paciento lytis (X_1)</i>	<i>Rūkymas (X_2)</i>	<i>Kraujospūdis (X_3)</i>	<i>Ligos požymis (Y)</i>	<i>Pacientų skaičius</i>
<i>M</i>	<i>ne</i>	<i>mažas</i>	<i>N</i>	5
<i>M</i>	<i>ne</i>	<i>mažas</i>	<i>S</i>	2
<i>M</i>	<i>ne</i>	<i>normalus</i>	<i>N</i>	10
<i>M</i>	<i>ne</i>	<i>didelis</i>	<i>S</i>	6
<i>M</i>	<i>taip</i>	<i>mažas</i>	<i>N</i>	4
<i>M</i>	<i>taip</i>	<i>mažas</i>	<i>S</i>	2
<i>M</i>	<i>taip</i>	<i>normalus</i>	<i>N</i>	8
<i>M</i>	<i>taip</i>	<i>didelis</i>	<i>N</i>	1
<i>M</i>	<i>taip</i>	<i>didelis</i>	<i>S</i>	8
<i>V</i>	<i>ne</i>	<i>normalus</i>	<i>N</i>	8
<i>V</i>	<i>ne</i>	<i>didelis</i>	<i>S</i>	10
<i>V</i>	<i>ne</i>	<i>mažas</i>	<i>N</i>	2
<i>V</i>	<i>taip</i>	<i>mažas</i>	<i>S</i>	7
<i>V</i>	<i>taip</i>	<i>normalus</i>	<i>N</i>	6
<i>V</i>	<i>taip</i>	<i>normalus</i>	<i>S</i>	5
<i>V</i>	<i>taip</i>	<i>didelis</i>	<i>S</i>	16

2pvz. (Ligos rizikos faktoriai)

Informacijos kiekis
Inf.kiekio išraiška
Inf.kiekio vienetai
Sąlyginė informacija
Entropija
Binarinė entropija
Sąlyginė entropija
Jungt.s-mos entropija
Gibbs'o nelygybė
Entropijos įverčiai
Pavyzdys
Tiksl.s-mos entropija
Sąlyg.entrop.pvz.
Tarpus.infor.įvertis
Entropijų sąryšiai
Jungt.s-mos
entrop.įvertis
Entrop.sąr.diag.
Diskr.a.d.entropija
1pvz. (Šenono režis)
[2pvz.\(Ligos rizika\)](#)
Tol.a.d.entropija
Gauso a.d.entropija
Tol.a.d.entrop.įvertis

Atsitiktinio dydžio Y skirstinys yra

Y	N	S
P	0,44	0,56

Vadinasi, $H(Y) = h(0,44) \approx 0,989587521$
Skaičiuosime $H(Y|X_1)$.

$$\begin{aligned} H(Y|X_1 = M) &= \\ &P(Y = N|X_1 = M) \log_2 \frac{1}{P(Y = N|X_1 = M)} \\ &+ P(Y = S|X_1 = M) \log_2 \frac{1}{P(Y = S|X_1 = M)} \\ &= h\left(\frac{28}{46}\right) \approx 0,965636133 \end{aligned}$$

Analogiškai $H(Y|X_1 = V) = h\left(\frac{16}{54}\right) \approx 0,876716289$

2pvz. (Ligos rizikos faktoriai)

Informacijos kiekis

Inf.kiekio išraiška

Inf.kiekio vienetai

Sąlyginė informacija

Entropija

Binarinė entropija

Sąlyginė entropija

Jungt.s-mos entropija

Gibbs'o nelygybė

Entropijos įverčiai

Pavyzdys

Tiksl.s-mos entropija

Sąlyg.entrop.pvz.

Tarpus.infor.įvertis

Entropijų sąryšiai

Jungt.s-mos

entrop.įvertis

Entrop.sąr.diag.

Diskr.a.d.entropija

1pvz. (Šenono režis)

[2pvz.\(Ligos rizika\)](#)

Tol.a.d.entropija

Gauso a.d.entropija

Tol.a.d.entrop.įvertis

Dabar randame $H(Y|X_1)$

$$H(Y|X_1) =$$

$$P(X_1 = M)H(Y|X_1 = M) + P(X_1 = V)H(Y|X_1 = V)$$

$$= 0,46 \cdot h\left(\frac{28}{46}\right) + 0,54 \cdot h\left(\frac{16}{54}\right) \approx 0,917619417$$

Analogiškai $H(Y|X_2) \approx 0,945171922$ ir

$$H(Y|X_3) \approx 0,499226424.$$

Dabar jau galime rasti ieškomąsias tarpusavio informacijas

$$I(Y, X_1) \approx 0,071968104,$$

$$I(Y, X_2) \approx 0,044415599,$$

$$I(Y, X_3) \approx 0,490361097.$$

Absoliučiai tolydžiojo a. d. entropija

Informacijos kiekis
Inf.kiekio išraiška
Inf.kiekio vienetai
Sąlyginė informacija
Entropija
Binarinė entropija
Sąlyginė entropija
Jungt.s-mos entropija
Gibbs'o nelygybė
Entropijos įverčiai
Pavyzdys
Tiksl.s-mos entropija
Sąlyg.entrop.pvz.
Tarpus.infor.įvertis
Entropijų sąryšiai
Jungt.s-mos
entrop.įvertis
Entrop.sąr.diag.
Diskr.a.d.entropija
1pvz. (Šenono režis)
2pvz.(Ligos rizika)
[Tol.a.d.entropija](#)
Gauso a.d.entropija
Tol.a.d.entrop.įvertis

Tolydžiųjų atsitiktinių dydžių entropija apibrėžiama kitaip. Skiriasi ir jos interpretacija.

Apibrėžimas. Tolydžiojo atsitiktinio dydžio X su tankio funkcija $p_X(x)$ entropija $H(X)$ yra lygi

$$H(X) = - \int_{-\infty}^{\infty} p_X(x) \log_2 p_X(x) dx .$$

Iš karto reikia pažymėti, kad tolydžiojo atsitiktinio dydžio entropijos negalima interpretuoti kaip vidutinės informacijos, nes šiuo atveju $P(X = x) = 0$, nepriklausomai nuo tankio funkcijos $p_X(x)$ reikšmės. Be to, tolydžiojo atsitiktinio dydžio entropija gali būti ir neigiama.

Gauso a. d. entropija

Informacijos kiekis
Inf.kiekio išraiška
Inf.kiekio vienetai
Sąlyginė informacija
Entropija
Binarinė entropija
Sąlyginė entropija
Jungt.s-mos entropija
Gibbs'o nelygė
Entropijos įverčiai
Pavyzdys
Tiksl.s-mos entropija
Sąlyg.entrop.pvz.
Tarpus.infor.įvertis
Entropijų sąryšiai
Jungt.s-mos
entrop.įvertis
Entrop.sąr.diag.
Diskr.a.d.entropija
1pvz. (Šenono režis)
2pvz.(Ligos rizika)
Tol.a.d.entropija
[Gauso a.d.entropija](#)
Tol.a.d.entrop.įvertis

Tegul X yra normalusis (kitai: Gauso) atsitiktinis dydis su vidurkiu a ir dispersija σ^2 , $\sigma > 0$. Tokio atsitiktinio dydžio tankio funkcija yra

$$p_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left\{ -\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2} \right\}.$$

Rasime jo entropiją. Pagal apibrėžimą

$$\begin{aligned} H(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} p_X(x) \left(\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2} (\log_2 e) + \log_2(\sqrt{2\pi}\sigma) \right) dx \\ &= \frac{\log_2 e}{2\sigma^2} \int_{-\infty}^{\infty} (x-a)^2 p_X(x) dx + \log_2(\sqrt{2\pi}\sigma) \int_{-\infty}^{\infty} p_X(x) dx \\ &= \frac{\log_2 e}{2\sigma^2} \cdot \sigma^2 + \log_2(\sqrt{2\pi}\sigma) \cdot 1 = \frac{1}{2} \log_2(2e\pi\sigma^2). \end{aligned}$$

Absoliučiai tolydaus a. d. entropijos įvertis

Informacijos kiekis
Inf.kiekio išraiška
Inf.kiekio vienetai
Sąlyginė informacija
Entropija
Binarinė entropija
Sąlyginė entropija
Jungt.s-mos entropija
Gibbs'o nelygybė
Entropijos įverčiai
Pavyzdys
Tiksl.s-mos entropija
Sąlyg.entrop.pvz.
Tarpus.infor.įvertis
Entropijų sąryšiai
Jungt.s-mos
entrop.įvertis
Entrop.sąr.diag.
Diskr.a.d.entropija
1pvz. (Šenono režis)
2pvz.(Ligos rizika)
Tol.a.d.entropija
Gauso a.d.entropija
[Tol.a.d.entrop.įvertis](#)

"Tolydžioji" Gibbs'o nelygybės versija yra

$$\int_{-\infty}^{\infty} p_X(x) \log_b \left(\frac{p_Y(x)}{p_X(x)} \right) dx \leq 0.$$

Čia $b > 1$, o $p_X(x)$ ir $p_Y(x)$ - bet kokios tankio funkcijos.
Pasinaudoję šia nelygybe, galime įrodyti tokį teiginį.

Teorema. *Jei absoliučiai tolydus atsitiktinis dydis X turi baigtinę dispersiją $\mathbf{D}X = \sigma^2$, $\sigma > 0$, tai jo entropija*

$$H(X) \leq \frac{1}{2} \log_2(2e\pi\sigma^2).$$