
# 聲帶結節 Vocal Fold Nodules


聲音沙啞、說話容易累、高音唱不上去，是聲帶長期用力磨出了「繭」。

## 為什麼 聲帶撞太多次，磨出了繭

說話時，兩條聲帶會**每秒互相碰撞上百次**。長期大聲或用力說話，碰撞最多的那一點就會**摩擦增厚**，像手掌磨出繭。結節讓聲帶閉不緊、**漏氣**，聲音就變得沙啞、費力。




正常：發聲時完全貼合




結節：互相頂住，留下縫隙

▲ 從喉嚨上方往下看聲帶（喉鏡視角示意）

**常見誘因：** 用聲過度 | 大聲說話、喊叫 | 常清喉嚨、咳嗽 | 胃酸逆流 | 抽菸 | 喝水少

## 怎麼做 日常自我照顧

**讓聲音休息 ★ 重要**
說一段時間就停下來，不硬撐

**多喝溫水**
保持聲帶濕潤

**少清喉嚨**
改喝一小口水或吞口水

**控制胃酸逆流**
睡前 3 小時不進食

**醫師可能的治療：**音聲復健（語言治療師指導正確發聲）・手術（保守治療效果不佳時考慮）
**★ 手術最好配合音聲復健，不然很容易復發。**

## 出現以下情況，請提早回診

- 沙啞超過 2–3 週沒改善
- 呼吸困難，或呼吸時有雜音
- 突然完全發不出聲音
- 吞嚥困難或咳血

本單張為衛教參考，實際治療請依醫師評估。

健安聯合診所