



Ministério da Educação
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Faculdade de Ciências Sociais, Aplicadas e Exatas - FACSAB
Departamento de Ciências Exatas - DCEX
Disciplina: Cálculo Numérico
Prof.: Luiz C. M. de Aquino



Lista de Exercícios III

1. Utilize o Método de Newton para determinar uma aproximação para a raiz da função polinomial definida por $p(x) = 2x^4 - 2x^3 - 22x^2 - 10x + 8$ no intervalo $[0; 1]$ (considere uma tolerância de 10^{-5}).
2. Use o Método da Falsa Posição para encontrar a raiz aproximada da equação $e^x - e^{-x} = 2 \cos x$ no intervalo $[0; 1]$ (considere uma tolerância de 10^{-5}).
3. Considere o problema de encontrar uma raiz aproximada da equação $e^{-x^2} = \frac{1}{2}$ no intervalo $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$. Determine uma função de iteração e resolva este problema pelo Método do Ponto Fixo.
4. Seja ϕ uma função de iteração da equação $f(x) = 0$ no intervalo $[a; b]$. Prove que se ϕ é contínua em $[a; b]$ e $\phi(x) \in [a; b]$ para todo $x \in [a; b]$, então ϕ possui algum ponto fixo em $[a; b]$.
5. Seja x um número natural não nulo qualquer. Considere que n seja um quadrado perfeito mais próximo de x . Prove que $\sqrt{x} \approx \frac{x+n}{2\sqrt{n}}$. (Observação: dizemos que n é um quadrado perfeito se existe um natural m tal que $n = m^2$.)

Gabarito

[1] $x \approx 0.41421$. [2] $x \approx 0,70329$. [3] Considere $\phi(x) = x + e^{-x^2} - \frac{1}{2}$. Note que $|\phi'(x)| < 1$ para $x \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]$. Deste modo, a sequência $x_{n+1} = \phi(x_n)$ é convergente e teremos $x \approx 0,832438$ como solução aproximada da equação dada. [4] Sugestão: Usando que ϕ é contínua em $[a; b]$, justifique que a função definida por $g(x) = \phi(x) - x$ é contínua em $[a; b]$. Já usando que $\phi(x) \in [a; b]$ para todo $x \in [a; b]$, justifique que $g(a)g(b) < 0$. Aplicando então o Teorema do Valor Intermediário, conclua que existe $\alpha \in [a; b]$ tal que $g(\alpha) = 0$. A partir disso, conclua que ϕ possui algum ponto fixo em $[a; b]$. [5] Sugestão: Aplique o Método de Newton na resolução aproximada (em u) da equação $u^2 - x = 0$. Use como valor inicial $u_0 = \sqrt{n}$.