



Ministério da Educação
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Faculdade de Ciências Sociais, Aplicadas e Exatas - FACSAB
Departamento de Ciências Exatas - DCEX
Disciplina: Cálculo Numérico
Prof.: Luiz C. M. de Aquino



Aluno(a): _____ Data: ____ / ____ / ____

Avaliação I

Instruções

- Todas as justificativas necessárias na solução de cada questão devem estar presentes nesta avaliação;
 - As respostas finais de cada questão devem estar escritas de caneta;
 - Esta avaliação tem um total de 25,0 pontos.
1. **[6,0 pontos]** Dado $a \in \mathbb{R}_+^*$ proponha uma maneira de usar o Método da Bissecção para calcular um valor aproximado de \sqrt{a} com tolerância de 10^{-5} .
 2. **[4,5 pontos]** Considere o problema de encontrar uma raiz aproximada da equação $e^{-x^2} = \frac{1}{2}$ no intervalo $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$. Determine uma função de iteração e resolva este problema pelo Método do Ponto Fixo (considere uma tolerância de 10^{-5}).
 3. **[4,5 pontos]** Utilize o Método de Newton para determinar uma aproximação para a raiz da função polinomial definida por $p(x) = 2x^4 - 2x^3 - 22x^2 - 10x + 8$ no intervalo $[0; 1]$ (considere uma tolerância de 10^{-5}).
 4. **[5,0 pontos]** A cada passo no Método da Falsa Posição, escolhemos $x_k = \frac{a_k|f(b_k)| + b_k|f(a_k)|}{|f(a_k)| + |f(b_k)|}$, sendo que no intervalo $[a_k; b_k]$ temos $f(a_k)f(b_k) < 0$. Prove que esta escolha de x_k coincide com a abscissa do ponto de interseção entre o eixo x e a reta passando por $(a_k, f(a_k))$ e $(b_k, f(b_k))$.
 5. **[5,0 pontos]** Seja $f : [a; b] \rightarrow [a; b]$ uma função contínua em todo o seu domínio. Prove que o gráfico de f e de $g(x) = x$ tem pelo menos um ponto em comum.