

## 第12章

### 12-1

解:

由光速不变原理得固有长度

$$L_0 = c\Delta t.$$

### 12-2

解:

记某参考系相对飞船系的运动速度为 $-u_{r1}$ , 微流星在某参考系中的速度为 $-u_{r2}$ . 微流星在飞船系中的速度大小

$$u = \frac{-u_{r1} - u_{r2}}{1 + \frac{u_{r1}u_{r2}}{c^2}} = 0.981c.$$

经过飞船所耗时间

$$t = \frac{l}{u} = 1.19 \mu\text{s}.$$

### 12-5

解:

设 $S'$ 相对 $S$ 速度为 $v_r$ , 由

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_r^2}{c^2}}} = \frac{2000 \text{ m}}{1000 \text{ m}} = 2,$$

解得 $v_r = \frac{\sqrt{3}}{2}c$ .

时间间隔

$$\begin{aligned} \Delta t_{21} &= \frac{t_2 - \frac{v_r}{c^2}x_2}{\sqrt{1 - \frac{v_r^2}{c^2}}} - \frac{t_1 - \frac{v_r}{c^2}x_1}{\sqrt{1 - \frac{v_r^2}{c^2}}} \\ &= \frac{-\Delta x_{21} \frac{v_r}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v_r^2}{c^2}}} \end{aligned}$$

代入数值得

$$\Delta t_{21} = -5.77 \mu\text{s}.$$

即从 $S'$ 相对 $S$ 的运动方向来看位置靠前的事件比靠后的事件早发生 $5.77 \mu\text{s}$ .

### 12-7

解:

记两系的 $A$ 和 $A'$ 钟位置为各自的原点, 两者重合时 $t = t' = 0$ . 设 $\Delta x$ 为从 $A$ 到 $B$ 的有向距离.  $A'$ 钟和 $B$ 钟相遇时 $S$ 系的时间即为 $B$ 钟读数

$$t_B = \frac{\Delta x}{v}.$$

$S'$ 系中 $A'$ 钟读数

$$\begin{aligned} t_{A'} &= \frac{t_B - \frac{v}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\ &= \frac{\Delta x}{v} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}. \end{aligned}$$

### 12-8

解:

在洛伦兹变换

$$\begin{cases} x = \gamma(x' + \beta ct') \\ ct = \gamma(ct' + \beta x') \end{cases}$$

中固定时间 $t'$ , 整理得

$$ct = \beta x + \frac{c}{\gamma}t'$$

在以 $x$ 为横轴,  $ct$ 为纵轴的坐标系中, 在 $S'$ 系中同时发生的两个事件所在直线的斜率为 $\beta$ .

$$\beta = c \frac{t_2 - t_1}{x_2 - x_1}.$$

又从以上洛伦兹变换方程组的第一式得, 当 $\Delta t' = 0$ 时,

$$\Delta x = \gamma \Delta x' = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \Delta x'.$$

$$\begin{aligned} \Delta x' &= \sqrt{1 - \beta^2} (x_2 - x_1) \\ &= \sqrt{1 - c^2 \frac{(t_2 - t_1)^2}{(x_2 - x_1)^2}} (x_2 - x_1) \\ &= (\Delta x^2 - c^2 \Delta t^2)^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

## 12-9

解:

火箭发射时, 地面上的时间

$$\Delta t_1 = \gamma \Delta t' = 12.5 \text{ s.}$$

火箭升空的距离

$$x = v \Delta t_1 = 12.5 \text{ s} \cdot 0.6c.$$

导弹落地所用时间

$$\Delta t_2 = \frac{x}{v_1} = 25 \text{ s.}$$

从火箭发射到导弹到达地球的时间

$$\Delta t = \Delta t_1 + \Delta t_2 = 37.5 \text{ s.}$$

## 12-10

解:

记 $\mu$ 子动能为 $E_k = 10395 \text{ MeV}$ . 总能量

$$\begin{aligned} E &= \gamma m_0 c^2 \\ &= m_0 c^2 + (\gamma - 1) m_0 c^2 \\ &= m_0 c^2 + E_k \\ &= 10500 \text{ MeV.} \end{aligned}$$

由 $E_k = (\gamma - 1)m_0 c^2$ 得 $\gamma = 100$ . 解得

$$v = \frac{3\sqrt{1111}}{100} c = 0.99995c.$$

动量

$$p = \gamma m_0 v = 1.05 \times 10^4 \text{ MeV} \cdot \text{c}^{-1}.$$

## 12-11

解:

由动量守恒, 粒子正碰合并后静止, 所有能量均转化为静质能. 总能量

$$E = 2 \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

由 $E = m'_0 c^2$ 得

$$m'_0 = \frac{2m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

## 12-13

解:

(1)

电子的总能量

$$E = \frac{m_e c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 5.81 \times 10^{-13} \text{ J.}$$

(2)

电子的经典力学动能与相对论动能之比

$$\frac{E_{k0}}{E_k} = \frac{\frac{1}{2} m_0 v^2}{(\gamma - 1) m_0 c^2} = \frac{v^2}{2(\gamma - 1) c^2} = 0.08.$$

## 12-16

解:

记 $E_{kB} = 6m_0 c^2$ , 复合质点为 $C$ . 由相对论能量与动量的关系

$$(E_{kB} + m_0 c^2)^2 = p_B^2 c^2 + m_0^2 c^4,$$

动量守恒

$$p_B = p_C,$$

其中

$$p_C = \frac{m_C v_C}{\sqrt{1 - \frac{v_C^2}{c^2}}},$$

能量守恒

$$E_{kB} + m_0 c^2 + m_0 c^2 = \frac{m_C c^2}{\sqrt{1 - \frac{v_C^2}{c^2}}}$$

解得 $m_C = 4m_0$ .

## 第13章

## 13-2

解:

由

$$\lambda_1 T_1 = b,$$

$$\lambda_2 T_2 = b,$$

$$E_1 = \sigma T_1^4,$$

$$E_2 = \sigma T_2^4$$

得总辐射出射度变为原来的 $\frac{E_2}{E_1} = \frac{\lambda_1^4}{\lambda_2^4} = 3.63$ 倍.

## 13-3

解:

(1)

设金属的逸出功为 $A$ , 由光电效应方程

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + A,$$

遏止电压 $U_e$ 满足 $eU_e = \frac{1}{2}mv_m^2$ 得

$$U_e = \frac{h}{e}\nu - \frac{A}{e}. \quad (1)$$

故 $AB$ 线斜率 $k = \frac{h}{e}$ , 与金属材料无关.

(2)

由图得斜率 $K = \frac{2 \text{ V}}{5.0 \times 10^{14} \text{ Hz}} = 4 \times 10^{-15} \text{ V/Hz}$ .由(1)式得 $h = eK = 6.4 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ .

## 13-5

解:

正确的有(2)和(4).

## 13-8

解:

(1)

散射前光的波长

$$\lambda_0 = \frac{hc}{\varepsilon} = 124.3 \text{ pm}.$$

散射过程中波长的变化量

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos 60^\circ) = 1.2 \text{ pm}.$$

碰撞后散射光的波长 $\lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda = 125.5 \text{ pm}$ .

(2)

由能量守恒

$$\frac{hc}{\lambda_0} = \frac{hc}{\lambda} + E_{ke}$$

解得 $E_{ke} = 1.53 \times 10^{-17} \text{ J}$ .

## 13-9

解:

记 $\varepsilon = 0.5 \text{ MeV}$ ,  $E_e = 0.1 \text{ MeV}$ . 由

$$\begin{aligned} \lambda_0 &= \frac{hc}{\varepsilon} \\ hc \left( \frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda} \right) &= E_e \\ \lambda &= \lambda_0 + \Delta\lambda \end{aligned}$$

由上式整理得

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{\Delta\lambda}{\Delta\lambda + \lambda_0} = \frac{E_e}{\varepsilon} = \frac{1}{5}.$$

故

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{1}{4}.$$

## 13-10

解:

记 $\lambda_0 = 3 \text{ pm}$ ,  $E_{ke} = (\gamma - 1)m_e c^2 = \frac{1}{4}m_e c^2$ . 由能量守恒

$$\frac{hc}{\lambda_0} = \frac{hc}{\lambda} + E_{ke}.$$

解得 $\lambda = 4.34 \text{ pm}$ , 则 $\Delta\lambda = 1.34 \text{ pm}$ .设散射角为 $\varphi$ , 由

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos \varphi)$$

得 $\varphi = 63^\circ$ .

## 13-16

解:

电子的动量

$$p_e = h/\lambda_e = 3.32 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1},$$

总能量 $E_e = \sqrt{p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4} = 8.20 \times 10^{-14} \text{ J}$ .

动能

$$E_{ke} = E_e - m_e c^2 = 6.03 \times 10^{-18} \text{ J}.$$

光子的动量

$$p_p = h/\lambda_p = 3.32 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1},$$

动能

$$E_{kp} = p_p c = 9.95 \times 10^{-16} \text{ J}.$$

## 13-18

解:

粒子的动量

$$p = \frac{h}{\lambda} = 3.32 \times 10^{-22} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

记  $U = 206 \text{ V}$ . 由

$$eU = \frac{1}{2}mv^2$$

和

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$$

解得  $m = \frac{h^2}{2eU\lambda^2}$ .代入数值得粒子的静质量  $m_0 = 1.67 \times 10^{-33} \text{ kg}$ .

## 13-24

解:

$$|\Psi(x)|^2 = c^2 x^2 (l-x)^2, 0 \leq x \leq l,$$

归一化

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x)|^2 dx = \int_0^l |\Psi(x)|^2 dx = 1,$$

解得

$$c^2 = \frac{30}{l^5}.$$

在  $[0, l/3]$  发现粒子的概率

$$\int_0^{l/3} |\Psi(x)|^2 dx = \frac{17}{81} = 0.21.$$

## 13-21

解:

(1)

动量的不确定度

$$\Delta p_e = m_e \Delta v = 9.1 \times 10^{-33} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

坐标的不确定度

$$\Delta x_e = \frac{h}{\Delta p_e} = 0.072 \text{ m}.$$

(2)

同(1)得

$$\Delta x_2 = \frac{h}{m_3 \Delta v} = 6.63 \times 10^{-19} \text{ m}.$$

(3)

同(1)得

$$\Delta x_3 = \frac{h}{m_3 \Delta v} = 6.63 \times 10^{-28} \text{ m}.$$

## 13-23

解:

$$|\Psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \left( \frac{2\pi}{a} x \right).$$

联系  $a$  的范围可以知道, 当  $x$  取  $a/4$  及  $3a/4$  时,  $|\Psi(x)|^2$  最大, 粒子被发现的概率最大.