

## TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE

## Budesonida, Dipropionato de Beclometasona, Fumarato de Formoterol, Salbutamol, Prednisona, Prednisolona, Omalizumabe e Mepolizumabe

Eu,_							(no	me do(a)	paciente	), declar	o ter	sido
informado(a) sobre benefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos adversos relacionados ao uso de												
Bud	esonida,	Dipropiona	to de	Beclometason	a,	Fumarato	de	Formoter	ol, Salbu	itamol, F	redni	sona,
Prednisolona, Omalizumabe e Mepolizumabe indicados para o tratamento da Asma.												
Os	termos	médicos	foram	explicados	е	todas	as	dúvidas	foram	esclarec	idas	pelo
méd	dico							(non	ne do méd	dico que p	rescre	eve).
Assi	m, declar	o que fui clai	ramente	e informado (a)	de	que o me	dican	nento que ¡	passo a re	ceber po	de tra:	zer os
segı	uintes ber	nefícios:										
_	Controle	dos sintomas	5;									

- Melhora da qualidade de vida;
- Normalização ou estabilização da função pulmonar;
- Redução do absenteísmo escolar e ao trabalho;
- Redução da utilização de serviços de saúde, incluindo hospitalizações.

Fui também informado (a) a respeito das seguintes contraindicações, potenciais efeitos adversos e riscos:

- os riscos na gravidez e na amamentação ainda não são bem conhecidos; portanto, caso engravide, devo avisar imediatamente o médico;
- efeitos adversos da beclometasona e budesonida: problemas na fala (reversíveis com a suspensão do tratamento), infecções na boca (candidíase), boca seca, alteração do paladar, irritação na garganta, tosse, infecções urinárias, inchaço, cansaço, reações alérgicas de pele, palpitação, taquicardia, dor abdominal, vertigem, tontura, ganho de peso; efeitos adversos mais raros: náuseas, vômitos, coceira, problemas na visão, agitação, depressão, insônia, faringite, sinusite, alteração do ciclo menstrual, diarreia ou constipação, febre, dores de cabeça, infecções virais, redução da velocidade do crescimento em crianças, aumento dos níveis de glicose no sangue, reações de hipersensibilidade, sangramento anal e osteoporose (em caso de tratamento longo);
- efeitos adversos do fenoterol, formoterol, salbutamol e salmeterol: ansiedade, agitação, insônia, náuseas, vômitos, dores abdominais, prisão de ventre, tonturas, dores de cabeça, diminuição dos níveis de potássio no sangue, tremores, palpitações, tosse, respiração curta, alteração do paladar, secura da boca, dor muscular, reações alérgicas de pele, problemas no coração, aumento ou diminuição intensa da



Local:	Data:									
Nome do paciente:										
Cartão Nacional de Saúde:										
Nome do responsável legal:										
Documento de identificação do responsável legal:										
Assinatura do paciente ou do responsável legal										
Médico responsável:		CRM:	UF:							
	inatura e carimbo do médico ita:									