COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO

Portaria nº 1.203, de 4 de novembro de 2014 (Protocolo na íntegra)

Medicamentos

- Olanzapina 5 mg e 10 mg comprimido
- Quetiapina 25 mg, 100 mg, 200 mg e 300 mg comprimido
- Risperidona 1 mg, 2 mg e 3 mg comprimido
- Ziprasidona 40 mg e 80 mg cápsula
- Clozapina 25 mg e 100 mg comprimido

CID's contemplados

F25.0, F25.1, F25.2

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

1ª solicitação

- Relatório médico com descrição do quadro clínico;
- Escala BPRS-A (Escala Breve de Avaliação Psiquiátrica Ancorada);
- Dosagem sérica colesterol total;
- Dosagem sérica HDL (High-density lipoprotein);
- Dosagem sérica triglicerídeos;
- Dosagem sérica LDL <u>ou</u> cálculo do LDL pela equação de Friedewald;

Equação de Friedewald: LDL = [(Colesterol total) – HDL] – (Triglicerídeos/5)

· Glicemia de jejum.

Renovação da Continuidade

PARA OLANZAPINA, QUETIAPINA, RISPERIDONA, ZIPRASIDONA:

Anualmente:

- Dosagem sérica colesterol total;
- Dosagem sérica HDL (High-density lipoprotein);
- Dosagem sérica triglicerídeos;
- Dosagem sérica LDL <u>ou</u> cálculo do LDL pela equação de Friedewald;
- Glicemia de jejum.

A critério do médico prescritor:

Escala BPRS-A (Escala Breve de Avaliação Psiquiátrica Ancorada);

TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO (Atualizado em 25/09/2018)



COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

PARA CLOZAPINA:

Mensalmente:

Hemograma.

Anualmente:

- Dosagem sérica colesterol total;
- Dosagem sérica HDL (High-density lipoprotein);
- Dosagem sérica triglicerídeos;
- Dosagem sérica LDL <u>ou</u> cálculo do LDL pela equação de Friedewald;
- Glicemia de jejum;

A critério do médico prescritor:

• Escala BPRS-A (Escala Breve de Avaliação Psiquiátrica Ancorada).

