

ESPONDILITE ANCILOSANTE

Portaria SAS/MS/SCTIE nº 25, de 22 de outubro de 2018 ([Protocolo na íntegra](#))

Medicamentos

- [Adalimumabe 40 mg injetável – seringa preenchida](#)
- [Adalimumabe 40 mg injetável – frasco-ampola](#)
- [Etanercepte 25 mg injetável – frasco-ampola; e 50 mg injetável – frasco-ampola](#)
- [Infliximabe 10 mg/mL injetável – frasco-ampola com 10mL](#)
- [Golimumabe 50 mg injetável – seringa preenchida](#)
- [Metotrexato 25 mg/mL – injetável, ampola de 2 mL e 2,5 mg – comprimido](#)
- [Naproxeno 250 mg e 500 mg – comprimido](#)
- [Sulfassalazina 500 mg – comprimido](#)
- [Secuquinumabe 150mg/ml injetável – caneta aplicadora](#)
- [Certolizumabe pegol 200mg/ml injetável – caneta aplicadora](#)

CID's contemplados

M45, M46.8


Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

1ª solicitação

PARA METOTREXATO, SULFASSALAZINA E NAPROXENO:

- VHS (Velocidade de Hemossedimentação).
- Dosagem sérica – PCR (Proteína C Reativa);
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Hemograma com contagem de plaquetas;
- Dosagem sérica – creatinina;
- Laudo/relatório médico de Radiografia ou Ressonância Magnética de articulações sacroílicas ou HLA – B27.

ESPONDILITE ANCILOSANTE (Atualizado em 24/01/2020)



COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

PARA ADALIMUMABE, ETANERCEPTE, INFLIXIMABE, GOLIMUMABE, CERTOLIZUMABE PEGOL:

- VHS (Velocidade de Hemossedimentação);
- Dosagem sérica – PCR (Proteína C Reativa);
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Hemograma com contagem de plaquetas;
- Sorologia - Anti-HCV (Anti-Vírus da Hepatite C);
- Sorologia - HbsAG (Antígeno de superfície – Hepatite B);
- Sorologia - Anti-HIV (Anti-Vírus da Imunodeficiência Humana).
- Avaliação de Tuberculose Latente ou Ativa:
 - Laudo/relatório médico de Radiografia de tórax;
 - [Prova de Mantoux - PPD \(teste tuberculínico\)](#) ou equivalente.
- Laudo/relatório médico de Radiografia ou Ressonância Magnética de articulações sacroilíacas ou HLA – B27.


PARA SECUQUINUMABE

- VHS (Velocidade de Hemossedimentação);
- Dosagem sérica – PCR (Proteína C Reativa);
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Hemograma com contagem de plaquetas;
- Sorologia - Anti-HCV (Anti-Vírus da Hepatite C);
- Sorologia - HbsAG (Antígeno de superfície – Hepatite B);
- Sorologia - Anti-HIV (Anti-Vírus da Imunodeficiência Humana).
- Avaliação de Tuberculose Latente ou Ativa:
 - Laudo/relatório médico de Radiografia de tórax;
 - [Prova de Mantoux - PPD \(teste tuberculínico\)](#) ou equivalente.
- Laudo/relatório médico de Radiografia ou Ressonância Magnética de articulações sacroilíacas ou HLA – B27.
- Descrição no campo “11 – Anamnese” do LME:
 - Tipo de manifestação: Espondilite Ancilosante Axial ou Espondilite Ancilosante Periférica;
 - Medicamentos utilizados e período de uso.

Renovação da Continuidade

Trimestralmente:

- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
 - Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- ESPONDILITE ANCILOSANTE (Atualizado em 24/01/2020)



COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

- Hemograma com contagem de plaquetas;
- Dosagem sérica – creatinina;

À critério do médico prescritor:

- [Índice BASDAI \(Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index\).](#)
- VHS (Velocidade de Hemossedimentação);
- Dosagem sérica – PCR (Proteína C Reativa).

Para orientações sobre como obter os medicamentos, [clique aqui](#).

ESPONDILITE ANCILOSANTE (Atualizado em 24/01/2020)

