

MUCOPOLISSACARIDOSE DO TIPO II

Portaria Conjunta nº 16, de 24 de maio de 2018 ([Protocolo na íntegra](#))

Medicamentos

- [Idursulfase alfa 2 mg/mL injetável - frasco com 3 mL](#)

CID's contemplados

E76.1

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

1ª solicitação

- Relatório médico descrevendo [sinais e sintomas de suspeita clínica](#);
- Atividade da enzima IDS (iduronato-2-sulfatase) < 10% do limite inferior dos valores de referência em plasma, fibroblastos ou leucócitos, **E** atividade normal de pelo menos outra sulfatase (medida na mesma amostra na qual determinada a atividade da IDS) **E** presença de níveis aumentados de GAGs totais na urina ou de excreção aumentada de sulfatos de heparan e dermatan; **OU** presença de mutação reconhecidamente patogênica no gene IDS;
- Laudo/relatório médico de radiografias do crânio (perfil), coluna vertebral (perfil, incluindo região cervical), tórax (póstero-anterior), coxofemorais (póstero-anterior) e ambas as mãos.

A critério do médico prescritor:

- Laudo neurológico clínico;
- Ressonância magnética do Crânio **e/ou** Tomografia computadorizada de crânio;
- Ressonância magnética da Coluna;
- Avaliação oftalmológica (acuidade visual, retina, córnea);
- Ecocardiograma;
- Eletrocardiograma;
- Capacidade Vital Forçada/Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo (CVF/VEF1).

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

Renovação da Continuidade

Semestralmente:

- Análise de GAG (glicosaminoglicanos) urinários.

A critério do médico prescritor:

- Laudo/relatório médico de radiografias do crânio (perfil), coluna vertebral (perfil, incluindo região cervical), tórax (póstero-anterior), coxofemorais (póstero-anterior) e ambas as mãos.

Para orientações sobre como obter os medicamentos, [clique aqui](#).