

UVEÍTES NÃO INFECCIOSAS

Portaria conjunta nº 14, de 11 de setembro de 2019 ([Protocolo na íntegra](#))

Medicamentos

- [Azatioprina 50 mg – comprimido](#)
- [Ciclosporina 25 mg, 50 mg e 100 mg – cápsula; 100 mg/mL solução oral – frasco de 50 mL](#)
- [Adalimumabe 40 mg injetável - seringa preenchida](#)
- [Metilprednisolona 500 mg solução injetável - ampola](#)

CID's contemplados

H30.1, H30.2, H30.8, H20.1, H15.0

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo


PARA CICLOSPORINA E AZATIOPRINA

- **Relatório médico** de exame oftalmológico clínico, descrevendo:
 - Alterações oculares compatíveis com o quadro de uveítes;
 - Indicação de uso crônico em longo prazo de glicocorticoide sistêmico (superior a 3 meses);
 - Falha na terapêutica com glicocorticoide sistêmico em monoterapia;
 - Toxicidade aguda, crônica presente ou presumida ou contraindicação ao uso de glicocorticoide por qualquer via de administração;
 - Diagnóstico de uveítes sabidamente graves, como doença de Behçet, coroidite serpiginosa e vasculites retinianas idiopáticas ou uveíte de caráter agressivo e com rápido comprometimento funcional.

PARA ADALIMUMABE:

- **Relatório médico** de exame oftalmológico clínico, descrevendo:
 - Alterações oculares compatíveis com o quadro de uveítes;
 - Tratamento com imunossupressor prévio, não corticoide, descontinuado por falta de efetividade, intolerância ou toxicidade;
 - Contraindicação aos imunossupressores não corticoides e não biológicos;
 - Doença de Behçet com uveíte posterior bilateral ativa com alto risco de cegueira ou associada com doença sistêmica em atividade.

UVEÍTES NÃO INFECCIOSAS (Atualizado em 03/02/2020)



COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

- Avaliação de Tuberculose Latente ou Ativa, realizado nos últimos 12 meses:
 - Laudo/relatório médico da radiografia de tórax;
 - [Prova de Mantoux - PPD \(teste tuberculínico\)](#), ou equivalente.

PARA METILPREDNISOLONA:

- **Relatório médico**, descrevendo:
 - Alterações oculares compatíveis com o quadro de uveítes;
 - Exame oftalmológico completo, com medida da acuidade visual, avaliação dos reflexos pupilares, biomicroscopia de segmento anterior, tonometria e fundoscopia direta e indireta.

Renovação da Continuidade

PARA AZATIOPRINA E ADALIMUMABE:

Trimestralmente:

- Hemograma;
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica).

PARA CICLOSPORINA

Trimestralmente:

- Dosagem sérica – sódio
- Dosagem sérica – potássio
- Dosagem sérica – ácido úrico
- Dosagem sérica – triglicerídeos
- Dosagem sérica – colesterol total
- Dosagem sérica – HDL (High-density lipoprotein);
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica).

PARA METILPREDNISOLONA:

ATENÇÃO: Não são necessários exames de renovação.

UVEÍTES NÃO INFECCIOSAS (Atualizado em 03/02/2020)

