Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

PSORÍASE

Portaria conjunta nº 10, de 6 de setembro de 2019 (Protocolo na íntegra)

Medicamentos

- Clobetasol 0,5 mg/g creme bisnaga de 30g e 0,5 mg/g solução capilar frasco de 50g
- Calcipotriol 50 mcg/g pomada bisnaga de 30g
- Acitretina 10 mg comprimido e 25 mg comprimido
- Metotrexato 25 mg/mL injetável, ampola de 2 ml e 2,5 mg comprimido
- Ciclosporina 25 mg, 50 mg e 100 mg cápsula; 100 mg/mL solução oral frasco de 50 mL
- Adalimumabe 40 mg injetável seringa preenchida
- Etanercepte 25 mg injetável frasco ampola; 50 mg injetável frasco ampola
- Secuquinumabe 150 mg/mL solução injetável (seringa preenchida)

CID's contemplados

L40.0, L40.1, L40.4, L40.8

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

1ª solicitação

PARA ACITRETINA:

- Relatório médico descrevendo um dos critérios:
 - escore PASI (Psoriasis Área and Severity Index);
 - o porcentagem de acometimento da superfície corporal;
 - DLQI (Índice de Qualidade de Vida Dermatológico);
 - psoríase acometendo extensamente o aparelho ungueal (onicólise ou onicodistrofia em ao menos duas unhas);
 - psoríase palmo-plantar resistente a tratamentos tópicos de uso padrão, como corticosteroides de alta potência, análogo da vitamina D e queratolíticos (ácido salicílico a 5%) com uso contínuo por 3 meses;
 - psoríase acometendo outras áreas especiais, como genitália, rosto, couro cabeludo e dobras, resistentes a medicamentos tópicos, tais como corticosteroides e análogos da vitamina D e fototerapia com uso contínuo por 3 meses.



Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

- Dosagem sérica TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Dosagem sérica fosfatase alcalina;
- Dosagem sérica bilirrubinas;
- Dosagem sérica –GGT (Gama Glutamiltransferase);
- Dosagem sérica triglicerídeos;
- Dosagem sérica uréia;
- Dosagem sérica creatinina.

Para mulheres em idade fértil (até 55 anos):

• ß-HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) ou documento de esterilização

PARA CALCIPOTRIOL:

- Relatório médico descrevendo um dos critérios:
 - escore PASI (Psoriasis Área and Severity Index);
 - o porcentagem de acometimento da superfície corporal;
 - DLQI (Índice de Qualidade de Vida Dermatológico);
 - psoríase acometendo extensamente o aparelho ungueal (onicólise ou onicodistrofia em ao menos duas unhas);
 - psoríase palmo-plantar resistente a tratamentos tópicos de uso padrão, como corticosteroides de alta potência, análogo da vitamina D e queratolíticos (ácido salicílico a 5%) com uso contínuo por 3 meses:
 - psoríase acometendo outras áreas especiais, como genitália, rosto, couro cabeludo e dobras, resistentes a medicamentos tópicos, tais como corticosteroides e análogos da vitamina D e fototerapia com uso contínuo por 3 meses.
- Dosagem sérica cálcio.

PARA CLOBETASOL:

- Relatório médico descrevendo um dos critérios:
 - escore PASI (Psoriasis Área and Severity Index);
 - o porcentagem de acometimento da superfície corporal;
 - DLQI (Índice de Qualidade de Vida Dermatológico);
 - psoríase acometendo extensamente o aparelho ungueal (onicólise ou onicodistrofia em ao menos duas unhas);
 - psoríase palmo-plantar resistente a tratamentos tópicos de uso padrão, como corticosteroides de alta potência, análogo da vitamina D e queratolíticos (ácido salicílico a 5%) com uso contínuo por 3 meses;



Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

 psoríase acometendo outras áreas especiais, como genitália, rosto, couro cabeludo e dobras, resistentes a medicamentos tópicos, tais como corticosteroides e análogos da vitamina D e fototerapia com uso contínuo por 3 meses.

PARA CICLOSPORINA:

- Relatório médico descrevendo um dos critérios:
 - escore PASI (Psoriasis Área and Severity Index);
 - o porcentagem de acometimento da superfície corporal;
 - o DLQI (Índice de Qualidade de Vida Dermatológico);
 - psoríase acometendo extensamente o aparelho ungueal (onicólise ou onicodistrofia em ao menos duas unhas);
 - psoríase palmo-plantar resistente a tratamentos tópicos de uso padrão, como corticosteroides de alta potência, análogo da vitamina D e queratolíticos (ácido salicílico a 5%) com uso contínuo por 3 meses;
 - psoríase acometendo outras áreas especiais, como genitália, rosto, couro cabeludo e dobras, resistentes a medicamentos tópicos, tais como corticosteroides e análogos da vitamina D e fototerapia com uso contínuo por 3 meses.

Para mulheres em idade fértil (até 55 anos):

ß-HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) ou documento de esterilização

PARA METOTREXATO:

- Relatório médico descrevendo um dos critérios:
 - escore PASI (Psoriasis Área and Severity Index);
 - o porcentagem de acometimento da superfície corporal;
 - o DLQI (Índice de Qualidade de Vida Dermatológico);
 - psoríase acometendo extensamente o aparelho ungueal (onicólise ou onicodistrofia em ao menos duas unhas);
 - psoríase palmo-plantar resistente a tratamentos tópicos de uso padrão, como corticosteroides de alta potência, análogo da vitamina D e queratolíticos (ácido salicílico a 5%) com uso contínuo por 3 meses:
 - psoríase acometendo outras áreas especiais, como genitália, rosto, couro cabeludo e dobras, resistentes a medicamentos tópicos, tais como corticosteroides e análogos da vitamina D e fototerapia com uso contínuo por 3 meses.
- Dosagem sérica TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Dosagem sérica fosfatase alcalina;
- Dosagem sérica bilirrubinas;
- Dosagem sérica GGT (Gama Glutamiltransferase);



Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

- Dosagem sérica uréia;
- Dosagem sérica creatinina;
- · Hemograma;
- Sorologia Anti-HIV (Anti-Vírus da Imunodeficiência Humana);

Para mulheres em idade fértil (até 55 anos):

ß-HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) ou documento de esterilização

PARA ADALIMUMABE E ETANERCEPTE:

- Relatório médico descrevendo falha, intolerância ou contraindicação ao uso da terapia padrão e um dos critérios abaixo:
 - escore PASI (Psoriasis Área and Severity Index);
 - porcentagem de acometimento da superfície corporal;
 - DLQI (Índice de Qualidade de Vida Dermatológico);
 - psoríase acometendo extensamente o aparelho ungueal (onicólise ou onicodistrofia em ao menos duas unhas);
 - psoríase palmo-plantar resistente a tratamentos tópicos de uso padrão, como corticosteroides de alta potência, análogo da vitamina D e queratolíticos (ácido salicílico a 5%) com uso contínuo por 3 meses;
 - psoríase acometendo outras áreas especiais, como genitália, rosto, couro cabeludo e dobras, resistentes a medicamentos tópicos, tais como corticosteroides e análogos da vitamina D e fototerapia com uso contínuo por 3 meses
- Sorologia Anti HCV (Anti-vírus da Hepatite C);
- Sorologia Anti HIV (Anti-vírus da Imunodeficiência Humana);
- Sorologia HbsAG (Antígeno de superfície Hepatite B);
- Avaliação de Tuberculose Latente ou Ativa:
 - Laudo/relatório médico de Radiografia de tórax;
 - o Prova de Mantoux PPD (teste tuberculínico).ou equivalente.

Para mulheres em idade fértil (até 55 anos):

 ß-HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) ou documento de esterilização

PARA SECUQUINUMABE:

- Relatório médico descrevendo falha, intolerância ou contraindicação ao ADALIMUMABE e um dos critérios abaixo:
 - escore PASI (Psoriasis Área and Severity Index);
 - o porcentagem de acometimento da superfície corporal;
 - DLQI (Índice de Qualidade de Vida Dermatológico);



Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

- psoríase acometendo extensamente o aparelho ungueal (onicólise ou onicodistrofia em ao menos duas unhas);
- psoríase palmo-plantar resistente a tratamentos tópicos de uso padrão, como corticosteroides de alta potência, análogo da vitamina D e queratolíticos (ácido salicílico a 5%) com uso contínuo por 3 meses;
- psoríase acometendo outras áreas especiais, como genitália, rosto, couro cabeludo e dobras, resistentes a medicamentos tópicos, tais como corticosteroides e análogos da vitamina D e fototerapia com uso contínuo por 3 meses
- Sorologia Anti HCV (Anti-vírus da Hepatite C);
- Sorologia Anti HIV (Anti-vírus da Imunodeficiência Humana);
- Sorologia HbsAG (Antígeno de superfície Hepatite B);
- Avaliação de Tuberculose Latente ou Ativa:
 - Laudo/relatório médico de Radiografia de tórax;
 - o Prova de Mantoux PPD (teste tuberculínico).ou equivalente.

Para mulheres em idade fértil (até 55 anos):

ß-HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) ou documento de esterilização

Renovação da Continuidade

PARA ACITRETINA:

Mensalmente:

Para mulheres em idade fértil (até 55 anos):

• ß-HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) ou documento de esterilização

Trimestralmente:

- Hemograma;
- Dosagem sérica TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Dosagem sérica colesterol total;
- Dosagem sérica HDL (High-density lipoprotein);
- Dosagem sérica triglicerídeos;
- Dosagem sérica LDL ou cálculo do LDL pela equação de Friedewald;
- Dosagem sérica creatinina.

Anualmente:

Laudo/relatório médico de radiografia de mãos e punhos (apenas para crianças).



Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

A critério do médico prescritor:

• Densitometria óssea para adultos com suspeita de osteopenia

PARA CALCIPOTRIOL E CLOBETASOL: Não são exigidos exames de monitoramento.

PARA CICLOSPORINA:

Trimestralmente:

- Dosagem sérica uréia;
- Dosagem sérica potássio;
- Dosagem sérica creatinina.

PARA METOTREXATO:

Mensalmente:

Para mulheres em idade fértil (até 55 anos):

ß-HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) ou documento de esterilização

Trimestralmente:

- · Hemograma;
- Dosagem sérica TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Dosagem sérica creatinina;

PARA ADALIMUMABE, ETANERCEPTE E SECUQUINUMABE:

Trimestralmente:

- Dosagem sérica TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Dosagem sérica creatinina;
- · Hemograma.

