

ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOIMUNE

Portaria SAS/MS nº 27, de 26 de novembro de 2018 ([Protocolo na íntegra](#))

Medicamentos

- [Ciclofosfamida 50 mg – drágea](#)
- [Ciclosporina 25 mg, 50 mg e 100 mg – cápsula; 100 mg/mL solução oral – frasco de 50 mL](#)
- [Imunoglobulina humana 5,0 g injetável – frasco](#)

CID's contemplados

D59.0, D59.1

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

1ª solicitação

- Hemograma;
- TCD (Teste de Coombs Direto);
- Desidrogenase láctica ou haptoglobina ou contagem de reticulócitos.
- Para a identificação do subtipo: Anti-IgG ou anti-IgA ou Anti-C3 e pesquisa de crioaglutininas ou Anti-IgG com teste de Donath-Landsteiner.

Renovação da Continuidade

PARA CICLOFOSFAMIDA:

Trimestralmente:


- Hemograma com contagem de plaquetas;
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Dosagem sérica – GGT (Gama Glutamyltransferase);
- Dosagem sérica – bilirrubinas.

PARA CICLOSPORINA:

À critério do médico prescritor:

- Dosagem sérica – ciclosporina;

ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOIMUNE (Atualizado em 03/04/2019)



COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

- Dosagem sérica – creatinina.

PARA IMUNOGLOBULINA HUMANA:

Trimestralmente:

- Hemograma;
- Dosagem sérica – creatinina.

Para orientações sobre como obter os medicamentos, [clique aqui](#).

ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOIMUNE (Atualizado em 03/04/2019)