

Р.Д.СИНЕЛЬНИКОВ  
Я.Р.СИНЕЛЬНИКОВ

# АТЛАС АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА

в 4-х томах

*Рекомендовано Управлением учебных заведений  
Министерства здравоохранения Российской  
Федерации в качестве учебного пособия  
для студентов медицинских вузов*

Издание второе, стереотипное



Москва  
«Медицина»  
1996

Р.Д. СИНЕЛЬНИКОВ  
Я.Р. СИНЕЛЬНИКОВ

# АТЛАС АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА

4 ТОМ

*Учение о нервной системе  
и органах чувств*



Москва  
«Медицина»  
1996

ББК 28.86  
С 38  
УДК 611 (084.4)

**Синельников Р. Д., Синельников Я. Р.**  
С 38    Атлас анатомии человека: Учеб. пособие.—2-е изд., стереотипное.—В 4 томах. Т. 4.—М.: Медицина, 1996.—320 с.: ил.—(Учеб. лит. Для студ. мед. вузов).—ISBN 5-225-02723-7

В четвертом томе рассмотрены строение, топография, функции и возрастные особенности центральной, периферической и вегетативной [автономной] нервной системы, а также органов чувств. Текст иллюстрирован оригиналыми рисунками, рентгенограммами и фотографиями препаратов. Анатомические термины приведены в соответствии с Международной анатомической номенклатурой (5-е издание).

С 1909000000-62  
039 (01)-96    Без объявления

ББК 28.86

ISBN 5-225-02723-7

© Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников, 1994

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

A., a.—arteria	— артерия
Aa., aa.—arteriae	— артерии
V., v.—vena	— вена
Vv., vv.—venae	— вены
M., m.—musculus	— мышца
Mm., mm.—musculi	— мышцы
N., n.—nervus	— нерв
Nn., nn.—nervi	— нервы
R., r.—ramus	— ветвь
Rr., rr.—rami	— ветви
Lig., lig.—ligamentum	— связка
Ligg., ligg.—ligamenta	— связки
Gl., gl.—glandula	— железа
Gll., gll.—glandulae	— железы
Nucl., nucl.—nucleus	— ядро
Nucll., nucll.—nuclei	— ядра
S.—seu, sive	— или
C <sub>I</sub> , C <sub>II</sub> , C <sub>III</sub> ...	— nervus cervicalis I, II, III ...
Th <sub>I</sub> , Th <sub>II</sub> , Th <sub>III</sub>	— nervus thoracicus I, II, III ...
L <sub>I</sub> , L <sub>II</sub> , L <sub>III</sub> ...	— nervus lumbalis I, II, III ...
S <sub>I</sub> , S <sub>II</sub> , S <sub>III</sub> ...	— nervus sacralis I, II, III ...

Непостоянные нервные сегменты заключены в круглые скобки, например (C<sub>II</sub>), (Th<sub>VI</sub>).

# 1 УЧЕНИЕ О НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ НЕВРОЛОГИЯ

Центральная нервная система —  
*Systema nervosum centrale*

17

Периферическая нервная система —  
*Systema nervosum periphericum*

107

Вегетативная (автономная) нервная система —  
*Systema nervosum autonomicum*

207

**Нервная система, systema nervosum** (рис. 868), контролирует и регулирует все функции организма, обеспечивает согласованность его работы как целого и вместе с эндокринной системой — реакцию на внешние и внутренние раздражители. Она осуществляет ввод информации, ее анализ, синтез и хранение, а также передачу сигналов к исполнительным органам. Все эти функции выполняют нейроны — нервные клетки с отростками, работающие среди опорных клеток нейроглии.

**Нейрон (нейроцит), neuronum (neurocytus)**, имеет тело, сома, длинный отросток — аксон (нейрит), axon (neuritum), и короткие ветвящиеся отростки — дендриты, dendrita.

Нейроны образуют цепи, передающие сигнал — нервный импульс — от дендритов к телу и далее на аксон, который, разветвляясь, контактирует с телами других нейронов, их дендритами или аксонами. Связь нейронов осуществляется через зону контакта — синапс, обеспечивающий передачу нервного импульса. В этой передаче, как правило, принимают участие химические вещества — медиаторы. При передаче импульса возникает небольшая задержка в прохождении импульса. Число связей одного нейрона достигает нескольких тысяч и определяется характером ветвления его отростков. На протяжении жизни человека синапсы могут разрушаться и могут формироваться новые синапсы. С образованием новых контактов между нейронами связаны, в частности, механизмы памяти.

Цепи нейронов, включающие в себя афферентный (чувствительный) нейрон, дендриты которого имеют чувствительные окончания (рецепторы) в различных органах, и эfferентный нейрон, чей аксон заканчивается в рабочем органе (мышце, железе), обозначаются как простейшие рефлекторные дуги. Обычно в рефлекторной дуге импульс с чувствительного нейрона передается на вставочный (ассоциативный) нейрон, а с последнего — на эfferентный (эффекторный) нейрон. Многочисленные связи ассоциативного нейрона включают рефлекторную дугу в сложнейшие нейронные комплексы.

Процессу становления окончательной структуры нервной системы индивида предшествует сложный путь онтогенетического развития.

Нервная система развивается из наружного зародышевого листка — эктодермы. Закладка нервной системы имеет вид нервной пластинки, представляющей собой утолщение эктодермы вдоль дорсальной поверхности туловища. В дальнейшем края нервной пластинки, утолщааясь, сближаются между собой, в то время как сама пластинка, углубляясь, образует *нервную бороздку*. Края пластинки, принявшие форму *нервных валиков*, соединяются и образуют *нервную трубку*, которая, погружаясь в глубину, отшнуровывается от эктодермы.

Одновременно из клеток, входящих в состав нервных валиков, образуются *узловые (гангиозные) пластинки*. В дальнейшем они расщепляются: часть их, располагаясь в виде валиков по бокам нервной трубы, ближе к ее дорсальной поверхности, образует *спинномозговые узлы*; другая часть нервных клеток мигрирует на периферию, образуя узлы вегетативной нервной системы.

Различная дифференцировка и неравномерность роста нервной трубы значительно изменяют ее внутреннюю структуру, внешний вид и форму полости.

Расширенный краиальный отдел нервной трубы развивается в **головной мозг**, а остальная ее часть — в **спинной мозг** (рис. 869—877).

Клетки нервной трубы дифференцируются в нейробласты, образующие нейроны с их отростками, и в спонгиобласты, дающие элементы нейроглии (ткань вспомогательного и трофического значения).

Нейроны развиваются как высокоспециализированные клетки. Посредством своих отростков одни нейроны устанавливают связи между различными отделами мозга — это вставочные (ассоциативные) нейроны, другие осуществляют связь нервной системы с другими органами — это афферентные (рецепторные) и эfferентные (эффекторные) нейроны.

Аксоны афферентных и эfferентных нейронов входят в состав **нервов**, отходящих от головного и спинного мозга.

Центральная нервная система — головной и спинной мозг — состоит из **серого и белого вещества**. Серое вещество представляет собой скопление тел нервных клеток, белое вещество образовано аксонами нервных клеток. Серая окраска характерна также для тех участков нервной системы,

которые содержат скопления тел нейронов, выселившихся далеко за пределы нервной трубы (симпатические и другие узлы).

В той части нервной трубы, которая образует спинной мозг, нервные клетки концентрируются в окрестности ее полости, формируя серое вещество. Отростки этих клеток, располагаясь по периферии стенки трубы, участвуют в образовании белого вещества. Полость трубы по мере развития спинного мозга становится узкой и превращается в **центральный канал спинного мозга**, заполненный *спинномозговой жидкостью*.


В передней части нервной трубы заметны два перехода, которые делят ее на три первичных пузьря (см. рис. 869): передний мозговой пузирь, или **передний мозг**, prosencephalon, средний мозговой пузирь, или **средний мозг**, mesencephalon, и задний мозговой пузирь, или **ромбовидный мозг**, rhombencephalon.

В дальнейшем образуется пять вторичных пузирей (см. рис. 870, 873). Передний мозг делится на два пузиря: первый мозговой пузирь, или **конечный мозг**, telencephalon, и второй мозговой пузирь, или **промежуточный мозг**, diencephalon. Средний мозг не делится и становится третьим мозговым пузирем. Ромбовидный мозг делится на два пузира: **задний мозг**, metencephalon, и **продолговатый мозг**, myelencephalon.


Одновременно в результате неравномерности роста головного мозга образуется ряд изгибов: теменной — на уровне среднего мозгового пузира, мостовой — в области заднего мозгового пузира и затылочный — на границе перехода спинного мозга в продолговатый.

Вследствие значительного утолщения стенок и усложнения рельефа поверхности мозга полости мозговых пузирей приобретают форму различных по величине и положению щелей — **желудочек головного мозга**. Желудочки мозга заполнены спинномозговой жидкостью и сообщаются между собой и с центральным каналом спинного мозга. Стенка каждого мозгового пузира развивается в определенную часть головного мозга, а полость превращается в соответствующий желудочек.


Центральная стенка заднего отдела ромбовидного мозга преобразуется в **продолговатый мозг**, а задняя стенка



868. Нервная система, *systema nervosum* (полусхематично).



869. Головной мозг, encephalon, эмбриона; вид справа.  
(Стадия трех мозговых пузырей.  
По реконструкционной модели.)



870. Головной мозг, encephalon;  
эмбрион длиной 10,2 мм; вид  
справа.  
(Стадия пяти мозговых пузырей.  
По реконструкционной модели.)

остается тонкой пластинкой и образует **нижний мозговой парус**.

Задний мозг составляют мозжечок и мост.

Полость ромбовидного мозга превращается в **IV желудочек**, который посредством отверстий сообщается с подпаутинным пространством.

Дорсальная стенка среднего мозга образует **крышу среднего мозга**, или **четверохолмие**, а вентральная — **носки мозга**. Полость среднего мозга превращается в узкий канал — **водопровод мозга**, который соединяет **III** и **IV желудочки** (см. рис. 877).

Промежуточный мозг также интенсивно развивается. Боковые стенки его образуют таламусы, а вентральная стенка — гипоталамус. Из дорсальной стенки развивается шишковидное тело, но на большем своем протяжении эта стенка остается недифференцированной и образует **эпителиальную пластинку**. Полость промежуточного мозга превращается в узкую сагиттально расположенную щель между таламусами — **III желудочек**.

Конечный мозг представлен правым и левым полушариями и большого мозга, покрывающими все остальные мозговые пузыри (см. рис. 874—877). Полушария состоят из наружно расположенной **коры большого мозга** (**плащ**), составляющего почти всю массу полушарий **белого вещества**, залегающих в области нижнего отдела полушарий **базальных ядер** и занимающего наиболее вентральное положение **обонятельного мозга**. Полость конечного мозга образует два боковых **желудочка**, из которых левый условно считают первым боковым желудочком.

Развившиеся из нервной трубы спинной и головной отделы мозга вместе с отходящими от них нервами как анатомически, так и функционально представляют собой единое целое.

Нервы являются совокупностью отростков нейронов. Дендриты чувствительных клеток, залегающих в узлах спинномозговых и черепных нервов, заканчиваются на периферии рецепторами. Рецепторы воспринимают раздражения из внешней и внутренней среды, трансформируя их в нервный импульс. Последний по дендритам (афферентным — центроствремительным, чувствительным волокнам) через тело чувствительного нейрона и затем по его аксону переда-


ется в спинной или головной мозг. Аксоны клеток, залегающих в сером веществе головного и спинного мозга, в составе нервов получают название двигательных (эффекторных, центробежных) волокон. Они заканчиваются на периферии эффекторами, через которые передают импульсы из головного и спинного мозга исполнительным органам (мышцам и железам).

Абсолютное большинство нервов состоит из аfferентных и efferentных волокон.



Учитывая преимущественную локализацию тел нейронов в головном и спинном мозге и особую функцию головного и спинного мозга, всю единую нервную систему условно делят на **центральную нервную систему** (ЦНС) — головной и спинной мозг и **периферическую нервную систему**, куда входят **черепные и спинномозговые нервы с комплексом узлов, а также нервные сплетения**.

В соответствии с функционально-морфологическими особенностями нервная система разделяется также на **анимальную** (соматическую) и **вегетативную** (автономную) системы, а в последней выделяют симпатическую и парасимпатическую части.

**871. Головной мозг, encephalon; эмбрион длиной 10,2 мм; правая половина; вид изнутри. (Полость мозговых пузырей.)**





**872. Головной мозг, encephalon; эмбрион длиной 13,6 мм; вид справа. (По реконструкционной модели.)**




**873. Головной мозг, encephalon; эмбрион длиной 13,6 мм, правая половина; вид изнутри. (Полости мозговых пузырей.)**

874. Головной мозг, encephalon; эмбрион длиной 50 мм; вид справа.  
(По реконструкционной модели.)




875. Головной мозг, encephalon; эмбрион длиной 13 см; вид справа.

**876. Головной мозг новорожденного, правое полушарие; вид сбоку.**



**877. Головной мозг взрослого, правое полушарие; медиальная поверхность.**



# ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Спинной мозг

18

Головной мозг

27

Краткий обзор проводящих путей

84

Мозговые оболочки

95

**Центральная первая система [центральная часть], systema nervosum centrale [pars centralis]**, состоит из филогенетически более старого спинного мозга, расположенного в позвоночном канале, и более нового головного мозга, лежащего в полости черепа. Спинной и головной мозг генетически, морфологически и функционально связаны между собой и без резкой границы переходят один в другой.


## СПИННОЙ МОЗГ

### Внешнее строение спинного мозга

**Спинной мозг, medulla spinalis** (рис. 878, 879), имеет по сравнению с головным мозгом относительно простой принцип строения и выраженную сегментарную организацию. Он обеспечивает связи головного моз-

га с периферией и осуществляет сегментарную рефлекторную деятельность.


Залегает спинной мозг в позвоночном канале от верхнего края I шейного позвонка до I или верхнего края II поясничного позвонка, повторяя до известной степени направление кривизны соответствующих частей позвоночного столба. У плода 3 мес он оканчивается на уровне V пояснично-



878. Спинной мозг, medulla spinalis.

(Все оболочки спинного мозга и корешки удалены.)

А — вид спереди. Б — вид сзади.




879. Спинной мозг, medulla spinalis, со спинномозговыми корешками, radices, и спинномозговые нервы, nn. spinales; вид сзади.  
*(Твердая оболочка спинного мозга вскрыта; в пределах конского хвоста слева удалены спинномозговые корешки.)*  
 А — верхняя половина мозга. Б — нижняя половина мозга.

го позвонка, у новорожденного — на уровне III поясничного позвонка.

Спинной мозг без резкой границы переходит в продолговатый мозг у места выхода первого шейного спинномозгового нерва. Скелетотопически эта граница проходит на уровне между нижним краем большого затылочного отверстия и верхним краем I шейного позвонка.

Внизу спинной мозг переходит в *мозговой конус*, *conus medullaris*, продолжающийся в *концевую нить* (*спинномозговую*), *filum terminale (spinale)*, которая имеет поперечник до 1 мм и является редуцированной частью нижнего отдела спинного мозга. Концевая нить, за исключением ее верхних участков, где есть элементы нервной ткани, представляет со-

бой соединительнотканное образование. Вместе с твердой оболочкой спинного мозга она проникает в крестцовый канал и прикрепляется у его конца. Та часть концевой нити, которая располагается в полости твердой мозговой оболочки и не сращена с ней, называется *внутренней концевой нитью*, *filum terminale internum*; остальная ее часть, сращенная с твер-



**880. Спинной мозг, medulla spinalis; вид спереди, справа и сверху (полусхематично).**  
(Два сегмента спинного мозга; на правой стороне показана топография белого вещества; на левой стороне после удаления белого вещества видна форма серого вещества.)

дой мозговой оболочкой,—это *наружная концевая нить (твёрдой оболочки)*, *filum terminale exterritum (durale)*. Концевая нить сопровождается передними спинномозговыми артериями и венами, а также одним или двумя корешками копчиковых нервов.

Спинной мозг не занимает целиком полость позвоночного канала: между


стенками канала и мозгом остается пространство, заполненное жировой тканью, кровеносными сосудами, оболочками мозга и спинномозговой жидкостью.

Длина спинного мозга у взрослого колеблется от 40 до 45 см, ширина — от 1,0 до 1,5 см, а масса равна в среднем 35 г.

Различают четыре поверхности

спинного мозга: несколько уплощенную переднюю, немного выпуклую заднюю и две боковые, почти округлые, переходящие в переднюю и заднюю.

Спинной мозг не на всем протяжении имеет одинаковый диаметр. Его толщина несколько увеличивается снизу вверх. Наибольший размер в поперечнике отмечается в двух вере-



881. Спинной мозг, *medulla spinalis*.  
(Горизонтальный разрез верхнего отдела грудной части спинного мозга.)


тенообразных утолщениях: в верхнем отделе — это *шейное утолщение*, *intumescentia cervicalis*, соответствующее выходу спинномозговых нервов, идущих к верхним конечностям, и в нижнем отделе — это *пояснично-крестцовое утолщение*, *intumescentia lumbosacralis*. — место выхода нервов к нижним конечностям. В области шейного утолщения поперечный размер спинного мозга достигает 1,3—

1,5 см, в середине грудной части — 1 см, в области пояснично-крестцового утолщения — 1,2 см; переднезадний размер в области утолщений достигает 0,9 см, в грудной части — 0,8 см.

Шейное утолщение начинается на уровне III—IV шейного позвонка, доходит до II грудного, достигая наибольшей ширины на уровне V—VI шейного позвонка (на высоте пятого

шестого шейного спинномозгового нерва). Пояснично-крестцовое утолщение простирается от уровня IX—X грудного позвонка до I поясничного, наибольшая ширина его соответствует уровню XII грудного позвонка (на высоте третьего поясничного спинномозгового нерва).

Форма поперечных срезов спинного мозга на разных уровнях различна: в верхней части срез имеет форму



882. Спинной мозг, *medulla spinalis* (схема).  
(Поперечный разрез спинного мозга; распределение белого и серого вещества.)

овала, в средней части — округлый, а в нижней части приближается к квадратной.

На передней поверхности спинного мозга, по всей его длине, залегает глубокая *передняя срединная щель*, *fissura mediana ventralis (anterior)* (рис. 880—882, см. рис. 878), в которую втячивается складка мягкой мозговой оболочки — *промежуточная шейная перегородка*, *septum cervicale intermedium*. Эта щель менее глубокая у верхнего и нижнего концов спинного мозга и наиболее выражена в средних его отделах.

На задней поверхности мозга имеется очень узкая задняя срединная борозда, *sulcus medianus dorsalis [posterior]*, в которую проникает пластиночка глиозной ткани — задняя срединная перегородка, *septum medianum dorsale [posteriorius]*. Щель и борозда делят спинной мозг на две половины — правую и левую. Обе половины соединены узким мостиком мозговой ткани, в середине которой располагается *центральный канал*, *canalis centralis*, спинного мозга (см. рис. 879—881).

На боковой поверхности каждой половины спинного мозга находятся две неглубокие борозды. *Переднелатеральная борозда*, *sulcus ventrolateralis [anterolateralis]*, расположена книзу от передней срединной щели, более отдаленная от нее в верхней и средней частях спинного мозга, чем в нижней его части. *Заднелатеральная борозда*, *sulcus dorsolateralis [posterolateralis]*, лежит книзу от задней срединной борозды. Обе борозды идут почти по всей длине спинного мозга.

В шейном и отчасти в верхнем грудном отделах, между задней срединной и заднелатеральной бороздами, проходит нерезко выраженная задняя промежуточная борозда, *sulcus intermedius dorsalis [posterior]* (см. рис. 881).

У плода и новорожденного иногда встречается довольно глубокая передняя промежуточная борозда, которая, следуя по передней поверхности верхних отделов шейной части спинного мозга, располагается между передней срединной щелью и переднелатеральной бороздой.

Из переднелатеральной борозды или вблизи нее выходят передние корешковые нити, *fila radicularia*, представляющие собой отростки двигательных клеток. Передние корешко-

вые нити образуют *передний корешок (двигательный)*, *radix ventralis [anterior] (motoria)*. Передние корешки содержат центробежные (эфферентные) волокна, проводящие двигательные и вегетативные импульсы на периферию тела: к поперечно-полосатым и гладким мышцам, железам и др.

В заднелатеральную борозду входят задние корешковые нити, состоящие из отростков клеток, залегающих в спинномозговом узле. Задние корешковые нити образуют *задний корешок (чувствительный)*, *radix dorsalis [posterior] [sensoria]*. Задние корешки содержат афферентные (центrostремительные) нервные волокна, проводящие чувствительные импульсы от периферии, т. е. от всех тканей и органов тела, в ЦНС.

*Спинномозговой узел (чувствительный)*, *ganglion spinale [sensorius]* (см. рис. 879, 880) — это веретенообразное утолщение, расположенное на заднем корешке. Он представляет собой скопление главным образом псевдоуниполярных нервных клеток. Отросток каждой такой клетки делится Т-образно на два отростка: длинный периферический направляется на периферию в составе *спинномозгового нерва*, *n. spinalis*, и оканчивается чувствительным нервным окончанием; короткий центральный следует в составе заднего корешка в спинной мозг (см. рис. 947).

Все спинномозговые узлы, за исключением узла копчикового корешка, плотно окружены твердой мозговой оболочкой; узлы шейного, грудного и поясничного отделов залегают в межпозвоночных отверстиях, узлы крестцового отдела — внутри крестцового канала.

Направление корешков неодинаково: в шейном отделе они отходят почти горизонтально, в грудном — направляются косо вниз, в пояснично-крестцовом отделе следуют прямо вниз (см. рис. 879).

Передний и задний корешки одного уровня и одной стороны тотчас книзу от спинномозгового узла соединяются, образуя *спинномозговой нерв*, *n. spinalis*, который является, таким образом, смешанным. Каждая пара спинномозговых нервов (правый и левый) соответствует определенному участку — сегменту — спинного мозга.

Следовательно, в спинном мозге насчитывается такое количество сег-

ментов, сколько пар спинномозговых нервов.

Спинной мозг делят на пять частей: *шейную часть*, *pars cervicalis*, *грудную часть*, *pars thoracica*, *поясничную часть*, *pars lumbalis*, *крестцовую часть*, *pars sacralis*, и *копчиковую часть*, *pars coccygea* (см. рис. 879). В каждую из этих частей входит определенное число *сегментов спинного мозга*, *segmenta medullae spinalis*, т. е. участков спинного мозга, дающих начало одной паре спинномозговых нервов (правому и левому).

Шейную часть спинного мозга составляют восемь *шейных сегментов*, *segmenta medullae spinalis cervicalia*, грудную часть — 12 *грудных сегментов*, *segmenta medullae spinalis thoracicae*, поясничную часть — пять *поясничных сегментов*, *segmenta medullae spinalis lumbalia*, крестцовую часть — пять *крестцовых сегментов*, *segmenta medullae spinalis sacralia*, и, наконец, копчиковую часть составляют от одного до трех *копчиковых сегментов*, *segmenta medullae spinalis coccygea*. Итого 31 сегмент.

### Белое и серое вещество спинного мозга

На поперечных срезах спинного мозга видно расположение белого и серого вещества. Серое вещество занимает центральную часть и имеет форму бабочки с расправленными крыльями или буквы Н. Белое вещество располагается вокруг серого, на периферии спинного мозга (см. рис. 880, 881).

Соотношение белого и серого вещества в разных частях спинного мозга различно. В шейной части, особенно на уровне шейного утолщения, серого вещества значительно больше, чем в средних участках грудной части, где количество белого вещества намного (примерно в 10—12 раз) превышает массу серого вещества. В поясничной области, особенно на уровне поясничного утолщения, серого вещества больше, чем белого. По направлению к крестцовой части количество серого вещества уменьшается, но в еще большей степени уменьшается количество белого вещества. В области мозгового конуса почти вся поверхность поперечного среза выполнена серым веществом, и только по периферии располагается узкий слой белого вещества.

**Белое вещество спинного мозга**

**Белое вещество**, *substancia alba*, спинного мозга представляет собой сложную систему различной протяженности и толщины миelinовых и отчасти безмиelinовых нервных волокон и опорной нервной ткани — нейроглии, а также кровеносных сосудов, окруженных незначительным количеством соединительной ткани. Нервные волокна в белом веществе собраны в пучки.

Белое вещество одной половины спинного мозга связано с белым веществом другой половины очень тонкой, поперечно идущей впереди центрального канала белой спайкой, *commissura alba*.

Борозды спинного мозга, за исключением задней промежуточной борозды, разграничивают белое вещество каждой половины на три канатика спинного мозга, *funiculi medullae spinalis*. Различают передний канатик, *funiculus ventralis [anterior]*, — часть белого вещества, ограниченная передней срединной щелью и переднелатеральной бороздой, или линией выхода передних корешков спинномозговых нервов; боковой канатик, *funiculus lateralis*, — между переднелатеральной и заднелатеральной бороздами; задний канатик, *funiculus dorsalis [posterior]*, — между заднелатеральной и задней срединной бороздами (см. рис. 880, 881).

В верхней половине грудной части и в шейной части спинного мозга задняя промежуточная борозда делит задний канатик на два пучка: более тонкий, лежащий кнутри медиальный, так называемый тонкий пучок, и более мощный латеральный клиновидный пучок. Ниже клиновидный пучок отсутствует. Канатики спинного мозга продолжаются и в начальный отдел головного мозга — продолговатый мозг.

В составе белого вещества спинного мозга проходят проекционные волокна, составляющие афферентные и эfferентные проводящие пути (см. далее), и волокна ассоциативные. Последние осуществляют связи между сегментами спинного мозга и образуют передние, боковые и задние собственные пучки, *fasciculi proprii ventrales [anteriores], laterales et dorsales [posteriores]*, которые прилегают к серому веществу спинного мозга, окружая его со всех сторон. К этим пучкам относятся:

1) *дорсолатеральный путь, tractus dorsolateralis*, — небольшой пучок волокон, расположенный между вершиной заднего серого столба и поверхностью спинного мозга в непосредственной близости к заднему корешку;

2) *перегородочно-краевой пучок, fasciculus septomarginalis*, — тонкий пучок нисходящих волокон, вплотную прилежащий к задней срединной щели; прослеживается лишь в нижних грудных и поясничных сегментах спинного мозга;

3) *межпучковый пучок, fasciculus interfascicularis [semilunaris]*, образованный нисходящими волокнами, расположенными в медиальной части клиновидного пучка; прослеживается в шейных и верхних грудных сегментах (см. рис. 880, 882).

**Серое вещество спинного мозга**

**Серое вещество спинного мозга**, *substancia grisea* (см. рис. 880, 881), состоит главным образом из тел нервных клеток с их отростками, не имеющими миelinовой оболочки. Кроме них, в сером веществе имеются отростки тех нервных клеток, которые располагаются в других участках спинного и головного мозга, нейроглия, а также кровеносные сосуды и сопровождающая их соединительная ткань.

В сером веществе различают две боковые части, расположенные в обеих половинах спинного мозга, и поперечную часть, соединяющую их в виде узкого мостика, — *центральное промежуточное (серое) вещество, substantia (grisea) intermedia centralis*. Оно продолжается в боковые части, занимая их середину, как *латеральное промежуточное (серое) вещество, substantia (grisea) intermedia lateralis*.

В срединных отделах центрального промежуточного серого вещества располагается очень узкая полость — *центральный канал, canalis centralis*. На разных уровнях спинного мозга его просвет на горизонтальном разрезе имеет различные величину и форму: в области шейного и поясничного утолщений — овальную, а в грудном — округлую диаметром до 0,1 мм. У взрослых полость канала в ряде участков может зарастать. Центральный канал тянется на протяжении всего спинного мозга, переходя вверху в полость IV желудочка. Внизу, в области мозгового конуса, центральный канал расширен и его

диаметр достигает в среднем 1 мм; этот участок центрального канала получил название *концевого желудочка, ventriculus terminalis*.

Ткань, окружающая центральный канал спинного мозга и состоящая в основном из нейроглии и небольшого числа нейронов с их волокнами, носит название *центрального студенистого вещества, substantia gelatinosa centralis*.


Центральное промежуточное (серое) вещество, окружающее центральный канал, подразделяется на две части. Одна часть располагается впереди канала и примыкает к белой спайке, которая связывает передние канатики обеих половин спинного мозга. Другая часть лежит позади канала. Кзади от центрального промежуточного (серого) вещества, непосредственно прилегая к задней срединной перегородке, располагается *вторичное висцеральное вещество, substantia visceralis secundaria*.

Каждая из боковых частей серого вещества образует три выступа: более утолщенный передний, более узкий задний и между ними небольшой боковой выступ, который выражен не на всех уровнях спинного мозга. Боковой выступ особенно ясно виден в нижних сегментах шейной части и в верхних сегментах грудной части спинного мозга.

Выступы на протяжении всего спинного мозга образуют *серые столбы, columnae griseae*. Каждый из них на поперечном разрезе спинного мозга получает название *рога, cornu* (см. рис. 881, 882). Различают передний столб, *columna ventralis [anterior]*, на поперечном разрезе — *передний рог, cornu ventrale [anterius]*, задний столб, *columna dorsalis [posterior]* (задний рог, *cornu dorsale [posterior]*), и боковой столб, *columna lateralis* (боковой рог, *cornu laterale*).

Передний рог значительно шире, но короче заднего и не доходит до периферии спинного мозга, в то время как задний рог, более узкий и длинный, достигает наружной поверхности мозга.

В заднем роге можно различить *верхушку заднего рога, apex cornus dorsalis [posterioris]*, — наиболее узкую часть дорсального отдела заднего рога, окружающую головку заднего рога, *caput cornus dorsalis [posterioris]*, которая переходит в *шейку заднего рога, cervix cornus dorsalis [posterioris]*, а та в свою очередь — в наиболее шир-



883. Топография ядер спинного мозга.

рокую часть заднего рога — основание *заднего рога*, *basis cornus dorsalis [posterioris]* (см. рис. 881).

Верхушку заднего рога окаймляет участок, богатый нейроглией, с большим числом нервных клеток, который называется *студенистым веществом*, *substancia gelatinosa*.

Нервные клетки в сером веществе образуют скопления — ядра, или центры, спинного мозга, имеющие свою постоянную топографию (рис. 883).

1. В переднем столбе залегают двигательные ядра, клетки которых посыпают свои аксоны в состав передних корешков спинного мозга:


1) *переднелатеральное ядро*, *nucleus ventrolateralis*, имеющее две части: верхнюю, залегающую в сегментах  $C_{IV}$ — $C_{VIII}$ , и нижнюю, расположенную в сегментах  $L_{II}$ — $S_I$ ;

2) *переднемедиальное ядро*, *nucleus ventromedialis*, часто также представлено двумя частями: верхней в  $C_{II}$ —

$L_{IV}$  и нижней в  $S_{II}$ — $C_{O_I}$ ; реже эти части не имеют перерыва в сегментах ( $L_V$ — $S_I$ );

3) *заднелатеральное ядро*, *nucleus dorsolateralis*, разделено на две части: более крупную верхнюю в  $C_V$ — $C_{VIII}$  и нижнюю в  $L_{III}$ — $S_{II}$ ;

4) *заднелатеральное ядро*, *nucleus retrodorsolateralis*, залегает кзади от предыдущего. Оно представлено двумя небольшими скоплениями клеток в  $C_{VIII}$ — $Th_I$  и в  $S_I$ — $S_{III}$ ;



884. Головной мозг, encephalon; вид снизу. (Нижняя поверхность.)

5) заднемедиальное ядро, *nucleus dorsomedialis*, представлено небольшой верхней частью, залегающей в верхнем шейном сегменте  $C_1$ , и нижней — в сегментах  $Th_1—S_{II}$ ;

6) центральное ядро, *nucleus centralis*, чаще расположено в сегментах  $Th_1—L_{III}$ , но может иметь и дополнительную часть в  $S_I—S_V$ ;

7) ядро добавочного нерва, *nucleus n. accessorii*, обычно ограничено сегментами  $C_1—C_{VI}$ ;

8) ядро диафрагмального нерва, *nucleus n. phrenici*, залегает в сегментах  $C_{IV—VII}$ ;

9) поясничное дорсальное ядро, *nucleus lumbodorsalis*, залегает в сегментах  $L_{III—V}$ .

2. В заднем столбе залегают чувствительные ядра:

1) студенистое вещество, *substancia gelatinosa*, имеет на поперечном разрезе вид полуулния, окаймляющего верхушку заднего рога;

2) собственное ядро заднего рога, *nucleus proprius cornu posterioris* (BNA), расположенное в его центральной части, занимает почти всю его площадь и распространяется вдоль всего заднего столба ( $C_1—Co_1$ );

3) вторичное висцеральное вещество, *substancia visceralis secundaria*, залегает несколько дорсальнее центрального промежуточного (серого) вещества.

3. Боковой столб содержит следующие ядра:

1) грудной столб [грудное ядро], *columna thoracica [nucleus thoracicus]*, ограничен сегментами  $Th_1—L_{II}$  и располагается на медиальной стороне основания заднего рога, поэтому некоторые авторы относят его к ядрам последнего;

2) центральное промежуточное (серое) вещество, *substancia (grisea) intermedia centralis*, локализуется в сегментах  $Th_1—L_{III}$ , в центральном отделе бокового рога, почти достигая центрального канала;

3) латеральное промежуточное (серое) вещество, *substancia (grisea) intermedia lateralis*, залегает латеральнее предыдущего ядра, занимая выступ бокового рога и распространяясь на сегменты  $Th_1—L_{III}$ ;

4) крестцовые парасимпатические ядра, *nuclei parasympathici sacrales*, занимают сегменты  $S_{II—IV}$ , располагаясь несколько впереди предыдущего.

В нижних шейных и в верхних грудных сегментах спинного мозга, в углу

между боковым рогом и латеральным краем заднего рога, серое вещество в виде отростков проникает в белое вещество, образуя сетевидную структуру — ретикулярную формуацию, *formatio reticularis*, спинного мозга, в петлях которой располагается белое вещество.

Расположение переднего и заднего рогов соответствует передне- и заднелатеральным бороздам спинного мозга. Это соответствие между рогами и бороздами определяет топографию белого вещества на поперечных срезах: его деление на передние, задние и боковые канатики белого вещества.

## ГОЛОВНОЙ МОЗГ

**Головной мозг, encephalon**, является высшим органом нервной системы, регулирующим взаимоотношения организма и среды, а также управляющим функциями организма. С анатомо-функциональных позиций выделяют несколько уровней: I уровень — высший, осуществляющий высшее управление чувствительной и двигательной сферами, процессами логического мышления, памяти, воображения (кора головного мозга); II уровень — управление непроизвольными движениями и регуляция мышечного тонуса (базальные ядра полушарий большого мозга); III уровень — центр эмоционального контроля и эндокринной регуляции — представлен лимбической системой (гиппокамп, гипофиз, гипоталамус, поясная извилина, миндалевидное ядро); IV уровень — низший, управляющий вегетативными функциями организма и передающий сигналы в различные центры (ретикулярная формация и некоторые другие центры ствола мозга).

Головной мозг залегает в полости черепа. Форма внутренней поверхности черепа повторяет форму и рельеф головного мозга.

У взрослого человека головной мозг (без твердой мозговой оболочки) имеет массу в среднем 1375 г, сагиттальный размер составляет 16—17 см, поперечный — 13—14 см, вертикальный — 10,5—12,5 см; средний объем — 1200  $m^3$ .

Масса головного мозга имеет возрастные, половые и индивидуальные особенности. Так, масса головного мозга новорожденного составляет

10% от массы тела (в среднем 455 г), взрослого — 2,5% (у взрослых мужчин в среднем 1375 г), у женщин масса мозга на 100 г меньше, чем у мужчин. Индивидуальные вариации массы мозга составляют от 900 до 2000 г. Прямая связь массы мозга и одаренности человека не подтверждается.

Головной мозг подразделяют на ствол головного мозга, мозжечок и большой мозг. Каждый из этих отделов различен в филогенетическом, онтогенетическом, функциональном и анатомическом отношении.

Большой мозг покрывает мозжечок и ствол мозга, так что обе эти части головного мозга видны лишь со стороны его нижней поверхности (рис. 884), окруженные лобными и височными долями большого мозга. На нижних поверхностях лобных долей расположены обонятельные луковицы и обонятельные тракты, задние концы которых переходят в обонятельные треугольники. Эти образования входят в состав обонятельного мозга, составляющего часть большого мозга.

Позади обонятельных треугольников находится зрительный перекрест, продолжающийся кзади и латерально в зрительные тракты. Кзади к зрительному перекресту прилежит серый бугор, позади которого лежат сосцевидные тела. Эти образования относятся к промежуточному мозгу.

Латеральное и кзади от сосцевидных тел видны ножки мозга (части среднего мозга). Далее кзади виден мост, глубокой бороздой отделенный от продолговатого мозга. По бокам от моста и продолговатого мозга выступают полушария мозжечка.

Мост и мозжечок составляют задний мозг. Последний вместе с продолговатым мозгом представляют ромбовидный мозг. Продолговатый мозг, мост, средний и промежуточный мозг вместе образуют ствол мозга.



На нижней поверхности головного мозга видны места выхода 12 пар черепных нервов.

I пара — обонятельные нервы; проходят через продырявленную пластинку решетчатой кости и вступают в обонятельную луковицу.

II пара — зрительные нервы; выходят из зрительных каналов и образуют зрительный перекрест.

III пара — глазодвигательные нервы; выходят из медиальной поверхности ножек мозга.

885. Топография конечного мозга  
(обозначен цветом) (схема).



886. Большой мозг, cerebrum; вид сверху.  
(Мозговые оболочки удалены.)

IV пара—*блоковые нервы*; огибают латеральную поверхность пожек мозга.

V пара—*тройничные нервы*, выходят из боковых участков моста.

VI пара—*отводящие нервы*, VII пара—*лицевые нервы*, VIII пара—*преддверно-улитковые нервы*; все выходят из заднего края моста (VI пара—ближе к срединной линии).

IX пара—*языкоглоточные нервы*, X пара—*блуждающие нервы*, XI пара—*добавочные нервы*; все выходят из продолговатого мозга, ближе к его задней поверхности.

XII пара—*подъязычные нервы*; принадлежат продолговатому мозгу, но их корешки выходят ближе к его передней поверхности.

Выпуклая поверхность головного мозга полностью образована полушариями большого мозга.

На сагиттальном разрезе головного мозга видны все его отделы и их крупные части (см. рис. 877). Значительную часть разреза занимает медиальная поверхность полушарий большого мозга, ограниченная снизу мозолистым телом. Еще ниже виден свод мозга. Под затылочной долей полушарий большого мозга находится мозжечок. Остальные образования, видные на разрезе, принадлежат стволу мозга: таламус и гипоталамус (промежуточный мозг), крыша среднего мозга и ножки мозга (средний мозг), мост и продолговатый мозг.

## БОЛЬШОЙ МОЗГ


**Большой мозг**, *cerebrum*, является производным конечного мозга. Он представляет собой наиболее массивный отдел головного мозга и выполняет большую часть полости черепа (рис. 885; см. рис. 870—877, 888). *Продольная щель большого мозга*, *fissura longitudinalis cerebri*, разделяет большой мозг на два полушария—правое и левое, *hemispherium cerebri [cerebralis] dextrum et sinistrum*. От мозжечка полушария большого мозга отделяются *поперечной щелью*, *fissura transversa cerebri*.

В полушариях большого мозга объединяются три филогенетически и функционально различные системы: 1) обонятельный мозг, *rhinencephalon*; 2) базальные ядра, *nuclei basales*; 3) кора большого мозга (плащ), *cortex cerebri (pallium)*. Скопления серого вещества, принадлежащие всем трем системам, имеют обширные связи

между собой и с другими образованиями мозга. Эти связи составляют белое вещество полушарий, залегающее между корой и базальными ядрами, образующее прослойки между ядрами и внутри ядер, соединяющее полушария большого мозга со стволом мозга. В эмбриогенезе полость переднего мозгового пузыря претерпевает большие изменения и преобразуется в два боковых желудочка, представляющих собой полость большого мозга.

## Борозды и извилины большого мозга

Кора большого мозга покрывает поверхность полушарий и образует большое количество различных по глубине и протяженности *борозд большого мозга*, *sulci cerebri*. Между бороздами расположены различной величины *извилины большого мозга*, *gyri cerebri*. Борозды и извилины хорошо различимы после удаления мозговых оболочек.



887. Большой мозг, *cerebrum*; вид сверху (полусхематично).

В каждом полушарии различают следующие поверхности:


1) выпуклую *верхнелатеральную поверхность полушария*, *facies superolateralis hemispherii*, примыкающую к внутренней поверхности костей свода черепа; 2) нижнюю *поверхность полушария*, *facies inferior hemispherii*, передние и средние отделы которой располагаются на внутренней поверхности основания черепа, в области передней и средней черепных ямок, а задние — на намете мозжечка; 3) медиальную *поверхность полушария*, *facies medialis hemispherii*, направленную к продольной щели мозга.

Эти три поверхности каждого по-

лушария, переходя одна в другую, образуют три края. *Верхний край*, *margo superior (superomedialis)*, разделяет верхнелатеральную и медиальную поверхности полушарий. *Нижнелатеральный край*, *margo inferior (inferolateralis)*, отделяет верхнелатеральную поверхность от нижней. *Нижнемедиальный край*, *margo medialis (inferomedialis)*, состоит из двух частей: медиальный затылочный край расположен между прилежащей к намету мозжечка и медиальной поверхностью полушария, а медиальный орбитальный край — между орбитальной частью нижней поверхности и медиальной поверхностью полушария.

В каждом полушарии различают наиболее выступающие места: спереди — лобный полюс, *polus frontalis*, сзади — затылочный полюс, *polus occipitalis*, и сбоку — височный полюс, *polus temporalis*.

Полушарие разделено на пять долей. Четыре из них примыкают к соответствующим костям черепа: лобная доля, *lobus frontalis*, теменная доля, *lobus parietalis*, затылочная доля, *lobus occipitalis*, височная доля, *lobus temporalis*. Пятая — островковая доля (островок), *lobus insularis [insula]* — заложена в глубине латеральной ямки большого мозга, *fossa lateralis cerebri*, отделяющей лобную долю от височной (рис. 886—890).



888. Головной мозг, encephalon;  
вид сбоку.  
(Мозговые оболочки удалены.)

**Борозды и извилины  
верхнелатеральной поверхности  
полушария большого мозга**

Лобную долю от теменной отделяет глубокая центральная борозда, *sulcus centralis*. Она начинается на медиальной поверхности полушария, переходит на его верхнелатеральную поверхность, идет по ней немного косо, сзади наперед, и обычно не доходит до латеральной борозды мозга (см. рис. 886—889).


Приблизительно параллельно центральной борозде располагается предцентральная борозда, *sulcus precentralis*, но она не доходит до верхнего края полушария. Предцент-

ральная борозда окаймляет спереди предцентральную извилину, *gyrus precentralis*.

Верхняя и нижняя лобные борозды, *sulci frontales superior et inferior*, направляются от предцентральной борозды вперед. Они делят лобную долю на верхнюю лобную извилину, *gyrus frontalis superior*, которая расположена выше верхней лобной борозды и простирается на медиальную поверхность полушария; среднюю лобную извилину, *gyrus frontalis medius*, которую ограничивают верхняя и нижняя лобные борозды. Орбитальный сегмент этой извилины переходит на нижнюю поверхность лобной доли. В передних отделах средней лобной

извилины различают верхнюю и нижнюю части. Нижняя лобная извилина, *gyrus frontalis inferior*, лежит между нижней лобной бороздой и ветвями латеральной борозды мозга делится на ряд частей (см. далее).

Латеральная борозда, *sulcus lateralis*, — одна из наиболее глубоких борозд головного мозга. Она отделяет височную долю от лобной и теменной. Залегает латеральная борозда на верхнелатеральной поверхности каждого полушария и идет сверху вниз и кпереди. В глубине этой борозды располагается углубление — латеральная ямка большого мозга, *fossa lateralis cerebri*, дном которой явля-



889. Головной мозг, *encephalon*;  
вид справа (полусхематично).

ется наружная поверхность островка.

От латеральной борозды кверху отходят мелкие борозды, называемые ветвями. Наиболее постоянными из них являются *восходящая ветвь*, *ramus ascendens*, и *передняя ветвь*, *ramus anterior*; верхнезадний отдел борозды называется *задней ветвью*, *ramus posterior* (см. рис. 888, 889).


Нижняя лобная извилина, в пределах которой проходят восходящая и передняя ветви, разделяется этими ветвями на три части (см. рис. 889): заднюю — покрышечную часть, *pars opercularis*, ограниченную спереди восходящей ветвью; среднюю — треугольную часть, *pars triangularis*, ле-

жающую между восходящей и передней ветвями, и переднюю — глазничную часть, *pars orbitalis*, расположенную между горизонтальной ветвью и нижнелатеральным краем лобной доли.


**Теменная доля** (см. рис. 886—889) залегает кзади от центральной борозды, которая отделяет ее от лобной доли. От височной доли теменная доля ограничена латеральной бороздой мозга, от затылочной доли — частью *теменно-затылочной борозды*, *sulcus parietooccipitalis*.

Параллельно предцентральной извилине проходит *постцентральная извилина*, *gyrus postcentralis*, ограниченная сзади *постцентральной бороздой*, *sulcus postcentralis*. От нее кзади,


почти параллельно продольной щели большого мозга, идет *внутрitemенная борозда*, *sulcus intraparietalis*, делящая задневерхние отделы теменной доли на две извилины: *верхнюю теменную дольку*, *lobulus parietalis superior*, лежащую выше внутрitemенной борозды, и *нижнюю теменную дольку*, *lobulus parietalis inferior*, расположенную книзу от внутрitemенной борозды. В нижней теменной дольке различают две сравнительно небольшие извилины: *надкраевую извилину*, *gyrus supramarginalis*, лежащую кпереди и замыкающую задние отделы латеральной борозды, и расположенную кзади от предыдущей угловой извилины, *gyrus angularis*, кото-



890. Островок, insula, правый; вид сбоку и немного снизу.  
(Мозговые оболочки и края боковой щели мозга удалены; боковая щель мозга широко раскрыта.)



891. Большой мозг, cerebrum; правое полушарие, hemispherium dextrum (Медиальная поверхность.)  
(Ствол головного мозга и мозжечок удалены.)



892. Большой мозг, cerebrum; правое полушарие; медиальная поверхность (полусхематично).  
(Свод мозга и сосцевидно-таламический пучок от препаратированы.)

прая замыкает верхнюю височную борозду.


Между восходящей ветвью и задней ветвью латеральной борозды мозга расположен участок коры, обозначаемый как *лобно-теменная покрышка*, *operculum frontoparietale*. В нее входят задняя часть нижней лобной извилины, нижние отделы предцентральной и постцентральной

извилин и нижний отдел передней части теменной доли.

**Затылочная доля** (см. рис. 886—889) на выпуклой поверхности не имеет границ, отделяющих ее от теменной и височной долей, за исключением верхнего отдела теменно-затылочной борозды, которая располагается на медиальной поверхности полушария и отделяет затылочную

долю от теменной. Все три поверхности затылочной доли: выпуклая латеральная, плоская медиальная и вогнутая нижняя, расположенная на наименее мозгечка, имеют ряд борозд и извилин.

Борозды и извилины выпуклой латеральной поверхности затылочной доли непостоянны и часто неодинаковы в обоих полушариях.



893. Большой мозг, cerebrum; вид снизу.

(Борозды и извилины основания большого мозга; ствол головного мозга и мозжечок, а также гипофиз и частично левый обонятельный тракт удалены.)

Наиболее крупная из борозд — *перечная затылочная борозда, sulcus occipitalis transversus*. Иногда она является продолжением кзади внутри теменной борозды и в заднем отделе переходит в непостоянную *полулунную борозду, sulcus lunatus*.


Приблизительно в 5 см кпереди от полюса затылочной доли на нижнем крае верхнелатеральной поверхности

полушария имеется углубление — *предзатылочная вырезка, incisura preoccipitalis*.

**Височная доля** (см. рис. 888—890) имеет наиболее выраженные границы. В ней различают выпуклую латеральную поверхность и вогнутую нижнюю. Тупой полюс височной доли обращен вперед и несколько вниз. Латеральная борозда большого мозга

резко отграничивает височную долю от лобной.

Две борозды, расположенные на верхнелатеральной поверхности: *верхняя височная борозда, sulcus temporalis superior*, и *нижняя височная борозда, sulcus temporalis inferior*, следя почти параллельно латеральной борозде мозга, разделяют долю на три височные извилины: *верхнюю, среднюю*



894. Большой мозг, cerebrum; вид снизу (полусхематично). (Нижняя поверхность.)

и нижнюю, *gyri temporales superior, medius et inferior*.

Те участки височной доли, которые своей наружной поверхностью направлены в сторону латеральной борозды мозга, изрезаны короткими *поперечными височными бороздами, sulci temporales transversi*. Между этими бороздами залегают 2—3 короткие *поперечные височные извилины, gyri temporales transversi*, связанные с извилинами височной доли и островком.

**Островковая доля** (островок) (см. рис. 890) залегает на дне *латеральной ямки большого мозга, fossa lateralis cerebri*.

Она представляет собой трехстороннюю пирамиду, обращенную своей вершиной — полюсом островка — кпереди и книзу, в сторону латеральной борозды. С периферии островок окружен лобной, теменной и височной долями, участвующими в образовании стенок латеральной борозды мозга.

Основание островка с трех сторон окружено *круговой бороздой островка, sulcus circularis insulae*, которая у нижней поверхности островка постепенно исчезает. В этом месте располагается небольшое утолщение — *порог островка, limen insulae*, лежащий на границе с нижней поверхностью мозга, между островком и передним продырявленным веществом.

Поверхность островка прорезана глубокой *центральной бороздой островка, sulcus centralis insulae*. Эта борозда разделяет островок на переднюю, большую, и заднюю, меньшую, части.

На поверхности островка различают значительное число более мелких извилин *островка, gyri insulae*. Передняя часть имеет несколько коротких извилин *островка, gyri breves insulae*, задняя — чаще одну длинную извилину *островка, gyrus longus insulae*.

#### Борозды и извилины медиальной поверхности полушария большого мозга

На медиальную поверхность полушария выходят лобная, теменная и затылочная доли (рис. 891, 892).

*Поясная извилина, gyrus cinguli*, начинается подмозолистым полем, *area subcallosa*, огибает мозолистое тело и при посредстве узкой полоски — *перешейка поясной извилины, isthmus gyrus cinguli*, переходит в па-

гиппокампальную, извилину на нижней поверхности полушария.

Позади подмозолистого поля находится *парамтерминалная извилина, gyrus paraterminalis*, ограниченная сзади концевой пластинкой, *lamina terminalis* (производное передней стенки нервной трубки). Борозда мозолистого тела, *gyrus corporis callosi*, отделяет поясную извилину от мозолистого тела и на нижней поверхности полушария продолжается в борозду гиппокампа.

Поясная извилина ограничена сверху *поясной бороздой, sulcus cinguli*. В последней различают выпуклую по направлению к лобному полюсу переднюю часть и заднюю часть, которая, следя вдоль поясной извилины и не доходя до ее заднего отдела, поднимается к верхнему краю полушария большого мозга. Задний конец борозды лежит позади верхнего конца центральной борозды, окончание которой иногда хорошо видно у верхнего края медиальной поверхности полушария, и концом поясной борозды располагается *парацентральная долька, lobulus paracentralis*.

Выше поясной извилины, кпереди от подмозолистого поля, начинается *медиальная лобная извилина, gyrus frontalis medialis*. Она тянется до парacentральной дольки и является нижней частью верхней лобной извилины.

Кзади от поясной борозды лежит небольшая четырехугольная долька — *предклинье, precuneus*. Ее задней границей является глубокая *теменно-затылочная борозда, sulcus parietooccipitalis*, нижней — *подтеменная борозда, sulcus subparietalis*, отделяющая предклинье от заднего отдела поясной извилины.

Дорсальнее предклиниев залегает треугольная долька — *клин, cuneus*. Выпуклая наружная поверхность клина участвует в образовании затылочного полюса. Направленная вниз и вперед вершина клина почти доходит до заднего отдела поясной извилины. Задненижней границей клина является очень глубокая *шпорная борозда, sulcus calcarinus*, передней — *теменно-затылочная борозда*.

#### Борозды и извилины нижней поверхности полушария большого мозга

На глазничной поверхности лобной доли (рис. 893, 894), т. е. на ее нижней

поверхности, недалеко от нижнемедиального края, следует в направлении кпереди *обонятельная борозда, sulcus olfactorius*. Кнутри от обонятельной борозды, между нею и нижнемедиальным краем полушария, лежит *прямая извилина, gyrus rectus*. Ее задний отдел доходит до *переднего продырявленного вещества, substantia perforata rostralis [anterior]*. Кнаружи от борозды располагается остальная часть глазничной поверхности лобной доли, изрезанная короткими *глазничными бороздами, sulci orbitales*, на ряд небольших глазничных извилин, *gyri orbitales*.


В обонятельной борозде располагается *обонятельная луковица, bulbus olfactorius*, переходящая кзади в *обонятельный тракт, tractus olfactorius*, и далее в *обонятельный треугольник, trigonum olfactorium*.

Латеральную и медиальную стороны обонятельного треугольника обрамляют тонкие полоски серого вещества — *медиальная и латеральная обонятельные извилины, gyri olfactorii medialis et lateralis*.

На верхней поверхности треугольника, в глубине обонятельной борозды, располагается обонятельный бугорок, который является как бы вершиной обонятельного треугольника. На нижней поверхности треугольника, на высоте переднего края переднего продырявленного вещества, просятываются две тонкие обонятельные полоски, на которые разделяется обонятельный тракт: 1) *медиальная обонятельная полоска, stria olfactory medialis*, волокна которой оканчиваются в подмозолистом поле, паратерминалной извилине, прозрачной перегородке и в переднем продырявленном веществе, и 2) *латеральная обонятельная полоска, stria olfactory lateral*.

Она более длинная, дугообразно заворачиваясь, следует по наружному краю переднего продырявленного вещества. Большая часть ее волокон, пройдя через порог островка, заканчивается в парагиппокампальной извилине.

Нижняя поверхность височной доли глубокой *бороздой гиппокампа, sulcus hippocampi*, отделена от ножек мозга. В глубине борозды залегает узкая *зубчатая извилина, gyrus dentatus*. Передний ее конец переходит в крючок, а задний — в *ленточную извилину, gyrus fasciolaris*, залегающую под валиком мозолистого тела. Латерально от борозды находится *пара-*



### 895. Строение коры большого мозга (схема).

А — слои клеток. Б — типы клеток. В — слои волокон. I—III — наружная главная зона; IV—VI — внутренняя главная зона (по Brodmann и Vogt). I — lamina molecularis externa; II — lamina granularis externa; малые пирамидные клетки; IV — lamina granularis interna; V — lamina pyramidalis interna; большие пирамидные клетки; VI — lamina multiformis.

гиппокампальную извилину, gyrus *parahippocampalis* [извилина гиппокампа, gyrus *hippocampi*]. Впереди эта извилина имеет утолщение в виде *крючка*, *uncus*, а кзади продолжается в язычную извилину, gyrus *lingualis*. Парагиппокампальную и язычную извилины с латеральной стороны ограничивает коллатеральная борозда, sulcus *collateralis*, переходящая кпереди в носовую борозду, sulcus *rhinalis*. Остальную часть нижней поверхности височной доли занимают медиальная и латеральная затылочно-височные извилины, gyri *occipitotemporales medialis et lateralis*, разделенные затылочно-височную бороздой, sulcus *occipitotemporalis*. Латеральная затылочно-височная извилина нижнелатеральным краем полушария отделяется от нижней височной извилины.

#### Строение коры большого мозга

**Кора большого мозга (плащ), cortex cerebri [pallium]**, является наиболее высокодифференцированным отделом нервной системы. Она неоднородна за счет происхождения в филогенезе. Различают древнюю, старую, среднюю и новую кору.

Древняя кора, paleocortex, наименее сложно устроена и занимает участок

нижневнутренней поверхности височной доли. В ее состав входят обонятельный бугорок и окружающая его кора, включающая участок переднего продырявленного вещества.

Старая кора, archeocortex, появляется позднее, но в отличие от древней коры отделена от подкорки корковой пластинкой, у взрослого остается однослойной. В состав старой коры входят гиппокамп, располагающийся в глубине гиппокампальной борозды, и зубчатая извилина.

Средняя (промежуточная) кора, mesocortex, делится на две зоны: одна отделяет новую кору от старой (периархикортикальная зона), другая — от древней (перипалеокортикальная зона). Эти зоны занимают нижний отдел островковой доли, парагиппокампальную извилину и нижний отдел лимбической области.

Новая кора, neocortex, у человека наиболее значительна по протяженности, составляет примерно 96% от всей поверхности полушарий большого мозга, и характеризуется многослойностью.

Кора большого мозга состоит из огромного количества нервных клеток. По морфологическим особенностям в коре взрослого человека можно выделить 6 слоев (рис. 895):

- 1) молекулярную пластинку, lamina molecularis (*plexiformis*);
- 2) наружную зернистую пластинку, lamina granularis externa;
- 3) наружную пирамидную пластинку, lamina pyramidalis externa;
- 4) внутреннюю зернистую пластинку, lamina granularis interna;
- 5) внутреннюю пирамидную пластинку, lamina pyramidalis interna (*ganglionaris*);
- 6) мультиформную пластинку, lamina multiformis.

Строение коры в разных отделах мозга имеет свои особенности, выражющиеся в различном числе слоев, а также в разных количестве, размерах, топографии и строении образующих кору нервных клеток.

На основании морфофункционального изучения отделов коры большого мозга в ней в настоящее время описано множество полей (рис. 896, 897). Для каждого поля характерны индивидуальные особенности архитектоники и функции. Это позволило создать карту полей коры большого мозга (цитоархитектоника), а также установить особенности распределения волокон коры (миелоархитектоника) (см. «Краткий обзор проводящих путей спинного и головного мозга»).

### Базальные ядра большого мозга

В толще белого вещества полушарий большого мозга, в области их оснований, латеральное и несколько книзу от боковых желудочков, располагается серое вещество. Оно образует скопления различной формы — **базальные ядра**, *nuclei basales*, называемые подкорковыми ядрами основания конечного мозга (рис. 898—904).

К базальным ядрам мозга в каждом полушарии относятся **полосатое тело**, *corpus striatum*, которое включает-


ет хвостатое и чечевицеобразное ядро, ограду, и **миндалевидное тело**.

**Хвостатое ядро**, *nucleus caudatus*, состоит из головки, *caput*, образующей латеральную стенку переднего рога бокового желудочка, *тела*, *corpus*, и хвоста, *cauda*, спускающегося в височную долю, где он принимает участие в образовании верхней стенки нижнего рога бокового желудочка.

**Чечевицеобразное ядро**, *nucleus lentiformis* [*lenticularis*], находится кнаружи от хвостатого, его продольная ось расположена спереди назад.

Небольшие прослойки белого вещества делят чечевицеобразное ядро на три части (ядра). Ядро, залегающее латеральнее, называется **скорлупой**, *putamen*, а остальные два ядра — это **медиальный бледный шар**, *globus pallidus medialis*, и **латеральный бледный шар**, *globus pallidus lateralis*. Они отделяются одно от другого **медиальной и латеральной мозговыми пластинками**, *laminae medullares medialis et lateralis*.

**Ограда**, *claustrum*, расположена кнаружи от чечевицеобразного ядра. Она представляет собой пластинку



толщиной до 2 мм, передняя часть которой утолщена. Медиальный край пластиинки ровный, а на латеральном краю имеются небольшие выпячивания серого вещества.

**Миндалевидное тело, corpus amygdaloideum**, располагается в толще височной доли, в области височного полюса, кпереди от верхушки нижнего рога бокового желудочка. Иногда его описывают как утолщение коры височной доли. В составе миндалевидного тела различают базально-латеральную часть, pars basolateralis, и корково-медиальную (обо-

нятельную) часть, pars corticomedialis (olfactoria). В последней части выделяют также переднее миндалевидное поле, area amygdaloidea anterior.

### Белое вещество полушарий большого мозга

Белое вещество полушарий большого мозга состоит из проекционных, ассоциативных и комиссулярных путей.


**I. Проекционные нервные волокна, neurofibrae projectiones**, соединяющие кору полушарий с нижележащими це-

нтралиями и передающие импульсы к коре (восходящие волокна), и от коры (нисходящие волокна), описаны в «Кратком обзоре проводящих путей головного и спинного мозга».

**II. Ассоциативные нервные волокна, neurofibrae associationes** (рис. 905, 906), соединяют между собой различные участки коры в пределах одного и того же полушария.

Ассоциативные пути полушарий делятся на короткие и длинные.

Короткие ассоциативные пути представлены дугообразными волокнами большого мозга, fibrae arcuatae



897. Цитоархитектонические поля коры полушарий большого мозга. (Медиальная поверхность. По данным Института мозга РАМН.)

*cerebri*, соединяющими смежные извилины.

К длинным ассоциативным путям относятся следующие:

1) *верхний продольный пучок*, *fasciculus longitudinalis superior*, соединяющий лобную, затылочную и теменную доли;

2) *нижний продольный пучок*, *fasciculus longitudinalis inferior*, свя-


зывающий затылочную долю с височной;

3) *крючковидный пучок*, *fasciculus uncinatus*, соединяющий кору области лобного полюса с крючком височной доли и смежными с ним извилинами;

4) *пояс*, *cingulum*, который соединяет область обонятельного треугольника и подмозолистое поле с крючком.

**III. Комиссулярные нервные волокна**, *neurofibrae commissurales*, представлены волокнами, которые соединяют одинаковые участки различных полушарий. К ним относятся мозолистое тело, передняя спайка и спайка свода.

1. *Мозолистое тело*, *corpus callosum* (рис. 907—909; см. рис. 892, 898), открывается в глубине продоль-



898. Большой мозг, *cerebrum*; вид сзади.  
(Фронтальный разрез спереди передней спайки.)

ной щели после удаления верхней части полушарий большого мозга. Это белого цвета удлиненное и несколько уплощенное образование, вытянутое спереди назад, длиной 7—9 см.


Мозолистое тело — самая большая спайка (комиссура) новых отделов полушарий головного мозга, так как соединяет серое вещество полушарий большого мозга более позднего в фи-

логенетическом отношении происхождения — новую кору (за исключением височных полосов).

Передний отдел мозолистого тела загибается вперед, вниз и затем назад, образуя *колено мозолистого тела*, *genu corporis callosi*, переходящее книзу в *клюв мозолистого тела*, *rostrum corporis callosi*. Последний продолжается в *концевую пластинку*, *lamina terminalis*.

Средний отдел мозолистого тела — *ствол*, *truncus corporis callosi*, образует выпуклость в продольном направлении и является наиболее длинной его частью.

Задний отдел мозолистого тела — *валик*, *splenium*, утолщен, свободно нависает над шишковидной железой и над пластинкой крыши среднего мозга.



**899. Боковые желудочки, ventriculi laterales; вид сверху.**  
(Ствол мозолистого тела удален; в левом полушарии вскрыты передний, задний и нижний рога

и центральная часть бокового желудочка, в правом полушарии — передний и задний рога и центральная часть бокового желудочка.)


На верхней поверхности мозолистого тела располагается тонкий слой серого вещества — *серый покров, indusium griseum*, который в некоторых участках образует четыре небольших продольно идущих утолщения в виде *полосок, striae*, по две с каждой стороны от срединной борозды. Различают две *медиальные продольные полоски, striae longitudinales mediales*, и две *латеральные продольные полоски, striae longitudinales laterales*. В переднем отделе мозолистого тела часть серого вещества

(главным образом медиальная продольная полоска) переходит в области клюва в паратерминальную извилину. Латеральная продольная полоска в заднем отделе, огибая нижнюю поверхность утолщения мозолистого тела, продолжается в серую полоску — *ленточную извилину, gyrus fasciolaris*, и переходит на медиальную поверхность парагиппокампальной извилины как зубчатая извилина.


Кроме продольно идущих полосок, на верхней поверхности мозолистого тела имеется ряд поперечных поло-

сок, хорошо выраженных между латеральными и медиальной продольными полосками.


На горизонтальном срезе полушария мозга, проведенном на уровне верхней поверхности мозолистого тела, отчетливо видно расположение белого вещества в виде полуovala. По периферии белое вещество окаймлено слоем серого вещества, образующего кору большого мозга. Отходящие от мозолистого тела волокна, расходясь радиально в толще каждого полушария, образуют *лучистость*




900. Боковые желудочки, *ventriculi laterales*, и сосудистая основа III желудочка, *tela choroidea ventriculi tertii*; вид сверху.  
(Мозолистое тело и тело ствола перерезаны и отвернуты кзади.)



**901. Большой мозг, cerebrum; вид сверху.  
(Горизонтальный разрез на уровне спайки свода.)**




**902. Большой мозг, cerebrum; вид сверху.  
(Горизонтальный разрез на уровне передней спайки.)**




**903. Большой мозг, cerebrum; вид сзади.**

(Фронтальный разрез через серый бугор и кзади от воронки.)




**904. Базальные ядра конечного мозга (полусхематично).**

А — вид сверху. Б — вид спаружки. В — вид изнутри. 1 — nucleus caudatus; 2 — caput nuclei caudati; 3 — corpus nuclei caudati; 4 — cauda nuclei caudati; 5 — thalamus; 6 — pulvinar thalami; 7 — corpus amygdaloideum; 8 — putamen; 9 — globus pallidus lateralis; 10 — globus pallidus medialis; 11 — nucleus lenticiformis; 12 — claustrum; 13 — commissura rostral; 14 — перемычки серого вещества между хвостатым и чечевицеобразным ядрами.



**905. Ассоциативные пути;  
верхнелатеральная поверхность  
правого полушария  
(полусхематично.)  
(Проекция волокон на поверхность  
полушария.)**



**906. Ассоциативные пути;  
медиальная поверхность правого  
полушария (полусхематично).  
(Проекция волокон на поверхность  
полушария.)**


мозолистого тела, *radiatio corporis callosi*. В ней соответственно долям мозга различают лобную, теменную, височную и затылочную части. Задние отделы лучистости, преимущественно в области затылочной части, истончаются и являются верхней стенкой — крышей — нижнего и зад-

него рогов каждого бокового желудочка.

Волокна мозолистого тела, которые проходят через клюв и колено в сторону лобных долей и сзади через утолщение мозолистого тела в сторону затылочных и задних отделов теменных долей, дугообразно изогну-

ты, причем их вогнутости обращены друг к другу. Поэтому они получили название затылочных щипцов [большие щипцы], *forceps occipitalis [major]*, и лобных щипцов [малые щипцы], *forceps frontalis [minor]* (см. рис. 908).

2. Передняя спайка, *commissura rostralis [anterior]*, располагается поза-



907. Полушария большого мозга, *hemispherii cerebrales*, и мозолистое тело, *corpus callosum*; вид сверху.  
(Полушария мозга частично

удалены; в правом полушарии вырезана часть белого вещества и видно мозолистое тело.)

ди концевой пластинки и делится на две части: *переднюю часть*, *pars anterior*, соединяющую между собой крючки обеих височных долей, и *заднюю часть*, *pars posterior*, более развитую, связывающую парагиппокампальные извилины (см. рис. 891, 902).


3. Спайка свода, *commissura fornicis*,

в виде треугольной пластинки расположается под утолщением мозолистого тела между ножками свода (рис. 910—912).

**IV. Свод, *fornix***, входящий в систему обонятельного мозга (см. рис. 891, 899, 900, 910, 912), также относится к белому веществу полушарий боль-

шого мозга. Это сильно изогнутый удлиненный тяж, почти весь состоящий из продольных волокон. В нем различают тело, ножки и столбы.

**Тело свода, *corpus fornici***, своей средней, наиболее утолщенной частью располагается под мозолистым телом. На фронтальном разрезе мозга



908. Мозолистое тело, *corpus callosum*, и лучистость мозолистого тела, *radiatio corporis callosi*; вид сверху.

(Часть белого вещества полушарий удалена; слева удалена боковая продольная полоска.)

тело свода имеет форму трехгранной призмы. Его верхняя поверхность срастается с нижним краем прозрачной перегородки и с нижней поверхностью мозолистого тела. У бокового края тела свода располагается сосудистое сплетение бокового желудочка, с эпителиальным листом которого этот край срастается, образуя ленту свода, *tenia fornicis*. Последняя продолжается вдоль ножки свода в нижний рог бокового желудочка. Боковые, обращенные косо вниз поверхности тела свода свободно прилегают к таламусам, к их верхним поверхностям и медиальным верхним


краям. Закругленный нижний край тела свода лежит над сосудистой основой III желудочка.

Задний отдел свода — правая и левая *ножки свода, crura fornicis*, — срастаются с нижней поверхностью мозолистого тела спереди от его валика. Позади таламуса ножки свода расходятся, загибаются латерально книзу и каждая из них входит в нижний рог соответствующего бокового желудочка. Здесь каждая ножка свода, следуя по ходу гиппокампа до его крючка, переходит в *бахромку гиппокампа, fimbria hippocampi*, располагаясь между медиально лежащей зубчатой из-

вилиной и латерально расположенным гиппокампом.


Обе ножки свода от начала своего расхождения и до погружения в нижний рог соединяются треугольной тонкой пластинкой. Вершина этой пластиинки направлена кпереди, основание — кзади. Пластиинка состоит из поперечно идущих волокон, хорошо выраженных у основания. Эта пластиинка получила название *спайки свода, commissura fornicis*, ее пучки соединяют между собой правый и левый гиппокампы.

Передние отделы свода несколько расходятся и, образуя выпуклую кве-



909. Большой мозг, cerebrum; вид сзади.

(Фронтальный разрез на уровне утолщения мозолистого тела.)



**910. Боковые желудочки, ventriculi laterales; вид сверху.**  
*(Ствол мозолистого тела удален; вскрыты передний, задний и нижний рога и центральная часть боковых желудочков.)*

руху дугу, переходят в *столбы свода, columnae fornicis*. Они располагаются кзади от передней спайки и над передними отделами таламусов, так что между каждым столбом и таламусом образуется полулунная щель — межжелудочковое отверстие. Этот отрезок столбов носит название свободной части столбов свода.

Каждый столб свода, загибаясь позади передней спайки, направляется вниз и погружается в вещество гипоталамуса, ближе к медиальной поверхности таламусов, т. е. ближе к полости III желудочка. Далее каж-

дый столб входит в соответствующее сосцевидное тело. Этот отрезок столбов называется скрытой частью столба свода.

Таким образом, свод простирается от гиппокампа до сосцевидных тел.

В сосцевидном теле берут начало нервные волокна, которые направляются в толщу таламуса в виде главного пучка сосцевидного тела. Одна часть волокон следует к клеткам передних ядер таламуса, образуя *сосцевидно-таламический пучок, fasciculus mamillothalamicus* (см. рис. 891, 911, 912). Другая часть главного пучка об-


разует *сосцевидно-покрышечный пучок, fasciculus mamillotegmentalis*, волокна которого заканчиваются в клетках ядер покрышки.

Белое вещество полушарий образует между подкорковыми ядрами ряд прослоек, называемых **капсулами** (см. рис. 898, 901—903):

1) самая наружная капсула, *capsula extrema*, расположена между корой остривка и оградой;

2) наружная капсула, *capsula externa*, располагается между оградой и чечевицеобразным ядром;

3) внутренняя капсула, *capsula*



**911. Свод, fornix, и спайка свода, commissura fornici; вид снизу и несколько спереди.  
(Нижние отделы височных и затылочных долей, а также ствол головного мозга удалены.)**

*interna*, отделяет чечвицеобразное ядро от хвостатого ядра и таламуса.

Через внутреннюю капсулу проходят все проекционные волокна полушарий, которые в белом веществе полушарий образуют лучистый венец, *corona radiata*.

Во внутренней капсule различают переднюю ножку внутренней капсулы, *crus anterius capsulae internae*, колено внутренней капсулы, *genu capsulae internae*, и заднюю ножку внутренней капсулы, *crus posterior capsulae internae*.

Передняя ножка внутренней капсулы образована лобно-мостовым


путем, *tractus frontopontinus*, который связывает кору лобной доли с ядрами моста и входит в состав корково-мостового пути, *tractus corticopontinus*. Кроме того, передняя ножка внутренней капсулы содержит передние таламические лучистости, *radiationes thalamicae anteriores*. В колене внутренней капсулы проходит корково-ядерный путь, *tractus corticonuclearis*.

В составе задней ножки внутренней капсулы различают 3 части:

1) таламочечвицеобразная часть, *pars thalamolentiformis*, включает кор-

ково-спинномозговые волокна, *fibrae corticospinales*, корково-красноядерные волокна, *fibrae corticorubrales*, корково-ретикулярные волокна, *fibrae corticoreticulares*, корково-таламические волокна, *fibrae corticothalamicae*, и таламо-теменные волокна, *fibrae thalamoparietales*, идущие в составе центральных таламических лучистостей, *radiationes thalamicae centrales*;

2) подчечвицеобразная часть, *pars sublentiformis*, содержит корково-покрышечные волокна, *fibrae corticotectales*, височно-мостовые волокна, *fibrae temporopontinae*, а также



912. Свод, fornix, и гиппокамп, hippocampus; вид сверху и несколько справа.


пучки зрительной и слуховой лучистости, *radiationes optica et acustica*;

3) зачечицеобразная часть, *pars retro lentiformis*, включает волокна задних таламических лучистостей, *radiationes thalamicae posteriores*, и теменно-затылочно-мостовой пучок, *fasciculus parietooccipitopontinus*.

### Боковые желудочки


**Боковые желудочки**, *ventriculi laterales* (рис. 913—917; см. рис. 898, 899, 900, 910, 912, 919, 920), лежат внутри полушарий большого мозга и представляют собой полости, развившиеся из пузыря конечного мозга.

Различают левый боковой желудочек, *ventriculus lateralis sinister*, и правый боковой желудочек, *ventriculus lateralis dexter*. Каждый из них располагается в соответствующем полушарии. В желудочке выделяют передний (лобный) рог, центральную часть, задний (затылочный) рог



913. Желудочки мозга, *ventriculi cerebri*; вид справа (схематично). (Пространственные взаимоотношения между полушариями головного мозга,


мозжечка, стволом головного мозга, представленными как бы прозрачными, и желудочками мозга.)




914. Желудочки мозга, ventriculi cerebri; вид сверху (полусхематично).  
(Пространственные взаимоотношения между


полушариями головного мозга, представленными как бы прозрачными, и желудочками мозга.)

915



916





### 915. Правый боковой желудочек; рентгенограмма.

1—лобная пазуха; 2—поднаутическое пространство; 3—передний рог; 4—центральная часть; 5—место перехода центральной части в нижний рог; 6—задний рог; 7—нижний рог; 8—полость III желудочка.

### 916. Желудочки мозга; рентгенограмма; затылочное положение.

1—глазницы; 2—лобные пазухи; 3—III желудочек; 4—правый боковой желудочек; 5—левый боковой желудочек; 6—IV желудочек.

### 917. Нижний рог бокового желудочка, cornu inferius ventriculi lateralis, правого; вид сзади. (Фронтальный разрез. Красным цветом изображена мягкая оболочка головного мозга, синим цветом — эпендима.)

и нижний (височный) рог. Каждая из указанных частей соответствует одной из долей полушария большого мозга.

1. *Передний [лобный] рог, cornu frontale [anterius]*, бокового желудочка залегает в толще лобной доли. Полость его имеет форму рога, выпуклого медиально; на поперечном срезе, проведенном через лобную долю полушария, полость имеет форму треугольника. Верхней и передней стенками переднего рога являются передние отделы мозолистого тела — лобная часть луцистости и колено мозолистого тела. Латеральную стенку и часть нижней стенки образует выпячивающаяся в полость переднего рога медиальная поверхность головки хвостатого ядра.

Медиальную стенку каждого из передних рогов образует тонкая пластинка прозрачной перегородки, *lamina septi pellucidi*. Пластиночка две. Они ограничены сзади передней поверхностью столбов и тела свода, сверху — нижней поверхностью ствола мозолистого тела, спереди и снизу — внутренней поверхностью колена и клюва мозолистого тела.

Правая и левая пластинки образуют прозрачную перегородку, *septum pellucidum*, а между пластинками располагается узкая щелевидная полость

прозрачной перегородки, *cavum septi pellucidi*. Последняя хорошо различима после удаления мозолистого тела. Часть перегородки, расположенная спереди от передней спайки, определяется как предспаечная перегородка, *septum precommissurale*. В каждой пластинке проходят передняя и задняя вены прозрачной перегородки, собирающие кровь от передних отделов мозолистого тела, прозрачной перегородки и головки хвостатого ядра и впадающие в верхнюю таламостриарную вену (см. рис. 900).

В заднем отделе медиальной стенки переднего рога, между таламусом и столбом свода, располагается овальное межжелудочковое отверстие, *foramen interventriculare*. Через это отверстие полость бокового желудочка сообщается с полостью III желудочка, *ventriculus tertius*.

Кзади передний рог непосредственно переходит в центральную часть бокового желудочка.

2. *Центральная часть, pars centralis*, бокового желудочка располагается в области теменной доли полушария. Полость центральной части длиной около 4 см и шириной 1,5 см, простирается от межжелудочкового отверстия до места отхождения заднего и нижнего рогов бокового желудочка.

дочка, на разрезе во фронтальной плоскости имеет вид узкой и неглубокой щели.

Верхней стенкой, или крышей, полости служит теменная часть лучистости мозолистого тела.

Нижнюю стенку, или дно, образуют тело хвостатого ядра, концевая полоска, таламус, над которым лежит тонкая прикрепленная пластиинка, и часть *сосудистого сплетения бокового желудочка*, *plexus choroideus ventriculi lateralis*.

*Прикрепленная пластиинка*, *lamina affixa*, представляет собой эмбриональный остаток стенки конечного мозга, покрывающий верхнюю поверхность таламуса. Медиально она истончается, образует извитую пластиинку — *сосудистую ленту*, *tenia choroidea*, и переходит в эпендиму — эпителиальный покров, выстилающий стенки бокового и других желудочков.

*Концевая полоска*, *stria terminalis*, располагаясь латеральнее прикрепленной пластиинки, несколько прикрывает небольшую терминальную бороздку, залегающую на границе между хвостатым ядром и таламусом. *Волокна концевой полоски*, *fibrae striae terminalis*, возникают в задней части миндалевидного тела, проходят в составе крыши нижнего рога бокового желудочка, концевой полоски, свода и связывают миндалевидное тело с прозрачной перегородкой, передним и предоптическим ядрами гипotalамуса, передним продырявленным веществом.

Медиальной границей центральной части бокового желудочка является тело свода.

Приподняв сосудистое сплетение и прикрепленную пластиинку и отодвинув тело свода, можно увидеть верхнюю поверхность таламуса. При этом становится видным щелевидное углубление между краем свода и верхней поверхностью таламуса — *сосудистая щель*, *fissura choroidea*.

3. *Задний [затылочный] рог*, *cornu occipitalis [posterioris]*, бокового желудочка, являясь непосредственным продолжением центральной части, располагается в области затылочной доли. Его полость длиной до 1,2—2,0 см, очень узкая и на фронтальном разрезе имеет форму треугольника. В полости различают 3 стенки: вогнутую медиальную, выпуклую латеральную и наиболее суженную верхнюю, дорсальную; задний суженный

конец полости направлен в сторону затылочного полюса.

На медиальной стенке различают два продольных валика, лежащих один над другим. Меньший верхний валик часто слабо выражен — это *луковица заднего рога*, *bulbus cornu occipitalis [posterioris]*. Валик образован пучком волокон, идущих от мозолистого тела к затылочной доле соответственно дну теменно-затылочной борозды и входящих в состав затылочных (больших) щипцов мозолистого тела. Волокна ствола и валика мозолистого тела, образующие крышу и боковую стенку заднего рога и боковую стенку нижнего рога бокового желудочка, называются *покровом*, *taretum*.

Нижний валик больше верхнего и называется *птичьей шпорой*, *calcar avis*. Он всегда выраженный, соответствует шпорной борозде, которая глубоко впячивается в стенку заднего рога. Сбоку и сверху полость заднего рога окружена волокнами мозолистого тела. Сзади задний рог ограничен веществом затылочной доли.

4. *Нижний [височный] рог*, *cornu temporale [inferius]*, бокового желудочка залегает в толще височной доли, ближе к ее медиальной периферии. Он представляет собой направленную дугой вниз, вперед и кнутри полость длиной 3—4 см.

Передние отделы полости слепо заканчиваются, не доходя до височного полюса, а достигая только крючка, где в толще мозга впереди нижнего рога располагается миндалевидное тело. На фронтальном разрезе различают 4 стенки, ограничивающие полость нижнего рога: латеральную, верхнюю, нижнюю и медиальную.

Латеральную и верхнюю стенки полости образуют волокна мозолистого тела, нижнюю — немного приподнятая треугольная площадка — *коллатеральный треугольник*, *trigonum collaterale*, задние отделы которого продолжаются в полость заднего рога. Впереди и кнаружи треугольник продолжается в удлиненный выступ — *коллатеральное возвышение*, *eminentia collateralis*, образованное глубоко впятившейся снаружи *коллатеральной бороздой*, *sulcus collateralis*.

Медиальной стенкой нижнего рога служит сильно вдающийся в полость рога изогнутой формы выступ — *гиппокамп*, *hippocampus*. Этот выступ длиной до 3 см образуется вследствие глубокого вдавления снаружи в по-

лость нижнего рога *борозды гиппокампа*, *sulcus hippocampi*. Задние отделы гиппокампа начинаются в области задних отделов центральной части бокового желудочка, впереди птичьей шпоры и на высоте коллатерального треугольника. Далее гиппокамп тянется вдоль всего нижнего рога в виде дугообразного выпячивания, направленного своей выпуклостью в сторону латеральной стенки. Передние, более широкие отделы его называются *носками гиппокампа*, *pes hippocampi*, и несут 3—4 возвышения в виде небольших пальцевидных выпячиваний, разделенных небольшими бороздками. Самый конец гиппокампа подходит к крючку, являющемуся частью парагиппокампальной извилины.

Наиболее поверхностный слой, прилежащий к эпендиме нижнего рога, формирует *лоток гиппокампа*, *alveus hippocampi*.


Кнутри от гиппокампа, между ним и зубчатой извилиной, располагается сращенная с гиппокампом узкая белая полоска — *бахромка гиппокампа*, *fimbria hippocampi*, являющаяся продолжением ножки свода, которая опускается в полость нижнего рога.

В образовании медиальной стенки нижнего рога принимает участие также *сосудистое сплетение бокового желудочка*. Это сплетение переходит в нижний рог из центральной части бокового желудочка, куда оно проникает через межжелудочковое отверстие. Следуя далее по направлению к заднему рогу, сплетение не заходит в последний, а, образовав в области коллатерального треугольника расширение — *сосудистый клубок*, *glomus choroideum*, входит в полость нижнего рога. Здесь посредством эпителиального листка сосудистое сплетение прикрепляется к краю бахромки гиппокампа. Место прикрепления в виде узкой и тонкой полоски получило название *ленты свода*, *tenia fornicis*.


## ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МОЗГ

*Промежуточный мозг*, *diencephalon* (рис. 918—925; см. рис. 870—877, 884, 893, 901, 903), — самая крупная часть ствола мозга, развивается из второго мозгового пузыря (стадия пяти мозговых пузырей). Из нижней стенки этого мозгового пузыря образуется филогенетически более старая область — *гипоталамус*, *hypothalamus*. Боковые стенки мозгового пузыря

918. Топография промежуточного мозга (обозначен цветом) (схема).



919. Третий желудочек, ventriculus tertius; вид сверху.  
(Большая часть мозолистого тела, свода и сосудистая основа III желудочка удалены.)



значительно увеличиваются в объеме и превращаются в *таламус, thalamus*, и *метаталамус, metathalamus*, представляющие собой филогенетически более новые структуры. Верхняя стенка мозгового пузыря растет менее интенсивно, образует *эпикаламус, epithalamus*, и крышу III желудочка — полости промежуточного мозга.

### Таламус, метаталамус и эпикаламус

**Таламус, thalamus**, представляет собой крупное, неправильно-яйцевидной формы скопление серого вещества, разделенного прослойками белого вещества на большое количество ядер — центров восходящих, афферентных, путей. В нем выделяют *нижний таламус, thalamus ventralis*, и более утолщенную часть — *верхний таламус, thalamus dorsalis*. Медиальная поверхность таламуса обращена в полость III желудочка и ограничена снизу *гипоталамической бороздой, sulcus hypothalamicus*. Медиальные по-

верхности правого и левого таламусов соединяются *межталамическим сращением, adhesio interthalamica*.

Верхняя поверхность таламуса также свободна. От медиальной поверхности ее отделяет *мозговая полоска таламуса, stria medullaris thalami*, а от лежащего латеральнее хвостатого ядра — *пограничная борозда*. Мозговая полоска таламуса кзади расширяется и образует *треугольник поводка, trigonum habenulae*.

Кнутри от пограничной борозды прикрепляется сосудистая основа III желудочка, после удаления которой остается след в виде зазубренной каймы — *лента таламуса, tenia thalami*. Верхняя поверхность таламуса имеет форму треугольника. В передней вершине треугольника располагается *передний бугорок таламуса, tuberculum anterius thalami*, а основание представлено значительным утолщением — *подушкой, pulvinar*. Прилежащий с медиальной стороны к подушке треугольник поводка отделяется от нее *бороздой поводка, sulcus habenulae*.


Кнаружи и несколько кпереди от таламуса располагается внутренняя капсула, отделяющая его от полосатого тела. На разрезах таламуса видны прослойки белого вещества — *мозговые пластинки таламуса, laminae medullares thalami*, наиболее выраженные из которых — *внутренняя и наружная, laminae medullares interna et externa*.

Серое вещество, входящее в состав таламуса, образует *ядра таламуса, nuclei thalami* (см. рис. 902, 920—922):


1) *передние ядра (таламуса), nuclei anteriores (thalami)*, располагаются в переднем бугорке таламуса. Эти ядра представлены *передним верхним ядром, nucleus anterodorsalis*, *передним нижним ядром, nucleus anteroventralis*, и *переднемедиальным ядром, nucleus anteromedialis*;

2) *серединые ядра (таламуса), nuclei mediani (thalami)*, залегают у медиальной поверхности таламуса. В эту группу входят *передние и задние паравентрикулярные ядра, nuclei paraventriculares anteriores et*


920



921



922



**920. Третий желудочек, ventriculus tertius; задняя часть; вид спереди.**  
*(Фронтальный разрез головного мозга через межталамическое сращение и сосцевидные тела.)*

**921. Ядра промежуточного мозга (таламуса) (схема).**  
*(Правый таламус разрезан во фронтальной плоскости.)*

**922. Ядра промежуточного и среднего мозга в системе стереотаксических координат (по С. Масловскому).**  
*(Подушка заднего таламуса удалена.)*

1—nuclei anteriores; 2—nuclei mediales;  
 3—aqueductus mesencephali; 4—nuclei areae H,  
 $H_1, H_2$ ; 5—nucleus ruber; 6—substantia nigra;  
 7—nucleus subthalamicus; 8—zona incerta;  
 9—nuclei ventrolaterales.

*postiores*, ромбовидное ядро, *nucleus rhomboidalis*, и соединяющее ядро, *nucleus reuniens*;

3) медиальные ядра, *nuclei mediales (thalami)*, среди которых выделяется верхнее медиальное ядро, *nucleus medialis dorsalis*;

4) нижнелатеральные ядра (таламуса), *nuclei ventrolaterales (thalami)*, наиболее крупные, располагаются латерально по отношению к передним и медиальным. К ним относятся:

а) заднее латеральное ядро, *nucleus lateralis posterior*;

б) верхнее латеральное ядро, *nucleus lateralis dorsalis*;

в) переднее нижнее ядро, *nucleus ventralis anterior*;

г) латеральное нижнее ядро, *nucleus ventralis lateralis*;

д) медиальное нижнее ядро, *nucleus ventralis medialis*;

е) задние нижние ядра, *nuclei ventrales posteriores*, которые представлены заднелатеральным нижним ядром, *nucleus ventralis posterolateralis*, и заднемедиальным нижним ядром, *nucleus ventralis posteromedialis*;

5) внутрипластинчатые ядра (таламуса), *nuclei intralaminares (thalami)*, представляют собой мелкие образования, залегающие в мозговых пластинках таламуса. В их состав входят: а) центральное срединное ядро, *nucleus centromedianus*; б) паракентральное ядро, *nucleus paracentralis*; в) парафасцикулярное ядро, *nucleus parafascicularis*; г) латеральное центральное ядро, *nucleus centralis lateralis*, и д) медиальное центральное ядро, *nucleus centralis medialis*;

6) задние ядра (таламуса), *nuclei posteriores (thalami)*, залегающие в подушке;

7) субталамическое ядро, *nucleus subthalamicus*, расположенное в нижнем отделе нижнего таламуса. Оно представляет собой скопление серого вещества с пронизывающими его волокнами. Это ядро прилегает к медиальной поверхности внутренней капсулы, отделяющей его от бледного шара, с которым субталамическое ядро связано большим числом волокон, проходящих в составе субталамического пучка, *fasciculus subthalamicus*. Оно относится к числу центров экстрапирамидной системы;

8) ретикулярные ядра (таламуса), *nuclei reticulares (thalami)*, залегают в области нижнего таламуса;

9) неопределенная зона, *zona incerta*,

располагается рядом с ядрами в нижнем таламусе. В виде тонкой пластинки серого вещества она прослеживается на всем протяжении промежуточного мозга и отделена от таламуса волокнами таламического пучка, *fasciculus thalamicus*, а снизу ограничена волокнами чечевицеобразного пучка. По ходу этих волокон у медиальной границы неопределенной зоны имеется скопление нейронов — ядро поля *H*, *nucleus areae H*. Участки серого вещества по ходу таламического пучка образуют ядро поля *H<sub>1</sub>*, *nucleus areae H<sub>1</sub>*, залегающее дорсальнее неопределенной зоны. Между верхней частью субталамического ядра и нижней границей неопределенной зоны также имеются скопления нейронов, окружающие место выхода чечевицеобразного пучка из состава внутренней капсулы — ядро поля *H<sub>2</sub>*, *nucleus areae H<sub>2</sub>*.

Вентральнее таламуса располагаются волокна ножковой петли и ножкового пучка, *ansa et fasciculus pedunculares*. Эти волокна связывают миндалевидное тело с чечевицеобразным ядром.

**Метаталамус**, *metathalamus*, составляют коленчатые тела — парные образования, в которых различают медиальное коленчатое тело, *corpus geniculatum mediale*, и латеральное коленчатое тело, *corpus geniculatum laterale*. Они залегают в виде продолговато-ovalных бугорков латеральное и книзу от подушки (см. рис. 930, 940). В каждом из них находится скопление серого вещества, образующее ядро медиального коленчатого тела, *nucleus corporis geniculati medialis*, и ядро латерального коленчатого тела, *nucleus corporis geniculati lateralis*. Ядра коленчатых тел, как латерального, так и медиального, имеют задние части, *partes dorsales*, залегающие в области метаталамуса, и передние части, *partes ventrales*, расположенные в нижнем таламусе.

**Эпиталамус**, *epithalamus*, включает следующие образования:

а) шишковидное тело (шишковидная железа), *corpus pineale (glandula pinealis)*. Это эндокринная железа, которая развивается из заднего участка верхней стенки промежуточного мозга (см. «Эндокринные железы», т. 2);

б) поводки, *habenulae*, являющиеся продолжением треугольников поводка. Соединяясь между собой, поводки образуют спайки поводков, *commissura habenularum*. Каждый поводок содержит

жит медиальное и латеральное ядра поводка, *nuclei habenulae medialis et lateralis*;

в) эпиталамическую спайку (заднюю спайку), *commissura epithalamicus (posterior)*.

Эти образования входят в состав стенок III желудочка. В клетках ядер поводка заканчивается большинство волокон мозговой полоски таламуса. Меньшая часть волокон проходит через спайку поводка, при этом одни из них соединяются с клетками узла поводка противоположной стороны, другие достигают верхнего холмика крыши среднего мозга.

Основная часть волокон от ядер поводка входит в состав поводково-межножкового пути, *tractus habenulo-interpeduncularis*, проходящего в дорсовентральном направлении к межножковому ядру, *nucleus interpeduncularis*, залегающему вблизи базальной поверхности переднего продырявленного вещества.

## Гипоталамус

**Гипоталамус**, *hypothalamus*, соответствует передненижнему участку промежуточного мозга, залегает книзу от таламуса, под гипоталамической бороздой (см. рис. 884, 923, 924).

Гипоталамус включает зрительный перекрест, *chiasma opticum*, со зрительными трактами, *tractus optici*; первый бугор, *tuber cinereum*; воронку, *infundibulum* — наиболее суженную часть серого бугра; гипофиз, *hypophysis* (см. «Эндокринные железы», т. 2), и сосцевидные тела, *corpora mamillaria*.

Эти образования видны со стороны нижней поверхности мозга между его ножками. Зрительный тракт, обойдя ножки мозга, разделяется на два пучка, заканчивающихся в подкорковых зрительных центрах: один — в подушке таламуса и латеральном коленчатом теле, второй — в верхних холмиках крыши среднего мозга.

В гипоталамусе различают ряд полей и областей, которые содержат скопления ядер (32 пары) и пучки волокон, связывающих гипоталамус с другими отделами мозга, а также с гипофизом.

1. **Верхняя гипоталамическая область**, *regio hypothalamica dorsalis*, соответствует зоне залегания внутриножкового ядра, *nucleus endopeduncularis*, и ядра чечевицеобразной петли, *nucleus ansae lenticularis*.


2. Передняя гипоталамическая область, *regio hypothalamica anterior*, содержит медиальное предоптическое ядро, *nucleus preopticus medialis* (ему соответствует предзрительное поле, *area preoptica*); прилежащее к конечной пластинке латеральное предоптическое ядро, *nucleus preopticus lateralis*; супраоптическое ядро, *nucleus supraopticus* (обоим ядрам соответствует латеральное гипоталамическое поле, *area hypothalamica lateralis*); направентрикулярные ядра, *nuclei paraventriculares*; переднее гипоталамическое ядро, *nucleus hypothalamicus anterior*.

3. Промежуточная гипоталамическая область, *regio hypothalamica intermedia*, содержит ядро воронки (дугообразное ядро), *nucleus infundibularis (arcuatus)*; серобугорные ядра, *nuclei tuberales*; нижнemedиальное гипоталамическое ядро, *nucleus hypothalamicus ventromedialis*; верхнemedиальное гипоталамическое ядро, *nucleus hypothalamicus dorsomedialis*; верхнее гипоталамическое ядро, *nucleus hypothalamicus dorsalis*; заднее перивентрикулярное ядро, *nucleus periventricularis posterior*. Серобугорные ядра входят в латеральное гипоталамическое поле.

Дорсолатеральное латерального гипоталамического поля располагается верхняя гипоталамическая область.

4. Задняя гипоталамическая область, *regio hypothalamica posterior*, содержит заднее гипоталамическое ядро, *nucleus hypothalamicus posterior*, а также медиальные и латеральные ядра сосцевидного тела, *nuclei corporis mamillaris mediales et laterales*.

На всем протяжении гипоталамуса прослеживаются продольные волокна, образующие медиальный пучок переднего мозга, *fasciculus prosencephalicus medialis*. Эти волокна



**923. Головной мозг, encephalon, правая половина; медиальная поверхность.  
(Сагиттальный разрез головного мозга.)**

связывают гипоталамические ядра между собой, а также с центрами прозрачной перегородки, покрышкой среднего мозга, корой большого мозга (нижняя поверхность лобной доли).

Аксоны крупноклеточных нейропректорных нейронов супраоптического и паравентрикулярных ядер направляются в нейрогипофиз и контактируют с капиллярами среднего возвышения (дно III желудочка) и задней доли гипофиза. Они образуют *гипоталамо-гипофизарный путь, tractus hypothalamohypophysialis*, являющийся путем транспорта нейропректорных гормонов вазопрессина и окситоцина.

В его составе имеются *супраоптические волокна, fibrae supraopticae*, и *паравентрикулярные волокна, fibrae paraventriculares*, от соответствующих ядер: супраоптического и паравентрикулярных.

Дорсальнее и кнутри от зрительного перекреста проходят пучки волокон, не имеющие отношения к зрительным нервам,— *верхняя и нижняя супраоптические спайки, commissae supraopticae dorsalis et ventralis*. Волокна, образующие спайки, являются не комиссурами, а перекрестами. Они связывают между собой медиальные коленчатые тела, а также обеспечивают поступление сигналов от сетчатки


к гипоталамическим ядрам, что важно для регуляции биоритмов.

### Третий желудочек

**Третий (III) желудочек, ventriculus tertius** (см. рис. 900, 901, 903, 913—916, 919, 920, 928), непарный, располагается в срединной сагittalной плоскости и сообщается с боковыми желудочками и с IV желудочком.

Полость III желудочка щелевидная, ограничена 6 стенками: верхней, передней, нижней, задней и двумя боковыми.

Верхняя стенка III желудочка — *сосудистая основа III желудочка, tela*






924. Гипоталамус, hypothalamus (полусхематично).  
(Проекция ядер гипоталамуса на боковую стенку III желудочка.)

**925. Головной мозг, encephalon; вид спереди.**



(Поперечный разрез мозга; в левом полушарии мозжечка отпрепарирована средняя мозжечковая ножка.)

А — линия разреза мозга. Б — образования мозга в плоскости разреза.





926. Топография среднего мозга  
(обозначен цветом) (схема).



Б

927. Ножки мозга, pedunculi cerebri; вид сзади.

(Поперечный разрез на уровне выхода глазодвигательного нерва на высоте передних холмиков среднего мозга.)

А — линия разреза. Б — образования в плоскости разреза.

*choroidea ventriculi tertii* (см. рис. 900), представляет собой образование из двух пластинок — верхней, дорсальной, лежащей под сводом и мозолистым телом, и нижней,ентральной, обращенной к полости III желудочка. Между обеими пластинками располагается рыхлая соединительная ткань. В неи проходят по обеим сторонам срединной линии две внутренние вены мозга, которые, приняв кровь от вен таламуса и полосатого тела, вен прозрачной перегородки и сосудистого сплетения, боковых желудочков, впадают в большую вену мозга. От вентральной пластинки в полость III желудочка вдается ряд ворсинок, которые образуют *сосудистое сплетение III желудочка, plexus choroideus ventriculi tertii*. Впереди у межжелудочкового отверстия оно соединяется со сплетениями обоих боковых желудочеков.

Боковые стенки III желудочка образуются медиальными поверхностями таламусов. Под эпендимой боковой стенки проходят вертикальные пучки *перивентрикулярных волокон, fibrae periventriculares*, связывающих медиальную группу ядер таламуса с гипоталамическими ядрами.

Спереди полость III желудочка ограничена столбами свода и передней спайкой, прилегающей к задней поверхности концевой пластинки. Между передним бугорком каждого таламуса и лежащими спереди столбиками свода образуется *межжелудочковое отверстие, foramen interventriculare*, соединяющее III желудочек с боковыми.

Вентрально по отношению к задней спайке располагается скопление специализированных клеток эпендимы — таницитов. Эти клетки осуществляют секреторную функцию и участвуют в транспорте гормональных и медиаторных веществ из прилежащей ткани в цереброспинальную жидкость и в обратном направлении. Данный участок эпендимы III желудочка обозначают как *субкомиссуральный орган, organum subcommissurale*.

Между расходящимися столбами свода и передней спайкой имеется небольшое, треугольной формы углубление. В нем также находится скопление специализированных клеток эпендимы — *субфорникальный орган, organum subformicale*.

На участке прилегания концевой пластинки к зрительному перекресту образуется *зрительное углубление*,

*recessus opticus*. На ранних стадиях развития головного мозга оно представляет собой концевой отдел полости мозговой (нервной) трубы.


Нижней стенкой, или дном, III желудочка служат образования гипоталамуса, лежащие на основании мозга.

Задняя стенка III желудочка представлена в основном *эпиталамической спайкой, commissura epithalamicā*. Она представляет собой изогнутую, выдающуюся в полость желудочка пластинку и состоит из поперечных волокон. Под ней располагается *шишковидное углубление, recessus pinealis*, переходящее в водопровод мозга, соединяющий III желудочек с IV, над ней — *надшишковидное углубление, recessus suprapinealis*, и еще выше — спайка поводков.

## СРЕДНИЙ МОЗГ

*Средний мозг, mesencephalon* (рис. 926—930; см. рис. 869—877, 893, 919, 923), развивается из среднего мозгового пузыря и соответствует со стороны дорсальной поверхности участку ствола головного мозга в пределах между основанием шишковидного тела (уровень задней спайки) спереди и передним краем верхнего мозгового паруса (или местом выхода блоковых нервов) сзади; со стороны вентральной поверхности — между задней поверхностью сосцевидных тел спереди и передним краем моста сзади.

В среднем мозге различают крышу, расположенную на задней поверхности, и ножки мозга, залегающие на



928. Продолговатый мозг, medulla oblongata, мост, pons, и ножки мозга, pedunculi cerebri; вид спереди.

его передней поверхности. Полостью среднего мозга является водопровод мозга, соединяющий полость III желудочка с полостью IV желудочка.

#### Крыша среднего мозга

**Крыша среднего мозга**, *tectum mesencephali* (см. рис. 919, 927, 929, 939, 943—946), представляет собой пластинку крыши, *lamina tecti*, на которой расположены четыре холмика.

Холмики поперечной бороздой разделяются на верхнее двуххолмие, в состав которого входят два **верхних холмика**, *colliculi rostrales [superiores]*, правый и левый, и на нижнее двуххолмие, в которое входят два **нижних холмика**, *colliculi caudales [inferiores]*, также правый и левый, но меньших размеров, чем верхние.

Над пластинкой крыши среднего

мозга нависает валик мозолистого тела. Вместе они прикрыты сверху (дорсально) и с боков соответствующими участками полушарий большого мозга. Над верхними холмиками, в основном между ними, располагается шишковидное тело.


Снаружи холмики покрыты тонким слоем белого вещества. В толще холмиков залегает скопление серого вещества, которое в верхнем холмике образует *слои (серый и белый) верхнего холмика*, *strata (grisea et alba) colliculi rostralis [superioris]*, а в нижнем холмике — ядро *нижнего холмика*, *nucleus colliculi caudalis [inferioris]*. В клетках скоплений серого вещества заканчивается и возникает несколько систем проводящих путей. Вентральне серого вещества холмиков находится глубокий белый слой.

Пучок волокон, связывающих оба

нижних холмика, образует *спайку нижних холмиков*, *commissura collicularum caudalium [inferiorum]*. Между верхними холмиками также прослеживается *спайка верхних холмиков*, *commissura collicularum rostralium [superiorum]*.

Зона, соответствующая соединению среднего и промежуточного мозга, обозначается как *предкрышечное поле*, *area prefrontalis*. В составе поля имеются скопления серого вещества — *предкрышечные ядра*, *nuclei pretectales*. Эти ядра имеют двусторонние связи с верхними холмиками и парасимпатическими ядрами глазодвигательных нервов. Двусторонний характер этих связей обеспечивает содружественную реакцию обоих зрачков при освещении сетчатки одного глаза.

От каждого холмика в латераль-



929. Мозжечок, cerebellum; вид сверху и сзади.  
(Большой мозг и частично таламусы удалены.)

ном направлении идут ручки холмиков, представляющие собой белые валики, из которых тяж, отходящий от нижнего холмика, значительно толще. Валик верхнего холмика называется *ручкой верхнего холмика*, *brachium colliculi rostralis [superioris]*, валик нижнего холмика — *ручкой нижнего холмика*, *brachium colliculi caudalis [inferioris]* (см. рис. 930). Обе ручки доходят до возвышений коленчатых тел, принадлежащих метаталамусу промежуточного мозга.

Ручка верхнего холмика, следя между подушкой и медиальным коленчатым телом, достигает области латерального коленчатого тела и частично переходит в таламус, а частично продолжается в *латеральный корешок зрительного тракта*, *radix lateralis tractus optici*. Ручка нижнего холмика направляется под медиаль-

ное коленчатое тело, в области которого она теряется, а из самого тела выходит пучок, продолжающийся в *медиальный корешок зрительного тракта*, *radix medialis tractus optici*.

### Ножки мозга

**Ножки мозга**, *pedunculi cerebri*, и заднее продырявленное вещество, *substantia perforata interpeduncularis [posterior]*, расположены на нижней поверхности мозга (см. рис. 893, 923, 927, 930).


На поперечных срезах ножек мозга, проведенных на различных уровнях, можно различить переднюю часть — основание ножки мозга, *basis pedunculi cerebri*, и заднюю часть — покрышку среднего мозга, *tegmentum mesencephali*; на границе между ними

залегает черное вещество, *substantia nigra* (см. рис. 927).

Основание ножки мозга имеет полулуенную форму и содержит волокна продольных путей: *корково-спинномозговые волокна*, *fibrae corticospinales*, и *корково-ядерные волокна*, *fibrae corticonucleares* (занимают середину основания ножек мозга), а также *корково-мостовые волокна*, *fibrae corticopontinae*.

Богатое пигментом черное вещество также имеет полулуенную форму, обращено выпуклостью в сторону основания ножек мозга. В составе черного вещества различают дорсально расположенную *компактную часть*, *pars compacta*, и вентральную *сетчатую часть*, *pars reticularis*.

Покрышка среднего мозга простирается от черного вещества до уровня водопровода мозга, содержит правое



930. Мозжечок, cerebellum, и ствол головного мозга, *truncus cerebri*; вид справа.

и левое красные ядра, *nuclei ruber*, ядра III, IV, V черепных нервов, скопления нейронов ретикулярной формации и продольные пучки волокон. В пределах красного ядра выделяют крациальнно расположенную мелкоклеточную часть, *pars parvocellularis*, и каудально расположенную крупноклеточную часть, *pars magnocellularis*.

Впереди красного ядра на уровне краиального конца водопровода мозга залегает промежуточное ядро, *nucleus interstitialis*. Нейроны этого ядра являются основным источником волокон медиального продольного пучка, *fasciculus longitudinalis medialis*. Последний прослеживается на всем протяжении ствола головного мозга и занимает паравентрикулярное положение. В составе медиального продольного пучка имеются волокна, связывающие ядра глазодвигательных, блоковых и отводящих нервов, а также волокна, идущие от вестибулярных ядер к ядрам III, IV и VI пар черепных нервов. Эти структуры связаны и с мотонейронами передних столбов верхних шейных сегментов спинного мозга, иннервирующими мышцы шеи. За счет волокон медиального продольного пучка обеспечиваются содружественные движения головы и глазных яблок.

В составе покрышки среднего мозга выделяют также перекрестья покрышки, *decussationes tegmenti*, образованные перекрещивающимися волокнами красноядерно-спинномозгового пути, *tractus rubrospinalis*, и покрышечно-спинномозгового пути, *tractus tectospinalis*.

Над покрышкой лежит пластинка крыши. В середине, по линии, отделяющей правые холмики от левых, расположено отверстие водопровода мозга, который соединяет полость III желудочка с полостью IV желудочка. Длина водопровода 2,0—2,5 см.

От пластинки крыши к мозжечку направляются два тяжа — верхняя мозжечковая ножка, *pedunculus cerebellaris rostralis [superior]* (см. рис. 939, 943, 944). Волокна каждой верхней мозжечковой ножки начинаются в ядрах мозжечка и подходят к области крыши среднего мозга, охватывая с двух сторон верхний мозговой парус. Далее волокна следуют вентральнее водопровода мозга и центрального серого вещества, *substancia grisea centralis*, перекрещиваются, образуя перекрест верхних

мозжечковых ножек, *decussatio peduncularum cerebellarum rostralium [superiorum]*, и почти все заканчиваются в красном ядре, *nucleus ruber*. Меньшая часть волокон пронизывает красное ядро и следует к таламусу, образуя зубчато-таламический путь, *tractus dentatothalamicus*.

Вентролатерально по отношению к водопроводу мозга проходят продольные волокна заднего продольного пучка, *fasciculus longitudinalis dorsalis*, связывающие таламус и гипоталамус с ядерными образованиями ствола мозга.

Место перехода среднего мозга в ромбовидный представляет собой наибольше суженную часть ствола головного мозга. Этот отдел мозга, который иногда называют перешейком ромбовидного мозга, *isthmus rhombencephali*, лучше выражен у плода.

В перешейке ромбовидного мозга залегают следующие образования (см. рис. 943, 944): а) верхние мозжечковые ножки, *pedunculi cerebellares rostrales [superiores]*, которые располагаются вдоль дорсолатеральных участков крыши среднего мозга; б) верхний мозговой парус, *velum medullare rostralis [superius]*, образующий переднюю часть крыши IV желудочка; в) треугольник петли, *trigonum lemnisci* — парное образование, расположенное между ручкой нижнего холмика и нижним холмиком крыши среднего мозга с одной стороны, ножкой мозга — с другой и верхней мозжечковой ножкой — с третьей. В треугольнике залегают волокна, образующие латеральную петлю, *lemniscus lateralis*. Большинство этих волокон состоит из центральных слуховых проводников, примыкающих с латеральной стороны к медиальной петле, *lemniscus medialis*.

Латеральное верхней мозжечковой ножки, в борозде между нею и средней мозжечковой ножкой, проходят небольшие пучки, представляющие собой отделившиеся от вещества моста передние пучки средней мозжечковой ножки.

Между нижними холмиками крыши среднего мозга, из борозды между ними, берет начало узелок верхнего мозгового паруса, *frenulum veli medullaris rostralis [superioris]*, продолжающаяся кзади в верхний мозговой парус. Последний представляет собой непарную удлиненную четырехугольную тонкую пластинку бело-

го вещества,натянутую между верхними мозжечковыми ножками (см. рис. 943).

Кпереди верхний мозговой парус соединяется с нижними холмиками крыши среднего мозга и с задними краями треугольников петель, кзади — с белым веществом передней части червя мозжечка, сбоку (латерально) — с верхними мозжечковыми ножками. Средние и задние отделы его дорсальной, или верхней, поверхности прикрыты извилинами язычка мозжечка, а вентральная, или нижняя, поверхность, обращенная в полость IV желудочка, образует передневерхние отделы крыши полости этого желудочка.

В верхнем мозговом парусе проходят перекрещающиеся волокна, принадлежащие корешкам блоковых нервов, образующих перекрест блоковых нервов, *decussatio nervorum troclearium*, и волокна передних спинно-мозжечковых путей, *tractus spinocerebellares anteriores* (см. рис. 947).

Несколько латерально от узелки верхнего мозгового паруса, прободая последний, на его поверхность выходит тонкий ствол блокового нерва. Этот нерв появляется на границе между задним краем треугольника петли и передним краем паруса. Это единственный черепной нерв, выходящий из мозга на его задней поверхности, а не на передней, как все остальные.

## РОМБОВИДНЫЙ МОЗГ

**Ромбовидный мозг**, *rhombencephalon*, включает в себя задний мозг и продолговатый мозг, а его полостью является IV желудочек.

## Задний мозг

**Задний мозг**, *metencephalon* (рис. 931), представлен мостом и мозжечком.

## Мост

**Мост**, *pons*, является производным вентральной части заднего мозга, входит в состав ствола мозга и представляет собой большой белый вал, лежащий кзади от центра основания мозга. Спереди он резко ограничен от ножек мозга, сзади — от продолговатого мозга посредством бульбарно-мостовой борозды, *sulcus bulborontinus* (см. рис. 884, 923, 928).

Латеральной границей моста считают продольную линию, проведенную через места выхода корешков тройничного нерва (V пара черепных нервов) и лицевого нерва (VII пара черепных нервов). Кнаружи от этой линии располагается *средняя мозжечковая ножка*, *pedunculus cerebellaris medius [pontinus]*. Таким образом, мост с мозжечком соединяют правая и левая средние мозжечковые ножки.

Располагаясь на скате основания черепа, мост имеет несколько косое направление, благодаря чему в нем различают две поверхности — переднюю и заднюю. Передняя поверхность залегает на основании черепа, а задняя участвует в образовании передних отделов *ромбовидной ямки*, *fossa rhomboidea* (см. «Четвертый желудочек»).

На выпуклой передней поверхности моста по срединной линии располагается продольно идущая *базилярная борозда*, *sulcus basilaris*, в которой залегает базилярная артерия. По обеим сторонам от борозды выступают два хорошо выраженных продольных пирамидальных возвышения, в толще которых проходят пирамидные пути.


На этой поверхности моста отчетливо различима поперечная исчерченность, обусловленная залегающими в этом направлении пучками нервных волокон (см. рис. 928).

На разрезах моста, проведенных во фронтальной плоскости на различных уровнях, можно видеть расположение пучков нервных волокон и скопление серого вещества (нервные клетки).


Толщу моста делят на более массивную *переднюю [базилярную] часть моста*, *pars ventralis [basilaris] pontis*, и более тонкую *заднюю часть [покрышка моста]*, *pars dorsalis pontis [tegmentum pontis]*. В передней части проходит больше нервных волокон, чем в задней, в то время как в задней части больше скоплений нервных клеток.

В передней части моста впереди продольных пирамидных пучков располагаются поперечно идущие поверхностные волокна, которые в совокупности образуют верхний пучок моста. Более дорсально между пирамидными пучками идут поперечные волокна, направляющиеся к задним отделам средней мозжечковой ножки; они образуют нижний пучок моста.

Как поверхностные, так и глубокие волокна принадлежат к системе *поперечных волокон моста*, *fibrae pontis transversae*, (рис. 932). Они образуют




931. Топография заднего мозга (обозначен цветом) (схема).



### 932. Мост, pons.

А — направление разреза. Б — образования в плоскости разреза.




соответствующие слои волокон — поверхностный слой и глубокий слой средних мозжечковых ножек и соединяют между собой ствол мозга и мозжечок. Поперечно идущие пучки по средней линии перекрещиваются. Ближе к латеральной поверхности основания моста проходит дугообразно выпуклый книзу косой, или средний, пучок моста, волокна которого следуют к месту выхода лицевого и преддверно-улиткового нервов.

Между поперечными пучками моста, но медиальнее косого пучка рас-

полагаются медиальные и нижние продольные волокна моста, *fibrae pontis longitudinales*, принадлежащие к системе пирамидных путей. Они начинаются от клеток коры больших полушарий большого мозга и проходят во внутренней капсуле, в ножке мозга и через мост следуют к продолговатому мозгу в составе корково-ядерных волокон, *fibrae corticonucleares*, а в составе корково-спинномозговых волокон, *fibrae corticospinales*, — к спинному мозгу (см. рис. 948).


В толще передней части моста зале-

гают небольшие скопления серого вещества — ядра моста, *nuclei pontis*. На клетках этих ядер заканчиваются волокна, начинающиеся от клеток коры полушарий большого мозга и получившие название корково-мостовых волокон, *fibrae corticopontinae*. От этих же клеток берут начало волокна, перекрещивающиеся с одноименными волокнами противоположной стороны, образуя мостомозжечковые волокна, *fibrae pontocerebellares*, направляющиеся в составе средней мозжечковой ножки к коре мозжечка.



933. Мозжечок, cerebellum; вид сверху.  
(Мозговые оболочки мозжечка удалены.)

934. Мозжечок, cerebellum; вид сверху (полусхематично).



На уровне границы между передней и задней частями моста располагается пучок поперечно идущих волокон, образующих так называемое *трапециевидное тело*, *corpus trapezoideum*. Эти волокна, начинаясь от клеток *переднего улиткового ядра*, *nucleus cochlearis ventralis [anterior]*, частично достигают клеток *переднего ядра трапециевидного тела*, *nucleus ventralis [anterior] corporis trapezoidei*, которые рассеяны между волокнами трапециевидного тела, а частично оканчиваются в клетках *заднего ядра трапециевидного тела*, *nucleus dorsalis [posterior] corporis trapezoidei*. Обе группы этих волокон, переключившись в указанных ядрах, продолжаются далее в пучок *латеральной петли*, *lemniscus lateralis*, этой же стороны. Большая часть волокон трапециевидного тела переходит на противоположную сторону и достигает клеток *ядра латеральной петли*, *nucleus lemnisci lateralis* (см. рис. 928).

На всем протяжении покрышки моста прослеживается *ретикулярная формация*, *formatio reticularis*, которая без отчетливой границы переходит в ретикулярную формуацию продолговатого и среднего мозга.

Центральный стержень вещества покрышки моста, образованный скоплениями ретикулярных нейронов и их отростками, обозначается как *шов моста*, *raphe pontis*.

В боковом отделе ретикулярной формации моста на уровне нижней его границы располагается *верхнее оливное ядро*, *nucleus olivaris rostralis [superioris]*. Медиальнее этого ядра находится трапециевидное тело, ниже — комплекс ядер нижней оливы.

В задней части моста располагаются продолжающиеся из среднего мозга медиальный и задний продольные пучки, а также восходящие волокна, проходящие из продолговатого мозга. Здесь же залегают ядра V, VI, и VII пар черепных нервов.

У заднего края моста выходят более медиально лицевой нерв, а латеральнее его — преддверно-улитковый нерв. Между ними залегает тонкий ствол промежуточного нерва.

### Мозжечок

**Мозжечок**, *cerebellum* (рис. 933—940, см. рис. 873—877, 884, 888, 929, 930), развивается из пластинки мозжечка, которая принадлежит средней и боко-

вым частям крыши заднего мозга; боковые части образуют *полушария мозжечка*, *hemisphera cerebelli*, а средняя часть — *червь мозжечка*, *vermis cerebelli*, соединяющий оба полушария. Мозжечок выполняет почти всю заднюю черепную ямку. Поперечник мозжечка (9—10 см) значительно больше его переднезаднего размера (3—4 см). Масса мозжечка у взрослого колеблется от 120 до 150 г. Сверху над мозжечком лежат затылочные доли большого мозга. Мозжечок отделен от большого мозга глубокой щелью, в которую вклинивается отросток твердой оболочки головного мозга — *намет мозжечка*, *natens cerebelli* (см. рис. 957). Впереди мозжечка располагаются мост и продолговатый мозг. Мозжечок, как и большой мозг, покрыт оболочками. Удалив их, можно различить отдельные части мозжечка и множество борозд и извилин, расположенных на его поверхностях.

### Внешнее строение мозжечка

Червь более короткий, чем полушария, поэтому на соответствующих краях мозжечка образуются вырезки: на переднем крае — передняя, на заднем крае — задняя. Наиболее выступающие участки переднего и заднего краев образуют соответствующие передний и задний углы, а наиболее выступающие латеральные участки — латеральные углы.

*Горизонтальная щель*, *fissura horizontalis*, идущая от средних мозжечковых ножек к задней вырезке мозжечка, разделяет каждое полушарие мозжечка на две поверхности: верхнюю, относительно ровную и косо спускающуюся к краям, и выпуклую нижнюю. Своей нижней поверхностью мозжечок прилегает к продолговатому мозгу, так что последний вдавлен в мозжечок, образуя впячивание — *долинку мозжечка*, *vallecula cerebelli*, на дне которой располагается червь.

На черве мозжечка различают верхнюю и нижнюю поверхности. Идущие продольно по бокам червя бороздки: на передней поверхности — более мелкие, на задней — более глубокие — отделяют его от полушарий мозжечка.

Мозжечок состоит из серого и белого вещества (см. рис. 937, 939, 940). Серое вещество полушарий и червя мозжечка, расположенное в поверх-

ностном слое, образует *кору мозжечка*, *cortex cerebelli*, а скопление серого вещества в глубине мозжечка — *ядра мозжечка*, *nuclei cerebelli*. Белое вещество — *мозговое тело (мозжечка)*, *corpus medullare cerebelli*, залегает в толще мозжечка и при посредстве трех пар мозжечковых ножек (верхних, средних и нижних) связывает серое вещество мозжечка со стволом головного мозга и спинным мозгом.

Поверхности полушарий и червя мозжечка делятся более или менее глубоким *щелями мозжечка*, *fissurae cerebelli*, на различные по величине многочисленные дугообразно изогнутые *листки мозжечка*, *folia cerebelli*, большинство которых располагается почти параллельно один другому. Группы извилин образуют отдельные дольки мозжечка. Одноименные дольки обоих полушарий разграничены одной и той же бороздой, которая переходит через червь с одного полушария на другое, в результате этого двум — правой и левой — одноименным долькам обоих полушарий соответствует определенная долька червя.

Отдельные дольки образуют доли мозжечка. Таких долей три: передняя, задняя и клочково-узелковая. Они ограничены одна от другой постоянными щелями мозжечка.

1) *Передняя доля мозжечка*, *lobus rostralis [anterior] cerebelli*, включает следующие долики:

1) *язычок*, *lingula*, — небольшая тонкая долька червя; своей передне-нижней поверхностью покрывает среднюю и заднюю части верхнего мозгового паруса (крыша IV желудочка). Участок полушария мозжечка, связывающий язычок с верхней мозжечковой ножкой, переходит через последнюю и направляется к средней мозжечковой ножке;

2) *центральную дольку*, *lobulus centralis*, принадлежащую червю; она составляет срединный участок передней вырезки мозжечка, переходя по сторонам в принадлежащие полушариям *крылья центральной дольки*, *alae lobuli centralis*, несущие несколько мелких и коротких извилин;

3) *четырехугольную дольку [передняя часть]*, *lobulus quadrangularis [pars anterior]*, имеющую форму неправильного четырехугольника с извилинами, идущими сзади наперед и латерально. В центре передней части, в области червя мозжечка, расположается выступ — *вершина*, *cultus*.

2. Задняя доля мозжечка, *lobus caudalis [posterior] cerebelli*, отделяется от передней доли *первой щелью*, *fissura prima*. Заднюю долю мозжечка составляют следующие образования:


1) задняя часть четырехугольной дольки, *lobuli quadrangularis [pars caudalis]*. Центральный участок этой дольки в области червя мозжечка образует *скам, declive*;

2) верхняя полулунная долька, *lobulus semilunaris rostralis [superior]*,— довольно крупная долька, резко суживается к середине мозжечка и переходит в листок червя, *folium vermis*;

3) нижняя полулунная долька, *lobulus semilunaris caudalis [inferior]*, отделяется горизонтальной щелью, *fissura horizontalis*, от верхней полулунной дольки. Извилины этой дольки сильно изогнуты латерально и кзади,


при этом медиальные отделы дольки у задней вырезки мозжечка более утолщенные, чем латеральные. Эта долька переходит в бугор червя, *tuber vermis*;

4) тонкая долька [*парамедианная долька*], *lobulus gracilis [lobulus paramedianus]*,—небольшой парный участок задней доли, расположенный по сторонам от *пирамиды червя, pyramis vermis*, отделяется от нижней полу-



**935. Мозжечок, cerebellum; вид снизу и спереди.**  
(Мозжечок отделен от большого мозга разрезами через верхние и средние мозжечковые ножки и верхний мозговой парус.)

**936. Мозжечок, cerebellum; вид спереди (полусхематично).**



лунной дольки задней нижней щелью, *fissura dorsolateralis [posterolateralis]*;


5) двубрюшная долька, *lobus biventer*, отделяется передней нижней бороздой от тонкой дольки. Извилины двубрюшной дольки по их направлению можно разделить на две части: задняя латеральная часть имеет короткие извилины, обращенные в латеральную сторону, передняя медиальная часть имеет длинные извилины,

большинство которых проходят спереди назад. Вся долька соответствует пирамиде червя;

6) миндалина мозжечка, *tonsilla cerebelli*, залегает медиальнее двубрюшной дольки, отделяется от нее второй щелью, *fissura secunda*, в небольшом углублении, так называемом птичьем гнезде, расположенным у нижнего мозгового паруса. Короткие извилины этой дольки следуют спереди назад.


Она соответствует язычку червя, *uvula vermis*.

3. Клочково-узелковая доля, *lobus flocculonodularis*, — наименьшая из долей мозжечка. В нее входит клочек, *flocculus*, — самая маленькая долька полушария мозжечка, отделенная задней латеральной щелью, *fissura dorsolateralis*. Клочек подвешен на тонкой ножке клочка, *pedunculus flocculi*, которая расположена позади средней



**937. Мозжечок, cerebellum.**  
(Сагиттальный разрез через червь мозжечка — «древо жизни», *arbor vitae*.)

**938. Мозжечок, cerebellum**  
(полусхематично).  
(Сагиттальный разрез через червь мозжечка.)



и нижней мозжечковых ножек и у медиальной поверхности миндалины присоединяется к нижнему мозговому парусу. У средней мозжечковой ножки нередко локализуется небольшая группа мелких извилин, составляющих *околоклочек*, *paraflocculus*. Клочок соответствует узелку, *nodus*, червя.

Структуры мозжечка возникли на разных этапах филогенеза. Наиболее старую часть мозжечка, *archaeocerebellum*, образуют клочок, узелок и язычок, они получают афферентные связи в основном в составе вестибуло- и спинно-мозжечковых путей. Передняя доля (за исключением язычка) вместе с пирамидой и язычком червя образуют древнюю часть мозжечка,

*palaeocerebellum*. Эта часть получает афферентные волокна в составе спинно-мозжечковых путей. С развитием коры больших полушарий формируются новые структуры мозжечка, *neocerebellum*, представленные средней долей (за исключением пирамиды и язычка червя); основной источник афферентных сигналов для этой части мозжечка — корково-мостомозжечковые пути.

#### Белое и серое вещество мозжечка


Белое вещество мозжечка, или мозговое тело, залегает в толще мозжечка. Здесь оно, разветвляясь, проникает в каждую извилину в виде белых

полосок, *laminee albae*, покрытых серым веществом — корой мозжечка, *cortex cerebelli*. На сагиттальных срезах мозжечка виден рисунок соотношения белого и серого вещества, называемый *древом жизни мозжечка*, *arbor vitae cerebelli*.

Мозжечок соединяется со стволом мозга посредством трех пар ножек. Ножки мозжечка, *pedunculi cerebellares*, представляют собой системы проводящих путей, волокна которых следуют к мозжечку и от него:

1) нижние мозжечковые ножки, *pedunculi cerebellares caudales [inferiores]*, — от продолговатого мозга к мозжечку (см. «Продолговатый мозг» и «Краткий обзор проводящих путей спинного и головного мозга»);

939



2) *средние мозжечковые ножки*, *pedunculi cerebellares medii*, — от моста к мозжечку (см. «Мост», «Краткий обзор проводящих путей спинного и головного мозга»);

3) *верхние мозжечковые ножки*, *pedunculi cerebellares rostrales [superiores]*, — к среднему мозгу (см. «Крыша среднего мозга», «Краткий обзор проводящих путей спинного и головного мозга»).

Серое вещество образует кору мозжечка и его ядра.

В коре мозжечка различают *молекулярный слой*, *stratum moleculare*, *слой грушевидных нейронов*, *stratum neuronorum piriformium*, и *зернистый слой*, *stratum granulosum*.

Ядра мозжечка (см. рис. 939, 940)

представляют собой парные скопления серого вещества в толще мозгового тела. Различают следующие ядра:

1. *Зубчатое ядро*, *nucleus dentatus*, залегает в медиально-нижних участках белого вещества. Это ядро представляет собой волнообразно изгибающуюся пластинку серого вещества с небольшим перерывом в медиальном отделе, который получил название *ворот зубчатого ядра*, *hilum nuclei dentati*.

2. *Пробковидное ядро*, *nucleus emboliformis*, расположено медиально и параллельно зубчатому ядру.


3. *Шаровидное ядро*, *nucleus globosus*, залегает несколько медиальнее пробковидного ядра и на разрезе мо-

жет быть представлено в виде нескольких небольших шариков.

4. *Ядро шатра*, *nucleus fastigii*, локализуется в белом веществе червя, по обеим сторонам от его срединной плоскости, под долькой язычка и центральной долькой, в крыше IV желудочки.


### Продолговатый мозг

**Продолговатый мозг**, *medulla oblongata [myelencephalon, bulbus]* (рис. 941—944; см. рис. 871—877, 884, 925, 928), — производное ромбовидного мозга, который на стадии пяти пузьрей разделяется на задний мозг, *metencephalon*, и продолговатый мозг, *myelencephalon*. Являясь частью ство-





939. Мозжечок, cerebellum, и крыша среднего мозга, tectum mesencephali; вид сверху.  
(Горизонтальный разрез через мозжечок немного выше горизонтальной борозды мозжечка.)

940. Мозжечок, cerebellum, и ствол головного мозга, truncus cerebri; вид справа.  
(Разрез мозжечка немного вправо от срединной плоскости.)



941. Топография продолговатого мозга (обозначен цветом) (схема).



Б

942. Продолговатый мозг, medulla oblongata; вид сверху и несколько спереди.  
(Горизонтальный разрез на уровне нижней оливы.)

А — линия разреза. Б — образования в плоскости разреза.

ла мозга, он представляет собой продолжение спинного мозга в виде его утолщения.


Продолговатый мозг имеет форму конуса, несколько сдавленного в задних отделах и округлого в передних. Его узкий конец направлен вниз к спинному мозгу, верхний, расширенный,— к мосту и мозжечку. Границей между продолговатым и спинным мозгом считают место выхода верхней корешковой нити первого шейного нерва или нижний уровень перекреста пирамид (см. рис. 928). От моста продолговатый мозг отделяет хорошо выраженная на передней поверхности поперечно идущая бульбарно-мостовая борозда, из которой выходит на поверхность мозга отводящий нерв. Продольный размер продолговатого мозга составляет 3,0—3,2 см, поперечный—в среднем до 1,5 см, переднезадний—до 1 см.


**943. Четвертый желудочек, ventriculus quartus, и сосудистая основа IV желудочка, tela choroidea ventriculi quarti; вид сверху и сзади.**  
(Мозжечок удален полностью; частично удалены средние мозжечковые ножки; сосудистое сплетение IV желудочка окрашено в фиолетовый цвет.)

Передняя (вентральная) поверхность продолговатого мозга расположена на скате и занимает его нижний участок до большого затылочного отверстия (см. рис. 923, 925, 931, 932, 941—946). На ней проходит передняя срединная щель, *fissura mediana ventralis [anterior]*, которая является продолжением одноименной щели спинного мозга.

На уровне выхода корешковых нитей I пары шейных нервов передняя срединная щель несколько прерывается, становится менее глубокой вследствие образуемого здесь перекреста пирамид [моторный перекрест], *decussatio pyramidum [decussatio motoria]*.

В верхних отделах передней поверхности продолговатого мозга с каждой стороны передней срединной щели располагается конусообразный валик—пирамида (продолговатого мозга), *pyramis (medullae oblongatae)*.





**944. Ромбовидная ямка, fossa rhomboidea; вид сверху и сзади.  
(Мозжечок удален; верхний мозговой парус и основа IV желудочка с сосудистым сплетением отвернуты.)**

На поперечных разрезах продолговатого мозга можно определить, что каждая пирамида представляет собой комплекс пучков (они видны, если растянуть в стороны края передней срединной щели), которые частично взаимно перекрещиваются. Далее волокна переходят в систему бокового канатика спинного мозга, где следуют как латеральный корково-спинномозговой (пирамидный) путь. Остальная, меньшая, часть пучков, не входя в перекрест, следует в системе переднего канатика спинного мозга как передний корково-спинномозговой (пирамидный) путь. Эти пути объединяют в единый пирамидный путь.

Кнаружи от пирамиды располагается продолговато-округлое возвышение — олива, *oliva*. Она выступает на передней поверхности бокового канатика; сзади ее ограничивает *позадиоливная борозда*, *sulcus retroolivaris*.

Оливу от пирамиды отделяет *переднелатеральная борозда*, *sulcus ventrolateralis [anterolateralis]*, являющаяся продолжением одноименной борозды спинного мозга. Переход этой борозды со спинного мозга на продолговатый сглаживается поперечно идущими *наружными дугообразными волокнами*, *fibrae arcuatae externae*, которые, располагаясь у нижнего края оливы, направляются к пирамиде. Различают *передние и задние наружные дугообразные волокна*, *fibrae arcuatae externae ventrales [anteriores] et dorsales [posterior]*.

Передние наружные дугообразные волокна являются отростками клеток *дугообразных ядер*, *nuclei arcuati* — скоплений серого вещества, прилежащих к передней и медиальной поверхностям пирамиды. Эти волокна выходят на поверхность продолговатого мозга в области передней срединной щели, огибают пирамиду и оливу, следуют в составе нижней мозжечковой ножки к ядрам мозжечка.

Задние наружные дугообразные волокна образованы отростками клеток *дополнительного клиновидного ядра*, *nucleus cuneatus accessorius*, и направляются в мозжечок в составе нижней мозжечковой ножки своей стороны. Добавочное клиновидное ядро расположено дорсолатерально по отношению к *клиновидному ядру*, *nucleus cuneatus*. Из глубины переднелатеральной борозды выходит на поверхность продолговатого мозга от 6 до 10 корешков подъязычного нерва.

На поперечных разрезах, проведенных через оливы, кроме нервных волокон, можно также различить скопления серого вещества. Наибольшее из скоплений подковообразное, со складчатой поверхностью — это *оливный плащ*, *amiculum olivare*, а само ядро — *нижнее оливное ядро*, *nucleus olivaria caudalis [inferior]*, в котором имеются *ворота нижнего оливного ядра*, *hilum nuclei olivaris caudalis [inferioris]*, для оливомозжечкового пути. Другие ядра меньшего размера: одно залегает кнутри — *медиальное добавочное оливное ядро*, *nucleus olivaris accessorius medialis*, другое кзади — *заднее добавочное оливное ядро*, *nucleus olivaris accessorius dorsalis [posterior]* (см. рис. 942).

На дорсальной (задней) поверхности продолговатого мозга располагается *задняя срединная борозда*, *sulcus medianus dorsalis [posterior]*. Направляясь кверху, она достигает тонкой мозговой пластинки — *задвижки*, *ovex*. Последняя, натянутая между бугорками тонкого ядра, представляет собой часть крыши IV желудочка в области заднего угла ромбовидной ямки. Под задвижкой полость центрального канала спинного мозга переходит в полость IV желудочка (см. рис. 944).

Кнаружи от задней срединной борозды проходят две борозды: одна ближе к срединной борозде — промежуточная борозда, другая более латерально — *заднелатеральная борозда*, *sulcus dorsolateralis [posteriorlateralis]*. Из глубины последней выходят на поверхность продолговатого мозга 4—5 корешков языгоглоточного нерва, 12—16 корешков блуждающего нерва и 3—6 черепных корешков добавочного нерва.

Задняя срединная и заднелатеральная борозды ограничивают *задний канатик*, *funiculus posterior*, являющийся продолжением одноименного канатика спинного мозга. Промежуточная борозда разделяет задний канатик на два пучка. Один пучок залегает между ней и задней срединной бороздой — это *тонкий пучок*, *fasciculus gracilis*, переходящий вверху в утолщение — *буторок тонкого ядра*, *tuberculum gracile*. Второй пучок расположен между промежуточной и заднелатеральной бороздами — это *клиновидный пучок*, *fasciculus cuneatus*, переходящий вверху в менее выраженный *буторок клиновидного ядра*, *tuberculum cuneatum*. Каждый бугорок без резких

границ переходит в нижнюю мозжечковую ножку.

В обоих бугорках залегают скопления серого вещества: в бугорке тонкого ядра — *тонкое ядро*, *nucleus gracilis*, в бугорке клиновидного ядра — *клиновидное ядро*, *nucleus cuneatus*. На клетках этих ядер заканчиваются волокна соответствующих пучков заднего канатика.

На дорсальной поверхности продолговатого мозга между клиновидным пучком и корешками добавочного нерва находится непостоянное возвышение — *тройничный бугорок*, *tuberculum trigeminale*. Он образован каудальным отделом ядра спинномозгового пути тройничного нерва.

Тотчас у верхнего конца заднелатеральной борозды, над корешками языгоглоточного нерва, в виде продолжения заднего и бокового канатиков располагается полукруглое утолщение — *нижняя мозжечковая ножка* (см. рис. 943, 944). В состав каждой нижней мозжечковой ножки, правой и левой, входят волокна проводящих систем, которые образуют в ней латеральную, большую, и медиальную, меньшую, части.

На поперечных разрезах продолговатого мозга дорсальное пирамид, между ядрами олив, залегают волокна, составляющие восходящие пути, соединяющие спинной мозг с головным. *Ретикулярная формация*, *formatio reticularis*, продолговатого мозга представлена многочисленными скоплениями нейронов и сложно переплетающимися волокнами. Она располагается преимущественно в дорсомедиальной части продолговатого мозга и без отчетливой границы переходит в ретикулярную формуцию моста. В этой же зоне располагаются ядра VIII—XII пар черепных нервов.

В ретикулярную формуацию продолговатого мозга входит также ряд клеточных скоплений, локализующихся вблизи ядра подъязычного нерва и ядра одиночного пути: *заднее парамедианное ядро*, *nucleus paramedianus dorsalis [posterior]*; *вставочное ядро*, *nucleus intercalatus*, ядро *околоодиночного пути*, *nucleus parasolitarius*; *комиссуральное ядро*, *nucleus commissuralis*.

Центральный стержень вещества продолговатого мозга, образованный скоплениями ретикулярных клеток и их отростками, обозначают как *шов продолговатого мозга*, *raphe medullae oblongatae*. Расположенные

парамедианно группы клеток ретикулярной формации обозначают как *ядра шва, nuclei raphae*.

### Четвертый желудочек

**Четвертый (IV) желудочек, *ventriculus quartus*** (см. рис. 913—916, 943), непарный, представляет собой полость, развивающуюся из полости заднего мозгового пузыря (см. рис. 870—877). Четвертый желудочек сообщается сверху через водопровод мозга с полостью III желудочка, внизу — с полостью спинного мозга, его центральным каналом. Кроме того, полость желудочка в трех местах сообщается с подпаутинным пространством.

Как и все желудочки мозга, IV желудочек заполнен спинномозговой жидкостью. Он окружен спереди мостом и продолговатым мозгом, сзади — мозжечком.

Сама полость IV желудочка ограничена сзади крышей IV желудочка, спереди — дном, которым является ромбовидная ямка.

Заднюю стенку, или *крышу, IV желудочка, tegmen ventriculi quarti*, образуют *верхний мозговой парус, velum medullare rostrale [superius]*, который ограничен с боков обеими верхними мозжечковыми ножками, и *нижний мозговой парус, velum medullare caudale [inferius]*, вместе с *сосудистой основой IV желудочка, tela choroidea ventriculi quarti* —rudimentом задней стенки первичного мозгового пузыря. Боковыми сторонами нижний парус прикрепляется к медиальным краям нижних мозжечковых ножек. Сосудистую основу и нижний парус иногда объединяют под общим названием «крыша ромбовидной ямки».

Крыша имеет как бы форму шатра, и в месте перехода верхнего и нижнего парусов в червь мозжечка (см. рис. 923) образуется угол между язычком мозжечка спереди и узелком сзади.

Сосудистая основа IV желудочка на первых этапах эмбрионального развития со всех сторон замкнута. Только в дальнейшем она прорывается, в результате чего образуется ряд отверстий, посредством которых полость IV желудочка сообщается с полостью подпаутинного пространства (см. рис. 943). Таких отверстий три: *центральная апертура IV желудочка, apertura mediana ventriculi quarti*, и две *латеральные апертуры IV желудочка,*

*aperturae laterales ventriculi quarti*. Срединная апертура больше латеральных. Она расположена в нижних отделах крыши, немного выше задвижки, и открывается в полость подпаутинного пространства, в мозжечково-мозговую цистерну.

Латеральные апертуры находятся в области *латерального кармана IV желудочка, recessus lateralis ventriculi quarti*, достигающего клоака полузащития мозжечка, и открываются в полость подпаутинного пространства.

Сосудистая основа со стороны полости желудочка имеет ворсинчатые выпячивания, которые вместе с единительной тканью и вросшими сосудами образуют *сосудистое сплетение IV желудочка, plexus choroideus ventriculi quarti*, покрытое со стороны полости желудочка эпителием.

Сосудистое сплетение IV желудочка впереди узелка мозжечка разделяется на среднее сосудистое сплетение, которое в виде двух тяжей лежит по обеим сторонам срединной плоскости и следует к срединной апертуре сосудистой покрышки, и два латеральных, направленных в сторону латеральных карманов.

При удалении сосудистого сплетения у места его прикрепления к боковым стенкам IV желудочка остается след отрыва в виде зазубренной каемки — *лента IV желудочка, tenia ventriculi quarti*. Сзади и сверху к ленте примыкает нижняя мозжечковая ножка, идущая к продолговатому мозгу; кзади она переходит в бугорок тонкого ядра и достигает внизу задвижки. Кпереди и в сторону лента направляется в область латерального кармана, который она окаймляет, переходит далее по ножке клоака к свободному краю нижнего мозгового паруса и по нему достигает узелка. К последнему таким же путем подходит лента с противоположной стороны. Таким образом, ленты обеих сторон переходят одна в другую.

Дно IV желудочка образует соответствующая по форме своему названию *ромбовидная ямка, fossa rhomboidea* (см. рис. 944). Она расположена на дорсальной поверхности моста и продолговатого мозга и покрыта тонким слоем серого вещества. Онтогенетически ромбовидная ямка является образованием двух отделов: ее верхняя часть возникла из заднего мозга и залегает между передними мозжечковыми ножками, а также правым и левым латеральными кар-


манами; нижняя часть возникла из продолговатого мозга и расположена между правой и левой нижними мозжечковыми ножками.

Ромбовидная ямка простирается от водопровода мозга впереди до спинного мозга сзади. Ее острые углы направлены к среднему мозгу — передний, к спинному мозгу — задний, а тупые — к латеральным карманам IV желудочка.

По длинной диагонали ромбовидной ямки проходит *срединная борозда, sulcus medianus*, которая переходит спереди в водопровод мозга, расположаясь там по его дну. Короткая диагональ проходит между обеими латеральными карманами. Срединная борозда делит ямку на два треугольника — правый и левый. Основание каждого треугольника соответствует срединной борозде, а вершина направлена к наиболее широкому участку ромбовидной ямки — латеральному карману, локализующемуся в области переднего отдела нижней мозжечковой ножки. Линия, проведенная между обеими нижними мозжечковыми ножками, делит ромбовидную ямку на два неодинаковых по величине треугольника — верхний и нижний.

По обе стороны от срединной борозды имеется два *медиальных возвышения, eminentiae mediales*. Они особенно хорошо выражены в передних участках ромбовидной ямки. В толще этих возвышений залегают двигательные ядра черепных нервов. На каждом возвышении, в его задней части, что соответствует задним отделам верхнего треугольника, имеется *лицевой бугорок, colliculus facialis*, образованный коленом лицевого нерва.

Медиальное возвышение и лицевой бугорок ограничены с латеральной стороны *пограничной бороздой, sulcus limitans*, ромбовидной ямки. В верхних отделах пограничной борозды, ближе к верхней мозжечковой ножке, располагается небольшой, синеватого цвета участок — *голубоватое место, locus ceruleus*; его цвет зависит от залегающих здесь пигментированных клеток. Кзади от голубоватого места и у латеральной поверхности лицевого бугорка имеется неглубокая впадина — *верхняя ямка, fovea rostralis [superior]*, являющаяся как бы расширением пограничной борозды. В нижних отделах пограничной борозды переходит в *нижнюю ямку, fovea caudalis [inferior]*.



**945. Ядра черепных нервов, nuclei nervorum cerebralis, в области среднего и ромбовидного мозга (полусхематично).  
(Проекция ядер с дорсальной стороны.)**

Кзади от нижней части лицевого бугорка в поперечном направлении проходит ряд тонких, белого цвета волокон — мозговых полосок IV желудочка, *striae medullares ventriculi quarti*. Они расположены в промежуточной части ромбовидной ямки. Возникают мозговые полоски у вестибулярного поля, *area vestibularis*, отходя от клеток заднего ядра улиткового нерва и направляются к срединной борозде. Они идут по поверхности ромбовидной ямки горизонтально, пересекая пограничную борозду, вдоль вестибулярного поля.

Медиальнее вестибулярного поля располагается *треугольник подъязычного нерва*, *trigonum n. hypoglossi*, латеральное и несколько ниже его, под нижней ямкой, имеется небольшой темно-коричневого цвета участок — *треугольник блуждающего нерва*, *trigonum n. vagi*. Еще ниже расположен испещренный мелкими бороздками участок, кзади от которого срединная борозда ромбовидной ямки переходит в центральный канал спинного мозга. Этот участок прикрыт задвижкой — концом нижнего края крыши IV желудочка, под задвижкой имеется вход в центральный канал.

Узкое возвышение, окаймляющее нижний край треугольника блуждающего нерва, обозначают как *самостоятельный канатик*, *funiculus separans*. Между последним и бугорком тонкого ядра имеется небольшая площадка в форме лепестка — *самое заднее поле*, *area postrema*. Обе эти структуры покрыты специализированной утолщенной эпендимой; ее клетки выполняют хеморецепторную функцию.

#### ЯДРА ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ, ЗАЛЕГАЮЩИЕ В СТВОЛЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА

В стволовой части мозга серое вещество представлено в виде отдельных скоплений клеток — ядер, причем почти все они расположены в задних отделах ножек мозга, моста и продолговатого мозга (рис. 945, 946).

Ядра глазодвигательного и блокового нервов залегают в задних отделах ножек мозга.

Ядра глазодвигательного нерва, *nuclei n. oculomotorii*, локализуются в покрышке ножек мозга, на уровне верхних холмиков крыши среднего мозга. Среди них различают соматические ядра и автономное (вегетативное) ядро — добавочное ядро глазодви-

гательного нерва, *nucleus oculomotorius accessorius*.

Ядро блокового нерва, *nuclei n. trochlearis*, лежит в покрышке ножек мозга, на уровне нижних холмиков крыши среднего мозга.

Все ядра черепных нервов — от V до XII пары — залегают в задних отделах моста и продолговатого мозга и проецируются в различных участках ромбовидной ямки.

Ядра тройничного нерва, *nuclei n. trigemini*, расположены на протяжении всей длины ромбовидной ямки. Различают двигательное и чувствительные ядра. Двигательное ядро, *nucleus motorius n. trigemini*, залегает в заднем отделе моста, причем со стороны ромбовидной ямки основная часть ядра проецируется кнутри от области голубоватого места. Мостовое ядро тройничного нерва, *nucleus pontinus n. trigemini*, является его сенсорным ядром. Оно лежит в заднем отделе моста и со стороны ромбовидной ямки проецируется спереди и немного кнаружи от лицевого бугорка в области голубоватого места. Спинномозговое ядро тройничного нерва, *nucleus spinalis n. trigemini*, вытянутое, располагается в задних отделах продолговатого мозга, доходя до шейных сегментов спинного мозга. Ядро среднемозгового пути тройничного нерва, *nucleus tractus mesencephalici n. trigemini*, поднимается вдоль моста и среднего мозга до задней белой спайки, располагаясь в центральном сером веществе сбоку от водопровода мозга.

Ядро отводящего нерва, *nucleus n. abducens*, залегает в задней части моста и со стороны ромбовидной ямки соответствует лицевому бугорку.

К ядрам лицевого нерва относится не только двигательное ядро лицевого нерва, *nucleus n. facialis*, но и вегетативное (секреторное) ядро промежуточного нерва — верхнее слюноотделительное ядро, *nucleus salivatorius rostralis [superior]*, часть которого составляет слезное ядро, *nucleus lacrimalis*, и чувствительное ядро одиночного пути, *nucleus solitarius*. Они залегают несколько спереди, ниже и кнаружи от ядра отводящего нерва и со стороны ромбовидной ямки проецируются латеральнее лицевого бугорка.

Ядра преддверно-улиткового нерва представлены вестибулярными ядрами, *nuclei vestibulares*, и улитковыми ядрами, *nuclei cochleares*. Каждая из

этих групп образуется несколькими ядрами. Большинство из них расположено на границе между мостом и продолговатым мозгом и со стороны ромбовидной ямки проецируется в области вестибулярного поля. Выделяют следующие вестибулярные ядра: верхнее вестибулярное ядро, *nucleus vestibularis rostralis [superior]*; медиальное вестибулярное ядро, *nucleus vestibularis medialis*; латеральное вестибулярное ядро, *nucleus vestibularis lateralis*, и нижнее вестибулярное ядро, *nucleus vestibularis caudalis [inferior]* (залегает полностью в продолговатом мозге).

Улитковые ядра представлены двумя небольшими ядрами, занимающими наиболее латеральное положение вестибулярного поля: передним улитковым ядром, *nucleus cochlearis ventralis [anterior]*, и задним улитковым ядром, *nucleus cochlearis dorsal [posterior]*.


Языкоглоточный нерв имеет двигательное соматическое, так называемое двойное ядро, *nucleus ambiguus*, чувствительное ядро одиночного пути, *nucleus solitarius*, и вегетативное (секреторное) нижнее слюноотделительное ядро, *nucleus salivatorius caudalis [inferior]*. Все указанные ядра залегают в задней части продолговатого мозга, причем двигательное ядро является также ядром блуждающего нерва.

Со стороны ромбовидной ямки ядра языко-глоточного нерва проецируются в области треугольника блуждающего нерва.

Блуждающий нерв имеет три ядра: вегетативное заднее ядро блуждающего нерва, *nucleus dorsalis n. vagi*, двигательное двойное ядро, *nucleus ambiguus*, и чувствительное ядро одиночного пути, *nucleus solitarius*.

Ядра добавочного нерва, *nuclei n. accessorii*, залегают не только в стволовой части мозга, но и в спинном мозге. Двойное ядро, *nucleus ambiguus*, лежит в продолговатом мозге, а в спинном мозге — ядро добавочного нерва, *nucleus n. accessorii*. Оно располагается в сером веществе спинного мозга, в дорсальной части передних рогов, на протяжении 5—6 верхних шейных сегментов.

Ядра подъязычного нерва, *nuclei n. hypoglossi*, локализуются в дорсальных отделах продолговатого мозга и со стороны ромбовидной ямки проецируются в области треугольника подъязычного нерва.



946. Ядра черепных нервов, nuclei nervorum cerebralium, в области среднего и ромбовидного мозга (полусхематично).  
(Проекция ядер с боковой стороны.)

## КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОВОДЯЩИХ ПУТЕЙ СПИННОГО И ГОЛОВНОГО МОЗГА

Совокупность аксонов нервных клеток в спинном и головном мозге, которые являются проводниками однородных импульсов, носит название проводящего пути. Все проводящие пути спинного и головного мозга подразделяются на афферентные (восходящие), или центростремительные, эфферентные (нисходящие), или центробежные, и сочетательные, или ассоциативные.

Ассоциативные нервные пути осуществляют связи между нейронами в пределах спинного мозга или той или иной части головного мозга, не выходя за пределы производных каждого мозгового пузьря.

Афферентные, или центростремительные, нервные пути (рис. 947) проводят импульсы от экстеро-, proprio- и интерорецепторов к мозжечку, таламусу, оливам и крыше среднего мозга. Каждый из этих путей проводит импульсы от определенного вида рецепторов. В спинном мозге восходящие пути образованы аксонами клеток, залегающих в спинномозговых узлах, или аксонами клеток, образующих ядра задних рогов спинного мозга. Указанные аксоны в составе одних путей проходят в той половине спинного мозга, с которой связаны рецепторы этих путей, в составе других — переходят в другую половину спинного мозга, т. е. происходит перекрест. В головном мозге восходящие пути состоят из аксонов клеток чувствительных ядер черепных нервов. Эти аксоны по выходе из ядра обычно совершают перекрест — переходят на противоположную сторону.

На пути к мозжечку или ядрам области таламуса центробежные импульсы проходят два нейрона: афферентный, лежащий в периферическом ганглии, и вставочный — в спинном мозге или стволе мозга (продолговатый мозг, мост).

Достигнув области таламуса, восходящие пути заканчиваются на нервных клетках его ядер. В последних локализуются тела третьих нейронов восходящих путей, по которым центростремительные импульсы достигают коры головного мозга.

Участки коры головного мозга, к которым подходят восходящие пу-

ти (от органов зрения, вкуса, слуха, обоняния, кожи, внутренних органов), носят название корковых отделов анализаторов: зрительного, вкусового, слухового, обонятельного, кожного, внутреннего (интерорецептивного) и мышечного (двигательного).

Таким образом, в состав анализатора входят афферентные нейроны, нейроны спинного мозга и ствола мозга, а также все клетки коры, участвующие в реакции на импульсы, вызванные раздражением рецепторов.

Эфферентные, или центробежные, пути (рис. 948, 949) представляют собой следующее:

1) совокупность аксонов определенного вида клеток коры полушарий большого мозга, которые передают нервные импульсы клеткам двигательных ядер черепных нервов или клеткам ядер передних рогов (столов) спинного мозга;

2) совокупность аксонов клеток базальных ядер полушарий большого мозга и ряда ядер ствола, передающих нервные импульсы к эфферентным нейронам спинного мозга и ствола головного мозга.

Первая группа волокон образует пирамидную систему, а вторая — экстрапирамидную систему путей.

Имеются также эфферентные пути вегетативной (автономной) нервной системы, которые из области гипоталамуса передают импульсы на эфферентные нейроны вегетативной (автономной) нервной системы.

Как пути экстрапирамидной системы, так и пути вегетативной (автономной) нервной системы находятся под влиянием коры полушарий большого мозга, которое обеспечивается наличием пучков нервных волокон, соединяющих кору полушарий с базальными ядрами, гипоталамусом и другими ядрами этих систем.

Корковый отдел каждого анализатора состоит из ядра, занимающего определенный участок в коре головного мозга (рис. 950), и рассеянной части — нервных клеток, которые находятся за пределами этих участков.

Ядра *двигательного анализатора* локализуются в предцентральной извилине, задних отделах средней и нижней лобных извилин. В верхнем отделе предцентральной извилины и в паракентральной дольке находятся корковые отделы двигательных анализаторов мышц нижней конечности, ниже — мышц таза, брюшной

стенки, туловища, верхних конечностей, шеи и, наконец, в самом нижнем отделе — головы. В заднем отделе средней лобной извилины расположена корковый отдел *двигательного анализатора сочетанного поворота головы и глаз*. Здесь находится и *двигательный анализатор письменной речи*, имеющий отношение к произвольным движениям, связанным с написанием букв, цифр и других знаков. Задний отдел нижней лобной извилины является местом расположения ядра *двигательного анализатора устной речи*.

Корковый отдел *обонятельного анализатора* (*и вкуса*) находится в крючке височной доли, *зрительного* — занимает кору края шпорной борозды (затылочная доля), *слухового* — в коре средней части верхней височной извилины. В задней части верхней височной извилины расположен *слуховой анализатор речевых сигналов* (контроль своей и восприятие чужой речи). *Зрительный анализатор письменных знаков* локализуется в коре угловой извилины.


Корковый отдел *анализатора общей чувствительности*: температурной, болевой, осязательной, мышечно-суставной — располагается в постцентральной извилине; проекция отдельных частей тела здесь такая же, как и в двигательном анализаторе. В верхней теменной дольке имеется область коры, обеспечивающая функцию узнавания предметов на ощупь (*стереогноз*), а в нижней теменной дольке — двигательный анализатор, ответственный за воспроизведение военных в течение жизни координированных движений (праксия, у правшей — слева).

Корковые концы анализаторов связаны с их периферическими отделами (с рецепторами) системой проводящих путей головного и спинного мозга и отходящих от них нервов.

## ВОСХОДЯЩИЕ (АФФЕРЕНТНЫЕ) ПУТИ СПИННОГО И ГОЛОВНОГО МОЗГА

### *Восходящие (афферентные) пути, начинающиеся в спинном мозге*

Тела первых нейронов — проводников всех видов чувствительности к спинному мозгу — лежат в спинномозговых узлах. Аксоны клеток спинномозговых узлов в составе задних кореш-



947. Восходящие пути спинного и головного мозга; правое полушарие (полусхематично).  
(Проекция волокон на поверхность полушария.)

ков вступают в спинной мозг и делятся на две группы: медиальную, состоящую из толстых, более миелинизованных волокон, и латеральную, образуемую тонкими, менее миелинизованными волокнами.

Медиальная группа волокон заднего корешка направляется в задний канатик белого вещества, где каждое волокно делится Т-образно на восходящую и нисходящую ветви. Восходящие ветви, следя кверху, вступают в контакт с клетками серого вещества спинного мозга в студенистом веществе и в заднем роге, а часть их доходит до продолговатого мозга, образуя тонкий и клиновидный пучки, *fasciculi gracilis et cuneatus* (см. рис. 880—882), спинного мозга.

Нисходящие ветви волокон направляются вниз и вступают в контакт с клетками серого вещества задних столбов на протяжении шести—семи

нижележащих сегментов. Часть этих волокон образует в грудном и шейном отделах спинного мозга пучок, имеющий на поперечном сечении спинного мозга вид запятой и расположенный между клиновидным и тонким пучками; в поясничном отделе — вид медиального тяжа; в крестцовом отделе — вид овального пучка заднего канатика, примыкающего

к медиальной поверхности тонкого пучка.

Латеральная группа волокон заднего корешка направляется в краевую зону, а затем в задний столб серого вещества, где вступает в контакт с расположенными в нем клетками заднего рога.

Волокна, отходящие от клеток ядер спинного мозга, направляются кверху частично по боковому канатику своей стороны, а частично переходят в составе белой спайки на противоположную сторону спинного мозга и также направляются кверху в боковом канатике.


К восходящим путям (см. рис. 880—882), начинающимся в спинном мозге, относят следующие:

1. Задний спинно-мозжечковый путь, *tractus spinocerebellaris dorsalis [posterior]* — прямой мозжечковый путь, проводит импульсы от рецеп-

#### 948. Нисходящие пути спинного и головного мозга (полусхематично; фронтальный разрез).

(Проекция волокон на поверхность мозга.)

Обозначение волокон отсутствует в современной *Nomina Anatomica*.



торов мышц и сухожилий к мозжечку. Тела первых нейронов лежат в спинномозговом узле, тела вторых нейронов — на всем протяжении спинного мозга в грудном столбе (грудном ядре) заднего рога. Длинные отростки вторых нейронов идут книзу; достигнув задненаружного отдела спинного мозга той же стороны, заворачивают вверх и поднимаются вдоль бокового канатика спинного мозга, а затем по нижней мозжечковой ножке следуют к коре червя мозжечка.


2. *Передний спинно-мозжечковый путь*, *tractus spinocerebellaris ventralis [anterior]*, проводит импульсы от рецепторов мышц и сухожилий к мозжечку. Тела первых нейронов лежат в спинномозговом узле, а вторых нейронов — в медиальном ядре промежуточной зоны и посыпают часть своих волокон через белую спайку в боковые канатики противоположной сто-

роны, а часть — в боковые канатики своей стороны. Указанные волокна достигают передненаружных отделов боковых канатиков, располагаясь спереди от заднего спинно-мозжечкового пути. Здесь волокна заворачивают вверх, идут по спинному, а затем по продолговатому мозгу и, пройдя мост, по верхним мозжечковым ножкам, совершив второй перекрест, достигают червя мозжечка.

#### 949. Нисходящие пути спинного и головного мозга; верхнелатеральная поверхность (полусхематично). (Проекция волокон на поверхность полушария.)

3. *Спинно-оливный путь*, *tractus spinoolivaris*, берет начало от клеток задних рогов серого вещества. Аксоны этих клеток перекрещиваются и поднимаются вблизи поверхности спинного мозга на границе бокового и переднего канатиков, заканчиваясь в ядрах оливы. Волокна этого пути несут информацию от кожных, мышечных и сухожильных рецепторов.

4. *Передний и латеральный спинно-таламические пути*, *tractus spinothalamici ventralis [anterior] et lateralis* (см. рис. 947), проводят импульсы болевой, температурной (латеральный путь) и тактильной (передний путь) чувствительности. Тела первых нейронов лежат в спинномозговых ганглиях. Отростки вторых нейронов от клеток собственного ядра заднего рога направляются через белую спайку в передний и боковой канатики противоположной стороны. Поднимаясь



вверх, волокна этих путей проходят в задних отделах продолговатого мозга, моста и ножек мозга и достигают таламуса в составе спинномозговой петли, *lemniscus spinalis*. В таламусе залегают тела третьих нейронов этих путей, а их отростки направляются к коре головного мозга в составе центральных таламических лучистостей через заднюю ножку внутренней капсулы (рис. 951, 952).

5. Спинно-ретикулярный путь, *tractus spinoreticularis*, составляют волокна, которые проходят в составе спинно-таламических путей, не перекрещиваются и образуют двусторонние проекции на все отделы стволовой ретикулярной формации.


6. Спинно-покрышечный путь, *tractus spinotectalis*, вместе со спинно-таламическим путем проходит в боковых канатиках спинного мозга и заканчивается в пластинке крыши среднего мозга.

7. Тонкий пучок, *fasciculus gracilis*, и клиновидный пучок, *fasciculus cuneatus* (см. рис. 947), проводят импульсы от мышц, суставов и рецепторов тактильной чувствительности. Тела первых нейронов этих путей локализуются в соответствующих спинномозговых узлах. Аксоны идут в составе задних корешков и, вступив в задние столбы спинного мозга, принимают восходящее направление, достигая ядер продолговатого мозга.


Тонкий пучок занимает медиальное положение и проводит соответствующие импульсы от нижних конечностей и нижних частей туловища — ниже 4-го грудного сегмента.

Клиновидный пучок образуется волокнами, начинающимися от клеток всех спинномозговых узлов, лежащих выше 4-го грудного сегмента.

Достигнув продолговатого мозга, волокна тонкого пучка вступают в контакт с клетками ядра этого пучка, лежащего в бугорке тонкого ядра; волокна клиновидного пучка заканчиваются в клиновидном бугорке. Клетки обоих бугорков являются телами вторых нейронов описываемых путей. Их аксоны — внутренние дугообразные волокна, *fibrae arcuatae internae*, — направляются вперед и вверх, переходят на противоположную сторону и, образуя перекрест медиальных петель (чувствительный перекрест), *decussatio lemniscorum medialis* (*decussatio sensoria*), с волокнами противоположной стороны, идут в составе медиальной петли, *lemniscus medialis*.



А



Б

Достигнув таламуса, эти волокна вступают в контакт с его клетками — телами третьих нейронов пути, которые посыпают через внутреннюю капсулу свои отростки к коре головного мозга.

#### **Восходящие (афферентные) пути, начинающиеся в стволе головного мозга**

В стволе головного мозга начинаются медиальная петля, тройничная пет-

#### **950. Ядра анализаторов в коре большого мозга.**

А — верхнелатеральная поверхность: 1 — двигательная зона коры; 2 — ядро кожного анализатора; 3 — центр целенаправленных комбинированных движений; 4 — зрительный анализатор письменной речи; 5 — слуховой анализатор устной речи; 6 — зрительный анализатор; 7 — слуховой анализатор; 8 — вкусовой анализатор; 9 — двигательный анализатор устной речи; 10 — двигательный анализатор сочетанного поворота головы и глаз; 11 — двигательный анализатор письменной речи. Б — медиальная и нижняя поверхности: 1 — вкусовой анализатор; 2 — обонятельный анализатор; 3 — зрительный анализатор; 4 — центр стереогностического чувства; 5 — ядро кожного анализатора.

ля, восходящий путь слухового анализатора, зрительная лучистость, таламические лучистости.

1. *Медиальная петля* как продолжение тонкого и клиновидного пучков описана ранее.

2. *Тройничная петля*, *lemniscus trigeminalis*, образована отростками нервных клеток, составляющих чувствительные ядра тройничного нерва (V пара), лицевого нерва (VII пара), языкошлотового нерва (IX пара) и блуждающего нерва (X пара).

К чувствительным ядрам тройничного нерва подходят аксоны афферентных нейронов, залегающих в тройничном узле. К общему чувствительному ядру трех других нервов — ядру одиночного пути — подходят аксоны афферентных нейронов, залегающих в узле коленца (VII пара)


и в верхних и нижних узлах IX и X пар нервов. В перечисленных узлах локализуются тела первых нейронов, а в чувствительных ядрах — тела вторых нейронов пути, по которому передаются импульсы от рецепторов головы.

Волокна тройничной петли переходят на противоположную сторону (часть волокон следует на своей стороне) и достигают таламуса, где заканчиваются в его ядрах.


Нервные клетки таламуса являются телами третьих нейронов восходящих путей черепных нервов, аксоны которых в составе центральных таламических лучистостей через внутреннюю капсулу направляются к коре головного мозга (постцентральная извилина).

3. *Восходящий путь слухового ана-*

*лизатора* имеет в качестве первых нейронов клетки, залегающие в узле улитковой части преддверно-улиткового нерва. Аксоны этих клеток подходят к клеткам переднего и заднего улитковых ядер (вторые нейроны). Отростки вторых нейронов, переходя на противоположную сторону, образуют трапециевидное тело, а затем принимают восходящее направление и получают название *латеральной петли*, *lemniscus lateralis*. Эти волокна заканчиваются на телах третьих нейронов слухового пути, залегающих в латеральном коленчатом теле. Отростки третьих нейронов образуют *слуховую лучистость*, *radiatio acustica*, которая идет от медиального коленчатого тела через заднюю ножку внутренней капсулы к средней части верхней височной извилины.



951. Капсулы и ход проводящих путей через внутреннюю капсулу (полусхематично).



952. Проводящие пути внутренней капсулы и ножек мозга (полусхематично).

4. Зрительная лучистость, *radiatio optica* (см. рис. 951), соединяет подкорковые центры зрения с корой шпорной борозды.

В состав зрительной лучистости входят две системы восходящих волокон:

а) коленчато-корковый зрительный тракт, который начинается от клеток латерального коленчатого тела;

б) подушково-корковый тракт, начинающийся от клеток ядра, залегающего в подушке таламуса; у человека развит слабо.

Совокупность этих волокон обозначают как задние таламические лучистости, *radiationes thalamicae posteriores*.

Поднимаясь к коре мозга, обе системы проходят через заднюю ножку внутренней капсулы.

5. Таламические лучистости, *radiationes thalamicae* (см. рис. 947), образованы отростками клеток таламуса и составляют конечные отделы восходящих путей коркового направления.

В состав таламических лучистостей входят:

а) передние таламические лучистости, *radiationes thalamicae anteriores*,— радиально идущие волокна белого вещества больших полушарий. Они начинаются от верхнего медиального ядра таламуса и направляются через переднюю ножку внутренней капсулы в кору боковой и нижней поверхностей лобной доли. Часть волокон передних таламических лучистостей связывает переднюю группу ядер таламуса с корой медиальной поверхности лобных долей и передней части поясной извилины;

б) центральные таламические лучистости, *radiationes thalamicae centrales*,— радиальные волокна, связывающие вентролатеральную группу ядер таламуса с корой пре- и постцентральной извилины, а также с прилежащими отделами коры лобной и теменной долей. Проходят в составе задней ножки внутренней капсулы;

в) нижняя ножка таламуса, *pedunculus thalami inferior*, содержит радиальные волокна, связывающие подушку таламуса и медиальные коленчатые тела с участками височной коры;

г) задние таламические лучистости (см. ранее).

## ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ МОЗЖЕЧКА

Белое вещество мозжечка состоит из трех групп волокон: 1) ассоциативных, соединяющих различные извилины в пределах одного полушария мозжечка; 2) комиссуральных, переходящих из одного полушария в другое; 3) проекционных. Проекционные волокна мозжечка— восходящие и нисходящие (рис. 953)— проходят в мозжечковых ножках и соединяются его со спинным мозгом и стволом головного мозга, с подкорковыми ядрами и корой полушарий.

Проводящие пути, обеспечивающие взаимодействие мозжечка с корой большого мозга, представлены корково-мостовыми волокнами [см. «Нисходящие (эфферентные) пути головного и спинного мозга»], которые заканчиваются на клетках ядер моста, и отростками последних, составляющими мостомозжечковые волокна, *fibrae pontocerebellares*. Эти волокна переходят на противоположную сторону и в составе средней мозжечковой ножки достигают коры мозжечка.

## Восходящие (афферентные) пути мозжечка

1. Задний спинно-мозжечковый путь и передний спинно-мозжечковый путь (см. рис. 882, 953) (см. «Восходящие пути, начинающиеся в спинном мозге»).

2. Передние и задние наружные дугообразные волокна, *fibrae arcuatae externae ventrales [anteriores] et dorsales [posterioribus]*, проходят в нижней мозжечковой ножке от ядер тонкого и клиновидного пучков своей и противоположной сторон к коре червя мозжечка.

3. Ядерно-мозжечковый путь (см. рис. 953) приходит в нижней мозжечковой ножке, связывает вестибулярные ядра с шаровидным ядром и ядром шатра, а также чувствительные ядра тройничного, языгоглоточного и блуждающего нервов с корой червя мозжечка.

4. Оливомозжечковый путь, *tractus olivocerebellaris* (см. рис. 953), проходит в нижней мозжечковой ножке и соединяет клетки ядра оливы своей и противоположной сторон с корой мозжечка.

## Нисходящие (эфферентные) пути мозжечка

Нисходящие проекционные волокна мозжечка соединяют последний с ядрами мозгового ствола (латеральное вестибулярное ядро, красное ядро, таламус).

1. Мозжечково-красноядерный путь, *tractus cerebellorubralis* (см. рис. 954), начинается от клеток коры мозжечка, отростки которых направляются к пробковидному, шаровидному и зубчатому ядрам. Волокна, отходящие от клеток этих ядер, идут по верхней мозжечковой ножке, переходят в среднем мозге на противоположную сторону и заканчиваются в красном ядре.

2. Зубчато-таламический путь, *tractus dentothalamicus* (см. рис. 954), начинается в зубчатом ядре, идет в составе верхней мозжечковой ножки, переходит в область среднего мозга на противоположную сторону. Здесь волокна этого пути проходят через красное ядро, не переключаясь на его клетки, достигают нижних ядер таламуса и оканчиваются на клетках последних.


3. Мозжечково-ядерный путь, *tractus cerebellonuclearis* (см. рис. 954), идет от коры червя мозжечка на противоположную сторону к ядру шатра, проходит в нижних мозжечковых ножках к продолговатому мозгу и затем к латеральному вестибулярному ядру и ретикулярной формации. Отростки клеток латерального вестибулярного ядра следуют в составе продольного пучка, волокна которого соединяются с клетками двигательных ядер глазодвигательного, блокового и отводящего нервов.

4. Дугообразный пучок, *fasciculus arcuatus*, соединяет клетки язычка, клетки ядра шатра с латеральным, медиальным и верхним преддверными ядрами.

## НИСХОДЯЩИЕ (ЭФФЕРЕНТНЫЕ) ПУТИ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА

Нисходящие (см. рис. 948, 949, 951) пути головного мозга берут начало в коре полушарий большого мозга и в ядрах ствола мозга. Заканчиваются эти пути либо в ядрах ствола мозга, либо на клетках передних столбов серого вещества спинного мозга.

От клеток двигательной области коры головного мозга двигательные,



953. Восходящие и нисходящие  
пути ствола головного мозга  
и мозжечка (полусхематично).

проекционные волокна идут в составе *лучистого венца*, *corona radiata*, и через внутреннюю капсулу выходят за пределы полушарий.

К нисходящим (двигательным, эфферентным) путям относят следующие:

1. *Корково-таламические волокна*, *fibrae corticothalamicae*, соединяют кору большого мозга с таламусом.

2. *Корково-красноядерные волокна*, *fibrae corticorubrales*, идут от коры лобных долей полушарий большого мозга (область покрышечной части) к красному ядру.

3. *Лучистость полосатого тела* представляет собой систему волокон, соединяющих клетки коры (экстрапирамидные области лобной и теменной долей большого мозга) с ядрами полосатого тела, и волокон, соединяющих хвостатое и чечевицеобразное ядра с таламусом, которые образуют *чечевицеобразные петлю и пучок*, *ansa et fasciculus lenticulares* (см. рис. 948, 952).

4. *Корково-мостовые волокна*, *fibrae corticopontinae* (см. рис. 951), начинаются в различных отделах коры полушарий большого мозга и заканчиваются в ядрах моста, где берут начало мостомозжечковые волокна, направляющиеся в противоположное полушарие мозжечка. Корково-мостовые волокна подразделяются на лобномостовые и теменно-височно-мостовые волокна:

а) *лобно-мостовые волокна*, *fibrae frontopontinae*, берут начало в коре лобной доли, проходят в передней ножке внутренней капсулы, вентральной части ножки мозга и заканчиваются в ядрах моста;

б) *теменно-височно-мостовые волокна*, *fibrae parietotemporopontinae*, начинаются в коре теменной и височной долей, проходят в задней ножке внутренней капсулы, вентральной части ножки мозга и заканчиваются в ядрах моста.

5. *Пирамидные пучки*, *fasciculi pyramidales* (некоторые авторы называют их пирамидными путями) (см. рис. 928, 948, 949, 951), начинаются от крупных пирамидных клеток двигательной зоны коры полушарий большого мозга (предцентральная извилина), идут в составе лучистого венца, через заднюю ножку внутренней капсулы выходят из полушарий и вступают в ножку мозга. Спускаясь ниже, пирамидные пучки проходят основание ножек мозга, образуя по-

пути пирамидные возвышения на передней части моста и пирамиды продолговатого мозга.

В составе пирамидных пучков различают корково-ядерные, корково-ретикулярные волокна и корково-спинномозговые пути:

а) *корково-ядерные волокна*, *fibrae corticonucleares*, проходят в колене внутренней капсулы, следуют по базальным отделам ножки мозга, моста и продолговатого мозга и заканчиваются в двигательных ядрах черепных нервов противоположной стороны;

б) *корково-ретикулярные волокна*, *fibrae corticoreticulares*, следуют от коры к ядрам ретикулярной формации;

в) *корково-спинномозговые пути*, *tractus corticospinales*, направляясь в спинной мозг, на границе между продолговатым и спинным мозгом в области перекреста пирамид образуют частичный перекрест: одна часть волокон переходит на противоположную сторону, образуя *латеральный корково-спинномозговой [пирамидный] путь*, *tractus corticospinalis [pyramidalis] lateralis*. Волокна этого пути следуют в боковые канатики белого вещества спинного мозга; другая часть волокон, не перекрециваясь, направляется в передние канатики белого вещества спинного мозга, образуя *передний корково-спинномозговой [пирамидный] путь*, *tractus corticospinalis [pyramidalis] ventralis [anterior]*. Перекрест волокон происходит на уровне того сегмента, где они оканчиваются на клетках передних столбов.

Латеральный корково-спинномозговой путь в боковом канатике спинного мозга на всем его протяжении располагается кнутри от заднего спинно-мозжечкового пути и вступает в контакт с клетками передних столбов серого вещества спинного мозга.

Передний корково-спинномозговой путь спускается по переднему канатику белого вещества спинного мозга, занимая его медиальную часть. Часть волокон этого пути переходит посегментно в составе белой спайки спинного мозга на противоположную сторону, где вступает в контакт с клетками передних столбов серого вещества спинного мозга. Меньшая часть волокон может вступать в контакт с клетками передних столбов серого вещества спинного мозга своей стороны.

Волокна, составляющие корково-спинномозговой путь, являются от-

ростками первых нейронов двигательного пути произвольных движений, второй нейрон этого пути — клетки передних рогов серого вещества спинного мозга, отростки которых входят в состав передних корешков спинномозговых нервов.

6. *Красноядерно-спинномозговой путь*, *tractus rubrospinalis* (см. рис. 948, 949, 952, 953), начинается в красном ядре и направляется в спинной мозг. Нисходящие волокна, отходящие от клеток красного ядра, образуют в среднем мозге перекрест с одноименными волокнами противоположной стороны и, направляясь вниз, проходят ножки мозга, мост и продолговатый мозг.

В спинном мозге волокна красноядерно-спинномозгового пути (см. рис. 882) проходят в боковых канатиках белого вещества, спереди от латерального корково-спинномозгового пути, и вступают в контакт с клетками передних столбов серого вещества спинного мозга.

Красноядерно-спинномозговой путь осуществляет связи экстрапирамидной системы и мозжечка со спинным мозгом.

7. *Покрышечно-спинномозговой путь*, *tractus tectospinalis* (см. рис. 882, 928, 949, 953), состоит из нисходящих волокон клеток ядер холмиков крыши среднего мозга. Эти волокна в среднем мозге образуют перекрест с волокнами противоположной стороны и, направляясь вниз, проходят в спинном мозге в составе передних канатиков его белого вещества, вступая в контакт с клетками передних столбов серого вещества.

Часть перекрещенных волокон, следующих в составе покрышечно-спинномозгового пути, заканчивается на клетках ядер моста и двигательных ядер черепных нервов. Эти волокна образуют *покрышечно-бульбарный путь*, *tractus tectobulbaris*.

8. *Преддверно-спинномозговой путь*, *tractus vestibulospinalis* (см. рис. 882, 953), образован нисходящими волокнами латерального вестибулярного ядра. Часть волокон этого пути идет в боковых канатиках белого вещества спинного мозга, образуя боковой преддверно-спинномозговой путь, который располагается вентральнее красноядерно-спинномозгового пути. Другая часть волокон направляется в передний канатик белого вещества спинного мозга и образует передний преддверно-спинномозговой путь.

Наиболее медиально расположенные волокна этого пути обозначают как *пучок краевой борозды*, *fasciculus sulcomarginalis* (см. рис. 882). Волокна обоих путей вступают в контакт с клетками передних рогов.


9. *Луковично-ретикулярно-спинномозговой путь*, *tractus bulboreticulospinalis* (см. рис. 953), состоит из аксонов крупных клеток ретикулярной формации продолговатого мозга.

Волокна этого пути перекрещиваются, проходят в боковом канатике спинного мозга и контактируют со вставочными и двигательными нейронами передних серых столбов. Волокна данного пути в составе передних канатиков спинного мозга обозначают также как *ретикулярно-спинномозговой путь*, *tractus reticulospinalis*.

10. *Мосторетикулярно-спинномозговой путь*, *tractus pontoreticulospinalis* (см. рис. 953), образован аксонами клеток ретикулярной формации моста. Волокна этого пути не перекре-

щаются. Они спускаются в составе переднего канатика, располагаясь в его медиальной части, и контактируют со вставочными нейронами передних серых столбов. Волокна данного пути в составе передних канатиков спинного мозга обозначают также как *ретикулярно-спинномозговой путь*, *tractus reticulospinalis*.

11. *Центральный покрышечный путь*, *tractus tegmentalis centralis* (см.



**954. Оболочки головного и спинного мозга.**  
(Распил, проведенный немного влево от срединной плоскости; виден серп большого мозга и его отношение к мозолистому телу.)

рис. 928, 932, 942), проходит в покрышке среднего мозга латеральное медиального продольного пучка. Его волокна начинаются главным образом от клеток серого вещества вокруг водопровода мозга, базальных ганглиев, таламуса и красного ядра; направляясь вниз, они связывают указанные структуры с ретикулярной формацией ствола мозга и ядрами нижней оливы.

12. *Оливоулитковый путь*, *tractus olivocochlearis*, образован эfferентными волокнами улиткового нерва, иннервирующими спиральный орган. Эти волокна берут начало от верхнеоливного ядра и направляются к спиральному органу как своей, так и противоположной стороны.

13. *Оливоспинномозговой путь*, *tractus olivospinalis* (см. рис. 882, 953), соединяет ядра оливы с двигательными клетками передних столбов верхних шейных сегментов спинного мозга.

## МОЗГОВЫЕ ОБОЛОЧКИ СПИННОГО И ГОЛОВНОГО МОЗГА

Спинной и головной мозг окружен *мозговыми оболочками*, *meninges* (рис. 954). Различают три оболочки.

**Твердая оболочка**, *dura mater*,— самая наружная.

**Паутинная оболочка**, *arachnoidea*,— средняя, располагается кнутри от твердой оболочки.


**Мягкая оболочка**, *pia mater*,— самая внутренняя.

Каждая из оболочек спинного мозга непосредственно продолжается в одноименную оболочку головного мозга, однако каждую из них в спинном и головном мозге отличает ряд анатомо-топографических особенностей, в силу чего различаются *мозговые оболочки спинного мозга*, *meninges spinalis*, и *мозговые оболочки головного мозга*, *meninges encephali*.


Между твердой оболочкой спинного мозга и позвонками образуются пространства, выполненные жировой и рыхлой соединительной тканью. В них располагается обширная сеть венозных сосудов (внутренние позвоночные венозные сплетения), отделяющих твердую оболочку спинного мозга от надкостницы позвонков. Это пространство получило название *эпидурального пространства*, *cavitas epiduralis*.

Твердая оболочка головного мозга срастается с надкостницей черепа (по существу последняя не развивается) и представляет одно целое с ней. Венозных сплетений в полости черепа нет. Здесь в ряде мест между двумя пластинками твердой оболочки залегают *синусы твердой мозговой оболочки*, *sinus durae matris* (см. далее). В полости черепа эпидуральное пространство отсутствует.

В пространстве между твердой и паутинной оболочками—*субдуральном пространстве*, *spatium subdurale*, проходят выходящие из головного и спинного мозга нервные корешки. Здесь они сопровождаются паутинной и мягкой оболочками. Проникая через твердую мозговую оболочку, нервы и сосуды сопровождаются элементами этой оболочки, которая в начальных отрезках



955. Оболочки спинного мозга, *meninges medullae spinalis*; вид сзади.  
(Дуги и остистые отростки двух позвонков удалены).



образует их наружное влагалище. Твердая оболочка снабжается нервами и сосудами, так же как и мягкая оболочка; паутинная оболочка со- судов не имеет. Мягкая оболочка не только окутывает головной и спин- ной мозг, но и следует внутрь их борозд, поэтому заложенные в ней сосуды, проникая в глубь борозд, проходят и в само вещество мозга.

#### ТВЕРДАЯ МОЗГОВАЯ ОБОЛОЧКА


**Твердая мозговая оболочка**, *dura mater*, представляет собой блестя- щую, беловатого цвета оболочку из плотной фиброзной ткани с большим количеством эластических волокон. Ее наружная шероховатая поверх-

#### 956. Оболочки спинного мозга, meninges medullae spinalis; вид сверху. (Поперечный разрез через межпозвоночный хрящ.)

ность обращена к внутренней по- верхности позвоночного канала и ко- стей черепа; своей внутренней глад- кой блестящей поверхностью, покры- той плоскими эпителиоидными клетками, она направлена к паутин- ной оболочке.

#### Твердая оболочка спинного мозга

**Твердая оболочка спинного мозга**, *dura mater spinalis* (рис. 955, 956), образует широкий, вытянутый сверху вниз ци- линдрической формы мешок. Верхняя граница этой оболочки располагается на уровне большого затылочного от- верстия, по внутренней поверхности которого, а также лежащего ниже I шейного позвонка срастается с их



надкостницей. Кроме того, она плотно связана с покровной мембраной и с задней атлантозатылочной мембранный, где ее прободает позвоночная артерия. Короткими соединительно-ткаными тяжами оболочка прикрепляется к задней продольной связке позвоночного столба. По направлению книзу мешок твердой оболочки несколько расширяется и, достигнув II—III поясничного позвонка, т. е. ниже уровня спинного мозга, переходит в нить (твердой оболочки) спинного мозга, *filum terminale externum*, которая прикрепляется к надкостнице копчика.

Отходящие от спинного мозга корешки, узлы и нервы твердая оболочка окутывает в виде влагалищ, расширившихся по направлению к меж-

**957. Твердая оболочка головного мозга, *dura mater encephali*; вид справа и сверху.  
(Правая часть свода черепа удалена горизонтальным и сагиттальным распилами.)**

позвоночным отверстиям и принимающих участие в фиксации оболочки.

Твердую оболочку спинного мозга иннервируют ветви мозговой оболочки спинномозговых нервов; кровоснабжают ветви позвоночных артерий и ветви пристеночных артерий грудной и брюшной частей аорты; венозная кровь собирается в венозные позвоночные сплетения.

#### Твердая оболочка головного мозга

Твердая оболочка головного мозга, *dura mater encephali* (рис. 957, 958), представляет собой крепкое соединительно-тканное образование, в котором различают наружную и внутреннюю

пластинки. *Наружная пластинка*, *lamina externa*, имеет шероховатую поверхность, богатую сосудами, и прилегает непосредственно к костям черепа, являясь их внутренней надкостницей. Проникая в отверстия черепа, через которые выходят нервы, она охватывает их в виде влагалища.

С костями свода черепа твердая оболочка головного мозга связана слабо, за исключением мест прохождения черепных швов, а на основании черепа она крепко сращена с костями.

У детей до заражения родничков соответственно их расположению твердая оболочка головного мозга плотно срастается с перепончатым черепом и тесно связана с костями свода черепа.

*Внутренняя пластинка*, *lamina interna*, твердой оболочки головного мозга гладкая, блестящая и покрыта эндотелием.

Твердая оболочка головного мозга образует отростки, которые располагаются между частями мозга, разделяя их.

По линиям прикрепления отростков твердой оболочки головного мозга в ней образуются пространства, имеющие на поперечном разрезе призматическую или треугольную форму — синусы твердой мозговой оболочки, представляющие собой коллекторы, по которым венозная кровь из вен головного мозга, глаз, твердой оболочки и черепных костей собирается в систему внутренних яремных вен. Эти пространства — синусы — имеют тугу натянутые стенки, при разрезе не спадаются, клапаны в них отсутствуют. В полость ряда синусов открываются эмиссарные вены, посредством которых синусы через каналы в костях черепа сообщаются с венами покровов головы.

Твердая оболочка головного мозга иннервируется менингеальными ветвями тройничного и блуждающего нервов, симпатическими нервами от периартериальных сплетений (средней менингеальной артерии, позвоночной артерии, а также пещеристого сплетения), ветвями большого каменистого нерва и ушного узла; иногда в толще некоторых нервов имеются внутриствольные нервные клетки. Большая часть нервных ветвей мозговой оболочки следует по ходу сосудов этой оболочки, за исключением намета мозжечка, где сосудов в отличие от других участков твердой оболочки головного мозга мало и где




большая часть нервных ветвей следует независимо от сосудов.

Первая ветвь тройничного нерва — глазной нерв посылает стволы к твердой оболочке головного мозга области передней черепной ямки, передним и задним участкам свода черепа, а также к серпу большого мозга, достигая нижнего сагиттального синуса, и к намету мозжечка (ветвь намета). Вторая и третья ветви тройничного нерва, верхнечелюстной нерв и нижнечелюстной нерв, посыпают среднюю ветвь мозговой оболочки к оболочке области средней черепной ямки, намету мозжечка и серпу большого мозга. Указанные ветви распределяются и в стенках близлежащих венозных синусов.

**958. Нервы твердой оболочки головного мозга (фотография). Препараторы Б. Перлина. (Участки totally окрашенной твердой мозговой оболочки.)**

A — область средней черепной ямки: 1 — тройничный узел; 2 — сплетение аркад; 3 — средняя менингеальная артерия; 4 — менингеальная ветвь нижнечелюстного нерва; 5 — средний менингеальный нерв; 6 — каменистая ветвь средней менингеальной артерии и сопровождающие ее нервы; 7 — верхняя барабанная артерия и сопровождающие ее нервы.



Б

Б—области задней черепной ямки и намета мозжечка: 1—твердая оболочка, покрывающая чешую затылочной кости; 2—намет мозжечка; 3—нижняя стенка поперечного синуса; 4—прямой синус; 5—затылочный синус; 6—краевой синус; 7—спинальный комплекс нервов; 8—оболочечная ветвь подъязычного нерва; 9—латеральная группа тенториальных нервов.

К твердой оболочке головного мозга области задней черепной ямки, вплоть до намета мозжечка, и к стенкам поперечного и затылочного синусов тонкую ветвь мозговой оболочки посыпает блуждающий нерв. Кроме того, в иннервации твердой оболочки головного мозга в той или иной степени могут принимать участие блоковый, языкоглоточный, добавочный и подъязычный нервы.

Кровоснабжается твердая оболочка головного мозга ветвями, подходящими от верхнечелюстной артерии (средняя менингеальная артерия); от позвоночной артерии (ветви к мозговой оболочке); от затылочной артерии (менингеальная ветвь и сосцевидная ветвь); от глазной артерии (от

передней решетчатой артерии—передняя менингеальная артерия). Венозная кровь собирается в близлежащих синусах твердой оболочки головного мозга.

#### *Отростки твердой оболочки головного мозга*

Различают следующие отростки твердой оболочки головного мозга (см. рис. 954, 957).


1. *Серп большого мозга*, *falx cerebri*, располагается в сагиттальной плоскости между обоими полушариями большого мозга, особенно глубоко входит своей передней частью. Начинаясь спереди от петушиного гребня решетчатой кости, серп большого мозга своим выпуклым краем прикрепляется к боковым ребрам борозды верхнего сагиттального синуса свода черепа и доходит до внутреннего затылочного выступа, где переходит в верхнюю поверхность намета мозжечка.

2. *Серп мозжечка*, *falx cerebelli*, следует от внутреннего затылочного выступа, идет по внутреннему затылочному гребню и достигает заднего края большого затылочного отверстия, где переходит в две складки, ограничивающие отверстие сзади. Серп мозжечка залегает между полушариями мозжечка в области его задней вырезки.

3. *Намет мозжечка*, *tentorium cerebelli*, натянут над задней черепной ямкой, между верхними краями пирамид височных костей и бороздами поперечных синусов затылочной кости, и отделяет затылочные доли большого мозга от мозжечка. Он имеет вид горизонтально расположенной пластиинки, средняя часть которой оттянута кверху. Его передний свободный край вогнут и образует *вырезку намета*, *incisura tentorii*, ограничивающую отверстие намета. Здесь проходит стволовая часть мозга.

4. *Диафрагма седла*, *diaphragma sellae*, натянута над турецким седлом, образуя как бы его крышу. Под ней залегает гипофиз. В середине диафрагмы седла находится отверстие, через него проходит воронка, на которой висит гипофиз.

В области тройничного вдавления, у вершины пирамиды височной кости, твердая оболочка головного мозга расщепляется на два листка. Эти листки образуют *тройничную*



**959. Вены большого мозга, vv. cerebri.**

(Большая часть твердой оболочки головного мозга правого полушария удалена; участок мозгового вещества в области боковой ямки большого мозга удален; верхний сагиттальный и поперечный синусы, а также сток синусов вскрыты; вырезана часть височной доли и показаны вены и артерии островка.)

**960. Паутинная оболочка спинного мозга (фотография. Препаратор В. Харитоновой).**

(Участок тотально окрашенного препарата. Трабекулы подпаутинного пространства.)

1—пластинчатые трабекулы; 2—нитевидные трабекулы.



полость, *cavum trigeminale*, в которой залегает узел тройничного нерва.

#### Синусы твердой оболочки головного мозга

Различают следующие синусы твердой оболочки головного мозга (рис. 959; см. рис. 957).

1. *Верхний сагиттальный синус*, *sinus sagittalis superior*, располагается


на выпуклой стороне верхнего края серпа большого мозга. Он начинается от петушиного гребня, направляется по срединной линии кзади, постепенно увеличиваясь в объеме, и у внутреннего затылочного выступа в области крестообразного возвышения влиивается в поперечный синус.

По бокам от верхнего сагиттального синуса между листками твердой оболочки головного мозга располага-

ются различной величины многочисленные щели — *боковые лакуны*, *lacunae laterales*, в которые впиваются грануляции.

2. *Нижний сагиттальный синус*, *sinus sagittalis inferior*, залегает по нижнему краю серпа большого мозга и вливается в прямой синус.

3. *Поперечный синус*, *sinus transversus*, располагается в одноименной борозде затылочной кости.



961. Паутинная оболочка головного мозга, *arachnoidea encephali*; вид снизу.  
(Нижняя поверхность мозга; в области височной доли удален небольшой участок паутинной оболочки.)

Он является самым крупным из всех синусов. Огибая сосцевидный угол теменной кости, он продолжается в сигмовидный синус, *sinus sigmoideus*. Последний по одноименной борозде спускается к яремному отверстию и переходит в верхнюю луковицу внутренней яремной вены.

В синус открываются две эмиссарные вены, которые связаны с венечными венами. Одна из них находится в отверстии сосцевидного отростка, другая — на дне мышелковой ямки затылочной кости, в непостоянном, чаще несимметричном, мышелковом канале.


4. Прямой синус, *sinus rectus*, располагается по линии соединения серпа большого мозга с наметом мозжечка. Вместе с верхним сагиттальным синусом они вливаются в поперечный синус.

5. Пещеристый синус, *sinus cavernosus*, получил свое название вследствие многочисленных перегородок, придающих синусу вид пещеристой структуры. Синус располагается по бокам турецкого седла. На

поперечном разрезе он имеет вид треугольника, в нем различают три стенки: верхнюю, наружную и внутреннюю. Верхнюю стенку прободает глазодвигательный нерв. Несколько ниже, в толще наружной стенки синуса, проходят блоковый нерв и первая ветвь тройничного нерва — глазной нерв. Между блоковым и глазным нервами залегает отводящий нерв.

Внутри синуса проходит внутренняя сонная артерия со своим симпатическим нервным сплетением. В полость синуса впадает верхняя глазная вена. Правый и левый пещеристые синусы сообщаются между собой в передних и задних отделах диафрагмы седла посредством межпещеристых синусов, *sinus intercavernosi*. Образующийся таким путем большой синус окружает со всех сторон лежащий в турецком седле гипофиз.

**962. Паутинная и мягкая оболочки головного мозга, arachnoidea et pia mater encephali (медиальная поверхность). (Сагиттальный разрез; участок паутинной оболочки в области медиальной поверхности полушария удален.)**



6. Клиновидно-теменной синус, *sinus sphenoparietalis*, парный, следует в медиальном направлении вдоль заднего края малого крыла клиновидной кости и впадает в пещеристый синус.

7. Верхний каменистый синус, *sinus petrosus superior*, также является притоком пещеристого синуса. Он располагается по верхнему краю пирамиды височной кости и соединяет пещеристый синус с поперечным синусом.

8. Нижний каменистый синус, *sinus petrosus inferior*, выходит из пещеристого синуса, залегает между скатом затылочной кости и пирамидой височной кости в борозде нижнего каменистого синуса. Он впадает в верхнюю луковицу внутренней яремной вены. К нему подходят вены лабиринта.


9. Базилярное сплетение, *plexus basilaris*, располагается на базилярной части тела затылочной кости. Оно образуется путем слияния нескольких соединительных венозных ветвей

между обоими нижними каменистыми синусами.

10. Затылочный синус, *sinus occipitalis*, залегает вдоль внутреннего затылочного гребня. Он выходит из поперечного синуса, делится на две ветви, которые охватывают боковые края большого затылочного отверстия и вливаются в симметричный синус. Затылочный синус анастомозирует с внутренними позвоночными венозными сплетениями. В том месте, где соединяются поперечный, верхний сагittalный, прямой и затылочный синусы, образуется венозное расширение, называемое *синусным стоком*, *confluens sinuum*. Это расширение соответствует на затылочной кости крестообразному возвышению.

Твердая оболочка головного мозга отделяется от лежащей под ней па-

### 963. Оболочки головного мозга, *meningea encephali* (полусхематично). (Топографоанатомические взаимоотношения оболочек головного мозга, мозгового вещества, костей черепа и его мягких покровов.)



утинной оболочки субдуральным пространством, *spatium subdurale*, представляющим собой капиллярные щели, в которых находится небольшое количество спинномозговой жидкости.

### ПАУТИННАЯ ОБОЛОЧКА

**Паутинная оболочка**, *arachnoidea*, тонкая, прозрачная, лишена сосудов и состоит из покрытой эндотелием соединительной ткани. Она облегает спинной и головной мозг со всех сторон и связана с лежащей кнутри от нее мягкой оболочкой при помощи многочисленных арахноидальных трабекул, которые образуют заднюю подпаутинную перегородку.

перечном направлении 1—2 мм и выполненная спинномозговой жидкостью, *liquor cerebrospinalis*.

Паутинная оболочка спинного мозга связана с твердой оболочкой спинного мозга в области корешков спинномозговых нервов, в тех местах, где эти корешки проникают через твердую оболочку спинного мозга (см. ранее). С мягкой оболочкой спинного мозга она связана посредством многочисленных, особенно в задних отделах, арахноидальных трабекул, которые образуют заднюю подпаутинную перегородку.

Кроме того, паутинная оболочка спинного мозга связана как с твердой, так и с мягкой оболочками спинного мозга при помощи особых зубчатых связок, *ligamenta denticulata*.

### Паутинная оболочка спинного мозга

**Паутинная оболочка спинного мозга**, *arachnoidea mater spinalis* (рис. 960; см. рис. 955, 956), так же как и твердая оболочка спинного мозга, представляет собой мешок, относительно свободно окружающий спинной мозг.

Между паутинной и мягкой оболочками спинного мозга находится подпаутинное пространство, *cavitas subarachnoidea*, — более или менее обширная полость, особенно в передних и задних отделах, достигающая в по-

Они представляют собой соединительнотканые пластинки (всего 20—25), располагающиеся во фронтальной плоскости по обеим боковым сторонам спинного мозга и идущие от мягкой оболочки к внутренней поверхности твердой оболочки.


### Паутинная оболочка головного мозга

**Паутинная оболочка головного мозга**, *arachnoidea mater encephali* (рис. 961, 962), покрытая, как и одноименная оболочка спинного мозга, эндотелием, связана с мягкой оболочкой головного мозга подпаутинными трабекулами, а с твердой оболочкой — грануляциями паутинной оболочки. Между ней и твердой оболочкой головного мозга имеется щелевидное субдуральное пространство, выполненное незначительным количеством спинномозговой жидкости.

Наружная поверхность паутинной оболочки головного мозга не сращена с прилегающей к ней твердой оболочкой. Однако местами, главным образом по сторонам верхнего сагittalного синуса и в меньшей степени по сторонам поперечного синуса, а также возле других синусов, ее отростки различной величины — так называемые грануляции паутинной оболочки, *granulationes arachnoideales*,

### 964. Подпаутинное пространство (I); рентгенограмма.

(Правое полушарие; левое боковое положение; пневмоэнцефалография: воздух, введенный в подпаутинное пространство поясничной части спинного мозга, проникает в полость желудочков головного мозга и в его подпаутинные пространства.)



входят в твердую оболочку головного мозга и вместе с ней — во внутреннюю поверхность черепных костей или в синусы. В этих местах в костях образуются небольшие углубления, так называемые ямочки грануляций; их особенно много возле сагиттального шва свода черепа. Грануляции паутинной оболочки представляют собой органы, осуществляющие путем фильтрации отток спинномозговой жидкости в венозное русло.

Внутренняя поверхность паутинной оболочки обращена к мозгу. На вы-


дающихся частях извилин головного мозга она тесно прилегает к мягкой оболочке головного мозга, не следя, однако, за последней в глубину борозд и щелей. Таким образом, паутинная оболочка головного мозга перекидывается как бы мостиками от

извилины к извилине, а в местах, где сращения отсутствуют, остаются пространства, называемые *подпаутинными пространствами*, *cavitates subarachnoideale*.

Подпаутинные пространства всей поверхности головного мозга, как и спинного, сообщаются между собой. В некоторых местах эти пространства довольно значительны и носят название *подпаутинных цистерн*, *cisternae subarachnoideae* (рис. 963, 964). Выделяются наиболее крупные цистерны:

### 965. Артерии и вены спинного мозга, aa. et vv. spinale.

А — вид спереди. Б — вид сзади. В — вид сверху.



1) мозжечково-мозговая цистерна, *cisterna cerebellomedullaris*, залегает между мозжечком и продолговатым мозгом;

2) цистерна латеральной ямки большого мозга, *cisterna fossae lateralis cerebri*,—в латеральной борозде, соответствующая латеральной ямке большого мозга;

3) межножковая цистерна, *cisterna interpeduncularis*,—между ножками мозга;

4) цистерна перекреста, *cisterna chiasmatis*,—между перекрестом зрительных нервов и лобными долями мозга.

Кроме того, встречается ряд крупных подпаутинных пространств, которые можно отнести к цистернам: идущая вдоль верхней поверхности и колена мозолистого тела цистерна мозолистого тела; расположенная на дне поперечной щели большого мозга, между затылочными долями полушарий и верхней поверхностью мозжечка, обходящая цистерна, имеющая вид канала, идущего по бокам ножек мозга и крыше среднего мозга; боковая цистерна моста, залегающая под средними мозжечковыми ножками, и, наконец, в области базилярной борозды моста—средняя цистерна моста.

Подпаутинные полости мозга сообщаются между собой, а также через срединную и латеральные апертуры с полостью IV желудочка, а через последний—с полостью остальных желудочков мозга.

В подпаутинном пространстве собирается спинномозговая жидкость, *liquor cerebrospinalis*, из разных отделов мозга.

Отток жидкости отсюда идет через периваскулярные, периневральные щели и через грануляции паутинной оболочки в лимфатические и венозные пути.

### МЯГКАЯ МОЗГОВАЯ ОБОЛОЧКА

**Мягкая мозговая оболочка**, *pia mater*, образована нежной рыхлой соединительной тканью, в которой залегает большое количество сосудов, проникающих в вещество мозга, и нервов. Сопровождая сосуд в вещество мозга, мягкая оболочка образует вокруг него как бы влагалище—сосудистую основу, *tela choroidea*. В последней имеются вокругсосудистые пространства—узкие щели, сообщающиеся с подпаутинными пространствами.

### Мягкая оболочка спинного мозга

**Мягкая оболочка спинного мозга**, *pia mater spinalis* (рис. 965), несколько толще и крепче, чем в головном мозге. Плотно прилегая к наружной поверхности мозга, она проникает в его переднюю щель. Мягкая оболочка состоит из наружной и внутренней пластинок. Наружная пластинка, *lamina externa*, образует зубчатые связки, которые начинаются от мягкой оболочки между передними и задними корешками и прикрепляются к твердой оболочке, фиксируя обе оболочки одну к другой. Внутренняя пластинка, *lamina interna*, при помощи наружной глиальной мембрани, *membrana gliae externae*, срастается с веществом спинного мозга.

### Мягкая оболочка головного мозга

**Мягкая оболочка головного мозга**, *pia mater encephali* (см. рис. 962), прилегает непосредственно к веществу головного мозга и проникает в глубь всех борозд и щелей; только на выступающих частях извилин она тесно срастается с паутинной оболочкой. Мягкая оболочка головного мозга менее крепко связана с поверхностью мозга, чем мягкая оболочка спинного мозга. Кровеносные сосуды, залегающие в ней, соединяют ее с головным мозгом, и, по мнению некоторых авторов, узкая щель, так называемое надмозговое, или субпialное, пространство, отделяет ее от поверхности мозга.

Вокругсосудистые пространства, отделяя мягкую оболочку от сосудов, образуют их влагалище—сосудистую основу, *tela choroidea*. Эти пространства сообщаются с подпаутинным пространством.

Проникая в поперечную щель мозга и поперечную щель мозжечка, мягкая мозговая оболочка натянута между частями, ограничивающими эти щели, и тем самым замыкает сзади полости III и IV желудочков.

С мягкой оболочкой головного мозга связаны сосудистые сплетения, *plexus choroidei*, и сосудистые основы, *tela choroidea*, боковых, III и IV желудочков мозга.

Мягкая оболочка головного мозга иннервируется главным образом нервами, отходящими от сплетений, сопровождающих внутреннюю сонную и позвоночную артерии, и кровоснабжается ветвями этих артерий.

# ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Черепные нервы

110

Спинномозговые нервы

143

Живой организм работает по принципу рефлекса (отражения) и представляет собой уникальную систему, способную к самоуправлению, что осуществляется за счет ввода информации от воспринимающих нервных приборов, переработки ее в центрах и передачи управляющих сигналов на периферию. Структурную основу каналов ввода и передачи информации составляет периферическая нервная система. По одним каналам информация поступает с периферии в центры спинного и головного мозга — это афферентные, чувствительные, нервы, *nn. sensories*, по другим — из центров на периферию в составе эфферентных, двигательных, нервов, *nn. motorius*.

Воспринимают раздражение специализированные нервные приборы — рецепторы, *receptores*, в которых энергия раздражителя превращается в сигналы, идущие по восходящим путям.

Афферентные и эфферентные волокна идут в составе нервов, относящихся к периферической нервной системе.

Нервы, отходящие от головного мозга, называются черепными нервами, *nn. craniales*, а отходящие от спинного мозга — спинномозговыми нервами, *nn. spinales*. К последним относятся также нервные клетки, выселившиеся за пределы центральной нервной системы.

Каждый нерв представляет собой совокупность отростков нервных клеток. Отдельные группы нервных волокон окружены наружной соединительной оболочкой — периневрием, *perineurium*. Отростки периневрия проникают между отдельными нервными волокнами, образуя внутреннюю соединительнотканную оболочку, — эндоневрий, *endoneurium*.

Весь нерв окружен соединительной тканью, образующей эпиневрий, *epineurium* (рис. 966).

В состав нервного волокна входит отросток нервной клетки — осевой цилиндр, или аксон, который в одних волокнах покрыт снаружи нейролеммой, содержащей слой миелина, *stratum myelini*, а в других — нейролеммой, не содержащей миелина.

Волокна первого типа носят название миелиновых нервных волокон, *neurofibrae myelinatae*. У таких волокон миелиновый слой не сплошной, а местами прерывается так называемыми насечками миелина, в области которых осевой цилиндр покрыт только нейролеммой. Волокна второ-

го типа называются безмиелиновыми нервными волокнами, *neurofibrae nonmyelinatae*.

Миелиновые нервные волокна образуют основную массу черепных и спинномозговых нервов. Безмиелиновые нервные волокна встречаются главным образом в вегетативной (автономной) нервной системе (послеузловые волокна), а также среди волокон некоторых чувствительных путей (например, болевой чувствительности).

Нервные волокна, входящие в состав нервов, являются отростками морфологически и функционально различных нервных клеток: а) двигательных, лежащих в сером веществе передних столбов спинного мозга или в двигательных ядрах черепных нервов, в стволовой части головного мозга; б) чувствительных, образующих спинномозговые узлы, *ganglia spinalia*, спинномозговых нервов или соответствующие им узлы черепных нервов; в) вегетативных, располагающихся в боковых столбах спинного мозга, в узлах симпатических стволов либо в нервных узлах межоргановых или внутриорганных автономных сплетений.

Соответственно нервные волокна подразделяются на двигательные [эфферентные], *neurofibrae efferentes*, среди которых выделяются вегетативные (автономные), и чувствительные [афферентные], *neurofibrae afferentes*.

Двигательные нервные волокна иннервируют соматические мышцы, в которых заканчиваются двигательными окончаниями.

Чувствительные нервные волокна начинаются разнообразными рецепторами во всех органах и тканях тела, откуда они несут импульсы в центральную нервную систему.

Волокна вегетативной (автономной) нервной системы (симпатические и парасимпатические) направляются к внутренностям, кровеносным сосудам, образованиям кожи (волосы, железы), к мышцам и др. [см. «Вегетативная (автономная) нервная система»].

В зависимости от того, какого вида нервные волокна преимущественно входят в состав нерва, различают нервы двигательные, чувствительные, смешанные и вегетативные (автономные). Нервы появляются на поверхности мозга двигательными или чувствительными корешками. Двигательные корешки являются аксонами

двигательных клеток, находящихся в спинном и головном мозге, а чувствительные — аксонами нервных клеток спинномозговых узлов (или узлов черепных нервов).

В двигательном нерве волокна, не прерываясь, достигают иннервируемого органа.

Чувствительный нерв образуется дистальнее чувствительного (черепного или спинномозгового) узла так, что его волокна, направляющиеся от узла на периферию, являются дендритами заложенных в нем нервных клеток.

Двигательные волокна только прилегают к указанным узлам. К периферии от узлов чувствительные и двигательные волокна образуют смешанный нерв (см. «Спинномозговые нервы»).

Направляясь на периферию, смежные нервы соединяются друг с другом, обмениваются волокнами, образуя между собой различной формы петли и аркады. Такого типа соединения, относящиеся к нервам, направляющимся к определенной части тела, носят название *нервного сплетения*, *plexus nervorum*.



Различают сплетения как соматических, так и вегетативных нервов.

Все периферические нервы на основании их топографоанатомических особенностей делят на черепные нервы, *nn. craniales*, — 12 пар; спинномозговые нервы, *nn. spinales*, — 31 пара и вегетативные (автономные) нервы.

## 966. Строение периферического нерва (схема) (по Д. Сигалевичу). (*Создана на основании макромикроскопического изучения нервов и сосудов тотальных участков оболочек нервных стволов, обработанных методом импрегнации нитратом серебра.*)

А — попечерное сечение периферического нерва:  
1 — эпиневрий; 2 — периневрий; 3 — эндоневрий;  
4 — сосуды в оболочках нерва; 5 — жировая ткань.

Б — иннервация и кровоснабжение периферического нерва: 1 — эпиневрий; 2 — внутреннее эпиневральное сосудисто-нервное сплетение; 3 — периневрий; 4 — эндоневрий; 5 — наружное эпиневральное сосудисто-нервное сплетение; 6 — пластинчатые тельца в эпиневрии; 7 — околопучковое сосудисто-нервное сплетение; 8 — периневральное сосудисто-нервное сплетение; 9 — эндоневральное сосудисто-нервное сплетение; 10 — миелиновые нервные волокна; 11 — сосуды и нервы, проникающие в периневрий и эндоневрий; 12 — отделение нервного волокна от пучка к оболочкам первого ствола; 13 — пластинчатое тельце в периневрии.



## ЧЕРЕПНЫЕ НЕРВЫ


**Черепные нервы, nn. craniales**, анатомически связаны в основном со стволом мозга, где расположены их ядра. Местом выхода черепных нервов является основание мозга (рис. 967).

К черепным нервам относятся:

1. Обонятельные нервы, nn. olfactoryi (I)
2. Зрительный нерв, n. opticus (II)
3. Глазодвигательный нерв, n. oculomotorius (III)
4. Блоковый нерв, n. trochlearis (IV)

## 967. Черепные нервы, nn. craniales. (Нижняя поверхность головного мозга и места выхода черепных нервов.)

5. Тройничный нерв, n. trigeminus (V)
6. Отводящий нерв, n. abducens (VI)
7. Лицевой нерв [промежуточно-лицевой нерв], n. facialis [n. intermediofacialis] (VII) (Промежуточный нерв, n. intermedius)
8. Преддверно-улитковый нерв, n. vestibulocochlearis (VIII)
9. Языкоглоточный нерв, n. glossopharyngeus (IX)
10. Блуждающий нерв, n. vagus (X)
11. Добавочный нерв, n. accessorius (XI)



12. Подъязычный нерв, *n. hypoglossus* (XII)

Каждый черепной нерв направляет- ся к определенному отверстию основания черепа (рис. 968), через которое и покидает его полость. Далее нервы делятся на конечные ветви, достигающие иннервируемых областей.

До выхода из полости черепа черепные нервы сопровождаются оболочками головного мозга.

Локализация ядер черепных нервов, места выхода их из мозга и из черепа, а также область распределения


**968. Внутреннее основание черепа с проходящими через него черепными нервами; вид сверху.**

(Справа удалена твердая оболочка головного мозга; видны места прохождения черепных нервов через твердую оболочку головного мозга и основание черепа; слева вскрыты левый поперечный венозный синус и тройничная полость твердой оболочки головного мозга.)

ния основных ветвей приведены в сводной таблице (см. с. 140).

**ОБОНЯТЕЛЬНЫЕ НЕРВЫ**

**Обонятельные нервы, *nn. olfactorii* (I пара)** (рис. 969; см. рис. 1158), представляют собой нервы специальной чувствительности — обонятельной. Они начинаются от обонятельных нейросенсорных клеток, *cellulae neurosensoriae olfactoriae*, образующих первый нейрон обонятельного пути и залегающих в обонятельной



области слизистой оболочки полости носа. В виде 15—20 тонких нервных стволов (обонятельные нити), состоящих из безмиelinовых нервных волокон, они, не образуя общего ствола обонятельного нерва, проникают через решетчатую пластинку решетчатой кости в полость черепа, где вступают в обонятельную луковицу (здесь лежит тело второго нейрона), переходящую в обонятельный тракт, представляющий собой аксоны клеток, залегающих в обонятельной луковице.

Обонятельный тракт переходит в обонятельный треугольник. Последний состоит преимущественно из нервных клеток и разделяется на две обонятельные полоски, вступающие

в переднее продырявленное вещество, подмозолистое поле и прозрачную перегородку, где находятся тела третьих нейронов. Затем волокна клеток этих образований различными путями достигают коркового конца обонятельного анализатора, залегающего в области крючка и парагиппокампальной извилины (см. «Орган обоняния»).


Параллельно обонятельному нерву кнаружи от него иногда залегает *концевой нерв, n. terminalis*, образованный несколькими нервными волокнами, проходящими между твердой мозговой оболочкой и периостом. Этот нерв начинается в слизистой оболочке обонятельной области перегородки носа и, пройдя через отверстие

решетчатой пластинки, подходит к медиальной обонятельной полоске несколькими корешками.

### ЗРИТЕЛЬНЫЙ НЕРВ

*Зрительный нерв, n. opticus* (II пара) (рис. 970; см. рис. 967, 968, 1111, 1115), представляет собой нерв специальной чувствительности.

Волокна зрительного нерва берут начало от мультиполлярных нервных клеток сетчатки глаза и, прободая соудистую и белочную оболочки, образуют *внутриглазничную часть зрительного нерва, pars intraocularis n. optici*. Пройдя через толщу жирового тела глазницы, *corpus adiposum*



969. Нервы перегородки носа и твердого неба.  
(Правая поверхность перегородки носа; левая половина твердого неба.)

*orbitae*, зрительный нерв подходит к общему сухожильному кольцу, *annulus tendineus communis*. Этот участок нерва носит название глазничной части, *pars orbitalis*. Затем нерв входит в зрительный канал — это внутренняя часть нерва, *pars intracanalicularis*, а из глазницы в полость черепа выходит внутренняя часть, *pars intracranialis*. Здесь в области предперекрестной борозды клиновидной кости происходит частичный перекрест (полуперекрест) волокон зрительных нервов, *chiasma opticum*.

Латеральная часть волокон каждого из зрительных нервов направляется дальше по своей стороне.

Медиальная часть переходит на

противоположную сторону, где соединяется с волокнами латеральной части зрительного нерва этой стороны и образует вместе с ними зрительный тракт, *tractus opticus*.

Таким образом, правый зрительный тракт содержит волокна из правых половин обеих сетчаток, а левый — из левых половин.


По своему ходу ствол зрительного нерва окружен внутренним влагалищем зрительного нерва, *vagina interna n. optici*, представляющим собой вырост мягкой оболочки головного мозга. Внутреннее влагалище щелевидным межвлагалищным пространством, *spatia intervaginalis*, отделяется от наружного влагалища зрительного нерва, *vagina externa n. optici*, являю-

щегося выростом паутинной и твердой оболочек головного мозга.

В межвлагалищном пространстве проходят артерии и вены.

Каждый зрительный тракт огибает с боковой стороны ножку мозга и заканчивается в первичных подкорковых зрительных центрах, которые представлены с каждой стороны латеральным коленчатым телом, подушкой таламуса и ядрами верхнего холмика (серый слой верхнего холмика).

Волокна, отходящие от клеток латерального коленчатого тела и подушки, направляются через заднюю ножку внутренней капсулы в полушарие и, образуя зрительную лучистость, заканчиваются в коре медиальной поверхности затылочной доли



970. Зрительные нервы и тракты;  
нижняя поверхность мозга.  
(Большая часть височных долей  
и мост удалены.)

по краям шпорной борозды. Волокна, отходящие от верхних холмиков крыши среднего мозга, идут к ядрам глазодвигательных и других черепных нервов, а также вступают в контакт с клетками передних столбов спинного мозга.

#### ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫЙ НЕРВ

**Глазодвигательный нерв, n. oculomotorius** (III пара) (рис. 971, 972; см. рис. 967, 968, 970)— смешанный


#### 971. Нервы глазницы, правой; вид сверху.

(Верхняя стенка глазницы удалена; вскрыта полость залегания узла тройничного нерва.)

нерв. Ядра этого нерва лежат в покрышке ножек мозга, на дне водопровода мозга, на уровне верхних холмиков крыши среднего мозга (см. рис. 928, 945, 946).

Глазодвигательный нерв имеет два ядра: *двигательное ядро глазодвигательного нерва, nucleus n. oculomotorius*, и *добавочное ядро глазодвигательного нерва (парасимпатическое), nucleus oculomotorius accessorius (autonomicus)*.

Из вещества мозга глазодвигатель-



ный нерв выходит в области медиальной поверхности ножки, показывается на основании мозга возле переднего края моста, в межножковой ямке.

Затем глазодвигательный нерв, направляясь спереди, ложится между задней мозговой артерией и верхней мозжечковой артерией, прободает твердую мозговую оболочку и, проходя через верхнюю стенку пещеристого синуса, снаружи от внутренней сонной артерии, входит через верх-

### 972. Нервы глазницы, правой; вид сверху.


(Верхняя стена глазницы и частично мышца, поднимающая верхнее веко, и верхняя прямая мышца удалены; пещеристый синус вскрыт, твердая оболочка головного мозга в области узла тройничного нерва удалена.)

нюю глазничную щель в полость глазницы.

Еще до входа в глазницу глазодвигательный нерв делится на две ветви — верхнюю и нижнюю.

1. *Верхняя ветвь, r. superior*, идет по латеральной поверхности зрительного нерва, разделяется на две ветви, которые подходят к мышце, поднимающей верхнее веко, и к верхней прямой мышце глаза.

2. *Нижняя ветвь, r. inferior*, более мощная, вначале, как и верхняя ветвь,



залегает снаружи от зрительного нерва.

Нижняя ветвь в глазнице делится на три ветви, из которых внутренняя подходит к медиальной прямой мышце глаза, средняя, наиболее короткая, иннервирует нижнюю прямую мышцу и наружная, самая длинная, проходит вдоль нижней прямой мышцы к нижней косой мышце. От последней ветви отходит глазодвигательный корешок (парасимпатический), *radix oculomotoria [parasympathica]*, состоящий из аксонов клеток добавочного ядра и направляющийся к ресничному узлу (см. рис. 973).

В составе глазодвигательного нерва, помимо указанных двигательных и парасимпатических волокон, проходят симпатические волокна, подходящие к нему от симпатического внутреннего сонного сплетения, окружающего внутреннюю сонную артерию, и чувствительные волокна, отходящие от глазного нерва, ветви тройничного нерва.

## БЛОКОВЫЙ НЕРВ

**Блоковый нерв, *n. trochlearis*** (IV пара) (см. рис. 932, 967, 968, 971, 972), — двигательный нерв.

**Ядро блокового нерва, *nucleus n. trochlearis***, лежит в покрышке ножек мозга, на дне водопровода мозга, на уровне нижних холмиков крыши среднего мозга (см. рис. 945, 946). Аксоны клеток правого и левого ядер образуют перекрест блоковых нервов, *decussatio nn. trochlearium*. Из вещества мозга блоковые нервы показываются позади нижних холмиков по сторонам от узелки верхнего мозгового паруса.

Каждый блоковый нерв огибает с латеральной стороны ножку мозга.

На основании мозга нерв выходит из щели между височной долей полушария и ножкой мозга. Затем, направляясь кпереди, блоковый нерв прободает твердую оболочку головного мозга и следует в наружной стенке пещеристого синуса, через верхнюю глазничную щель входит в полость глазницы, располагается поверх сухожильного кольца рядом с глазным нервом, над глазодвигательным нервом и, направляясь несколько медиально, подходит к верхней косой мышце.

## ТРОЙНИЧНЫЙ НЕРВ

**Тройничный нерв, *n. trigeminus*** (V пара) (рис. 973—982; см. рис. 967—969, 971, 972), по своему характеру смешанный. Различают двигательное и чувствительные ядра тройничного нерва (см. рис. 945, 946).

**Двигательное ядро тройничного нерва, *nucleus motorius n. trigemini***, залегает в задней части моста, в срединном возвышении, кпереди и несколько кнаружи от ядра отводящего нерва. Со стороны ромбовидной ямки оно проецируется кнутри от голубоватого места.

Отростки клеток этого ядра идут в нисходящем направлении и образуют **двигательный корешок, *radix motoria***.

Чувствительные ядра:

1. **Мостовое ядро тройничного нерва, *nucleus pontinus n. trigemini***, лежит в задней части моста, кнаружи и кзади от двигательного ядра, в области голубоватого места, и состоит из клеток, на которых оканчиваются восходящие волокна **чувствительного корешка, *radix sensoria***, идущие от **тройничного узла, *ganglion trigeminale***.

2. **Спинномозговое (нижнее) ядро тройничного нерва, *nucleus spinalis [inferior] n. trigemini***, вытянутой формы, располагается в задних отделах продолговатого мозга, доходя до верхних шейных сегментов спинного мозга на месте студенистого вещества заднего рога. На составляющих его клетках оканчиваются нисходящие волокна чувствительного корешка тройничного нерва. Эти волокна образуют **спинномозговой путь тройничного нерва, *tractus spinalis n. trigemini***.

3. **Ядро среднемозгового пути тройничного нерва, *nucleus mesencephalicus n. trigemini***, поднимается вдоль моста и среднего мозга до задней комиссуры. Клетки этого ядра сопровождают **среднемозговой путь тройничного нерва, *tractus mesencephalicus n. trigemini***.

На основании мозга тройничный нерв показывается из толщи моста у места отхождения от последнего средней мозжечковой ножки двумя частями: чувствительным и двигательным корешками.

Обе части направляются вперед и несколько латерально и проникают в щель между листками твердой мозговой оболочки. По ходу чувствительного корешка, между листками

твердой мозговой оболочки образуется **тройничная полость, *cavum trigeminale***, которая расположена на тройничном вдавлении, на вершине пирамиды височной кости. В полости залегает сравнительно больших размеров (длиной от 15 до 18 мм) тройничный узел, располагающийся вогнутостью кзади и выпуклостью кпереди.

Тройничный узел представляет собой совокупность нервных клеток. Отростки этих клеток, идущие к центру, образуют **чувствительный корешок, *radix sensoria***, тройничного нерва, а отростки, направляющиеся на периферию, — чувствительные волокна всех ветвей тройничного нерва.

От переднего выпуклого края тройничного узла отходят три основные ветви тройничного нерва: первая ветвь, или глазной нерв; вторая ветвь, или верхнечелюстной нерв, и третья ветвь, или нижнечелюстной нерв.

**Двигательный корешок, *radix motoria***, огибает тройничный узел с внутренней стороны, направляется к овальному отверстию, где вступает в состав третьей ветви тройничного нерва.

## Глазной нерв

**Глазной нерв, *n. ophthalmicus*** (см. рис. 971—978, 891), чувствительный, является верхней и самой меньшей из ветвей тройничного нерва. Направляясь вверх и вперед, он прободает наружную стенку пещеристого синуса, принимает здесь ветвь от внутреннего сонного симпатического нервного сплетения и, ложась латеральнее отводящего нерва и ниже блокового нерва, покидает череп через верхнюю глазничную щель.

До своего выхода из черепа глазной нерв отдает тонкие ветви, иннервирующие твердую оболочку головного мозга в области намета мозжечка, — **тенториальную ветвь, *r. tentorii*** (см. рис. 971).

Вступая в глазницу, нерв делится на 3 основные ветви.

1. **Лобный нерв, *n. frontalis***, — самый мощный, идет непосредственно под верхней стенкой глазницы вперед и делится на две ветви:

1) **надблоковый нерв, *n. supratrochlearis*** (см. рис. 976, 977), направляется кнутри, проходя над блоком верхней косой мышцы, анастомозирует с ветвью подблокового нерва, прободает круговую мышцу глаза

и мышцу, сокращающую брови, заканчивается в конъюнктиве и коже верхнего века, корня носа и нижнего отдела лба, а также в слезном мешке, иннервируя их;


2) надглазничный нерв, *n. supraorbitalis* (см. рис. 977), более мощный, расположен латеральнее предыдущего, направляется вперед под верхней стенкой глазницы, где делит-

ся на две ветви: *латеральную*, *r. lateralis*, которая, пройдя через надглазничную вырезку, разветвляется в коже лба, достигая теменной и височной областей, и *медиальную*, *r. medialis*, более тонкую, которая, пройдя через лобную вырезку, заканчивается в коже лба.


2. Слезный нерв, *n. lacrimalis* (см. рис. 971, 975), идет вдоль наруж-

ной стенки глазницы, заканчиваясь в коже области наружного угла глаза и верхнего века.

На своем пути слезный нерв соединяется *соединительной ветвью со склеральным нервом*, *r. communicans* (*см. n. zygomatico*) (ветвь от крылонебного узла). Эта ветвь вместе с ветвями слезного нерва иннервирует слезную железу.



**973. Тройничный нерв и автономные (вегетативные) узлы головы; вид справа (полусхематично).**



3. Носоресничный нерв, *n. nasociliaris* (см. рис. 972), составляет третью, наиболее глубоко лежащую ветвь глазного нерва. Сопровождая глазную артерию, нерв проходит между верхней прямой мышцей и зрачковым нервом, направляется вперед и медиально, идет между верхней косой и внутренней прямой мышцами. Этот нерв отдает ряд ветвей:

1) подблоковый нерв, *n. infartrochlearis*, идет по внутренней стенке глазницы, под верхней косой мышцей и, направляясь вперед, заканчивается в коже медиального угла глаза (ветви век, *rr. palpebrales*) и корня носа, предварительно соединяясь с ветвями надблокового нерва. Подблоковый нерв иннервирует также слезное мускуло и слезный мешок;

2) передний решетчатый нерв,

*n. ethmoidalis anterior* (см. рис. 973, 978), выходит через переднее решетчатое отверстие (вместе с одноименными артерией и веной) в полость черепа, располагаясь здесь под твердой оболочкой головного мозга в области передней черепной ямки. Направляясь кпереди, нерв проходит через решетчатую пластинку решетчатой кости в полость носа, отдает тонкую ветвь к слизистой оболочке лобной пазухи.

От переднего решетчатого нерва отходят носовые ветви, *rr. nasales* (*n. ethmoidalis anterioris*), которые представлены двумя группами ветвей:

а) внутренние носовые ветви, *rr. nasales interni*, иннервируют слизистую оболочку передней части перегородки носа, отдавая латеральные


носовые ветви, *rr. nasales laterales*, которые заканчиваются в слизистой оболочке переднего отдела боковой стенки полости носа, и медиальные носовые ветви, *rr. nasales mediales*, заканчивающиеся в слизистой оболочке перегородки носа; б) наружная носовая ветвь, *r. nasalis externus*, иннервирует кожу нижней части спинки и верхушки наружного носа;

3) задний решетчатый нерв, *n. ethmoidalis posterior* (см. рис. 973, 978), выходит через заднее решетчатое отверстие (вместе с одноименными артерией и веной) в задние решетчатые ячейки и иннервирует слизистую оболочку последних и слизистую оболочку клиновидной пазухи;

4) длинные ресничные нервы, *nn. ciliares longi*, представлены 2—3 небольшими стволами, идущими ме-

**974. Нервы головы; тройничный нерв, *n. trigeminus*, правый; вид справа и немного спереди.  
(Часть головного мозга, верхней и нижней челюстей удалены.)**

**975. Тройничный нерв, *n. trigeminus*, правый; вид сбоку.  
(Боковая стенка глазницы удалена.)**



диально от зрительного нерва. Они подходят к глазному яблоку, соединяются с короткими ресничными нервами от ресничного узла и иннервируют сосудистую оболочку глазного яблока и склеру;

5) соединительная ветвь с ресничным узлом, *r. communicans* (*sit ganglio ciliari*), бывает двойной и даже тройной; направляясь вперед, подходит к верхнезаднему углу ресничного узла (см. «Головной отдел парасимпатической нервной системы»).

#### Верхнечелостной нерв

**Верхнечелостной нерв, *n. maxillaris*** (см. рис. 972—977, 1054, 1065), чувствительный. Отойдя от тройничного узла и миновав пещеристый синус, нерв покидает полость черепа через

круглое отверстие и вступает в крыловидно-небную ямку, где делится на основные ветви.

Еще до выхода из черепа нерв отделяет (среднюю) менингеальную ветвь, *r. meningaeus (medius)*, которая разветвляется в твердой оболочке головного мозга вместе со средней менингейальной артерией (см. рис. 972, 979).

В крыловидно-небной ямке от верхнечелостного нерва отходят следующие ветви.

- Подглазничный нерв, *n. infraorbitalis* (см. рис. 976, 977).—наиболее мощная из всех ветвей верхнечелостного нерва, которая является как бы его прямым продолжением. Из крыловидно-небной ямки нерв через нижнюю глазничную щель входит в полость глазницы, идет в подглазничной борозде и, пройдя подглаз-


ничный канал, выходит через подглазничное отверстие на переднюю поверхность лица в области клыковой ямки и разделяется на ветви:

- нижние ветви век, *rr. palpebrales inferiores*, иннервируют кожу нижнего века и область угла глаза;

- наружные и внутренние носовые ветви, *rr. nasales externi et interni*, многочисленные, иннервируют кожу боковой стенки носа по всей ее длине, начиная от внутреннего угла глаза, до окружности отверстия ноздри;

- верхние губные ветви, *rr. labiales superiores*, направляются к коже и слизистой оболочке верхней губы, деснам и краем носа;

- верхние альвеолярные нервы, *rr. alveolares superiores*, по пути от подглазничного нерва отдают ветви к зубам верхней челюсти;



а) задние верхние альвеолярные ветви, *rr. alveolares superiores posteriores* (см. рис. 974, 975), начинаются 2—3 ветвями от ствола подглазничного нерва еще до его входления в нижнюю глазничную щель, направляются к бугру верхней челюсти и, вступив в одноименные отверстия, проходят по каналам, расположенным в толще кости, к корням трех больших коренных зубов верхней челюсти;

б) средняя верхняя альвеолярная ветвь, *r. alveolaris superior medius*,— довольно мощный ствол. Отходит от подглазничного нерва в подглазничной борозде. Направляясь вниз и впе-


ред, нерв ветвится в толще наружной стенки верхнечелюстной пазухи, анастомозирует с верхним задним и передним альвеолярными нервами и подходит к малым коренным зубам верхней челюсти;

в) передние верхние альвеолярные ветви, *rr. alveolares superiores anteriores* (см. рис. 973, 974), самые мощные. Отходят 1—3 ветвями от подглазничного нерва почти перед его выходом через подглазничное отверстие. Эти ветви проходят через передние альвеолярные каналы в толще передней стенки верхнечелюстной пазухи и, направляясь немного вперед

и вниз, разветвляются на несколько зубных ветвей и носовую ветвь. Первые подходят к резцам и клыкам верхней челюсти, а вторая принимает участие в иннервации переднего отдела слизистой оболочки дна полости носа.

Верхние альвеолярные нервы соединяются между собой в канальцах альвеолярного отростка верхней челюсти и образуют *верхнее зубное сплетение*, *plexus dentalis superior*. Ветви этого сплетения под названием *верхних зубных и верхних десневых ветвей*, *rr. dentales et gingivales superiores*, направляются к зубам и соответст-

**976. Нервы головы и шеи; вид справа и несколько спереди.  
(Часть височной, клиновидной, лобной и скуловой костей, а также правая половина нижней челюсти удалены.)**



вующим участкам десны верхней челюсти.

2. Узловые ветви, *rr. ganglionares*, представлены 2—3 короткими тонкими нервами, которые подходят к крылонебному узлу, *ganglion pterygopalatinum* (см. рис. 979).

Часть волокон этих нервов входит в узел; другие соединяются с ветвями, отходящими от крылонебного узла.

Ветви крылонебного узла:

- 1) глазничные ветви, *rr. orbitales*;
- 2) медиальные и латеральные верхние задние носовые ветви, *rr. nasales posteriores superiores mediales et laterales*;

3) глоточная ветвь, *r. pharyngeus*;

4) большой небный нерв, *n. palatinus major*;

5) малые небные нервы, *nn. palatini minores*

(описание этих нервов см. «Вегетативная (автономная) нервная система»).

3. Скуловой нерв, *n. zygomaticus*, отходит от верхнечелюстного нерва в области крыловидно-небной ямки и вместе с подглазничным нервом через нижнюю глазничную щель входит в глазницу, располагаясь на ее наружной стенке. По своему ходу скуловой нерв имеет соединительную ветвь со


**977. Кожные ветви тройничного нерва (полусхематично). (По препаратам А. Миронцовой.)**

слезным нервом (от глазного нерва), состоящую из волокон, отходящих от крылонебного узла.


В дальнейшем скуловой нерв входит в скулоглазничное отверстие и внутри скуловой кости делится на две ветви:

1) скулолицевая ветвь, *r. zygomaticofacialis*, выходит из одноименного отверстия, заканчиваясь в коже щеки и латерального угла глаза;

2) скуловисочная ветвь, *r. zygomaticotemporalis*, выходит также из одноименного отверстия и разветвляется в коже виска и латеральной части лба.



A



Б

**978. Нервы и сосуды слизистой оболочки лабиринта решетчатой кости. (Препараторы Н. Скрипникова.)**

A: 1—ветвь переднего решетчатого нерва к слизистой оболочке лобной пазухи; 2—передняя решетчатая артерия; 3—задняя решетчатая артерия; 4—задний решетчатый нерв; 5—разветвления заднего решетчатого нерва; 6—глазная артерия; 7—средняя решетчатая артерия; 9—передний решетчатый нерв.

Б: 1, 8, 11—передний решетчатый нерв; 2—передняя решетчатая артерия; 3, 9—глазная артерия; 4, 6—задний решетчатый нерв; 5—задняя решетчатая артерия; 7—средняя решетчатая артерия; 10—передняя решетчатая артерия.

Оба нерва концевыми ветвями широко соединяются с лицевым нервом.

#### Нижнечелюстной нерв

**Нижнечелюстной нерв, *n. mandibularis*** (см. рис. 972—974, 976, 977, 980—982, 1065), смешанный; он представляет собой наиболее мощную ветвь тройничного нерва. Образуется нижнечелюстной нерв чувствительной ветвью, отходящей от тройничного узла, к которой присоединяется двигательный корешок тройничного нерва. Нижнечелюстной нерв выходит из черепа вниз на его основание через овальное отверстие и делится на две основные ветви — переднюю, преимущественно двигательную, и заднюю, преимущественно чувствительную.

Еще до деления на эти ветви от нижнечелюстного нерва отходит тонкая менингеальная ветвь *n. mandibularis* (*r. meningeus n. mandibularis* (см. рис. 972), которая через остистое отверстие возвращается в полость черепа, иннервируя твердую оболочку головного мозга средней черепной ямки. От задней поверхности нижнечелюстного нерва отходят 3—4 коротких ствола к ушному узлу, *ganglion oticum*.

От передней ветви отходит ряд нервов:

1. **Жевательный нерв, *n. massetericus***, направляется кнаружи и отдает 1—2 тонкие ветви к височно-нижнечелюстному суставу, затем проходит через вырезку нижней челюсти к внутренней поверхности жевательной мышцы и иннервирует ее.

2. **Глубокие височные нервы, *nn. temporales profundi***, обычно два нерва (меньший — задний и больший — передний), направляются латерально в щель между верхним краем латеральной крыловидной мышцы и подвисочным гребнем клиновидной кости и, поворачивая кверху на внутреннюю поверхность височной мышцы, разветвляются в ее толще (см. рис. 980—982).

3. **Латеральный крыловидный нерв, *n. pterygoideus lateralis***, короткий, чаще отходит вместе со щечным нервом, подходит к латеральной крыловидной мышце с внутренней стороны, иннервируя ее.

4. **Щечный нерв, *n. buccalis***, довольно мощный нерв, единственный чувствительный из этой группы. Чаще всего проходит между головками латеральной крыловидной мышцы,

следует вперед по латеральной поверхности щечной мышцы и заканчивается в коже и слизистой оболочке щеки; иннервирует также кожу угла рта. У места разветвления имеет соединительные ветви с ветвями лицевого нерва.

От задней ветви отходят следующие нервы:

1. *Медиальный крыловидный нерв, n. pterygoideus medialis*, начинается от внутренней поверхности задней ветви, подходит к медиальной крыловидной мышце и иннервирует ее.

На уровне ушного узла (см. рис. 973, 979) от медиального крыловидного нерва отходят две небольшие ветви:

1) *нерв мышцы, напрягающей барабанную перепонку, n. musculi tensoris tympani*, который направляется не-


сколько вверх и назад, проходит через ушной узел и иннервирует указанную мышцу;

2) *нерв мышцы, напрягающей небную занавеску, n. musculi tensoris veli palatini*, отходит несколько выше предыдущего нерва, реже от нижнечелюстного нерва и, направляясь вниз и вперед, иннервирует соответствующую мышцу.

2. *Ушно-височный нерв, n. auriculotemporalis* (см. рис. 976, 977, 979), по своему составу смешанный. Он содержит чувствительные и секреторные волокна, подходящие к нему от ушного узла. Нерв начинается двумя корешками от задней поверхности ствола нижнечелюстного нерва, направляется назад, охватывая среднюю менингальную артерию, проходит по внутренней поверхности

### 979. Крылонебный узел, ganglion pterygopalatinum, и ушной узел, ganglion oticum, правые; вид изнутри.

(*Сагиттальный распил передних отделов черепа. Распилом по оси пирамиды височной кости удалены задние отделы черепа; в толще твердой оболочки головного мозга располагаются ее нервы и сосуды; часть слизистой оболочки боковой стенки полости носа удалена.*)




мышцелкового отростка нижней челюсти, направляется кзади и вверх по капсуле височно-нижнечелюстного сустава (отдает две-три небольшие суставные ветви), располагаясь под околоушной железой, впереди слухового прохода. Направляясь далее вверх, он заканчивается в коже височной области. На своем пути ушно-височный нерв отдает ряд ветвей:

1) *околоушные ветви*, *rr. parotidei*, отходят от ушно-височного нерва

в месте его прохождения под паренхимой железы и соединяются с височной ветвью лицевого нерва. Эти ветви в основном содержат секреторные волокна (от ушного узла);

2) *нерв наружного слухового прохода*, *n. meatus acustici externi*, проникает в стенку наружного слухового прохода на границе между его костной и хрящевой частями и иннервирует кожу наружного слухового прохода;

3) *ветви барабанной перепонки*,



980



981

**980. Нервы височной мышцы, правой, ребенка 1,5 лет. (Внутренняя поверхность.) (Фотография. Препаратор В. Ольховского.)**


1 — верхний край мышцы; 2 — задний край мышцы; 3 — задние глубокие височные нервы; 4 — средний глубокий височный нерв; 5 — передние глубокие височные нервы.

**981. Нервы височной мышцы, правой, ребенка 5 лет. (Внутренняя поверхность.) (Фотография. Препаратор В. Ольховского.)**

1 — верхний край мышцы; 2 — задний край мышцы; 3 — задний глубокий височный нерв; 4 — ветви среднего глубокого височного нерва; 5 — передний глубокий височный нерв.

**982. Нервы височной мышцы, правой. (Внутренняя поверхность мышцы.) (Фотография. Препаратор А. Миронцовой.)**

1 — задние внутримышечные ветви глубокого височного нерва; 2 — средние внутримышечные ветви; 3 — передние внутримышечные ветви; 4 — сухожилие височной мышцы.



982

*rr. membranae tympani*, две-три тонкие ветви, подходят к наружной поверхности барабанной перепонки, иннервируя ее передненижнюю часть;

4) *передние ушные нервы, rr. auriculares anteriores*, обычно их два, направляются к переднему отделу ушной раковины, иннервируют кожу козелка и части завитка;

5) *поверхностные височные ветви, rr. temporales superficiales*, являются концевыми ветвями ушно-височного нерва. Они разветвляются в коже височной области, имеют соединительные ветви с ветвями лицевого, лобного и большого затылочного нервов;

6) *соединительные ветви с лицевым первом, rr. communicantes (см. n. facialis)*, присоединяются к последнему позади шейки нижней челюсти.

3). *Нижний альвеолярный нерв, n. alveolaris inferior* (см. рис. 974, 976, 979), по своему характеру смешанный. Он представляет собой мощный ствол, который направляется вниз сначала по медиальной поверхности латеральной крыловидной мышцы, а затем, пройдя между крыловидными мышцами, по латеральной поверхности медиальной крыловидной мышцы. Направляясь немного кпереди и войдя через нижнечелюстное отверстие в нижнечелюстной канал, он следует в нем вместе с одноименными артерией и веной и выходит из подбородочного отверстия на поверхность лица.

На своем протяжении нижний альвеолярный нерв отдает ряд ветвей:

1) *челюстно-подъязычный нерв, n. mylohyoideus* (см. рис. 974, 976, 979), отходит от нижнего альвеолярного нерва у места входления последнего в нижнечелюстное отверстие, направляется вперед и вниз, идет в одноименной борозде на внутренней поверхности нижней челюсти. Затем подходит к челюстно-подъязычной мышце, разветвляется в ней и посыпает небольшую ветвь к переднему брюшку двубрюшной мышцы;

2) *нижнее зубное сплетение, plexus dentalis inferior* (см. рис. 973), образуется ветвями нижнего альвеолярного нерва, отходящими от основного ствола на всем его протяжении при прохождении через нижнечелюстной канал.

Ветви соединяются между собой, образуют сплетение, посыпающее два вида ветвей:

а) *нижние десневые ветви, rr.*

*gingivales inferiores*, иннервирующие десну нижней челюсти;

б) *нижние зубные ветви, rr. dentales inferiores*, следующие к зубам нижней челюсти.

4). *Подбородочный нерв, n. mentalis* (см. рис. 973, 974, 977), является концевой ветвью нижнего альвеолярного нерва. Выйдя через подбородочное отверстие, подбородочный нерв распадается на ряд ветвей, заканчивающихся в коже подбородка — *подбородочные ветви, rr. mentales*, и нижней губы — *нижние губные ветви, rr. labiales inferiores*; часто посыпает одну-две тонкие ветви к слизистой оболочке нижней губы.

5). *Язычный нерв, n. lingualis* (см. рис. 973, 974, 976, 979), по своему характеру смешанный, так как его составляют волокна, воспринимающие общую чувствительность (осзание и температуру) слизистой оболочки передних  $\frac{2}{3}$  языка, и волокна, составляющие барабанную струну — ветвь лицевого нерва, участвующую во вкусовых ощущениях передней части языка.

Отделяясь от переднего края нижнечелюстного нерва, язычный нерв, как и нижний альвеолярный нерв, идет вначале по медиальной поверхности латеральной крыловидной мышцы, а несколько ниже проникает в щель между ней и медиальной крыловидной мышцей (кпереди от нижнего альвеолярного нерва). Здесь язычный нерв принимает волокна барабанной струны (ветвь лицевого нерва), которая входит в него сзади под острым углом. Между язычным нервом и барабанной струной имеются *соединительные ветви с барабанной струной, rr. communicantes (см. chorda tympani)*. Дальше язычный нерв направляется дугообразно вниз и вперед по внутренней поверхности нижней челюсти и, залегая над поднижнечелюстной железой, подходит к нижней поверхности тела языка, где и посыпает в его толщу свои концевые ветви.

По своему ходу язычный нерв отдает следующие ветви:

1) *ветви перешейка зева, rr. isthmi fauci* — несколько тонких ветвей, направляющихся к слизистой оболочке передней дужки зева и к небной миндалине;

2) *узловые ветви, rr. ganglionares*, к поднижнечелюстному нервному узлу, представленные двумя-тремя короткими стволами, в составе которых

идут, помимо собственных чувствительных волокон, еще секреторные, входящие в барабанную струну;

3) *подъязычный нерв, n. sublingualis*, отходит от передней поверхности язычного нерва и иннервирует подъязычную железу, слизистую оболочку дна полости рта в области подъязычной складки и передние отделы десны нижней челюсти;

4) *соединительные ветви с подъязычным нервом, rr. communicantes (см. n. hypoglossi)*, 2 или 3 ветви в виде дуг, выпуклостями обращенных вперед, идут по наружной поверхности подъязычно-язычной мышцы, присоединяются к стволу подъязычного нерва;

5) *язычные ветви, rr. linguales*, являются концевыми ветвями язычного нерва. Подходят к языку со стороны нижней его поверхности, входят в его толщу и, соединяясь между собой, следуют вверх, подходят к слизистой оболочке и иннервируют ее передние две трети (верхушка, края и спинка языка), отдавая тонкие ветви к нитевидным и грибовидным сосочкам языка. На границе корня и тела языка язычные ветви соединяются с язычными ветвями языкооглоточного нерва.

## ОТВОДЯЩИЙ НЕРВ

*Отводящий нерв, n. abducens* (VI пара) (см. рис. 967, 968, 971, 973) — двигательный нерв. *Ядро отводящего нерва, nucleus n. abducentis*, расположено в задней части моста. Со стороны ромбовидной ямки ядро проецируется в области задних отделов медиального возвышения — в лицевом бугорке, несколько кнутри и дорсальнее ядер лицевого нерва (см. рис. 945, 946).

Волокна, отходящие от нервных клеток, образующих ядро отводящего нерва, направляются вперед, прободают всю толщу моста и выходят на нижнюю поверхность мозга в борозде между мостом и пирамидой.

Отводящий нерв направляется вперед, прободает твердую оболочку головного мозга и вступает в пещеристый синус, залегая латеральнее внутренней сонной артерии. Выйдя из синуса, нерв входит через верхнюю глазничную щель в глазницу, где прободает общее сухожильное кольцо, ложится под глазодвигательный нерв и подходит к латеральной прямой мышце, которую иннервирует.

## ЛИЦЕВОЙ НЕРВ


**Лицевой нерв [промежуточно-лицевой нерв], n. facialis [n. intermediofacialis]** (VII пара) (рис. 983—987: см. рис. 967, 968, 979, 1066)—смешанный нерв. Ядро лицевого нерва, *nucleus n. facialis*, залегает в центральной части моста, в ретикулярной формации, несколько кзади и кнаружи от ядра отводящего нерва. Со стороны ромбовидной ямки ядро лицевого нерва проецируется латеральнее лицевого бугорка (см. рис. 946, 947).

### 983. Лицевой нерв, n. facialis, правый; вид справа.

(Подкожная мышца шеи, мышца, опускающая нижнюю губу, и мышцы верхней губы частично удалены.)

Отростки клеток, образующих ядро лицевого нерва, следуют вначале в дорсальном направлении, огибая ядро отводящего нерва, затем, образуя колено лицевого нерва, *genus n. facialis*, направляются вентрально и выходят на нижнюю поверхность мозга у заднего края моста, выше и латеральнее оливы продолговатого мозга.

Сам лицевой нерв является двигательным, но после присоединения промежуточного нерва, n. intermedius, представленного чувствительными



и вегетативными волокнами (вкусовыми и секреторными), приобретает смешанный характер и становится **промежуточно-лицевым нервом**.

Ядро промежуточного нерва — *верхнее слюноотделительное ядро, nucleus salivatorius superior* — вегетативное ядро, залегает несколько кзади и медиальнее ядра лицевого нерва.


Аксоны клеток этого ядра составляют основную массу промежуточного нерва.

На основании мозга промежуточ-

**984. Лицевой нерв, n. facialis, левый (фотография). Препаратор Е. Страховой.**

1 — височные ветви; 2 — ушно-височный нерв; 3 — околоушное сплетение; 4 — лицевой нерв; 5 — щечные ветви; 6 — краевая ветвь нижней челюсти; 7 — большой ушной нерв; 8 — шейная ветвь; 9 — ветви подбородочного нерва; 10 — щечные ветви лицевого и щечного нервов; 11 — ветви подглазничного нерва и связи с ветвями лицевого нерва; 12 — склеральные ветви (лицевого нерва).

ный нерв появляется вместе с лицевым нервом. В дальнейшем оба нерва вместе с преддверно-улитковым нервом (VIII пара) входят через внутреннее слуховое отверстие каменистой части (пирамиды) височной кости во внутренний слуховой проход. Здесь лицевой и промежуточный нервы соединяются и через *поле лицевого нерва, area n. facialis*, вступают в канал лицевого нерва. В месте изгиба этого канала лицевой нерв образует *коленце, geniculum n. facialis*, и утолщается за счет *узла коленца, ganglion geniculi*.



Этот узел относится к чувствительной части промежуточного нерва.

Лицевой нерв повторяет все изгибы лицевого канала и, выходя из пирамиды через шилососцевидное отверстие, ложится в толщу околоушной железы, где делится на свои основные ветви.

Внутри пирамиды от промежуточно-лицевого нерва отходит ряд ветвей:

1. *Большой каменистый нерв*, *n. petrosus major*, начинается вблизи узла коленца и состоит из парасимпатических волокон промежуточного нерва. Он выходит из пирамиды височной кости через расщелину канала большого каменистого нерва, ложится в одноименную борозду и выходит из полости черепа через рваное отверстие. В дальнейшем этот нерв, пройдя через крыловидный канал клиновидной кости, в котором вместе с симпатическим нервом образует *нерв крыловидного канала*, *n. canalis pterygoidei*, вступает в крыловидно-небную ямку, достигая крылонебного

узла. Преганглионарные парасимпатические волокна большого каменистого нерва переключаются на клетках этого узла [см. «Вегетативная (автономная) нервная система»].

2. *Соединительная ветвь с барабанным сплетением*, *r. communicans* (*сит plexi tympanico*), отходит от узла коленца или от большого каменистого нерва и подходит к малому каменистому нерву.

3. *Стременной нерв*, *n. stapedius*, представляет собой очень тонкую ветвь, которая начинается от нисходящей части лицевого нерва, подходит к стремянной мышце и иннервирует ее.

4. *Соединительная ветвь с блуждающим нервом*, *r. communicans* (*сит nervo vago*) — тонкий нерв, подходит к нижнему узлу блуждающего нерва.

5. *Барабанная струна*. *chorda tympani*, является концевой ветвью промежуточного нерва. Она отходит от ствола лицевого нерва несколько выше шилососцевидного отверстия,

**985. Лицевые нервы и их связи (препаратор В. Бобина).**


**986. Положение нервов во внутреннем слуховом проходе; вид изнутри.**



(*Внутренняя стенка прохода частично удалена.*)

**987. Лицевой нерв, *n. facialis*, и барабанный нерв, *n. tympanicus*; правые.**

(*Положение этих нервов в каменистой части височной кости.*)

## 985





входит в барабанную полость со стороны задней стенки, образуя небольшую дугу, обращенную вогнутостью вниз, и залегает между рукояткой молоточка и длинной ножкой наковальни. Подойдя к каменисто-барабанной щели, барабанная струна покидает через нее череп. В дальнейшем она направляется книзу и, пройдя между медиальной и латеральной крыловидными мышцами, под острым углом входит в язычный нерв. По своему ходу барабанная струна ветвей не отдает, только в самом начале, после выхода из черепа, соединяется несколькими ветвями с ушным узлом.

Барабанная струна состоит из двух видов волокон: предузловых парасимпатических, представляющих собой отростки клеток верхнего слюноотделительного ядра, и волокон вкусовой чувствительности — периферических отростков клеток узла коленца. Центральные отростки этих клеток заканчиваются в ядре одиночного пути.

Часть волокон барабанной струны, входящих в состав язычного нерва, направляется к поднижнечелюстному и подъязычному узлам в составе узловых ветвей язычного нерва (центрореберные волокна), а другая часть достигает слизистой оболочки спинки языка (центростремительные волокна — отростки клеток узла коленца).

Выходя через шилососцевидное отверстие из пирамиды височной кости, лицевой нерв еще до входления в толщу околоушной железы отдает ряд ветвей:

1. *Задний ушной нерв, n. auricularis posterior*, начинается непосредственно под шилососцевидным отверстием, поворачивает кзади и кверху, идет позади наружного уха и разделяется на две ветви: переднюю *ушную ветвь, r. auricularis*, и заднюю — *затылочную ветвь, r. occipitalis*. Ушная ветвь иннервирует заднюю и верхнюю ушные мышцы, поперечную и косую мышцы ушной раковины, противозелковую мышцу. Затылочная ветвь иннервирует затылочное брюшко надчерепной мышцы и соединяется с большим ушным и малым затылочным нервами шейного сплетения и с ушной ветвью блуждающего нерва.

2. *Шилоподъязычная ветвь, r. stylophyoideus*, может отходить от заднего ушного нерва. Это тонкий нерв, который направляется книзу, входит в толщу одноименной мышцы, предварительно соединившись с симпатическим сплетением, расположенным вокруг наружной сонной артерии.

3. *Двубрюшная ветвь, r. digastricus*, может отходить как от заднего ушного нерва, так и от ствола лицевого нерва. Располагается несколько ниже шилоподъязычной ветви, спускается по заднему брюшку двубрюшной мышцы и отдает к ней ветви. Имеет соединительную ветвь с языглотовичным нервом.

4. *Язычная ветвь, r. lingualis*, непостоянная, представляет собой тонкий нерв, огибающий шиловидный отросток и проходящий под небной миндалиной. Отдает соединительную ветвь к языглотовичному нерву и иногда ветвь к шилоязычной мышце.

Вступив в толщу околоушной железы, лицевой нерв делится на две основные ветви: более мощную верхнюю и меньшую нижнюю. Далее эти ветви делятся на ветви второго порядка, которые расходятся радиально: вверх, вперед и вниз к мышцам лица. Между этими ветвями в толще железы образуются соединения, составляющие *околоушное сплетение, plexus parotideus*.

От околоушного сплетения отходят следующие ветви лицевого нерва (см. рис. 983—985).

1. *Височные ветви, rr. temporales*: задняя, средняя и передняя. Они иннервируют верхнюю и переднюю ушные мышцы, лобное брюшко надчерепной мышцы, круговую мышцу глаза, мышцу, сморщающую бровь.

2. *Скуловые ветви, rr. zygomatici*, две, иногда три, направляются вперед и вверх и подходят к скуловым мышцам и к круговой мышце глаза.

3. *Щечные ветви, rr. buccales*, — это три-четыре довольно мощных нерва. Отходят от верхней главной ветви лицевого нерва и посыпают свои ветви к следующим мышцам: большой скуловой, мышце смеха, щечной, поднимающей и опускающей верхнюю и нижнюю губы, поднимающей и опускающей угол рта, круговой мышце рта и носовой. Изредка между симметричными нервными ветвями круговой мышцы глаза и круговой мышцы рта имеются соединительные ветви.

4. *Краевая ветвь нижней челюсти, r. marginalis mandibulae*, направляясь кпереди, проходит вдоль края нижней челюсти и иннервирует мышцы, опускающие угол рта и нижнюю губу, подбородочную мышцу.

5. *Шейная ветвь, r. colli*, в виде 2—3 нервов идет позади угла нижней челюсти, подходит к подкожной мышце, иннервирует ее и отдает ряд

ветвей, соединяющихся с верхней (чувствительной) ветвью шейного сплетения.

## ПРЕДДВЕРНО-УЛИТКОВЫЙ НЕРВ

*Преддверно-улитковый нерв, n. vestibulocochlearis* (VIII пара) (см. рис. 967, 968, 986), — нерв специальной чувствительности, состоящий из двух разных по функции корешков: *преддверного, radix vestibularis*, несущего импульсы от статического аппарата, представленного полукружными протоками вестибулярного лабиринта, и *улиткового, radix cochlearis*, проводящего слуховые импульсы от спирального органа улиткового лабиринта.

*Ядра преддверно-улиткового нерва, nuclei vestibulocochleares*, располагаются в стволовой части мозга между мостом и продолговатым мозгом. Со стороны ромбовидной ямки они проектируются в области преддверного поля (наружные углы ромбовидной ямки; см. рис. 945, 946). На нижней поверхности мозга нерв показывается ниже лицевого нерва, кнаружи от оливы продолговатого мозга.

Периферические волокна улиткового корешка берут начало от *улиткового узла (спирального узла улитки), ganglion cochleare [spirale cochleae]*, и заканчиваются в *спиральном органе, organum spirale*, являющемся воспринимающим прибором слухового пути.

Центральные отростки клеток спирального узла образуют улитковый корешок, который выходит из каменистой части височной кости через внутренний слуховой проход и входит в вещества мозга. Заканчивается в заднем и переднем улитковых ядрах, от которых импульсы идут к подкорковым центрам, а затем к корковому центру слухового анализатора (см. «Преддверно-улитковый орган»).

Преддверный корешок начинается от *преддверного узла, ganglion vestibulare*, залегающего во внутреннем слуховом проходе. Узел подразделяют на две части: *верхнюю, pars rostralis [superior]*, и *нижнюю, pars caudalis [inferior]*; клетки узла биполярны.

Периферические отростки клеток преддверного узла подходят к рецепторным клеткам сферического мешочка, эллиптического мешочка и полукружным протокам. Центральные отростки входят в состав преддверного корешка, подходят к преддверным ядрам вестибулярного поля ромбовидной ямки.

## ЯЗЫКОГЛОТОЧНЫЙ НЕРВ

**Языкоглоточный нерв, n. glossopharyngeus** (IX пара) (рис. 988—992; см. рис. 967, 968, 1065, 1066), по своему характеру смешанный.

Он содержит чувствительные, двигательные и парасимпатические секреторные волокна.

Разные по характеру волокна представляют собой аксоны различных ядер, причем некоторые ядра общие с блуждающим нервом.

Ядра языковоглоточного нерва залегают в задних отделах продолговатого мозга. Выделяют чувствительное ядро одиночного пути, *nucleus tractus solitarius*; двигательное двойное ядро,


*nucleus ambiguus*; парасимпатическое (секреторное) нижнее слюноотделительное ядро, *nucleus salivatorius inferior* (см. рис. 945, 946).


На поверхности ромбовидной ямки указанные ядра проецируются в задней части продолговатого мозга: двигательное ядро — в области треугольника блуждающего нерва; чувствительное ядро — кнаружи от пограничной борозды; вегетативное ядро — соответственно пограничной борозде, медиальнее двойного ядра.

Языкоглоточный нерв появляется на нижней поверхности мозга 4—6 корешками позади оливы, ниже VIII пары. Он направляется кнаружи и вперед и выходит из черепа через

## 988. Нервы головы и шеи; вид спереди

(Позвоночный канал вскрыт; удалены задние отделы черепа и головного мозга, правая половина нижней челюсти, частично жевательные мышцы, общая сонная артерия.)





**989. Нервы барабанной полости и слуховой трубы, левой (фотография). Препаратор Д. Розенгауза.**  
(Барабанная полость и слуховая труба вскрыты снаружи, удалены чешуйчатая часть и частично сосцевидный отросток височной кости.)

1—соединительная ветвь барабанного сплетения с лицевым нервом; 2—лицевой нерв; 3—боковой полукружный канал; 4—сосцевидные ячейки; 5—барабанная полость; 6—барабанное сплетение; 7—яремная стенка; 8—барабанный нерв; 9—языкоглоточный нерв; 10—каменистая ямка; 11—ветви трубы; 12—глоточное отверстие слуховой трубы; 13—тело клиновидной кости; 14—внутренняя сонная артерия; 15—малый каменистый нерв; 16—покрышка барабанной полости.

передний отдел яремного отверстия. В области отверстия нерв несколько утолщается за счет расположенного здесь *верхнего узла*, *ganglion rostralis [superius]*. Выйдя через яремное отверстие, нерв вторично утолщается за счет *нижнего узла*, *ganglion caudalis [inferius]*, залегающего в каменистой ямке на нижней поверхности пирамиды височной кости.

Чувствительные (афферентные) волокна являются отростками клеток верхнего и нижнего узлов языкоглоточного нерва, причем периферические следуют в составе нерва к органам, а центральные образуют одиночный путь, вокруг которого нервные клетки собраны в ядро одиночного пути (чувствительное). Часть волокон проходит к верхней части заднего ядра блуждающего нерва.

Двигательные (эфферентные) волокна представляют собой аксоны нервных клеток соматического двойного ядра, залегающего в задней части продолговатого мозга. Эти волокна составляют нерв к шилоглоточной мышце.

Парасимпатические (секреторные) волокна берут начало в вегетативном *нижнем слюноотделительном ядре*, *nucleus salivatorius caudalis [inferior]*, которое залегает несколько кпереди и медиальнее соматического двойного ядра.

исходит переключение парасимпатических волокон.

Все три отдела: барабанный нерв, барабанное сплетение и малый каменистый нерв—связывают нижний узел языкоглоточного нерва с ушным узлом.

Барабанный нерв или барабанное сплетение имеет соединения с лицевым нервом (с его ветвью—большим каменистым нервом) и с симпатическим сплетением внутренней сонной артерии посредством *сонно-барабанных нервов*, *rr. caroticotympanici*.

Барабанный нерв отдает следующие ветви:

1) *трубную ветвь*, *r. tubarius*, к слизистой оболочке слуховой трубы;

2) *соединительную ветвь с ушной ветвью блуждающего нерва*, *r. sympathetic (cum rami auriculi n. vagi)*.

Кроме того, встречаются 2—3 тонкие барабанные ветви к слизистой оболочке, покрывающей барабанную перепонку со стороны барабанной полости, и к ячейкам сосцевидного отростка, а также небольшие ветви к окну преддверия и окну улитки.

II. Ветви, начинающиеся от ствола языкоглоточного нерва:

1. *Глоточные ветви*, *rr. pharyngei*,—это 3—4 нерва, начинаются от ствола языкоглоточного нерва там, где последний проходит между наружной и внутренней сонными артериями. Ветви направляются к боковой поверхности глотки, где, соединяясь с одноименными ветвями блуждающего нерва (сюда также подходят ветви от симпатического ствола), образуют *глоточное сплетение*, *plexus pharyngeus*.

2. *Синусная ветвь*, *r. sinus carotici*, одна-две тонкие ветви, вступают в стенку сонного синуса и в толщу сонного гломуса.

3. *Ветви шилоглоточной мышцы*, *r. musculi stylopharyngei*, идет к соответствующей мышце и вступает в нее несколькими ветвями.

4. *Миндаликовые ветви*, *rr. tonsillares*, отходят от основного ствола 3—5 ветвями в том месте, где он проходит возле миндалины. Ветви эти короткие, направляются вверх и достигают слизистой оболочки небных дужек и миндалины.

5. *Язычные ветви*, *rr. linguales*, являются концевыми ветвями языкоглоточного нерва. Они прободают толщу корня языка и разделяются в нем на более тонкие, соединяющиеся между собой ветви. Концевые раз-

От основания черепа языкоглоточный нерв направляется вниз, идет между внутренней сонной артерией и внутренней яремной веной, образуя дугу, следует вперед, несколько вверх и входит в толщу корня языка.

По своему ходу языкоглоточный нерв отдает ряд ветвей.

I. Ветви, начинающиеся от нижнего узла:

*Барабанный нерв*, *n. tympanicus* (см. рис. 987, 989), по своему составу является афферентным и парасимпатическим. Он отходит от нижнего узла языкоглоточного нерва, входит в барабанную полость и идет по ее медиальной стенке. Здесь барабанный нерв образует небольшое *барабанное утолщение* [узел], *intumescentia [ganglion] tympanica*, а затем распадается на ветви, которые в слизистой оболочке среднего уха составляют *барабанное сплетение*, *plexus tympanicus*.

Следующий участок нерва, который является продолжением барабанного сплетения, выходит из барабанной полости через расщелину канала малого каменистого нерва под названием *малого каменистого нерва*, *n. petrosus minor*. К последнему подходит соединительная ветвь от большого каменистого нерва. Выходя из полости черепа через клиновидно-каменистую щель, нерв подходит к ушному узлу (см. рис. 973), где про-

ветвления этих нервов, несущих как вкусовые волокна, так и волокна общей чувствительности, заканчиваются в слизистой оболочке задней трети языка, занимая область от передней поверхности надгортанного хряща до желобовидных сосочеков языка включительно (см. рис. 923, 1155).

Не доходя до слизистой оболочки, эти ветви соединяются по средней линии языка с одноименными ветвями противоположной стороны, а также с ветвями язычного нерва (от тройничного нерва).

Чувствительные волокна языкоглоточного нерва, заканчивающиеся в слизистой оболочке задней трети языка, проводят вкусовые раздражения через периферические узлы языкоглоточного нерва к ядру одиночного пути. Сюда же приносят вкусовые раздражения волокна промежуточного нерва (барабанная струна) и блуждающего нерва. В дальнейшем раздражения достигают таламуса и, как полагают, доходят до области крючка (см. рис. 1156).

**990. Нервы шеи; вид справа.**  
(Правая половина нижней челюсти удалена; отношение верхнего шейного узла симпатического ствола, языкоглоточного и блуждающего нервов к сонным артериям, их сплетениям и к межсонному параганглию.)


### БЛУЖДАЮЩИЙ НЕРВ


**Блуждающий нерв, n.vagus** (X пара) (рис. 993; см. рис. 967, 968, 988, 990, 991, 1065, 1066), является смешанным, так как имеет в своем составе чувствительные и двигательные волокна, а также волокна автономной (вегетативной) системы, как парасимпатические, так и симпатические. У блуждающего нерва различают три ядра, залегающие в продолговатом мозге:


- 1) чувствительное ядро одиночного пути;
- 2) двигательное двойное ядро;
- 3) вегетативное (парасимпатическое) заднее ядро блуждающего нерва. Первые два ядра являются общими с языкоглоточным нервом (см. рис. 942, 945, 946).

1. Ядро одиночного пути, *nucleus solitarius*, проецируется со стороны ромбовидной ямки, несколько латеральнее пограничной борозды, и залегает значительно дорсальнее двойного ядра.

2. Двойное ядро, *nucleus ambiguus*, располагается в передних отделах








**991. Нервы шеи; вид спереди (препаратор О. Столовой).**  
*(Верхняя полая вена и легочная артерия удалены; на передней поверхности дуги аорты видна соединительная ветвь между обоими, правым и левым, блуждающими нервами.)*

**992. Нервы шеи и груди; вид сзади.**

*(Позвоночный столб и задние отделы ребер удалены; легкие оттянуты в стороны; грудная часть аорты, задняя стенка глотки и пристеночный листок плевры частично удалены.)*



**993. Нервы и сплетения органов грудной полости; вид слева (препаратор Р. Синельникова).**  
(Пристеночный листок брюшины и внутргрудная фасция удалены; левое легкое отведено вправо.)

продолговатого мозга, глубже заднего ядра блуждающего нерва, и проецируется на поверхности ромбовидной ямки соответственно пограничной борозде.

3. *Заднее ядро блуждающего нерва, nucleus dorsalis n.vagi*, располагается в продолговатом мозге латеральное ядра подъязычного нерва; на поверхности ромбовидной ямки проецируется в области треугольника блуждающего нерва.

Симпатические волокна поступают в блуждающий нерв и его ветви по соединительным ветвям от узлов симпатического ствола.

На нижней поверхности мозга блуждающий нерв показывается 10—15 корешками из толщи продолговатого мозга позади оливы. Направляясь латерально и вниз, блуждающий нерв покидает череп через переднюю часть яремного отверстия вместе с языко-глоточным и добавочным нервами, располагаясь между ними. В области яремного отверстия блуждающий нерв утолщается за счет *верхнего узла, ganglion rostralis [superius]*, а немногим ниже, через 1,0—1,5 см, имеется еще один узел несколько больших размеров — *нижний узел, ganglion caudalis [inferius]*.

В промежутке между этими узлами к блуждающему нерву подходит внутренняя ветвь добавочного нерва. Спускаясь ниже, блуждающий нерв в области шеи ложится на заднюю поверхность внутренней яремной вены и следует до верхней апертуры грудной клетки, располагаясь в желобе между указанной веной и находящимися медиальнее вначале внутренней сонной, а затем общей сонной артериями.

Блуждающий нерв с внутренней яремной веной и общей сонной артерией заключен в одно общее соединительнотканное влагалище, образуя сосудисто-нервный пучок шеи.

В области верхней апертуры грудной клетки блуждающий нерв располагается между подключичной артерией (позади) и подключичной веной (впереди).

Вступив в грудную полость, левый блуждающий нерв ложится на переднюю поверхность дуги аорты, а правый блуждающий нерв — на переднюю поверхность начального отдела правой подключичной артерии. Затем оба блуждающих нерва отклоняются несколько кзади, огибают заднюю поверхность бронхов и подходит

к пищеводу, где рассыпаются на ряд крупных и мелких нервных ветвей и теряют характер изолированных нервных стволов (см. рис. 992, 993, 1068, 1069, 1086).

Ветви левого и правого блуждающих нервов направляются на переднюю (преимущественно от левого нерва) и заднюю (преимущественно от правого нерва) поверхности пищевода и образуют *пищеводное сплетение, plexus esophageus*.

Из ветвей указанных сплетений у пищеводного отверстия диафрагмы образуются соответственно *передний и задний блуждающие стволы, trunci vagales anterior et posterior*, которые вместе с пищеводом проникают в брюшную полость. Как передний, так и задний ствол содержит волокна левого и правого блуждающего нервов.

В брюшной полости передний и задний стволы посыпают ряд ветвей к органам брюшной полости и чревному сплетению.

По своему ходу каждый блуждающий нерв делится на четыре отдела: головной, шейный, грудной и брюшной.

**Головной отдел блуждающего нерва** самый короткий, доходит до нижнего узла. От него отходят следующие ветви:

1. *Менингеальная ветвь, r. meningea*, отходит непосредственно от верхнего узла, направляется в полость черепа и иннервирует твердую оболочку головного мозга (поперечный и затылочный венозные синусы).

2. *Ушная ветвь, r. auricularis* (см. рис. 1066), как правило, начинается от верхнего узла или ниже — от ствола нерва, направляется кзади, следует по наружной поверхности луковицы внутренней яремной вены, подходит к яремной ямке и вступает в сосцевидный каналец. В толще пирамиды височной кости ушная ветвь обменивается волокнами с лицевым нервом и покидает пирамиду через барабанно-сосцевидную щель. Затем ушная ветвь делится на две ветви, которые появляются позади наружного уха, вблизи наружного конца костной части слухового прохода. Одна из ветвей соединяется с задним ушным нервом от лицевого нерва, другая иннервирует кожу задней стенки наружного слухового прохода.

3. *Соединительная ветвь с языко-глоточным нервом, r. communicans (cum nervo glossopharyngeo)*, соеди-

няет верхний узел блуждающего нерва и нижний узел языко-глоточного нерва.

4. Соединительная ветвь с добавочным нервом представлена *внутренней ветвью добавочного нерва, r. internus n. accessorius*. Это довольно мощный ствол, вступающий в состав блуждающего нерва между верхним и нижним узлами. Кроме того, от блуждающего нерва небольшие ветви направляются к добавочному нерву. Некоторые авторы описывают соединительную ветвь между верхним узлом блуждающего нерва и верхним шейным симпатическим узлом.

**Шейный отдел блуждающего нерва** тянется от нижнего узла до отхождения возвратного горланиного нерва (см. рис. 991—993). На этом протяжении от блуждающего нерва отходят следующие ветви:

1. *Глоточные ветви, rr. pharyngei*, часто отходят от нижнего узла, но могут отходить и ниже. Различают две ветви: верхнюю — большую и нижнюю — меньшую. Ветви идут по наружной поверхности внутренней сонной артерии вперед и несколько кнутри, соединяются с ветвями языко-глоточного нерва и ветвями симпатического ствола, образуя на среднем констрикторе глотки *глоточное сплетение, plexus pharyngeus*. Ветви, отходящие от этого сплетения, иннервируют мышцы и слизистую оболочку глотки. Кроме того, от верхней ветви идут нервы к мышце, поднимающей небную занавеску, и к мышце язычка.

2. *Верхний горланий нерв, n. laryngeus superior* (см. рис. 991), начинается от нижнего узла, идет книзу вдоль внутренней сонной артерии, принимая ветви от верхнего шейного симпатического узла и глоточного сплетения, и подходит к боковой поверхности горлани. Перед этим он расходится на ветви:

1) *наружная ветвь, r. externus*, иннервирует слизистую оболочку глотки, частично щитовидную железу, а также нижний констриктор глотки и перстнешитовидную мышцу; часто эта ветвь соединяется с наружным сонным сплетением;

2) *внутренняя ветвь, r. internus*, идет вместе с верхней горланиной артерией, прободает щитоподъязычную мембрану и своими ветвями иннервирует слизистую оболочку горлани (выше голосовой щели), надгорланика и частично корня языка;

3) соединительная ветвь с нижним гортанным нервом, *r. communicans* (*cum nervo laryngeo inferiori*), отходит от внутренней ветви верхнего гортанного нерва.

3. Верхние шейные сердечные ветви, *rr. cardiaci cervicales superiores* (см. рис. 1061, 1066, 1092), в количестве 2—3, отходят от ствола блуждающего нерва и направляются вдоль общей сонной артерии, причем ветви правого блуждающего нерва идут впереди плечеголовного ствола, левого — впереди дуги аорты. Здесь верхние шейные сердечные ветви соединяются с сердечными нервами от симпатического ствола и, подойдя к сердцу, входят в состав *сердечного сплетения*, *plexus cardiacus*.

4. Нижние шейные сердечные ветви, *rr. cardiaci cervicales inferiores* (см. рис. 993), более многочисленные и значительно толще верхних, отходят несколько ниже возвратного гортанного нерва. Направляясь к сердцу, ветви соединяются с остальными сердечными ветвями от блуждающего нерва и от симпатического ствола и также принимают участие в образовании сердечного сплетения.

5. Возвратный гортанный нерв, *n. laryngeus recurrens* (см. рис. 991—993), отходит от основного ствола справа — на уровне подключичной артерии, а слева — на уровне дуги аорты. Обогнув снизу указанные сосуды спереди назад, возвратные нервы направляются кверху в борозде между трахеей и пищеводом, достигая своими концевыми ветвями гортани.

На своем протяжении возвратный гортанный нерв отдает ряд ветвей (см. рис. 992):

1) трахеальные ветви, *rr. tracheales*, направляются к передней поверхности нижней части трахеи. По своему ходу они соединяются с симпатическими ветвями и подходят к трахее;

2) пищеводные ветви, *rr. esophagei*, иннервируют пищевод;

3) нижний гортанный нерв, *n. laryngeus inferior*, является концевой ветвью возвратного нерва. По своему ходу он делится на переднюю и заднюю ветви:

а) передняя ветвь иннервирует латеральную перстнечерпаловидную, щиточерпаловидную, щитонадгортанную, голосовую и черпалонадгортанную мышцы;

б) задняя, или соединительная, ветвь с внутренней гортанной ветвью, *r. communicans* (*cum rami laryngeo*

*inferiori*), в своем составе имеет как двигательные, так и чувствительные волокна. Последние подходят к слизистой оболочке гортани ниже голосовой щели. Двигательные волокна задней ветви иннервируют заднюю перстнечерпаловидную и поперечную черпаловидную мышцы.

Кроме того, в шейном отделе блуждающего нерва имеется еще несколько соединительных ветвей: 1) с верхним шейным симпатическим узлом (см. рис. 1065); 2) с подъязычным нервом (см. рис. 966, 1065); 3) между возвратным гортанным нервом и шейно-грудным узлом симпатического ствола (см. рис. 992, 994).

Грудной отдел блуждающего нерва начинается в месте отхождения возвратных нервов и заканчивается в месте прохождения блуждающего нерва через пищеводное отверстие диафрагмы. В грудной полости блуждающий нерв отдает следующие ветви (см. рис. 992, 993):

1. Грудные сердечные ветви, *rr. cardiaci thoracici*, начинаются ниже возвратного гортанного нерва, следуют вниз и медиально, соединяются с нижними сердечными ветвями, посыпают ветви к воротам легких и вступают в сердечное сплетение.

2. Бронхиальные ветви, *rr. bronchiales*, разделяются на менее мощные передние ветви (4—5) и более мощные и многочисленные задние ветви.

3. Легочное сплетение, *plexus pulmonalis*, образуется передними и задними бронхиальными ветвями, соединяющимися с ветвями верхних трех-четырех грудных симпатических узлов симпатического ствола. Ветви, отходящие от этого сплетения, соединяются между собой и вступают с бронхами и сосудами в ворота легких, разветвляясь в паренхиме последних.

4. Пищеводное сплетение, *plexus esophageus*, представлено множеством различного диаметра нервов, которые отходят от каждого блуждающего нерва ниже корня легкого. По своему ходу эти ветви соединяются между собой и с ветвями от верхних 4—5 грудных узлов симпатических стволов и образуют в окружности пищевода сплетение.

Сплетение окружает всю нижнюю часть пищевода и посылает часть ветвей к его мышечной и слизистой оболочкам.

Брюшной отдел блуждающего нерва представлен передним и задним блуждающими стволами, *trunci vagales*

*anterior et posterior* (см. рис. 993, 1072, 1075). Оба ствола формируются из пищеводного сплетения и по передней и задней поверхностям пищевода вступают в брюшную полость либо одиночными стволами, либо несколькими ветвями.

Задний ствол блуждающего нерва в области кардии посыпает ряд ветвей — задние желудочные ветви, *rr. gastrici posteriores*, на заднюю поверхность желудка, а сам отклоняется кзади, образуя чревные ветви, *rr. celiaci*, идущие по ходу левой желудочной артерии к чревному сплетению, *plexus celiacus*. Волокна, составляющие чревные ветви, проходят через чревное сплетение к брюшным органам.

Передний ствол блуждающего нерва в области желудка соединяется с симпатическими нервами, сопровождающими левую желудочную артерию, и посыпает 1—3 ветви между листками малого сальника к печени — печеночные ветви, *rr. hepatici*. Остальная часть переднего ствола следует вдоль передней периферии малой кривизны желудка и отдает здесь многочисленные передние желудочные ветви, *rr. gastrici anteriores*, к передней поверхности желудка.

Желудочные ветви от переднего и заднего стволов в подсерозном слое желудка соединяются с нервами, подходящими сюда по левой желудочной артерии, и образуют переднее и заднее сплетения желудка.

## ДОБАВОЧНЫЙ НЕРВ

Добавочный нерв, *n. accessorius* (XI пара), — двигательный (см. рис. 967, 968, 980, 1065, 1066). Ядра добавочного нерва, *nuclei n. accessorii*, располагаются в двух местах. Одно ядро (церебральное) — двойное ядро, *nucleus ambiguus*, вытянутое, залегает в задних отделах продолговатого мозга и является также двигательным ядром языголоточного и блуждающего нервов. Волокна, отходящие от этого ядра, образуют церебральную часть добавочного нерва, которая выходит на основании мозга из борозды продолговатого мозга, позади оливы.

Второе ядро — ядро добавочного нерва, *nucleus n. accessorii*, залегает в заднебоковом отделе переднего рога серого вещества спинного мозга на протяжении верхних пяти-шести шейных сегментов.

Корешки, выходящие из продолговатого мозга,—*черепные корешки [блуждающая часть], radices craniales [pars vagalis]*, четыре-пять, образуют верхний, или церебральный, корешок добавочного нерва.

Корешки, отходящие от бокового канатика спинного мозга, между передними и задними корешками,—*спинномозговые корешки [спинномозговая часть], radices spinale [pars spinalis]*, объединяясь, образуют спинномозговой корешок добавочного нерва, который поднимается вверх и через большое затылочное отверстие проникает в полость черепа. Здесь обе группы волокон соединяются и образуют *ствол добавочного нерва, truncus n. accessorii*. Этот ствол через яремное отверстие (вместе с IX и X парами) выходит из полости черепа и разделяется на две ветви:

1. *Внутренняя ветвь, r. internus*, подходит к блуждающему нерву и входит в его состав; в этой ветви имеется больше волокон блуждающей части.


2. *Наружная ветвь, r. externus*, следует вниз и на уровне угла нижней челюсти отклоняется кзади под грудино-ключично-сосцевидную мышцу; здесь добавочный нерв отдает к ней ряд *мышечных ветвей, rr. musculares*, соединяясь в ее толще с ветвями шейного сплетения (третий шейный нерв). Дальше нерв выходит из-под наружного края этой мышцы, выше середины его протяжения, в область латерального шейного треугольника, вступает под передний край трапециевидной мышцы и иннервирует последнюю.

#### ПОДЪЯЗЫЧНЫЙ НЕРВ


*Подъязычный нерв, n. hypoglossus* (XII пара),—двигательный (рис. 994; см. рис. 967, 968, 990—992, 1065, 1066).

*Ядро подъязычного нерва, nucleus n. hypoglossi*, двигательное, залегает в средних отделах задней части про-


**994.** Ветви подъязычного нерва в подбородочно-язычной (А), подъязычно-язычной (Б) и шилоязычной (В) мышцах языка (фотография. Препаратор Я. Синельникова).



А



Б



В

долговатого мозга. Со стороны ромбовидной ямки оно проецируется в области треугольника подъязычного нерва (см. рис. 945, 946).

Из вещества мозга подъязычный нерв выходит 10—15 корешками из борозды между пирамидой и оливой продолговатого мозга. Корешки объединяются в общий ствол, который через подъязычный канал выходит из полости черепа, следует вниз между блуждающим нервом и внутренней яремной веной, огибает снаружи внутреннюю сонную артерию, проходя между нею и внутренней яремной веной. Далее он пересекает наружную сонную артерию в виде выпуклой вниз дуги, подходит под заднее брюшко двубрюшной мышцы и подши-

лоподъязычную мышцу в область подчелюстного треугольника и, вступив в мышцы языка, отдает язычные ветви.

**Язычные ветви, rr. linguales**, — концевые ветви подъязычного нерва, подходят к нижней поверхности языка и иннервируют как собственные, так и скелетные мышцы последнего (см. рис. 994).

По своему ходу подъязычный нерв отдает ряд ветвей, которые соединяют его с другими нервами:

1) соединительная ветвь с верхним шейным узлом симпатического ствола (см. рис. 988, 990, 992, 993);

2) соединительная ветвь с нижним узлом блуждающего нерва (см. рис. 988, 990);

3) соединительная ветвь с язычной ветвью блуждающего нерва;

4) соединительная ветвь с шейной петлей (см. рис. 975, 977, 989), которая представляет собой нисходящую ветвь подъязычного нерва, содержащую двигательные волокна от  $C_1$  и  $C_2$  и принимающую участие в образовании шейной петли (см. «Шейное сплетение»);

5) соединительная ветвь с язычным нервом тройничного нерва.

Кроме соединительных ветвей, подъязычный нерв в самом начале отдает ветви к твердой оболочке головного мозга, которые отходят от него в области подъязычного канала и подходят к стенкам затылочного синуса.

### Черепные нервы

Пара нервов	Название нерва	Ядра			Локализация ядер	Место выхода из мозга	Место выхода из черепа	Область распространения основных ветвей
		двигательные	чувствительные	автономные (вегетативные)				
I	Обонятельные нервы, nn. olfactoryi				Bulbus olfactorius	Lamina cribrosa ossis ethmoidalis		Regio olfactoria tunicae mucosi nasi
II	Зрительный нерв, n. opticus				Chiasma opticum	Canalis opticus	Retina	
III	Глазодвигательный нерв, n. oculomotorius	Nucleus n. oculomotorii	Nucleus accessorius oculomotorius	Центральное серое вещество покрышки ножки мозга на уровне верхних холмиков крыши среднего мозга	Sulcus oculomotorius pedunculi cerebri	Fissura orbitalis superior	M. rectus superior, m. rectus inferior, m. levator palpebrae superioris, m. rectus medialis, m. obliquus inferior	
IV	Блоковый нерв, n. trochlearis	Nucleus n. trochlearis		Центральное серое вещество покрышки ножки мозга на уровне нижних холмиков крыши среднего мозга	Позади пластинки крыши, по бокам от уздечки верхнего мозгового папуса и огибают ножки мозга	Fissura orbitalis superior	M. obliquus superior	
V	Тройничный нерв, n. trigeminus	Nucleus motorius n. trigemini	Nucleus pontinus n. trigemini	Задняя часть моста — в срединном возвышении, кнутри от голубоватого места	Передняя поверхность моста на границе со средней мозжечковой ножкой	N. ophthalmicus — fissura orbitalis superior		Кожа лба, спинки носа, верхнего века, глазное яблоко, слезная железа, слезный мешок, слизистая оболочка полости носа и клиновидной пазухи, dura mater
			Nucleus spinalis n. trigemini	Задняя часть моста кнаружи и кзади от двигательного ядра в области голубоватого места				
				Задний отдел продолговатого мозга, начинается позади предыдущего ядра, идет в каудальном направлении, достигая верхних отделов спинного мозга		N. maxillaris foramen rotundum		Кожа нижнего века, носа, щеки, верхней губы, отчасти лба и височной области; слизистая оболочка полости носа, верхнечелюстной пазухи, верхней губы, неба; десны и зубы верхней челюсти; твердая оболочка головного мозга

Продолжение таблицы

Пара нервов	Название нерва	Ядра			Локализация ядер	Место выхода из мозга	Место выхода из черепа	Область распространения основных ветвей
		двигательные	чувствительные	автономные (вегетативные)				
VI	Отводящий нерв, <i>n. abducens</i>	Nucleus n. abducens		Nucleus tractus mesencephalici n. trigemini	На всем протяжении центрального серого вещества среднего мозга, сбоку от водопровода мозга		N. mandibularis — foramen ovale	Слизистая оболочка языка и дна полости рта, нижней губы, щеки; кожа подбородка, виска; височно-нижнечелюстной сустав; десна и зубы нижней челюсти; твердая оболочка головного мозга; жевательные мышцы; mm. masseter, temporalis, pterygoidei lateralis et medialis, а также m. mylohyoides, переднее брюшко m. digastricus, m. tensor tympani, m. tensor veli palatini
VII	Лицевой нерв, <i>n. facialis</i> ; промежуточный нерв, <i>n. intermedius</i> ( <i>n. intermediofacialis</i> )	Nucleus n. facialis		Nucleus tractus solitarius (промежуточный нерв)	Задняя часть моста в толще colliculi facialis	Позади моста из борозды между мостом и пирамидой продолговатого мозга	Fissura orbitalis superior	M. rectus lateralis
				Nucleus salivatorius superior (промежуточный нерв)	Центральный отдел задней части моста, ретикулярная формация кзади и кнаружи от ядра <i>n. abducens</i>	Между средней мозговой ножкой и оливой продолговатого мозга	Porus acusticus internus, canalis facialis, foramen stylomastoideum	Двигательные волокна иннервируют m. stapedius, platysma; все мимические мышцы и мышцы волосистой части головы, заднее брюшко m. digastricus, m. stylohyoides
					Начинается в области моста, достигая задней части продолговатого мозга в formatio reticularis кнаружи от nucleus <i>n. facialis</i> (общее ядро с <i>n. glossopharyngeus</i> et <i>n. vagus</i> )			Чувствительные (вкусовые волокна иннервируют передние 2/3 языка)
VIII	Преддверно-улитковый нерв, <i>n. vestibulocochlearis</i>				Zадняя часть моста в области areae vestibularis	Позади моста, между ним и оливой продолговатого мозга	Porus acusticus internus	Вегетативные волокна иннервируют слезную железу, железы твердого и мягкого неба, поджичечностную и подъязычную, слюнные железы и железы дна полости рта
	a) <i>pars vestibularis</i>			Nuclei vestibulares, medialis, lateralis superior et inferior				<i>N. vestibularis</i> — ampullae canalium semicircularium, utriculus et sacculus
	b) <i>pars cochlearis</i>			Nuclei cochleares ventralis et dorsalis				<i>N. cochlearis</i> — спиральный орган
IX	Языкоглоточный нерв <i>n. glossopharyngeus</i>	Nucleus ambiguus			Глубоко в задней части продолговатого мозга, в области треугольника блуждающего нерва	Позади <i>n. vestibulocochlearis</i> из sulcus lateralis posterior dorsальнее оливы	Foramen jugulare	Слизистая оболочка среднего уха, сосцевидного отростка, слуховой трубы, языка, глотки, небных дужек и миндалин; <i>glossus caroticum</i> ; <i>m. stylopharyngeus</i> ; <i>glandula parotis</i>

Продолжение таблицы

Пара нервов	Название нерва	Ядра			Локализация ядер	Место выхода из мозга	Место выхода из черепа	Область распространения основных ветвей
		двигательные	чувствительные	автономные (вегетативные)				
X	Блуждающий нерв, <i>n. vagus</i>	Nucleus ambiguus		Nucleus solitarius	B в задней части продолговатого мозга, в формации reticularis, отходит от sulcus limitans (см. п. facialis — промежуточный нерв)			
				Nucleus salvatorius inferior	Залегает глубоко в задней части продолговатого мозга, в области sulcus limitans, переди от nucleus ambiguus			
				Nucleus solitarius	В продолговатом мозге латеральнее ядра подъязычного нерва и несколько глубже дорсального ядра блуждающего нерва (см. п. glossopharyngeus)	Позади п. glossopharyngeus из sulcus lateralis posterior	Foramen jugulare	Органы шеи, грудной и брюшной полостей, твердая мозговая оболочка, кожа слухового прохода и ушной раковины
XI	Добавочный нерв, <i>n. accessorius</i>	Nucleus ambiguus		Nucleus dorsalis <i>n. vagi</i>	Задняя часть продолговатого мозга в п. trigonum <i>n. vagi</i> латеральнее ядра подъязычного нерва			
				Nucleus <i>n. accessorii</i>	Задний отдел продолговатого мозга как часть одноименного ядра языкошеечного и блуждающего нервов	Позади п. vagus из sulcus dorsolateralis продолговатого мозга и бокового канатика спинного мозга, в промежутке между передними и задними рогами	Foramen jugulare	R. externus <i>n. accessorii</i> — mm. trapezius et sternocleidomastoideus
XII	Подъязычный нерв, <i>n. hypoglossus</i>	Nucleus <i>n. hypoglossi</i>			В сером веществе заднебокового отдела переднего рога шести верхних шейных сегментов спинного мозга			R. internus <i>n. accessorii</i> вступает в состав п. <i>vagi</i>
					В области trigonum <i>n. hypoglossi</i> задней части продолговатого мозга	Из sulcus anterolateralis продолговатого мозга, вентральнее оливы	Canalis hypoglossi	Мышцы языка. Принимает участие в образовании ansa cervicalis, иннервирующей подъязычную группу мышц

## СПИННОМОЗГОВЫЕ НЕРВЫ

**Спинномозговые нервы, nn. spinales** (рис. 995—997), представляют собой парные (31 пара), метамерно расположенные нервные стволы:

1. Шейные нервы, nn. *cervicales* ( $C_1$ — $C_{VII}$ ), 8 пар
2. Грудные нервы, nn. *thoracici* ( $Th_1$ — $Th_{XII}$ ), 12 пар
3. Поясничные нервы, nn. *lumbales* ( $L_1$ — $L_V$ ), 5 пар
4. Крестцовые нервы, nn. *sacrales* ( $S_1$ — $S_V$ ), 5 пар
5. Копчиковый нерв, n. *coccygeus* ( $Co_1$ — $Co_{III}$ ), 1 пара, реже две


Спинномозговой нерв является смешанным и образуется путем слияния принадлежащих ему двух корешков: 1) **заднего корешка** [чувствительного], *radix dorsalis* [*sensoria*], и 2) **переднего корешка** [двигательного], *radix ventralis* [*motoria*]. Каждый корешок связан со спинным мозгом **корешковыми нитями**, *fila radicularia*. Задний корешок в области заднелатеральной борозды связан со спинным мозгом **корешковыми нитями заднего корешка**, *fila radicularia radicis dorsalis*, а передний корешок в области переднелатеральной борозды — **корешковыми нитями переднего корешка**, *fila radicularia radicis ventralis*.

Задние корешки более толстые, так как каждому из них принадлежит спинномозговой узел [чувствительный], *ganglion spinale* [*sensorius*]. Исключение составляет первый шейный нерв, у которого передний корешок крупнее заднего. Иногда отсутствует узел в корешке копчикового нерва.

Передние корешки узлов не имеют. В месте образования спинномозговых нервов передние корешки только прилегают к спинномозговым узлам и соединяются с ними при помощи соединительной ткани.

Соединение корешков в спинномозговой нерв происходит латерально от спинномозгового узла.

Корешки спинномозговых нервов проходят вначале в подпаутинном пространстве и окружены непосредственно мягкой мозговой оболочкой. Между передними и задними корешками в подпаутинном пространстве проходит зубчатая связка. Вблизи межпозвоночных отверстий корешки плотно покрыты всеми тремя мозговыми оболочками, которые срастаются между собой и продолжаются в соединительнотканное влагалище




спинномозгового нерва (см. рис. 879, 954, 956).

Корешки спинномозговых нервов направляются от спинного мозга к межпозвоночному отверстию (см. рис. 879, 997): 1) корешки верхних шейных нервов располагаются почти горизонтально; 2) корешки нижних шейных нервов и двух верхних грудных идут от спинного мозга косо вниз, располагаясь перед вступлением в межпозвоночное отверстие на один позвонок ниже от места отхождения из спинного мозга; 3) корешки следующих 10 грудных нервов следуют еще более наклонно вниз и перед вступлением в межпозвоночное отверстие находятся приблизительно на два позвонка ниже своего начала; 4) корешки 5 поясничных, 5 крестцовых и копчикового нерва направляются вниз вертикально и образуют с одноименными корешками противоположной стороны **конский хвост**, *cauda equina*, который находится в полости твердой мозговой оболочки. Отделяясь от конского хвоста, корешки направляются кнаружи и еще в позвоночном канале соединяются в **ствол спинномозгового нерва**, *truncus spinalis*.

Большинство спинномозговых узлов залегает в межпозвоночных отверстиях; нижние поясничные узлы располагаются частично в позвоночном канале; крестцовые узлы, кроме последнего, залегают в позвоночном канале вне твердой мозговой оболочки. Спинномозговой узел копчикового нерва находится внутри полости

### 995. Сегмент спинного мозга (полусхематично).

- 1 — columna posterior; 2 — columna lateralis;
- 3 — funiculus lateralis; 4 — r. dorsalis; 5 — r. ventralis;
- 6 — u. spinalis; 7 — columna anterior;
- 8 — funiculus anterior; 9 — radix ventralis;
- 10 — ganglion spinale; 11 — radix dorsalis;
- 12 — funiculus posterior.



996. Спинномозговые нервы, nn. spinales; вид спереди (схема).


твёрдой мозговой оболочки. Корешки спинномозговых нервов и спинномозговые узлы можно изучить после вскрытия позвоночного канала и удаления дуг позвонков и суставных отростков.

Все стволы спинномозговых нервов, за исключением первого шейного, пятого крестцового и копчикового нервов, залегают в межпозвоночных отверстиях, при этом нижние из них, принимающие участие в образовании конского хвоста, находятся также частично и в позвоночном канале. Первый шейный спинномозговой нерв ( $C_1$ ) проходит между затылочной kostью и I шейным позвонком; восьмой шейный спинномозговой нерв ( $C_{viii}$ ) располагается между VII шейным позвонком и I грудным позвонком; пятый крестцовый и копчиковый нервы выходят через крестцовую щель.

Стволы спинномозговых нервов являются смешанными, т. е. несут чувствительные и двигательные волокна. Каждый нерв по выходе из позвоночного канала почти тотчас делится на переднюю ветвь, *r. ventralis [anterior]*, и заднюю ветвь, *r. dorsalis [posterior]*, в каждой из которых имеются как двигательные, так и чувствительные волокна (см. рис. 880, 955, 995, 1060). Ствол спинномозгового нерва посредством соединительных ветвей, *rr. communicantes*, связан с соответствующим узлом симпатического ствола.

Соединительных ветвей две. Одна из них несет предузловые (миелиновые) волокна от кластиков боковых рогов спинного мозга. Она белого цвета [эти ветви имеются от восьмого шейного ( $C_{viii}$ ) до второго—третьего поясничного ( $L_1—L_3$ ) спинномозгового нерва] и называется белой соединительной ветвью, *r. communicans albus*. Другая соединительная ветвь несет послеузловые (преимущественно безмиелиновые) волокна от узлов симпатического ствола в спинномозговой нерв. Она более темного цвета и носит название серой соединительной ветви, *r. communicans griseus*.

От ствола спинномозгового нерва отходит ветвь к твердой оболочке спинного мозга — менингеальная ветвь, *r. meningaeus*, которая содержит в своем составе и симпатические волокна. Менингеальная ветвь возвращается в позвоночный канал через межпозвоночное отверстие. Здесь нерв делится на две ветви: более крупную, идущую по передней стенке



997. Проекция спинномозговых корешков и нервов на позвоночный столб (схема).

## ЗАДНИЕ ВЕТВИ СПИННОМОЗГОВЫХ НЕРВОВ

**Задние ветви спинномозговых нервов,** *rr. dorsales nn. spinalium* (см. рис. 995, 1027, 1029), за исключением двух верхних шейных нервов, значительно тоньше передних. Все задние ветви от места их отхождения, у латеральной поверхности суставных отростков позвонков, направляются назад между поперечными отростками позвонков, а в области крестца проходят через дорсальные крестцовые отверстия.

Каждая задняя ветвь делится на *медиальную ветвь, r. medialis*, и на *латеральную ветвь, r. lateralis*. В обеих ветвях проходят чувствительные и двигательные волокна. Концевые разветвления задних ветвей распределяются в коже всех дорсальных областей туловища, от затылочной до крестцовой области, в длинных и коротких мышцах спины и в мышцах затылка (см. рис. 995, 1027, 1028).

## ПЕРЕДНИЕ ВЕТВИ СПИННОМОЗГОВЫХ НЕРВОВ

**Передние ветви спинномозговых нервов,** *rr. ventrales nn. spinalium*, толще задних, за исключением двух первых шейных нервов, где имеются обратные отношения.

Передние ветви, кроме грудных нервов, вблизи позвоночного столба широко соединяются между собой и образуют *сплетения, plexus*. Из передних ветвей грудных нервов принимают участие в сплетениях ветви от  $T_{II}$  и  $T_{III}$ , иногда  $T_{IV}$  (плечевое сплетение), и от  $T_{XII}$  (поясничное сплетение). Однако эти ветви только частично вступают в сплетения.

Топографически различают следующие сплетения: шейное; плечевое; пояснично-крестцовое, в котором выделяют поясничное и крестцовое; копчиковое (см. рис. 998).

Все эти сплетения образуются посредством соединений соответствующих ветвей в виде петель.

Шейное и плечевое сплетения образуются в области шеи, поясничное — в поясничной области, крестцовое и копчиковое — в полости малого таза. От сплетений отходят ветви, которые направляются к периферии тела и, разветвляясь, иннервируют соответствующие его отделы. Передние ветви грудных нервов, не образующие сплетений, продолжаются непосредственно

но на периферии тела, разветвляясь в боковых и передних отделах стенок грудной клетки и живота.

## ШЕЙНЫЕ НЕРВЫ

**Шейные нервы,** *nn. cervicales* ( $C_1$ — $C_{VIII}$ ), составляют 8 пар (рис. 998—1006; см. рис. 996, 997).

### Задние ветви шейных нервов

**Задние ветви шейных нервов,** *rr. dorsales nn. cervicalium*, разделяются каждая на *медиальную ветвь, r. medialis*, и *латеральную ветвь, r. lateralis*.

Среди задних ветвей шейных нервов выделяют ветви первого, второго и третьего шейных нервов.

1. Задняя ветвь первого шейного нерва, или *подзатылочный нерв, n. suboccipitalis* ( $C_1$ ), крупнее передней ветви, проходит между затылочной костью и I шейным позвонком, залегая под позвоночной артерией, в борозде позвоночной артерии атланта. Далее этот нерв проходит в треугольное пространство, образованное задней большой прямой мышцей головы, нижней и верхней косыми мышцами головы, где делится, посылая ветви к указанным трем мышцам, а также к полуостистой мышце головы, длиннейшей мышце головы, задней малой прямой мышце головы.

От ветви, направляющейся к нижней косой мышце головы, отходит соединительная ветвь к задней ветви второго шейного спинномозгового нерва ( $C_{II}$ ). Одна из ветвей направляется к суставной капсуле атланзатылочного сустава.

2. Задняя ветвь второго шейного нерва ( $C_{II}$ ) — наиболее крупная, проходит между I и II шейными позвонками, огибает нижний край нижней косой мышцы головы и делится на ряд коротких и одну длинную ветвь. Короткие ветви иннервируют полуостистую мышцу головы, ременные мышцы головы и шеи, длиннейшую мышцу головы. Длинная ветвь, получившая название *большого затылочного нерва, n. occipitalis major* (см. рис. 999, 1000), прободает полуостистую мышцу головы и сухожилие трапециевидной мышцы; разветвляется в коже затылочной области, достигая теменной области. На своем пути большой затылочный нерв часто сопровождает затылочную артерию и ее ветви.

Задняя ветвь второго шейного нерва отдает соединительные ветви к задним ветвям первого и третьего шейных нервов, а в области затылка — к малому затылочному нерву, который является кожной ветвью шейного сплетения.

3. Задняя ветвь третьего шейного нерва ( $C_{III}$ ), или *третий затылочный нерв, n. occipitalis tertius* (см. рис. 999), непостоянная, в толще кожи располагается медиально от большого затылочного нерва и часто соединяется с ним; разветвляется в коже затылочной области.

### Передние ветви шейных нервов

**Передние ветви шейных нервов,** *rr. ventrales nn. cervicalium*, и большая часть *передней ветви первого грудного нерва, r. ventralis n. thoracici primi*, соединяются между собой посредством дугообразных или образующих острые углы петель в *шейное сплетение, plexus cervicalis*, и *плечевое сплетение, plexus brachialis*.

### Шейное сплетение

**Шейное сплетение,** *plexus cervicalis*, (см. рис. 996—1006), образуют передние ветви четырех верхних шейных спинномозговых нервов. Сплетение расположено на уровне четырех верхних шейных позвонков впереди места прикрепления средней лестничной мышцы, мышцы, поднимающей лопатку, ременных мышц головы и шеи и прикрыто спереди верхними отделами грудино-ключично-сосцевидной мышцы. В сплетении различают четыре передние ветви, три петли и отходящие от последних ветви.

Передняя ветвь первого шейного спинномозгового нерва залегает на I шейном позвонке, в борозде позвоночной артерии, под находящейся здесь позвоночной артерией. Отсюда, направляясь латерально, она проходит между передней и латеральной прямыми мышцами головы.

Остальные три передние ветви, как и все нижележащие, отделившись от соответствующих спинномозговых нервов, следуют латерально, располагаясь в промежутках между передними и задними межпоперечными мышцами, позади позвоночной артерии. Далее передние ветви, направляясь книзу, ложатся на передние поверхности мышцы, подни-

мающей лопатку, и средней лестничной мышцы и, соединяясь между собой при помощи ответвлений, образуют 3 петли. Нижняя ветвь частично входит в состав плечевого сплетения, вследствие чего образуется четвертая петля, соединяющая оба сплетения. Шейное сплетение связано с другими нервами соединительными ветвями и само отдает ветви к коже и мышцам.

#### Соединения шейного сплетения


1. Соединительная ветвь  $C_1$  к дуге подъязычного нерва. Волокна, составляющие эту ветвь, переходят (большая часть) в верхний корешок шейной петли, *radix superior ansae cervicalis*, который следует по передней поверхности общей сонной артерии, в толще ее соединительнотканного влагалища, и, направляясь вниз, на уровне срединного сухожилия лопаточно-подъязычной мышцы образует с ветвями  $C_1$ — $C_{III}$  и нижним корешком шейной петли, *radix inferior ansae cervicalis*, шейную петлю, *ansa cervicalis* (см. рис. 998, 1001, 1002), лежащую впереди внутренней яремной вены и общей сонной артерии. Нижний корешок шейной петли состоит из двигательных волокон передних ветвей второго и третьего спинномозговых нервов.

Величина петли зависит от длины верхнего корешка: чем короче последний, тем длиннее ветви, отходящие от петли к мышцам.

Нервы, отходящие от шейной петли, иннервируют всю группу мышц, расположенных ниже подъязычной кости. Волокна соединительной ветви, не входящие в верхний корешок шейной петли, выходят из подъязычного нерва и направляются к подбородочно-подъязычной мышце.

2. Соединительные ветви от второго, третьего и четвертого шейных нервов (наиболее крупные от третьего шейного нерва). Эти ветви направляются кзади и книзу, подходят к наружной ветви добавочного нерва и проникают в толщу грудино-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц.

3. Соединительные ветви с симпатическим стволом (см. рис. 999). Передние ветви первых трех шейных нервов соединяются с верхним шейным узлом симпатического ствола, а четвертого — со средним узлом.




#### Кожные ветви шейного сплетения

#### 998. Шейное сплетение, plexus cervicalis (полусхематично).

1. *Малый затылочный нерв, n. occipitalis minor* (см. рис. 998—1000), возникает из второго и третьего шейных нервов ( $C_{II}$  и  $C_{III}$ ), направляется к заднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы, а выйдя из-за него, часто делится на две ветви. Последние, следя вверх и кзади (к затылку), разветвляются позади ушной раковины и над ней в участке кожи, граничащем сзади с областью разветвления большого затылочного нерва, спереди — с областью большого ушного нерва. Малый затылочный нерв имеет соединения с большим затылочным нервом, большим ушным нервом и лицевым нервом (его задним ушным нервом).

2. *Большой ушной нерв, n. auricularis magnus* (см. рис. 998—1000) — наиболее крупный кожный нерв шейного сплетения. Начинается от  $C_{III}$  ( $C_{IV}$ ), следует к заднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы и, огибая его ниже малого затылочного нерва, переходит на наружную поверхность мышцы. Здесь ствол нерва, направляясь вперед и вверх к ушной раковине, делится на две ветви — переднюю и заднюю.



**999. Кожные нервы шейного сплетения, nn. cutanei plexus cervicalis, правого; вид справа.  
(Подкожная мышца шеи частично удалена.)**


Передняя ветвь, *r. anterior*, более тонкая, разветвляется в коже области околоушной железы, мочки уха и в коже вогнутой поверхности ушной раковины.

Задняя ветвь, *r. posterior*, разветвляется в коже выпуклой поверхности ушной раковины и в коже за ухом.

Большой ушной нерв имеет соединения с малым затылочным нервом и с задним ушным нервом (из лицевого нерва).

3. Поперечный нерв шеи, *n.*

*transversus colli* (см. рис. 998—1000), возникает от *C<sub>1</sub>(C<sub>II</sub>)*, направляется, так же как и большой ушной нерв, к заднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы, огибает его и далее следует в поперечном направлении вперед по наружной поверхности этой мышцы, между нею и подкожной мышцей шеи. Делится на более крупные *верхние ветви, rr. superiores*, и более тонкие *нижние ветви, rr. inferiores*. Ветви эти, прободая подкожную мышцу шеи, разветвля-



**1000. Области распространения кожных нервов головы и шеи; вид справа (полусхематично).**


ются в коже боковой области и переднего отдела шеи, достигая вверху края нижней челюсти, а внизу не доходят до ключицы. Поперечный нерв шеи имеет соединения с шейной ветвью лицевого нерва, образуя с ней поверхностную шейную петлю.

4. Надключичные нервы, *nn. supraclaviculares* (см. рис. 998—1000), возникают от  $C_{III}(C_{IV})$ , следуют по заднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы и выходят из-за него немного ниже поперечного нерва


ши, располагаясь здесь в области лопаточно-ключичного треугольника, под фасцией. Далее, прободая фацию, нервы направляются книзу, к ключице, и веерообразно расходятся на три группы ветвей:

1) медиальные надключичные нервы, *nn. supraclaviculares mediales*, разветвляются в коже соответственно яремной вырезке и рукоятке грудиной, ниже медиальной части ключицы;

2) промежуточные надключичные нервы, *nn. supraclaviculares intermedii*,




1001. Нервы головы и шеи; вид справа (полусхематично).  
(Двигательные нервы.)



1002. Диафрагмальный нерв, п. phrenicus, правый (по препаратам П. Евдокимова).

(Мышцы шеи большей частью удалены; правая половина грудной клетки вскрыта.)



**1003. Диафрагмальные нервы (фотография). Препаратор П. Евдокимова.**  
(Добавочные корешки, отходящие от правой и левой шейных петель, низко соединяются со стволами диафрагмальных нервов обеих сторон.)

1—шейная петля; 2—подключичная вена;  
3—ствол левого диафрагмального нерва;  
4—добавочный корешок диафрагмального нерва, связанный с шейной петлей; 5—левое легкое (отвернуто); 6—ветви к перикарду; 7—сердце (в перикарде); 8, 9—левый и правый куполы диафрагмы; 10—правое легкое (отвернуто);  
11—добавочный корешок диафрагмального нерва, связанный с шейной петлей; 12—ствол правого диафрагмального нерва; 13—передняя ветвь от C<sub>V</sub>; 14—шейная петля; 15—верхний корешок шейной петли; 16—подъязычный нерв.

11—добавочный корешок диафрагмального нерва, связанный с шейной петлей; 12—ствол правого диафрагмального нерва; 13—передняя ветвь от C<sub>V</sub>; 14—шейная петля; 15—верхний корешок шейной петли; 16—подъязычный нерв.

распределяются в коже соответствен-но медиальной части дельтовидной мышцы и передней поверхности груди, достигая уровня IV ребра;

3) латеральные (задние) надключичные нервы, *nn. supraclaviculares laterales [posteriora]*, разветвляются в коже над задними отделами дельтовидной мышцы и над акромионом.

#### Мышечные ветви шейного сплетения

1. Значительное количество коротких мышечных ветвей начинается непосредственно от передних ветвей отдельных шейных нервов (см. рис. 988, 1001, 1003) и направляется к некоторым мышцам головы, шеи и спины.


К мышцам головы: передняя прямая мышца головы иннервируется от C<sub>I</sub>(C<sub>II</sub>); латеральная прямая мышца головы—от C<sub>I</sub>; длинная мышца головы—от C<sub>I</sub>—C<sub>III</sub>(C<sub>IV</sub>).

К мышцам шеи и спины: длинная мышца шеи иннервируется от C<sub>II</sub>—C<sub>VII</sub>; грудино-ключично-сосцевидная мышца—от C<sub>II</sub>—C<sub>III</sub>; передняя лестничная мышца—от (C<sub>IV</sub>)C<sub>V</sub>—C<sub>VII</sub>(C<sub>VIII</sub>); средняя лестничная мышца—от (C<sub>III</sub>)C<sub>IV</sub>—C<sub>VIII</sub>; задняя лестничная мышца—от C<sub>VII</sub>, C<sub>VIII</sub>; мышца, поднимающая лопатку,—от (C<sub>II</sub>)C<sub>III</sub>, C<sub>IV</sub>, (C<sub>V</sub>); трапециевидная мышца—от C<sub>II</sub>—C<sub>IV</sub>; передние межпоперечные мышцы—от C<sub>II</sub>—C<sub>VII</sub>.

2. Шейная петля, *ansa cervicalis* (см. рис. 989, 999, 1002—1004, 1011), состоит из двигательных волокон передних ветвей шейных нервов, не принимающих участия в образовании шейного сплетения, и образуется верхним и нижним корешками (см. «Соединения шейного сплетения»).

#### Смешанная ветвь шейного сплетения

**Диафрагмальный нерв, *n. phrenicus*** (C<sub>III</sub>), C<sub>IV</sub>, (C<sub>V</sub>) (см. рис. 996, 998, 1002—1006, 1065), наряду с большим количеством двигательных волокон имеет чувствительные, следует вниз по передней поверхности передней лестничной мышцы, приближаясь к ее медиальному краю в нижнем отделе шеи, проходит между подключичной артерией и подключичной веной в полость груди, залегая спереди купола плевры и кнутри от него. В грудной полости диафрагмальный нерв располагается в верхнем и среднем средостениях, между плеврой и перикар-



дом, достигая диафрагмы, в которой широко разветвляется.


Расположение правого и левого диафрагмальных нервов неодинаково. Правый диафрагмальный нерв идет более вертикально. В верхних отделах грудной полости он пересекает правую внутреннюю грудную артерию, ложится латерально от правой плечеголовной вены и верхней полой вены. Далее он располагается между перикардом и медиастинальной плеврой (в сопровождении перикардиодиафрагмальных артерий

и вен), впереди корня правого легкого соответственно латеральной стенке правого предсердия. Впереди и латерально от отверстия нижней полой вены правый диафрагмальный нерв достигает диафрагмы.

Левый диафрагмальный нерв идет несколько дугообразно. В верхних отделах грудной полости он пересекает внутреннюю грудную артерию, ложится латерально от дуги аорты; далее располагается впереди корня левого легкого, более поверхностно, чем правый диафрагмальный

**1004. Нервы диафрагмы; вид сверху (препаратор П. Евдокимова).**

1005



1006



**1005. Нервы диафрагмы плода 8 мес (фотография. Препаратор С. Калашниковой).**

(*Распределение ветвей диафрагмальных нервов; вид сверху.*)

1—ствол правого диафрагмального нерва (отрезан); 2—внутримышечное сплетение (образовано вторичными ветвями от передней, наружной и задней ветвей диафрагмального нерва); 3—задняя ветвь диафрагмального нерва; 4—ветвь к сухожильному центру диафрагмы; 5—боковая (латеральная) ветвь диафрагмального нерва; 6—ствол левого диафрагмального нерва; 7—передняя ветвь диафрагмального нерва; 8—вторичная ветвь; 9—ветвь к межреберному нерву; 10—ветвь к нижней части перикарда и сухожильному центру; 11—передняя ветвь диафрагмального нерва; 12—латеральная ветвь диафрагмального нерва; 13—задняя ветвь диафрагмального нерва; 14—внутримышечное сплетение; 15—ветвь от чревного сплетения.

**1006. Нервы диафрагмы (фотография. Препаратор П. Евдокимова).**

(*Распределение ветвей диафрагмальных нервов в толще диафрагмы; вид сверху.*)

1—нижняя левая диафрагмальная артерия и сопровождающее ее первое сплетение; 2—ствол правого диафрагмального нерва (отрезан); 3—внутримышечное сплетение (образовано вторичными ветвями от передней, наружной и задней ветвей диафрагмального нерва); 4—задняя ветвь диафрагмального нерва; 5—ветвь к сухожильному центру диафрагмы; 6—боковая (латеральная) ветвь диафрагмального нерва; 7—ствол левого диафрагмального нерва; 8—передняя ветвь диафрагмального нерва; 9—вторичная ветвь; 10—ветвь к межреберному нерву; 11, 12—ветви к нижней части перикарда и сухожильному центру; 13—передняя ветвь диафрагмального нерва; 14—латеральные ветви диафрагмального нерва; 15—задняя ветвь диафрагмального нерва; 16—внутримышечное сплетение; 17—ветвь от чревного сплетения.

нерв. Следуя соответственно латеральной поверхности левого желудочка, позади верхушки сердца, левый диафрагмальный нерв достигает диафрагмы более кпереди и латерально, чем правый.

На своем пути диафрагмальный нерв отдает и получает ряд ветвей.

1. Соединительные ветви в области шеи, со средним и нижним шейными узлами симпатического ствола, а также с нервыми сплетениями, окружающими некоторые сосуды (щитошечный ствол, восходящую артерию шеи), с подключичной петлей.

2. Соединительная ветвь с подключичным нервом ( $C_V$ ). Иногда корешки диафрагмального нерва от  $C_V$  могут быть настолько длинными, что проникают в полость груди, где на различном уровне соединяются с основным стволом диафрагмального нерва. В таких случаях они получают название добавочных диафрагмальных нервов, *nn. phrenici accessorii* (см. рис. 1000, 1004).

3. От основного ствола, реже от добавочных диафрагмальных нервов в области корня легкого отходят 2—3 ветви к медиастинальной плевре.

4. *Перикардиальные ветви, rr. pericardiaci*, сопровождая разветвления перикардиодиафрагмальных сосудов, проникают в перикард.

5. Концевыми ветвями основного ствола диафрагмального нерва являются диафрагмальные ветви (см. рис. 1002, 1004, 1006), которые перед внедрением в толщу мышцы разделяются на три ветви: переднюю — в сторону грудинной части диафрагмы, латеральную — в сторону реберной части и заднюю — в сторону поясничной части. Все три ветви проникают в толщу диафрагмы, где, широко разветвляясь, образуют сетевидной формы сплетение. Иногда ветви этого сплетения соединяются с ветвями межреберных нервов. В передних отделах сухожильного растяжения, на границе его с мышечной частью, можно проследить соединительную ветвь между правым и левым диафрагмальными нервами (см. рис. 1005, 1006).

По ходу некоторых ветвей имеется небольшое количество внутриствольных нервных клеток.

6. *Диафрагмально-брюшные ветви, rr. phrenicoabdominales* (см. рис. 1004), среди которых различают ветви, входящие в состав правого и левого нижних диафрагмальных сплетений [см. «Автономная (вегетативная) часть

нервной системы»]; ветви к печечночному сплетению; ветви к верхнему желудочному сплетению; ветви к брюшине, связкам печени и передней стенке живота.


### Плечевое сплетение

**Плечевое сплетение, plexus brachialis** (рис. 1007—1011; см. рис. 996, 998), образуется соединением передних ветвей пятого, шестого, седьмого и восьмого шейных спинномозговых нервов. В образовании сплетения принимают участие также небольшая ветвь от передней ветви четвертого шейного нерва ( $C_{IV}$ ) и большая часть передней ветви первого грудного нерва. Кроме того, в подмышечной полости к сплетению присоединяется небольшая часть передней ветви второго грудного нерва.

Передние ветви спинномозговых нервов, образующие плечевое сплетение, выходят из межпозвоночных отверстий на уровне от IV шейного до I (II) грудного позвонков. Вначале сплетение представлено *стволами сплетения, trunci plexus*, среди которых различают верхний, средний и нижний. *Верхний ствол, truncus superior*, является результатом соединения передних ветвей нервов  $C_V$ ,  $C_{VI}$  и частично  $C_{VII}$ ; *средний ствол, truncus medius*, образован  $C_{VII}$ ; *нижний ствол, truncus inferior*, представлен соединением  $C_{VII}$ — $Th_1$  и лежит на I ребре, прилегая к задней поверхности подключичной артерии.

Разделение передних ветвей на стволы сплетения получило название *задних (дорсальных) разделений, divisiones posteriores [dorsales]*. Стволы сплетения следуют в межлестничный промежуток, располагаясь здесь позади подключичной артерии и под ней. Выйдя из межлестничного промежутка, стволы проникают в надключичную ямку, где сближаются между собой. В этом месте, тотчас выше ключицы, у худого человека стволы сплетений можно прощупать через кожу. Ветви, образующие плечевое сплетение, при помощи соединительных ветвей связываются с симпатическим стволом и его узлами — средним шейным и шейно-грудным (звездчатым).

Топографически различают две части плечевого сплетения: надключичную и подключичную (см. рис. 1008, 1011). *Надключичная часть, pars*



#### 1007. Плечевое сплетение, plexus brachialis (полусхематично).

*supraclavicularis*, располагается в большой надключичной ямке кнаружи и кзади от нижней части грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Сплетение перекрещивает спереди нижнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы. Между стволами сплетения часто проходит поперечная артерия шеи.

Подключичная часть, *pars infraclavicularis*, залегает в подмыщечной полости между подлопаточной и передней зубчатой мышцами, имея впереди большую и малую грудные мышцы.

Еще в надключичной ямке стволы плечевого сплетения соединяются

в три пучка: 1) латеральный пучок, *fasciculus lateralis*, лежит кнаружи от подмыщечной артерии; 2) медиальный пучок, *fasciculus medialis*, располагается медиально от артерии; 3) задний пучок, *fasciculus posterior*, находится позади артерии. Место образования пучков носит название *передних (центральных) разделений, divisiones ventrales [anteriores]*.

#### Надключичная часть плечевого сплетения

Надключичная часть, *pars supraclavicularis*, плечевого сплетения (см. рис. 1007, 1010) отдает нервы к глубоким мышцам шеи, некоторым мышцам пояса верхней конечности, спине и груди.


К этим первым относятся мышечные ветви, дорсальный нерв лопатки, длинный грудной нерв, подключичный нерв, надлопаточный нерв.

1. *Мышечные ветви* представляют собой короткие нервы, идущие к глубоким мышцам шеи. Они отходят от ветвей сплетения тотчас после выхода их из межпозвоночных отверстий и направляются к межпоперечным мышцам, передней, средней и задней лестничным, длинной мышце шеи.


2. *Дорсальный нерв лопатки, n. dorsalis scapulae* ( $C_V$ ) (см. рис. 1007), отходит от заднего отдела подключичной части сплетения, следует по передней поверхности мышцы, поднимающей лопатку, между ней и задней лестничной мышцей, и направляется к медиальному краю лопатки. Здесь он отдает ветви к большой и малой ромбовидным мышцам и к нижним отделам мышцы, поднимающей лопатку.

3. *Длинный грудной нерв, n. thoracicus longus* ( $C_V—C_{VII}$ ,  $C_{VIII}$ ) (см. рис. 1007, 1010), направляется вниз вдоль передней подмыщечной линии по латеральной поверхности передней зубчатой мышцы и входит своими ветвями в толщу ее зубцов.

4. *Подключичный нерв, n. subclavius* ( $C_{IV}—C_{VI}$ ) (см. рис. 1007), — тонкий нерв, располагается впереди подключичной артерии, латеральнее нижней части передней лестничной мышцы, и следует к подключичной мышце. Часто отдает соединительную ветвь к диафрагмальному нерву, которая подходит к последнему с его латеральной стороны.



1008. Плечевое сплетение, plexus brachialis, и нервы свободной части верхней конечности, правой; внутренняя поверхность (полусхематично).



**1009. Нервы верхней конечности, правой, новорожденного (фотография. Препаратор В. Полякова).**

1—шейное и плечевое сплетения; 2—медиальный и латеральный грудные нервы; 3—латеральный и медиальный корешки срединного нерва; 4—локтевой нерв; 5—срединный нерв; 6—ветви срединного нерва к поверхностным мышцам;

7—соединительная ветвь между срединным и локтевым нервами; 8—соединительная ветвь между локтевым и срединным нервами на кисти; 9—кожная ветвь лучевого нерва; 10—передний межкостный нерв предплечья; 11—плечевая артерия; 12—мышечно-кожный нерв.

5. *Надлопаточный нерв, n. suprascapularis* ( $C_5—C_{10}$ ) (рис. 1012, 1013), направляется вниз, к нижнему брюшку лопаточно-подъязычной мышцы, и в сопровождении надлопаточной артерии следует к верхней поперечной связке лопатки, проходит под ней через вырезку лопатки (артерия проходит над связкой) в надостную ямку, где посыпает ветви к надостной мышце (иногда отдает ветвь к акромиально-ключичному суставу). Следуя далее, нерв огибает шейку лопатки и, пройдя под нижней поперечной связкой лопатки, входит в подостную ямку, отдавая ветви к подостной мышце и задней поверхности суставной капсулы плечевого сустава (иногда к малой круглой мышце).

#### Подключичная часть плечевого сплетения

**Подключичная часть, pars infraclavicularis**, плечевого сплетения (см. рис. 1007—1011) отдает ветви главным образом к мышцам и коже свободной части верхней конечности (их принято называть длинными ветвями), а также к некоторым мышцам плечевого пояса, груди и спины.


Подключичная часть плечевого сплетения проходит в подмыщечную полость, где располагается позади большой и малой грудных мышц, впереди подлопаточной мышцы и кнаружи от передней зубчатой мышцы. У выхода из подмыщечной полости эта часть сплетения располагается между подлопаточной, клюво-видно-плечевой мышцами и широчайшей мышцей спины.

В подмыщечной полости три пучка подключичной части плечевого сплетения окружают подмыщечную артерию с латеральной, медиальной и задней сторон; непокрытой остается передняя поверхность артерии. Подмыщечная вена располагается по переднемедиальной поверхности артерии. Каждый пучок отдает как короткие, так и длинные ветви.


#### Латеральный пучок плечевого сплетения

**Латеральный пучок, fasciculus lateralis**, образуется передними ветвями пятого, шестого и седьмого шейных нервов ( $C_5—C_{10}$ ). Он отдает мышечно-кожный нерв и латеральный корешок срединного нерва.


1. *Мышечно-кожный нерв, n. musculocutaneus* ( $C_5—C_{10}$ ) (см. рис. 996,



**1010. Нервы шеи и пояса верхней конечности; вид справа.  
(Шейное и плечевое сплетения;  
ключица и большая грудная  
мышца, а также поверхностные  
мышцы шеи частично удалены.)**



1011. Нервы и артерии пояса верхней конечности и плеча, правого. (Передневнутренняя поверхность.)



**1012. Артерии и нервы пояса верхней конечности и плеча, правого. (Задняя поверхность.) (Участки над- и подостных**

*и дельтовидной мышц удалены; большая круглая мышца и латеральная головка трехглавой мышцы перерезаны.)*



**1013. Ветви надлопаточного нерва в надостной (I) и подостной (II) мышцах (фотография. Препаратор Я. Синельникова).**

1, 4—внутримышечные нервные ветви; 2—нерв к суставной капсуле плечевого сустава; 3—стволы надлопаточного нерва.

1007—1009, 1011), направляется вниз и книзу, прободает (не всегда) клювовидно-плечевую мышцу косо сверху вниз и ложится между двуглавой мышцей плеча и плечевой мышцей. Далее нерв выходит из-под латерального края дистального сухожилия двуглавой мышцы и в области локтевого сгиба проникает через фасцию плеча в подкожный жировой слой в качестве уже латерального кожного нерва предплечья.

На своем пути мышечно-кожный нерв посыпает ветви:

1) **мышечные ветви, rr. musculares**, которые снабжают клювовидно-плечевую, плечевую мышцы и двуглавую мышцу плеча. Нередко можно встретить соединительную ветвь между мышечно-кожным и срединным нервами;

2) **латеральный кожный нерв предплечья, n. cutaneus antebrachii lateralis** (см. рис. 1021, 1025),—концевая ветвь мышечно-кожного нерва. Прободая в области локтевого сгиба, латерально от апоневроза двуглавой мышцы плеча, фасцию плеча, нервный ствол располагается возле латеральной подкожной вены руки и, следуя вниз, разветвляясь в коже лучевого края и лучевой половины ладонной поверхности предплечья до области возвышения большого пальца кисти.

По ходу мышечно-кожного нерва встречаются ветви к надкостнице плечевой кости и к суставной капсуле локтевого сустава, а также ряд соединительных ветвей: а) с поверхностной ветвью лучевого нерва, б) с тыльной ветвью локтевого нерва, в) с медиальным кожным нервом предплечья.

2. **Латеральный корешок, radix lateralis**, срединного нерва образуется из шестого и седьмого шейных нервов ( $C_6$ ,  $C_7$ ). Он располагается книзу от подмышечной артерии.

**Медиальный пучок плечевого сплетения**

**Медиальный пучок, fasciculus medialis** (см. рис. 996, 1007—1011), образуется передними ветвями восьмого шейного и первого грудного нервов ( $C_8$ — $T_1$ ). Он отдает латеральный грудной нерв, медиальный грудной нерв, локтевой нерв, медиальный кожный нерв плеча, медиальный кожный нерв предплечья, медиальный корешок срединного нерва.

1. **Латеральный грудной нерв, n. pectoralis lateralis** ( $C_5$ — $C_8$ ,  $T_1$ ) (см. рис. 1007, 1009, 1010), отходит от верхнего ствола или несколько ниже—от латерального пучка сплетения и, направляясь книзу, проходит

впереди подмышечной артерии, отделяет ветви к глубокой части большой грудной мышцы, часто посылая соединительную ветвь к нерву, иннервирующему малую грудную мышцу.

2. *Медиальный грудной нерв*, *n. pectoralis medialis* ( $C_V—C_{VIII}$ ) (см. рис. 1007, 1009, 1010), отходит от нижнего ствола или ниже — от медиального пучка сплетения и, следя книзу, проходит между подмышечными артерией и веной, отдавая конечные ветви к большой и малой грудным мышцам.

3. *Локтевой нерв*, *n. ulnaris* ( $C_{VII—C_{VIII}}$ ) (рис. 1014—1021; см. рис. 996, 1007, 1009, 1011, 1012), располагается вначале медиально от подмышечной и начала плечевой артерии; на уровне средней трети плеча отходит от плечевой артерии к медиальной периферии плеча по направлению к медиальной межмышечной перегородке плеча, часто идя в ее толще, а в нижней половине плеча ложится позади нее. Здесь локтевой нерв в сопровождении верхней локтевой коллатеральной артерии следует, располагаясь на медиальной головке трехглавой мышцы плеча, вниз, в желоб между медиальным надмыщелком плечевой кости и локтевым отростком, где лежит непосредственно на кости в борозде локтевого нерва и покрыт только фасцией и кожей. На этом участке нерв отдает тонкую суставную ветвь к капсуле локтевого сустава (см. рис. 1015).

Выходя из этого промежутка, ствол локтевого нерва проходит между головками локтевого сгибателя запястья, ложится на переднюю поверхность предплечья между глубоким сгибателем пальцев и локтевым сгибателем запястья, кнутри от локтевых артерий и вен. В нижней части предплечья сухожилие локтевого сгибателя запястья прикрывает его вместе с сосудами.

На плече локтевой нерв ветвей не отдает. В области предплечья встречается соединительная ветвь между ним и срединным нервом (см. рис. 1009).

На границе средней и нижней третей предплечья, иногда выше или ниже, ствол локтевого нерва делится на свои концевые ветви: более тонкую тыльную ветвь локтевого нерва и более толстую ладонную ветвь локтевого нерва.

Ветви локтевого нерва (см. рис. 1015—1021):

1) *мышечные ветви*, *rr. musculares*,

к мышцам: локтевому сгибателю запястья и локтевой части глубокого сгибателя пальцев (к безымянному пальцу и мизинцу); в толще мышцы ветви локтевого нерва соединяются с ветвью срединного нерва, иннервирующей остальную часть мышцы;

2) *тыльная ветвь локтевого нерва*, *r. dorsalis n. ulnaris*, проходит между локтевой костью, ближе к ее головке, и сухожилием локтевого сгибателя запястья, следует на тыльную поверхность кисти, где, прободая фасцию, распадается на ветви к коже локтевой стороны тыла кисти и тыльным сторонам пальцев, отдавая тыльные пальцевые нервы:

а) *тыльные пальцевые нервы*, *nn. digitales dorsales*, в количестве пяти, иннервируют кожу тыльной поверхности мизинца, безымянного и локтевой стороны среднего пальцев (см. рис. 1020). На мизинце нервы доходят до основания ногтя, а на безымянном и среднем пальцах распространяются лишь в пределах кожи проксимальной фаланги;

б) *соединительные ветви* (непостоянны) с поверхностью ветвью лучевого нерва и с ветвями медиального, тыльного и латерального кожных нервов предплечья (см. рис. 1020);

в) *ладонная ветвь локтевого нерва*, *r. palmaris n. ulnaris* (см. рис. 1018), следует в сопровождении локтевой артерии и является продолжением основного ствола локтевого нерва. В дистальном отделе предплечья от нее отходит небольшая ладонная кожная ветвь, иногда в виде двух тонких нервов. Она посылает ветвь к локтевой артерии и, прободая фасцию предплечья, между локтевым сгибателем запястья и поверхностным сгибателем пальцев направляется к коже локтевого края области лучезапястного сустава, к коже возвышения мизинца и к коже мизинца. Между этой ветвью и медиальным кожным нервом предплечья имеется соединительная ветвь.

Следя далее, ладонная ветвь локтевого нерва, подойдя к гороховидной кости с ее лучевой стороны, ложится между короткой ладонной мышцей и удерживателем сгибателей и делится на поверхностную и глубокую ветви.

От *поверхностной ветви*, *r. superficialis*, отходят:

а) *общий ладонный пальцевой нерв*, *n. digitalis palmaris communis* (см. рис. 1016), лежит под ладонным апонев-

розом вдоль четвертого межкостного промежутка. Здесь он делится на *собственные ладонные пальцевые нервы*, *nn. digitales palmares proprii*, к которым относятся две ветви: собственный ладонный пальцевой нерв мизинца (иннервирует кожу лучевой стороны мизинца) и собственный ладонный пальцевой нерв безымянного пальца (иннервирует кожу локтевой поверхности безымянного пальца и кожу тыльной поверхности средней и дистальной фаланг этого же пальца);

б) *кожные ветви* прободают толщу короткой ладонной мышцы и иннервируют кожу области возвышения мизинца;

в) *соединительная ветвь* с третьим общим ладонным пальцевым нервом от срединного нерва (см. рис. 1016, 1017);

г) *собственный ладонный пальцевой нерв*, *n. digitalis palmaris proprius*, располагается у локтевого края ладонного апоневроза вдоль мышц возвышения мизинца, переходит на ладонную поверхность мизинца, иннервируя кожу его локтевого края (см. рис. 1016, 1025);

д) *мышечная ветвь* — один или несколько тонких нервов к короткой ладонной мышце (иногда и к другим мышцам возвышения мизинца).


Концевые ветви кожных нервов пальцев заканчиваются *пластиначатыми тельцами*, *corpuscula lamellosa*, — инкапсулированными рецепторами.

*Глубокая ветвь*, *r. profundus* (см. рис. 1018), начинается у лучевой поверхности гороховидной кости. Эта ветвь проходит через проксимальные участки мышц, образующих возвышение мизинца, между коротким сгибателем и отводящей мышцей мизинца, и, прободая мышцу, противопоставляющую мизинец, проникает в сопровождении глубокой ветви локтевой артерии в глубокое пространство ладони между сухожилиями длинных сгибателей и межкостными мышцами. Она идет слегка дугообразно, почти по ходу глубокой ладонной артериальной дуги в сторону большого пальца кисти. Глубокая ветвь посылает следующие нервы:

а) *соединительные ветви* с первым общим ладонным пальцевым нервом срединного нерва;

б) *суставные ветви* к суставным капсулам и надкостнице костей кисти;

в) *мышечные ветви*, *rr. musculares*, которые направляются к мышцам возвышения большого пальца [m.



**1014. Артерии и нервы предплечья и кисти, правой. (Ладонная поверхность.)**  
(Поверхностный слой мышц

**предплечья, круглый пронатор и поверхностные мышцы возвышения мизинца удалены.)**

*adductor pollicis, m. flexor pollicis brevis (caput profundum); возвышения мизинца (m. abductor digiti minimi, m. flexor digiti minimi brevis, m. opponens digiti minimi); средней группы мышц кисти (mm. lumbricales III, IV, mm. interossei palmares et dorsales);*

г) *прободающие ветви* проникают через межкостные промежутки на тыльную поверхность кисти, где соединяются с ветвями межкостного тыльного нерва предплечья.


4. *Медиальный кожный нерв плеча, n. cutaneus brachii medialis* ( $C_8$ ,  $Th_1$ , иногда  $Th_{II}$ ,  $Th_{III}$ ) (см. рис. 996, 1007, 1009, 1011, 1021, 1026), берет начало от медиального пучка плечевого сплетения и располагается в подмышечной полости кпереди от подлопаточной мышцы и широчайшей мышцы спины, вначале впереди подмышечной артерии, а затем ложится медиальнее ее.

Здесь нерв соединяется с латеральной кожной ветвью второго грудного нерва, иногда и третьего грудного нерва ( $Th_{III}$ ), которые называются *межреберно-плечевыми нервами, nn. intercostobrachiales*. Два, иногда три небольших нервных ствола прободают подмышечную и плечевую фасции и разветвляются в коже подмышечной полости, передней и заднemedиальной поверхностях плеча до медиального надмыщелка плечевой кости и локтевого отростка.

5. *Медиальный кожный нерв предплечья, n. cutaneus antebrachii medialis* ( $C_8$ ,  $Th_1$ ) (см. рис. 996, 1007, 1008, 1011, 1021, 1026), лежит в подмышечной полости вместе с подмышечной артерией, а в области плеча — с плечевой артерией и срединным нервом. Достигнув середины плеча, он проходит через фасцию в том месте, где через нее проникает медиальная подкожная вена верхней конечности, и, выйдя в подкожный слой (иногда проксимальнее), делится на переднюю ветвь и локтевую ветвь:

1) *передняя ветвь, r. anterior*, располагается впереди апоневроза двуглавой мышцы плеча, с лучевой стороны от медиальной подкожной вены, затем ложится позади промежуточной вены локтя и разветвляется в коже локтевой половины ладонной поверхности предплечья до области лучезапястного сустава.

По своему ходу передняя ветвь соединяется с ветвями латерального кожного нерва предплечья (от мышечно-кожного нерва);



2) *локтевая ветвь, r. ulnaris*, располагается по локтевой стороне медиальной подкожной вены руки, спускается вдоль локтевого края предплечья и, переходя своими разветвлениями на его тыльную поверхность, достигает области лучезапястного сустава.

По своему ходу локтевая ветвь соединяется с ветвями заднего кожного нерва предплечья (от лучевого нерва) и с ветвями тыльной ветви локтевого нерва.

6. *Срединный нерв, n. medianus* ( $C_6$ — $Th_1$ ) (см. рис. 996, 1007—1011, 1014—1017), образуется латеральным корешком, отходящим от латерального пучка, и медиальным корешком, отходящим от медиального пучка. Оба корешка, соединяясь под острым углом, образуют петлю, которая располагается на передней поверхности подмышечной артерии. Следуя далее одним стволом, срединный нерв при-

#### 1015. Нервы суставной капсулы локтевого сустава, левого; локтевая сторона (фотография). Препаратор Е. Страховой.

1 — плечевая мышца; 2 — срединный нерв; 3, 5, 7 — ветви к суставной капсуле локтевого сустава; 4 — ветвь к надкостнице плечевой кости; 6 — нерв к круглому пронатору; 8 — круглый пронатор (отрезан и оттянут); 9 — локтевой сгибатель кисти; 10 — локтевой отросток; 11 — суставная капсула локтевого сустава; 12 — медиальный надмыщелок; 13 — локтевой нерв; 14 — трехглавая мышца плеча.

лежит к лучевой стороне плечевой артерии и вместе с ней располагается под фасцией плеча в медиальной борозде плеча. Достигнув середины плеча, нерв пересекает артерию спереди, располагается с локтевой ее стороны и отдает 2—3 ветви к капсуле локтевого сустава (см. рис. 1015). Продолжая свой ход, он вместе с плечевой артерией проходит в локтевой ямке под апоневрозом лруглавой мышцы плеча на предплечье. Здесь срединный нерв на некотором расстоянии сопровождает локтевую артерию, которая располагается позади нерва. Проникая далее между обеими головками круглого пронатора, срединный нерв направляется к средней линии предплечья, подходит под сухожилие поверхностного сгибателя пальцев и в сопровождении срединной артерии следует между поверхностным и глубоким сгибателями пальцев к области лучезапястного сустава.

Между сухожилиями лучевого сгибателя запястия и длинной ладонной мышцы срединный нерв вместе с сухожилиями обоих сгибателей пальцев проходит под удерживатель сгибателей в канале запястия на кисть, где делится на свои концевые ветви.


В области кисти под ладонным апоневрозом концевые ветви срединного нерва располагаются между поверхностью ладонной дугой локтевой артерии и сухожилиями поверхностного сгибателя пальцев, отдавая ряд суставных ветвей к капсулам суставов запястия и суставов I—III (IV) пальцев со стороны ладонной поверхности.

Ветви срединного нерва (см. рис. 1008, 1015—1018):

1) *передний межкостный нерв [предплечья], n. interosseus [antebrachii] anterior*, берет начало от основного ствола срединного нерва на уровне круглого пронатора и, следя дистально в сопровождении передней межкостной артерии, располагается между длинным сгибателем большого пальца кисти и глубоким сгибателем пальцев, достигая квадратного пронатора.

Он иннервирует длинный сгибатель большого пальца кисти, глубокий сгибатель пальцев (лучевую часть к указательному и среднему пальцам) и квадратный пронатор;

2) *соединительные ветви с локтевым нервом, rr. communicantes cum nervo ulnari*, в толще глубокого сгибателя пальцев.



### 1016. Нервы кисти, правой. (Ладонная поверхность.) (Кожа, подкожная основа и ладонный апоневроз удалены.)

Кроме того, описан ряд соединительных ветвей:

а) в области плеча с мышечно-кожным нервом (иногда 2—3), непостоянные, располагаются в верхней трети плеча;

б) в области кисти с поверхностью ветвью локтевого нерва и с поверхностью ветвью лучевого нерва;

3) *мышечные ветви, rr. musculares*.

В области плеча срединный нерв не отдает ветвей (кроме указанной соединительной ветви с мышечно-кожным нервом). В области предплечья мышечные ветви отходят от основного ствола срединного нерва на уровне медиального надмыщелка

плечевой кости и направляются к круглому пронатору, лучевому сгибателю запястья, длинной ладонной мышце и к поверхностному сгибателю пальцев;

4) ладонная ветвь срединного нерва, *r. palmaris n. mediani*, — тонкая ветвь (иногда две), отходит от основного ствола срединного нерва в области нижней трети предплечья между сухожилиями лучевого сгибателя запястья и длинной ладонной мышцы, прободает фасцию предплечья и разветвляется в коже ладонной поверхности области лучезапястного сустава, большого пальца и ладони;

5) общие ладонные пальцевые нервы *I, II, III, nn. digitales palmares communes I, II, III* (см. рис. 1016), образуются путем разветвления основного ствола срединного нерва. Они отходят на уровне дистального края удерживателя сгибателей, располагаются под ладонным апоневрозом и поверхностью ладонной дугой в первом, втором и третьем межкостных промежутках, посылая тонкие кожные ветви, проникающие через ладонный апоневроз в кожу ладони, в области ее средних отделов. От каждого общего ладонного пальцевого нерва отходят мышечные ветви и иннервируют следующие мышцы области ладони:


а) первый общий ладонный пальцевой нерв — *m. abductor pollicis brevis, m. flexor pollicis brevis (caput superficiale), m. opponens pollicis, m. lumbricalis I*;

б) второй общий ладонный пальцевой нерв — *m. lumbricalis II*;

в) третий общий ладонный пальцевой нерв — *m. lumbricalis III* (непостоянно).

Затем общие ладонные пальцевые нервы отдают *собственные ладонные пальцевые нервы, nn. digitales palmares proprii* (см. рис. 1016, 1017), которые иннервируют кожу лучевого и локтевого краев ладонной поверхности большого, указательного, среднего пальцев и кожу лучевого края той же поверхности безымянного пальца. Первый общий ладонный пальцевой нерв посылает 3 нерва: два к большому пальцу и один к указательному пальцу, второй — два: к указательному и среднему пальцам и третий — два: к среднему и безымянному пальцам.

Собственные ладонные пальцевые нервы большого пальца иннервируют кожу лучевого и локтевого краев ладонной поверхности большого



### 1017. Ветви срединного и локтевого нервов ладонной поверхности кисти, левой (фотография. Препарат Л. Киселевой).

1 — срединный нерв; 2 — отводящая мышца большого пальца кисти (оттянута); 3 — поперечная запястная связка; 4 — нерв к отводящей мышце; 5 — нерв к мышце, противопоставляющей большой палец; 6 — мышца, противопоставляющая большой палец кисти; 7 — поверхность головки короткого сгибателя большого пальца кисти; 8 — нерв от глубокой ветви локтевого нерва входит в глубокую головку короткого сгибателя большого пальца кисти; 9 — нерв к пястно-фаланговому суставу большого пальца кисти; 10 — нерв к первой червеобразной мышце; 11 — нерв ко второй червеобразной мышце; 12 — собственные ладонные пальцевые нервы; 13 — нерв к третьей червеобразной мышце; 14 — соединительная ветвь от локтевого нерва к срединному; 15 — короткий сгибатель мизинца; 16 — мышца, отводящая мизинец; 17 — поверхностная ветвь локтевого нерва.


пальца и посыпают соединительные ветви к поверхности ветви лучевого нерва.

Собственные пальцевые нервы, иннервирующие кожу указательного, среднего и безымянного пальцев, посыпают ветви в кожу тыльной поверхности средней и дистальной фаланг тех же пальцев.

#### Задний пучок плечевого сплетения

Задний пучок, *fasciculus posterior* (см. рис. 996, 1007, 1008, 1011), образуется передними ветвями пятого, шестого, седьмого, восьмого шейных и первого грудного нервов (*C<sub>V</sub>—C<sub>VII</sub>, Th<sub>1</sub>*). Он отдает нервы: подлопаточный, грудоспинной, подмышечный и лучевой.

1. Подлопаточный нерв, *n. subscapularis* (*C<sub>V</sub>—C<sub>VII</sub>*) (см. рис. 1007, 1011), отходит от верхнего ствола или начальной части заднего пучка, располагается на передней поверхности подлопаточной мышцы и посылает тонкие нервы к этой мышце и к большой круглой мышце. Подлопаточный



**1018. Нервы кисти, правой.  
(Ладонная поверхность.)**  
*(Мышцы большей частью удалены; видно отношение нервов к глубокой ладонной дуге.)*


нерв может отходить от подмышечного нерва.

2. Грудоспинной нерв, *n. thoracodorsalis* [(*C<sub>V</sub>*) *C<sub>VII</sub>*—*C<sub>VIII</sub>*], спускается по латеральному краю лопатки и, достигнув переднего отдела широчайшей мышцы спины, разветвляется в толще этой мышцы.


Грудоспинной нерв может разделяться на две ветви и в редких случаях отходит от лучевого нерва.

3. Подмышечный нерв, *n. axillaris* (*C<sub>V</sub>*—*C<sub>VI</sub>*) (см. рис. 1007, 1008, 1011, 1012),—относительно толстый ствол,

располагается в подмышечной полости, позади подмышечной артерии, на поверхности сухожилия подлопаточной мышцы. Направляясь немногоВниз, книзу и кзади, нерв в сопровождении задней артерии, огибаящей плечевую кость, проходит через четырехстороннее отверстие и, обогнув сзади хирургическую шейку плечевой кости, располагается между ней и deltovидной мышцей, отдавая тонкие суставные ветви к капсуле плечевого сустава и к надкостнице плечевой кости. Подмышечный нерв по своему ходу отдает следующие ветви:




**1019. Кожные нервы кисти, правой. (Тыльная поверхность.)  
(Кожа и подкожная клетчатка удалены; нервы отпрепарированы.)**



**1020.** Ветви лучевого и локтевого нервов тыльной поверхности кисти, правой (фотография). Препарат В. Бобина.

1—поверхностная ветвь лучевого нерва; 2—соединительная ветвь между локтевым и лучевым нервами; 3—тыльные пальцевые нервы (от лучевого нерва); 4—концевые ветви от срединного нерва, переходящие на тыльную поверхность пальцев; 5—тыльные пальцевые нервы (от локтевого нерва); 6—тыльная ветвь локтевого нерва.



**1021.** Кожные нервы верхней конечности, правой (фотография). Препарат Н. Самойлова).

А—ладонная поверхность. Б—тыльная поверхность. 1—ветви медиального кожного нерва плеча; 2—медиальный кожный нерв предплечья; 3—разветвления медиального кожного нерва предплечья; 4—локтевой нерв; 5—срединный нерв; 6—ветви лучевого нерва; 7—поверхностная ветвь лучевого нерва; 8—ветви медиального кожного нерва предплечья на плече; 9, 10—латеральный кожный нерв предплечья; 11—задний кожный нерв плеча; 12—задний кожный нерв предплечья; 13—поверхностная ветвь лучевого нерва; 14—тыльная ветвь локтевого нерва; 15—ветви медиального кожного нерва предплечья.

1) *мышечные ветви, rr. musculares*, — несколько ветвей, входящих в толщу малой круглой мышцы со стороны ее нижненаружной поверхности и в толщу дельтовидной мышцы со стороны ее внутренней поверхности. Среди последних ветвей различают группу нервов, распределяющихся во всех пучках дельтовидной мышцы (рис. 1022).

Некоторые из этих нервов, прободая толщу мышцы, проникают в кожу. Кроме того, подмышечный нерв может посыпать мышечную ветвь к нижнелатеральной части подлопаточной мышцы;

2) *верхний латеральный кожный нерв плеча, n. cutaneus brachii lateralis superior* (см. рис. 1008, 1012, 1021,

1025, 1026), располагаясь между дельтовидной мышцей и длинной головкой трехглавой мышцы плеча (реже может проходить через толщу дельтовидной мышцы), разделяется на восходящие и нисходящие ветви, которые разветвляются в коже заднего отдела дельтовидной области, а также в коже верхней половины латеральной поверхности плеча. Концевые ветви могут соединяться с задним кожным нервом плеча от лучевого нерва и с задним кожным нервом предплечья от лучевого нерва.

4. *Лучевой нерв, n. radialis (C<sub>v</sub>—C<sub>viii</sub>, Th<sub>1</sub>)* (рис. 1023—1026; см. рис. 996, 1007, 1008, 1012), располагается в подмышечной полости позади

ду плечевой и плечелучевой мышцами. Достигнув уровня латерального надмыщелка, лучевой нерв делится на поверхностную и глубокую ветви.

Ветви лучевого нерва:

1) *задний кожный нерв плеча, n. cutaneus brachii posterior*, начинается от основного ствола лучевого нерва в подмышечной полости, направляется косо кзади, иногда проникая через толщу длинной головки трехглавой мышцы, прободает фасцию плеча приблизительно на уровне сухожилия дельтовидной мышцы и разветвляется в коже заднебоковой поверхности плеча. Его ветви могут соединяться с ветвями верхнего латерального кожного нерва (от подмышечного нерва);




### 1022. Нервы дельтовидной мышцы, правой. (Внутренняя поверхность мышцы.) (Фотография. Препаратор Я. Синельникова.)

Части дельтовидной мышцы: I — часть, начинающаяся от лопаточной ости; II — начинающаяся от ключицы; III — начинающаяся от акромиона. 1, 3, 4 — внутримышечные ветви дельтовидной мышцы (часть, начинающаяся от ости лопатки); 2 — подмышечный нерв (перерезан, часть его оттянута кверху).


подмышечной артерии. На уровне нижнего края сухожилия широчайшей мышцы спины лучевой нерв направляется кзади, книзу и в сопровождении глубокой артерии плеча вступает в верхнее отверстие плечемышечного канала. На уровне хирургической шейки плечевой кости отходит ветвь к капсуле плечевого сустава. Пройдя указанный канал в сопровождении лучевой коллатеральной артерии, нерв выходит меж-

2) *нижний латеральный кожный нерв плеча, n. cutaneus brachii lateralis inferior*, отходит чаще от основного ствола или от заднего кожного нерва предплечья на уровне начала медиальной головки трехглавой мышцы. Направляясь вниз и книзу вместе с задним кожным нервом предплечья, заканчивается в коже латеральной поверхности нижней трети плеча и локтя;

3) *задний кожный нерв предплечья,*



**1023. Нервы задней поверхности предплечья.  
(Кожа и подкожная основа удалены.)**



#### 1024. Нервы, артерии и вены кисти, правой; лучевой край.

*n. cutaneus antebrachii posterior* (см. рис. 1012, 1019, 1021, 1026), отходит от основного ствола лучевого нерва в плечемышечном канале, следует на некотором протяжении вместе с ним до латеральной межмышечной перегородки плеча, прободает ее и фасцию плеча у латерального края плечелучевой мышцы. Разветвляется в коже задней поверхности дистальной части плеча и тыльной поверхности предплечья, достигая области лучезапястного сустава. Его ветви могут соединяться с ветвями медиального и латерального кожных нервов предплечья, а также с тыльной ветвью локтевого нерва и с поверхностной ветвью лучевого нерва;

4) **мышечные ветви, rr. musculares** (см. рис. 1012, 1023), в области плеча направляются к трехглавой мышце плеча (ко всем трем ее головкам), к локтевой мышце и нередко к латеральной части плечевой мышцы;

5) **поверхностная ветвь, r. superficialis** (см. рис. 1019—1021, 1023, 1026), отходит от основного ствола лучевого нерва в локтевой ямке на уровне латерального надмыщелка, располагаясь медиально от плечелучевой мышцы. Ниже она ложится кнаружи от лучевой артерии. В средней части предплечья поверхностная ветвь отклоняется в лучевую сторону и, пройдя между сухожилиями плече-

лучевой мышцы и длинного лучевого разгибателя запястья на тыльную сторону лучевого края предплечья, прободает фасцию предплечья несколько выше лучезапястного сустава. Далее поверхностная ветвь лучевого нерва разветвляется в коже лучевой области лучезапястного сустава, лучевой половины тыла кисти и пальцев (см. далее) в виде тыльных пальцевых нервов.

Поверхностная ветвь посылает ветви:

а) **соединительные ветви, rr. communicantes** (см. рис. 1019, 1020), к латеральному и заднему кожным нервам предплечья в области задней поверхности нижней трети предплечья и лучезапястного сустава;

б) **локтевую соединительную ветвь, r. comunicans ulnaris**, — наиболее крупную, которая связывает поверхностную ветвь лучевого нерва с тыльной ветвью локтевого нерва на тыльной поверхности кисти;

в) **тыльные пальцевые нервы, rr. digitales dorsales** (см. рис. 1019, 1020), иннервируют следующие участки кожи: кожу лучевого и локтевого краев тыльной поверхности большого пальца кисти до основания ногтя, кожу лучевого и локтевого краев тыльной поверхности указательного пальца до средней фаланги и кожу лучевого края тыльной поверхности среднего пальца также до средней фаланги;

г) **глубокая ветвь, r. profundus** (см. рис. 1023), — более толстая, чем поверхностная ветвь, отходит от основного ствола так же, как и поверхност-


ная, на уровне латерального надмыщелка плечевой кости и, войдя в брюшко супинатора, огибает верхний участок лучевой кости, направляясь косо вниз на тыльную поверхность предплечья. Выйдя из мышцы, она располагается под разгибателем пальцев, т. е. между поверхностными и глубокими разгибателями. Далее глубокая ветвь в сопровождении задней межкостной артерии следует дистально до тыльной поверхности запястья.

Глубокая ветвь посылает ветви:

а) **задний межкостный нерв предплечья, n. interosseus (antebrachii) posterior**. Сначала он располагается между поверхностным и глубоким слоями разгибателей, далее ложится на дорсальную поверхность межкостной перепонки предплечья, между сухожилиями длинного и короткого разгибателей большого пальца кисти, достигая запястья.

На своем пути задний межкостный нерв посылает ветви к межкостной перепонке (они могут объединяться с передним межкостным нервом предплечья от срединного нерва), к надкостнице тыльной поверхности лучевой и локтевой костей, к капсурам запястных, запястно-пястных, а также пястно-фаланговых суставов;

б) **мышечные ветви** в области предплечья направляются к следующим мышцам: супинатору, короткому лучевому разгибателю запястья, разгибателю пальцев, разгибателю мизинца, короткому разгибателю большого пальца кисти, локтевому разгибателю запястья, длинной мыш-



**1025. Области распространения кожных нервов пояса и свободной части верхней конечности, правой (полусхематично). (Ладонная поверхность.)**

це, отводящей большой палец кисти, длинному разгибателю большого пальца кисти, разгибателю указательного пальца.

#### ГРУДНЫЕ НЕРВЫ

**Грудные нервы, nn. thoracici** ( $T_{1-12}$ ) (рис. 1027—1032; см. рис. 996, 997), 12 пар, сплетений не образуют.


Каждый ствол грудного спинномозгового нерва является смешанным. Выходя из межпозвоночного отвер-

стия, он отдает следующие ветви: менингеальную ветвь, белые соединительные ветви, заднюю ветвь и переднюю ветвь.

1. **Менингеальные ветви, rr. meningei**, через межпозвоночные отверстия направляются к оболочкам спинного мозга.

2. **Белые соединительные ветви, rr. communicantes album** (см. рис. 1027, 1060), идут к симпатическому стволу.

3. **Задние ветви, rr. dorsales** (см. рис. 1027), являются смешанными.




**1026. Области распространения кожных нервов пояса и свободной части верхней конечности, правой (полусхематично). (Тыльная поверхность.)**

Каждая задняя ветвь отходит от соответствующего грудного нерва в пространстве между двумя поперечными отростками соседних грудных позвонков и делится на медиальную и латеральную ветви:

1) **медиальная ветвь, r. medialis**, отойдя от задней ветви грудного нерва, проходит около остистого отростка между многораздельной и полуостистой мышцами и проникает в кожу как **медиальная кожная ветвь, r. cutaneus medialis**. На своем пути ме-

диальная ветвь посылает мышечные ветви к мышцам-вращателям, к многораздельной и полуостистой мышцам груди. Кожная ветвь иннервирует кожу в области, соответствующей указанным мышцам;

2) **латеральная ветвь, r. lateralis** (см. рис. 1027, 1029, 1030), проходит между подвздошно-реберной и длиннейшей мышцами и как **латеральная кожная ветвь, r. cutaneus lateralis**, проникает в кожу. Латеральная ветвь посылает мышечные ветви к под-



### 1027. Межреберные нервы, артерии и вены; вид сверху и немного спереди.

(Кожные покровы переднебоковых отделов груди в пределах V—VI ребер удалены; пристеночный листок плевры и внутргрудная фасция удалены.)


вздошно-реберной мышце поясницы, груди и шеи, к длиннейшей мышце груди и частично шеи. Кожные ветви иннервируют область кожи, соответствующую указанным мышцам.

4. Передние ветви, *rr. anteriores* (см. рис. 1027, 1030, 1031). Каждая передняя ветвь, направляясь спереди, ложится между ребрами. Передние ветви первых 11 грудных нервов получают название *межреберных нервов*, *pt. intercostales* ( $Th_1$ — $Th_{XI}$ ); переднюю ветвь двенадцатого грудного нерва ( $Th_{XII}$ ), проходящую под XII ребром, называют *подреберным нервом*, *pt. subcostalis*. Первый межреберный нерв ( $Th_1$ ) большей своей частью входит в состав плечевого сплетения, второй межреберный нерв ( $Th_{II}$ ), часто третий ( $Th_{III}$ ) и редко четвертый ( $Th_{IV}$ ) межреберные нервы своей небольшой частью переходят на плечо как *межреберно-плечевые нервы*, *pt. intercostobrachiales*. Они иннервируют соответствующую область кожи или соединяются с медиальным кожным


нервом плеча. Подреберный нерв ( $Th_{XII}$ ) участвует в образовании поясничного сплетения.

Каждый межреберный нерв, расположаясь в соответствующем межреберье, у своего начала лежит кнутри от наружной межреберной мышцы, будучи прикрыт внутргрудной фасцией и листком париетальной плевры, за исключением подреберного нерва, который следует не в межреберье, а под XII ребром и в начальных отделах располагается кнутри от квадратной мышцы поясницы. Далее каждый межреберный нерв проходит между внутренней и наружной межреберными мышцами, приближаясь к борозде ребра в сопровождении лежащих выше нерва межреберных артерий и вен.

Верхние 6—7 межреберных нервов ( $Th_1$ — $Th_{VI}$ — $Th_{VII}$ ), следя на всем протяжении в межреберьях, достигают латерального края грудини и разветвляются в коже этой области. Нижние межреберные нервы, дойдя до хрящей ребер, переходят через



**1028. Нервы туловища. (Задняя поверхность).**  
*(Задние ветви спинномозговых нервов: слева — кожные ветви, справа — мышечные.)*




**1029. Области распространения кожных нервов туловища; вид сзади (полусхематично).**

хрящ нижележащего ребра и проникают между поперечной и внутренней косой мышцами живота. Не теряя своего направления, нервы достигают латерального края влагалища прямой мышцы живота, прободают его и, следуя на небольшом протяжении (0,5—1,0 см) по задней поверхности прямой мышцы живота, вступают в ее толщу. Здесь нервы отдают кожные ветви, которые прободают переднюю стенку влагалища прямой мышцы живота, направляются к коже соответствующей области, а сами разветвляются в толще мышцы.

Смежные нервы имеют между собой соединительные ветви. Дистальные участки нижних (седьмого—двенадцатого) межреберных нервов образуют между собой соединения (см. рис. 1032).

На своем пути межреберные нервы отдают ряд ветвей:

- 1) **мышечные ветви** направляются к следующим мышцам: mm. levatores costarum, m. seratus posterior superior, m. serratus posterior inferior, m. transversus thoracis, mm. subcostales, mm. intercostales intimi, mm. intercostales interni, mm. intercostales



**1030. Области распространения кожных нервов туловища; вид спереди (полусхематично).**


externi, m. transversus abdominis, m. obliquus abdominis internus, m. obliquus abdominis externus, m. rectus abdominis, m. pyramidalis, m. quadratus lumborum;

2) плевральные и брюшинные ветви — тонкие нервы, которые отходят от межреберных нервов к реберной плевре, брюшине переднебоковых стенок живота, а также к серозному покрову начальных отделов диафрагмы;

3) кожные ветви, rr. cutanei (см. рис. 1027, 1030), отходят от межреберных нервов и образуют два ряда ветвей — более толстые латеральные

кожные ветви и более тонкие передние кожные ветви:

а) латеральные кожные ветви, rr. cutanei laterales, среди которых по области их распределения различают грудные кожные ветви, rr. cutanei pectorales, и брюшиные кожные ветви, rr. cutanei abdominales, отходящие от межреберных нервов и в пределах передней подмышечной линии в области груди прободают наружные межреберные мышцы, выходя между зубцами передней зубчатой мышцы, а в области живота прободают наружную косую мышцу живота. Затем



**1031. Симпатические стволы и сплетения спинномозговых нервов; вид спереди.**  
(Справа широко вскрыты грудная и брюшная полости и удалены париетальный листок плевры, брюшины, внутригрудная и внутрибрюшная фасции.)

каждая латеральная кожная ветвь делится на переднюю и заднюю ветви; обе эти ветви иннервируют кожу соответствующих областей.

Передние ветви четвертой-шестой латеральных кожных ветвей достигают кожи молочной железы — это *латеральные ветви молочной железы, rr. mammarii laterales*.

Первый грудной межреберный нерв ( $Th_1$ ) не имеет латеральной кожной ветви (входит в состав плечевого сплетения).

Латеральные кожные ветви второго ( $Th_{II}$ ), иногда третьего ( $Th_{III}$ ) и четвертого ( $Th_{IV}$ ) межреберных нервов могут следовать к коже плеча в виде межреберно-плечевых нервов. Передняя ветвь латеральной кожной ветви двенадцатого межреберного, или подреберного, нерва посылает книзу одну или несколько ветвей, которые переходят через подвздошный гребень в область средней ягодичной мышцы и достигают кожи в области большого вертела;


б) *передние кожные ветви, rr. cutanei anteriores*, — концевые ветви межреберных нервов, в области груди прободают внутренние межреберные мышцы и направляются к латеральному краю грудины под названием *грудных кожных ветвей, rr. cutanei pectorales*. Из них вторая-четвертая грудные кожные ветви иннервируют кожу молочной железы и получают название *медиальных ветвей молочной железы, rr. mammarii mediales*.

В области передней стенки живота одна из передних кожных ветвей прободает апоневроз наружной косой мышцы живота у латерального края прямой мышцы живота, другие — переднюю стенку влагалища прямой мышцы живота у ее медиального края и разветвляются в области белой линии; эти ветви носят название *брюшных ветвей, rr. cutanei abdominales*.

#### ПОЯСНИЧНЫЕ, КРЕСТЦОВЫЕ И КОПЧИКОВЫЙ НЕРВЫ

*Поясничные, крестцовые и копчиковый нервы, nn. lumbales, sacrales et coccygei*, как и все вышележащие спинномозговые нервы, отдают по 4 группы ветвей: менингальные, соединительные, передние и задние.

Передние ветви поясничных, крестцовых и копчикового спинномозговых нервов ( $L_1—L_V$ ,  $S_1—S_V$ ,  $Co_1—Co_{II}$ ), всего пять, образуются относи-



образуют одно общее *пояснично-крестцовое сплетение, plexus lumbosacralis*.


В этом сплетеии топографически различают *поясничное сплетение* ( $Th_{XII}—L_1—L_{IV}$ ) и *крестцовое сплетение* ( $L_{IV}—L_V—Co_1$ ). Крестцовое сплетение подразделяют на собственно крестцовое сплетение и копчиковое сплетение ( $S_{IV}—Co_1$ ,  $Co_{II}$ ) (см. рис. 997).

#### Поясничные нервы

*Поясничные нервы, nn. lumbales* (рис. 1033—1037; см. рис. 996, 997, 1031), всего пять, образуются относи-

#### 1032. Нервы поперечной мышцы живота, правой (фотография). Препарат С. Гордиенко.

1 — внутримышечное первое сплетение на всем протяжении мышцы; 2 — передние ветви второго поясничного нерва; 3 — передние ветви первого поясничного нерва; 4 — соединительная ветвь к подреберному нерву; 5 — подреберный нерв; 6 — соединительные ветви от одиннадцатого межреберного и подреберного нервов; 7 — одиннадцатый межреберный нерв; 8 — соединительная ветвь к десятому межреберному нерву; 9 — десятый межреберный нерв; 10 — соединительная ветвь к девятому межреберному нерву; 11 — девятый межреберный нерв; 12 — соединительная ветвь к восьмому межреберному нерву; 13 — восьмой межреберный нерв.



1033. Поясничное сплетение,  
plexus lumbalis (полусхематично).

тельно длинными спинномозговыми корешками, которые идут в позвоночном канале в вертикальном направлении. Передние и задние корешки, соединяясь в стволы спинномозговых нервов, выходят из позвоночного канала через соответствующее межпозвоночное отверстие так, что первый поясничный нерв ( $L_1$ ) располагается между I и II поясничными позвонками, а пятый ( $L_5$ ) — между V поясничным позвонком и основанием крестца. Каждый поясничный спинномозговой нерв, как и другие спинномозговые нервы, отдает менингеальную ветвь, соединительную ветвь, заднюю ветвь и переднюю ветвь.

1. *Менингеальные ветви, rr. meningei*, идут к оболочкам спинного мозга.

2. *Соединительные ветви, rr. communicantes*, направляются к симпатическому стволу.


3. *Задние ветви, rr. dorsales*, расположаясь между поперечными отростками поясничных позвонков, направляются дорсально, и вскоре каждая из них делится на две ветви — медиальную ветвь и латеральную ветвь, которые иннервируют собственные мышцы спины и кожу поясничной, крестцовой и ягодичной областей (см. рис. 1029). Задние ветви двух нижних поясничных нервов ( $L_4$ — $L_5$ ) иннервируют только мышцы:


1) *медиальные ветви, rr. mediales*, более слабые, чем латеральные, разветвляются в многораздельной мышце и в поясничной части межостистой мышцы;

2) *латеральные ветви, rr. laterales*, разветвляются в поясничных частях мышцы, выпрямляющей позвоночник, и в межпоперечных мышцах, а более толстые ветви идут к коже.

Латеральные кожные ветви задних ветвей трех верхних поясничных нервов ( $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$ ), пройдя через толщу указанных мышц и пояснично-грудную фасцию, спускаются ниже гребня подвздошной кости и разветвляются в коже ягодичной области. Они называются *верхними нервами ягодиц, nn. psoas superiores*.

**1034. Пояснично-крестцовое сплетение, plexus lumbosacralis, и нервы свободной части нижней конечности, правой; передняя поверхность (полусхематично).**





**1035. Нервы поясничной области и таза; вид спереди.**  
**(Пояснично-крестцовое и копчиковое сплетения; справа удалена большая поясничная мышца.)**

*clini<sup>ii</sup> superiores*. На своем пути они соединяются между собой и достигают кожи области большого вертела.

4. Передние ветви, *r. ventrales*, увеличиваются в диаметре от первой до пятой. Они значительно толще передних ветвей шейных и грудных нервов. Отойдя от ствола поясничных спинномозговых нервов, передние ветви первого ( $L_1$ ), второго ( $L_{II}$ ), третьего ( $L_{III}$ ) и большей верхней части четвертого ( $L_{IV}$ ) поясничных нервов, а также часть подреберного нерва ( $Th_{XII}$ ), соединяясь одна с другой в виде трех поясничных петель, образуют поясничное сплетение. Посредством пояснично-крестцового ствола, *truncus lumbosacralis*, который образован нижней частью передней ветви четвертого и верхней части пятого ( $L_5$ ) поясничных нервов, поясничное спле-

тение объединяется с крестцовым сплетением в *пояснично-крестцовое сплетение, plexus lumbosacralis*.

#### Поясничное сплетение

**Поясничное сплетение, plexus lumbalis** ( $Th_{XII}$ ,  $L_1—L_4$ ) (см. рис. 997, 1031, 1033—1035), располагается впереди поперечных отростков поясничных позвонков, проникая своими петлями между квадратной мышцей поясницы сзади и большой поясничной мышцей спереди, отчасти прободая толщу последней мышцы.

#### Ветви поясничного сплетения

1. **Мышечные ветви** отходят еще до образования сплетения от передних ветвей первого-четвертого пояснич-

ных нервов ( $L_1—L_{IV}$ ) к межпоперечным мышцам поясницы, от передних ветвей двенадцатого грудного и первого-третьего поясничных нервов ( $Th_{XII}, L_1—L_{III}$ ) — к квадратной мышце поясницы, от передних ветвей двенадцатого грудного и первого-четвертого поясничных нервов ( $Th_{XII}, L_1—L_{IV}$ ) — к большой поясничной мышце и от передних ветвей первого и второго поясничных нервов ( $L_1, L_{II}$ ) — к малой поясничной мышце.

2. Подвздошно-подчревный нерв, *n. iliohypogastricus* ( $Th_{XII}, L_1$ ) (см. рис. 996, 1033—1035), образуется из двенадцатого грудного и передней ветви первого поясничного нервов. Прободая верхнебоковой участок большой поясничной мышцы, он переходит на переднюю поверхность квадратной мышцы поясницы, расположаясь в этом месте между нею и почкой. Далее нерв идет сверху вниз и сзади наперед; не дойдя до подвздошного гребня, прободает толщу поперечной мышцы живота, следует между нею и внутренней косой мышцей живота, а затем между обеими косыми мышцами живота.

В области глубокого пахового кольца нерв прободает внутреннюю косую мышцу, а затем апоневроз наружной косой мышцы живота и, направляясь далее к области поверхностного пахового кольца, разветвляется в коже нижней части живота, выше симфиза.


Ветви подвздошно-подчревного нерва:

1) латеральная кожная ветвь, *r. cutaneus lateralis* (см. рис. 1054, 1055), отходит от основного ствола на середине подвздошного гребня, прободает обе косые мышцы живота и разветвляется в коже верхней латеральной области бедра, где может соединяться с латеральной кожной ветвью двенадцатого грудного нерва;

2) передняя кожная ветвь, *r. cutaneus anterior*, является продолжением основного ствола, прободает апоневроз наружной косой мышцы и разветвляется в коже над лобком;

3) мышечные ветви следуют к поперечной и внутренней косой мышцам живота.

3. Подвздошно-паховый нерв, *n. ilioinguinalis* ( $L_1$ ) (см. рис. 996, 1033—1035), располагается под подвздошно-подчревным нервом и идет почти параллельно с ним. Выйдя из-под латерального края большой поясничной



мышцы, он проходит по поверхности квадратной мышцы поясницы, прободает поперечную мышцу живота и, расположаясь между нею и внутренней косой мышцей живота, следует к поверхностному паховому кольцу. Пройдя через апоневроз наружной косой мышцы в области поверхностного отверстия пахового канала, где он прилежит к передневнутренней поверхности семенного канатика или круглой связки матки, нерв разветвляется в коже области лобка, мошон-

**1036. Нервы и сосуды бедра, правого. (Переднемедиальная поверхность).**  
*(Мышцы бедра частично удалены.)*

ки (больших половых губ у женщин) и паховой области.

Располагаясь между указанными мышцами, подвздошно-паховый нерв образует соединение с подвздошно-подчревным нервом.

Ветви подвздошно-пахового нерва:

1) *передние мошоночные нервы, nn. scrotales anteriores (передние губные нервы, nn. labiales anteriores)*, идут к коже корня полового члена, передних отделов мошонки (верхних отделов больших половых губ у женщин). Эти ветви могут соединяться с ветвями бедренно-полового нерва;


2) *мышечные ветви* иннервируют нижние участки поперечной мышцы живота и косые мышцы живота.

4. *Бедренно-половой нерв, n. genitofemoralis (L<sub>I</sub>, L<sub>II</sub>)* (см. рис. 996, 1033, 1034), проходит через толщу большой поясничной мышцы и ее переднюю поверхность, располагаясь позади мочеточника, направляется к паховой области. В толще мышцы или по выходе из нее нерв делится на две ветви — бедренную и половую.

Ветви бедренно-полового нерва:

1) *бедренная ветвь, r. femoralis*, располагаясь книзу и кзади от наружных подвздошных сосудов, идет вначале позади подвздошной фасции, а затем впереди нее и следует в сосудистой лакуне, где залегает снаружи и спереди от бедренной артерии. Далее прободает широкую фасцию бедра в области подкожной щели и разветвляется в коже этого участка. Некоторые ветви подходят под паховую связку и, прободая широкую фасцию бедра, распределяются в коже области бедренного треугольника. Бедренная ветвь соединяется с передними кожными ветвями бедренного нерва, с подвздошно-паховым нервом;

2) *половая ветвь, r. genitalis*, располагаясь на передней поверхности большой поясничной мышцы, медиальнее бедренной ветви, но также книзу от наружных подвздошных сосудов, направляется вниз, проникает в паховый канал и, следуя к его поверхностному кольцу, выходит вместе с семенным канатиком (или круглой связкой матки у женщин). Направляясь далее в мошонку, половая ветвь посыпает ветви к мышце, поднимающей яичко, коже мошонки и к ее мясистой оболочке, а также к верхним участкам медиальной поверхности бедра; у женщин она посыпает ветви к круглой связке матки, коже области поверхностного пахово-



го кольца и больших половых губ. Эта ветвь может соединяться с бедренной ветвью.

5. *Латеральный кожный нерв бедра, n. cutaneus femoris lateralis (L<sub>III</sub>, L<sub>IV</sub>)* (см. рис. 996, 1031, 1033, 1036, 1054, 1055), выходит из-под латерального края большой поясничной мышцы, иногда через толщу мышцы; следует, располагаясь под подвздошной фасцией, по передней поверхности подвздошной мышцы к передней верхней подвздошной ости и проходит медиальнее последней под паховой связкой на бедро. Здесь нерв направляется вниз, латеральнее портняжной

### 1037. Кожные нервы нижней конечности, правой (фотография. Препарат В. Безъязычного).

1 — кожная ветвь запирательного нерва;  
2 — подкожный нерв; 3 — медиальные кожные ветви голени; 4 — поднадколенниковая ветвь;  
5 — передние кожные ветви; 6 — запирательный нерв; 7 — бедренный нерв; 8 — латеральный кожный нерв бедра.

мышцы, прободает своими ветвями широкую фасцию верхнего участка бедра и разветвляется в коже на несколько мелких и два-три крупных нерва, достигающих коленного сустава. Его ветви могут образовывать соединения с передними кожными ветвями бедренного нерва.

6) *Запирательный нерв, n. obturatorius* ( $L_1 - L_5$ ) (см. рис. 996, 1031, 1033—1036), в начальных отделах лежит позади поясничной мышцы, затем выходит из-за ее медиального края и, прободая фасцию этой мышцы, направляется на уровне крестцово-подвздошного сочленения вниз к пограничной линии. Следуя на некотором расстоянии параллельно этой линии, прикрытый наружными подвздошными сосудами, он спускается на боковую стенку малого таза и идет к внутреннему отверстию запирательного канала в сопровождении лежащих под ним запирательных артерий и вен. Пройдя в указанный канал, нерв делится на две концевые ветви — переднюю и заднюю.

Ветви запирательного нерва:

1) *мышечная ветвь, r. muscularis*, берет начало от основного ствола перед входом его в запирательный канал, проходит вместе с ним через канал и разветвляется в наружной запирательной мышце;

2) *передняя ветвь, r. anterior* (см. рис. 1036), толще задней, является продолжением основного ствола, проходит между длинной и короткой приводящими мышцами и отдает мышечные ветви к этим мышцам, а также к тонкой и гребенчатой мышцам (непостоянно).

В дальнейшем запирательный нерв следует между длинной приводящей и тонкой мышцами, прободает широкую фасцию между портняжной и тонкой мышцами и в виде кожной ветви разветвляется в коже нижних отделов медиальной поверхности бедра вплоть до коленного сустава (см. рис. 1037, 1054, 1055). Запирательный нерв может соединяться с подкожным нервом от бедренного нерва;

3) *задняя ветвь, r. posterior* (см. рис. 1036), отойдя от основного ствола, прободает наружную запирательную мышцу (реже проходит под ней), ложится между большой и короткой приводящими мышцами и посыпает мышечные ветви к ним.

Кроме мышечных ветвей, задняя ветвь отдает суставные ветви к суставной капсуле тазобедренного су-

стava и ветви к надкостнице задней поверхности бедренной кости.

7) *Добавочный запирательный нерв, n. obturatorius accessorius* ( $L_{II} - L_{IV}$ ) (см. рис. 1033), непостоянный, лежит у медиального края большой поясничной мышцы над подвздошной фасцией, переходит через гребень лобковой кости и ложится между подвздошно-поясничной и гребенчатой мышцами. Здесь нерв разветвляется и посыпает ветви к гребенчатой мышце и тазобедренному суставу, соединяясь с ветвями запирательного нерва.

8) *Бедренный нерв, n. femoralis* ( $L_1 - L_{IX}$ ) (см. рис. 996, 1031, 1033, 1036, 1037) — самый толстый нерв поясничного сплетения. Начальный отдел нерва лежит позади большой поясничной мышцы, а затем выходит из-под ее латерального края. Располагаясь далее в борозде между большой поясничной и подвздошной мышцами, под подвздошной фасцией, он следует в мышечной лакуне, выйдя через которую на бедро, ложится под фасцию, покрывающую подвздошную и гребенчатую мышцы, залегая в бедренном треугольнике, латеральное бедренных сосудов. Непосредственно в мышечной лакуне или несколько дистальнее паховой связки нерв делится на свои концевые ветви, среди которых можно различить 3 группы: переднюю, медиальную и латеральную.

Ветви бедренного нерва:

1) *мышечные ветви, rr. musculares*, в области большого таза отходят от основного ствола к большой поясничной мышце: более короткие ветви — от латеральной поверхности ствола, более длинные ветви — от медиальной. Кроме того, мышечные ветви различных толщины и длины идут в области бедра к следующим мышцам: портняжной (от передней и латеральной групп ветвей), гребенчатой и медиальной широкой (от медиальной группы ветвей), прямой мышце бедра, промежуточной и латеральной широким мышцам (от латеральной группы ветвей) и к суставной мышце колена.

Мышечные ветви, направляющиеся к прямой мышце бедра, посыпают ветви к капсуле тазобедренного сустава; мышечные ветви, идущие к широким мышцам бедра, отдают ветви к суставной капсуле коленного сустава и к надкостнице бедренной кости. Одна-две ветви подходят к бедренной

кости и через питательные отверстия вступают в ее толщу;

2) *передние кожные ветви, rr. cutanei anteriores* (см. рис. 1037, 1054), всего 3—5, прободают на разных уровнях широкую фасцию бедра и разветвляются в коже передней и переднемедиальной поверхностей бедра, достигая области коленного сустава. Те из них, которые, прободая портняжную мышцу, располагаются над переднемедиальной поверхностью этой мышцы, образуют соединения с кожными ветвями передней ветви запирательного нерва. Другая группа ветвей, также прободающая эту мышцу, но залегающая на ее переднелатеральной поверхности, образует соединения с ветвями латерального кожного нерва бедренно-полового нерва;

3) *подкожный нерв ноги, n. saphenus* (см. рис. 1034, 1037, 1055) — самая длинная ветвь бедренного нерва, отходит от медиальной группы его ветвей. В своих начальных отделах он идет латеральнее бедренной артерии. Направляясь далее, он входит вместе с артерией и бедренной веной в приводящий канал, располагаясь в нем впереди и латеральнее артерии. Затем нерв проходит через переднюю стенку канала и ложится в желобе между медиальной широкой и большой приводящей мышцами, будучи прикрыт сухожилием портняжной мышцы. Здесь он прободает широкую фасцию бедра, проникает под кожу и в сопровождении большой подкожной вены ноги спускается по переднемедиальной поверхности голени, достигая стопы.

На своем пути подкожный нерв ноги дает следующие ветви:

а) *подколенниковая ветвь, r. infrapatellaris* (иногда несколько ветвей), отходит от ствола подкожного нерва ноги на уровне медиального надмышелка бедра; прободая или обходя сухожилие портняжной мышцы, она проникает через фасцию под кожу и разветвляется в области надколенника, медиальной поверхности колена и верхних отделов голени (над бугристостью большеберцовой кости);

б) *медиальные кожные ветви голени, rr. cutanei cruris mediales*, — ряд тонких ветвей, отходящих на протяжении подкожного нерва к медиальной поверхности голени; часть из них переходит в кожу области передней и задней поверхностей голени.

На стопе нерв идет по ее медиальному краю; концевые его ветви не достигают кожи большого пальца. Подкожный нерв образует на стопе соединения с ветвями поверхностного малоберцового нерва;

в) *соединительные ветви* часто встречаются в области медиальной поверхности колена с кожными ветвями запирательного нерва.

### Крестцовые нервы


**Крестцовые нервы, nn. sacrales** ( $S_1 - S_5$ ), всего 5, образуются наиболее длинными спинномозговыми корешками и, следуя вертикально вниз в по-

ясничном и крестцовом отделах позвоночного канала, уже в самом канале разделяются на свои основные ветви: менингеальные, соединительные (о них см. «Спинномозговые нервы»), задние и передние.

1. *Задние ветви, rr. dorsales* (см. рис. 1028, 1029), выходят из крестцового канала через дорсальные крестцовые отверстия; исключение составляет задняя ветвь пятого крестцового нерва, которая выходит вместе с задней ветвью копчикового нерва через крестцовую щель. Задние ветви крестцовых нервов, которые значительно тоньше передних, делятся на медиальные и латеральные ветви:

1) *медиальные ветви, rr. mediales*, короткие и тонкие. На дорсальной поверхности крестца они соединяются между собой и с задней ветвью копчикового нерва, образуя сплетение, лежащее в области крестцово-подвздошного сочленения и верхних отделов крестцово-буторной связки. Его стволики иннервируют суставную капсулу этого сочленения, ближайшие связки, крестцовый отдел многораздельной мышцы (преимущественно  $S_1$ ), а также кожу области крестца и отчасти копчика;

2) *латеральные ветви, rr. laterales* (имеются только у трех верхних задних ветвей крестцовых нервов), зна-



чительно длиннее медиальных, прободают у латерального края крестца большую ягодичную мышцу, разветвляются в коже этой области и называются *средними нервами ягодиц*, *nn. clunium medii*.

2. *Передние ветви, rr. ventrales* (см. рис. 1034), выходят из крестцового канала через тазовые крестцовые отверстия; они уменьшаются в диаметре от первой до пятой.

Нижняя, меньшая часть передней ветви четвертого поясничного нерва ( $L_{IV}$ ) и передние ветви пятого поясничного нерва ( $L_V$ ), первого крестцового ( $S_I$ ), второго крестцового ( $S_{II}$ ) и верхняя часть передней ветви

третьего крестцового нерва ( $S_{III}$ ), соединяясь между собой посредством 4 петель, образуют крестцовое сплетение.


#### Крестцовое сплетение

**Крестцовое сплетение, plexus sacralis** ( $L_{IV}—L_V$ ;  $S_I—S_{III}$ ) (рис. 1038—1056; см. рис. 997, 1034, 1035), представляет собой треугольную толстую пластинку, которая вершиной направлена к подгрушевидной щели. Часть сплетения залегает на передней поверхности крестца, часть — на передней поверхности грушевидной мышцы.

Сплетение окружено рыхлой соединительной тканью и лежит под пристеночным листком тазовой фасции; со стороны его медиальной поверхности располагается ряд ветвей внутренних подвздошных сосудов. Из крестцового сплетения образуются различные по длине нервы.


#### Ветви крестцового сплетения

1. *Внутренний запирательный нерв, n. obturatorius internus* (см. рис. 1035, 1038), отходит от пояснично-крестцового ствола и передней ветви первого крестцового нерва ( $S_I$ ). Выйдя из таза под грушевидной мышцей, нерв оги-



1038. Крестцовое сплетение, plexus sacralis, и копчиковое сплетение, plexus coccygeus (полусхематично).

1039. Нервы, артерии и вены промежности мужчины; вид снизу. (Большая ягодичная мышца справа перерезана; мошонка оттянута; крестцово-буторная связка частично удалена.)



бает седалищную ость, подходит к внутренней запирательной мышце, отдавая иногда небольшую ветвь к верхней близнецовой мышце.

2. *Нерв грушевидной мышцы, n. piriformis* (см. рис. 1038), образован двумя стволами, отходящими от задней поверхности передних ветвей первого и второго крестцовых нервов ( $S_1, S_2$ ); общим стволом нерв подходит к грушевидной мышце и иннервирует ее.

3. *Нерв квадратной мышцы бедра, n. quadratus femoris* (см. рис. 1038), отходит от передней поверхности пояснично-крестцового ствола и первого крестцового нерва. Выходя из таза под грушевидной мышцей, отдает конечные ветви к квадратной мышце бедра. Спускаясь несколько впереди седалищного нерва, он посыпает ветви к близнецовым мышцам и капсуле тазобедренного сустава.

4. *Верхний ягодичный нерв, n. gluteus superior* ( $L_{IV}, L_V, S_1$ ) (см. рис. 1038, 1045), выходит из полости малого таза в сопровождении одноименных сосудов через щель над грушевидной мышцей и, огибая большую седалищную вырезку, ложится между средней и малой ягодичными мышцами, направляясь дугообразно вперед. Отдав ветви указанным мышцам, нерв распределяется своими кон-

цевыми ветвями в толще напрягателя широкой фасции.

5. *Нижний ягодичный нерв, n. gluteus inferior* ( $L_V, S_1, S_2$ ) (см. рис. 1042—1045), выходит из полости малого таза через щель под грушевидной мышцей в ягодичную область под большую ягодичную мышцу вместе с половым нервом (латеральнее его), седалищным нервом и задним кожным нервом бедра (медиальнее их). Разветвляется в толще большой ягодичной мышцы, иннервируя также капсулу тазобедренного сустава. Иногда нерв принимает участие в иннервации внутренней запирательной, близнецовых мышц и квадратной мышцы бедра.

6. *Задний кожный нерв бедра, n. cutaneus femoris posterior* (см. рис. 1038, 1045, 1055), вначале прилегает к нижнему ягодичному нерву или идет с ним общим стволом; выходит из полости таза через щель под грушевидной мышцей медиальнее седалищного нерва и ложится под большую ягодичную мышцу, располагаясь почти посередине между седалищным бугром и большим вертелом бедра, спускается на заднюю поверхность бедра. Здесь он располагается тотчас под широкой фасцией соответственно борозде между полу-сухожильной и двуглавой мышцами

бедра; направляясь вниз, дает ветви, отходящие по обе стороны от основного ствола и прободающие фасцию на протяжении задней поверхности бедра. Ветви разветвляются в коже задней и особенно медиальной поверхности бедра, достигая кожи области подколенной ямки.

Ветви заднего кожного нерва бедра:

1) *нижние нервы ягодиц, nn. clunium inferiores* (см. рис. 1029, 1055), отойдя от основного ствола 2—3 ветвями, огибают или прободают нижний край большой ягодичной мышцы, направляются кверху и разветвляются в коже ягодичной области;

2) *промежностные ветви, rr. perineales*, всего 1—2, иногда больше,—тонкие нервы, отходят от основного ствола, направляются вниз и, огибая седалищный бугор, следуют кпереди, разветвляясь в коже медиальной поверхности мошонки (больших половых губ) и промежности. Эти ветви соединяются с одноименными ветвями полового нерва.

7. *Седалищный нерв, n. ischiadicus* ( $L_{IV}, L_V, S_1—S_3$ ) (см. рис. 996, 1034, 1038, 1045, 1049)—самый толстый нерв не только пояснично-крестцового сплетения, но и всего тела; является непосредственным продолжением всех корешков крестцового сплете-

**1040. Нервы промежности мужчины; вид слева (фотография. Препаратор А. Косова). (Левая подвздошная кость удалена; мочевой пузырь и прямая кишка вскрыты.)**

1—крестец; 2—крестцовые узлы симпатического ствола; 3—тазовые крестцовые отверстия; 4—ветви симпатического ствола к нижнему подчревному сплетению; 5—крестцовое сплетение; 6—тазовый внутренностный нерв от S<sub>1</sub> к подчревному сплетению; 7—половой нерв; 8—нижние прямокишечные нервы; 9—мышечные ветви полового сплетения; 10—промежностной нерв; 11—ветви промежностного нерва; 12—ветви к предстательной железе; 13—ветви промежностного нерва к коже промежности; 14—мошонка; 15—ветви промежностного нерва к мошонке; 16—половой член; 17—ветви дорсального нерва полового члена; 18—левая бульбоуретральная железа; 19—симфиз; 20—нерв от промежностного нерва к бульбоуретральной железе; 21—предстательная железа; 22—дорсальный нерв полового члена; 23—мочевой пузырь (вскрыт); 24—прямая кишка (вскрыта); 25—нижнее подчревное сплетение.

**1041. Нервы, артерии и вены промежности женщины; вид снизу. (Большая ягодичная мышца справа перерезана; крестцово-бугорная связка частично удалена.)**

ния. По выходе через щель под грушевидной мышцей седалищный нерв располагается латеральнее всех нервов и сосудов, проходящих через это отверстие, и ложится между большой ягодичной мышцей с одной стороны и близнецовыхами, внутренней запирательной мышцами и квадратной мышцей бедра — с другой, почти на середине линии, проведенной между седалищным бугром и большим вертелом бедра. Еще до выхода через щель от седалищного нерва отходит суставная ветвь к капсуле тазобедренного сустава.

Выходя из-под нижнего края большой ягодичной мышцы, седалищный нерв располагается в области ягодичной складки близко к широкой фасции бедра; далее книзу он прикрывается длинной головкой двуглавой мышцы бедра, располагаясь между нею и большой приводящей мышцей. На середине бедра длинная головка пересекает его; ниже он располагается между полуперепончатой мышцей медиально и двуглавой мышцей бедра латерально и достигает подколенной ямки, где в верхнем ее углу разделяется на две ветви: более толстую медиальную — большеберцовый нерв


и более тонкую латеральную — общий малоберцовый нерв.

Разделение седалищного нерва на указанные две ветви иногда может происходить выше подколенной ямки, даже непосредственно у самого крестцового сплетения. В этом случае из полости малого таза большеберцовый нерв проходит под грушевидной мышцей, а общий малоберцовый нерв может прободать эту мышцу или проходить над ней. Обе эти ветви на протяжении всего седалищного нерва лежат в общем соединительнотканном влагалище, вскрыв которое, легко разъединить их до крестцового сплетения. По линии соприкосновения большеберцового и общего малоберцового нервов проходит артерия, сопровождающая седалищный нерв.

Ветви седалищного нерва:

1) *мышечные ветви, rr. musculares* (см. рис. 1045), разветвляются в следующих мышцах: m. obturatorius internus, mm. gemelli superior et inferior (обе мышцы могут получать нервные стволы также от крестцового сплетения), m. quadratus femoris.

Мышечные ветви отходят либо до прохождения седалищного нерва через отверстие под грушевидной





**1042. Распределение верхнего ягодичного нерва в большой ягодичной мышце плода 7 мес. (Внутренняя поверхность мышцы.) (Фотография. Препаратор Б. Нурмухамбетовой.)**

I—верхний край большой ягодичной мышцы;  
II—медиальный край; III—нижний край;  
IV—латеральный край; 1—ветви верхнего ствола нижнего ягодичного нерва; 2—верхний ствол; 3—нижний ягодичный нерв; 4—нижний ствол; 5—ветви нижнего ствола; 6—средняя группа ветвей.

**1043. Нервы большой ягодичной мышцы ребенка 5 лет. (Внутренняя поверхность.) (Фотография. Препаратор Б. Нурмухамбетовой.)**

I—верхний край большой ягодичной мышцы;  
II—медиальный край; III—нижний край;  
IV—латеральный край; 1—ветви верхнего ствола нижнего ягодичного нерва; 2—верхний ствол; 3—передняя ветвь второго крестцового нерва; 4—передняя ветвь третьего крестцового нерва; 5—передняя ветвь четвертого крестцового нерва; 6—нижний ягодичный нерв; 7—нижний ствол нижнего ягодичного нерва; 8—ветви нижнего ствола; 9—средняя группа ветвей нижнего ягодичного нерва.



мышцей, либо в пределах его. Кроме того, мышечные ветви в области бедра отходят от большеберцовой части седалищного нерва к т. *biceps femoris* (*caput longum*), т. *semitendinosus*, т. *semimembranosus*, т. *aductor magnus* (см. рис. 1049).

От малоберцовой части седалищного нерва мышечные ветви направляются к т. *biceps femoris* (*caput breve*);

2) суставные ветви отходят от большеберцовой и малоберцовой частей седалищного нерва к суставной капсуле коленного сустава;

3) общий малоберцовый нерв, *n. fibularis [peroneus] communis* (*L<sub>IV</sub>, L<sub>V</sub>, S<sub>I</sub>, S<sub>II</sub>*) (см. рис. 1038, 1045, 1048, 1049), от проксимальной вершины подколенной ямки направляется к ее латеральной стороне и располагается под медиальным краем двуглавой мышцы бедра, между нею и латеральной головкой икроножной мышцы, спирально огибает головку малоберцовой kostи, будучи прикрыт здесь только фасцией и кожей. На этом участке от ствола нерва отходят непостоянные суставные ветви к латеральным отделам капсулы коленного сустава, а также к межберцовому суставу. Дистальнее этого участка он проникает в толщу начальной части длинной малоберцовой мышцы, где делится на свои две концевые ветви — поверхностный малоберцовый нерв и глубокий малоберцовый нерв.

От общего малоберцового нерва отходят ветви:

а) латеральный кожный нерв икры, *n. cutaneus surae lateralis*, отходит в подколенной ямке, направляется к латеральной головке икроножной мышцы и, прободая в этом месте фасцию голени, разветвляется в коже латеральной поверхности голени, достигая области латеральной лодыжки;

б) малоберцовая соединительная ветвь, *r. communicans fibularis [peroneus]* (см. рис. 1055), может начинаться от основного ствола или от латерального кожного нерва голени, следует по латеральной головке икроножной мышцы, располагаясь между нею и фасцией голени, прободает последнюю и, разветвляясь в коже, соединяется с медиальным кожным нервом голени;

в) поверхностный малоберцовый нерв, *n. fibularis [peroneus] superficialis* (см. рис. 1048, 1050—1053), проходит между головками длинной малоберцовой мышцы, следует вниз, располагаясь



#### 1044. Распределение нервов в правой большой ягодичной мышце взрослого. (Внутренняя поверхность мышцы.) (Фотография. Препаратор Н. Рыбакиной.)


I — верхний край мышцы; II — медиальный край мышцы; III — нижний край мышцы; IV — латеральный край мышцы; 1 — верхний ствол нижнего ягодичного нерва и его разветвления в толще мышцы; 2 — нижний ствол нижнего ягодичного нерва и его ветви в толще мышцы.

гаясь на некотором расстоянии между обеими малоберцовыми мышцами. Переходя на медиальную поверхность короткой малоберцовой мышцы, нерв прободает в области нижней трети голени фасцию голени и разветвляется на свои концевые ветви: тыльные медиальный и промежуточный кожные нервы (стопы).

Ветви поверхностного малоберцового нерва:

мышечные ветви, *rr. musculares* (см. рис. 1050), иннервируют длинную малоберцовую мышцу (2—4 ветви от проксимальных отделов ствола) и короткую малоберцовую мышцу (1—2 ветви от ствола в области средней трети голени);

медиальный тыльный кожный нерв, *n. cutaneus dorsalis medialis* — одна из двух концевых ветвей поверхностного малоберцового нерва. Следует на некотором протяжении поверх фасции




**1045. Нервы, артерии и вены бедра, правого. (Задняя поверхность.)**  
*(Большая и средняя ягодичные мышцы и длинная головка двуглавой мышцы перерезаны.)*


голени, направляется к медиальному краю тыла стопы, отдает ветви к коже медиальной лодыжки, где соединяется с ветвями подкожного нерва ноги, после чего делится на две ветви. Одна из них, медиальная, разветвляется в коже медиального края стопы и большого пальца до дистальной фаланги и соединяется в области первого межкостного промежутка с глубоким малоберцовым нервом. Другая ветвь, латеральная, соединяется с концевой ветвью глубокого малоберцового нерва и направляется к области второго межкостного промежутка, где разветвляется в обращенных одна к другой поверхностях II и III пальцев, давая здесь *тыльные пальцевые нервы стопы, nn. digitales dorsales pedis* (см. рис. 1053);

г) промежуточный тыльный кожный нерв, *n. cutaneus dorsalis intermedius* (см. рис. 1053), так же как и медиальный тыльный кожный нерв, располагается поверх фасции голени и следует по переднебоковой поверхности тыла стопы. Отдав ветви к коже области латеральной лодыжки, которые соединяются с ветвями икроножного нерва, делится на две ветви, из которых одна, идущая медиально, разветвляется в коже обращенных одна к другой поверхностей III и IV пальцев. Другая, лежащая латеральнее, направляется к коже обращенных друг к другу поверхностей IV пальца и мизинца и к латеральной поверхности мизинца, образуя здесь соединение с концевой ветвью икроножного нерва. Все эти ветви получили название *тыльных пальцевых нервов стопы, nn. digitales dorsales pedis*;


д) глубокий малоберцовый нерв, *n. fibularis [peroneus] profundus* (см. рис. 1048), прободая толщу начальных отделов длинной малоберцовой мышцы, передней межмышечной перегородки голени и длинного разгибателя пальцев, ложится на переднюю поверхность межкостной перепонки, располагаясь с латеральной стороны передних большеберцовых сосудов.

**1046. Нервы, артерии и вены голени, правой. (Задняя поверхность.)**  
(Трехглавая мышца голени частично удалена; задние большеберцовые и малоберцовые вены частично удалены.)





1047. Нервы, артерии и вены голени и стопы, правых.  
(Медиальная поверхность.)



**1048. Нервы голени и стопы.  
(Переднебоковая поверхность.)  
(Длинная малоберцовая мышца  
и разгибатель пальцев перерезаны  
и частично удалены.)**

Далее нерв переходит на переднюю, а затем на медиальную поверхность сосудистого пучка, располагается в верхних отделах голени между длинным разгибателем пальцев и передней большеберцовой мышцей, а в нижних отделах — между передней большеберцовой мышцей и длинным разгибателем большого пальца стопы, иннервируя их. Глубокий малоберцовый нерв имеет непостоянные соединительные ветви с поверхностным малоберцовым нервом.


При переходе на тыл стопы нерв проходит вначале под верхним удерживателем разгибателей, отдавая непостоянную суставную ветвь к капсуле голеностопного сустава, а затем под нижним удерживателем разгибателей и сухожилием длинного разгибателя большого пальца стопы и делится на две ветви: латеральную и медиальную. Первая более короткая, большая часть ее ветвей направляется к коротким разгибателям пальцев. Вторая ветвь длиннее, в сопровождении тыльной артерии стопы достигает области первого межкостного промежутка, где, проходя под сухожилием короткого разгибателя большого пальца стопы вместе с первой тыльной плюсневой артерией, делится на две концевые ветви, разветвляющиеся в коже тыльной поверхности обращенных друг к другу сторон I и II пальцев. Вместе с ними отходит непостоянное число тонких ветвей, подходящих к капсулам плюснефаланговых и межфаланговых суставов I и II пальцев со стороны их тыльной поверхности.

Ветви глубокого малоберцового нерва:

а) *мышечные ветви, rr. musculares*, в области голени направляются к следующим мышцам: m. tibialis anterior — 3 ветви, которые вступают в верхнюю, среднюю и нижнюю части мышцы, к m. extensor digitorum longus и m. extensor hallucis longus — по 2 ветви, которые вступают в верхнюю, среднюю и нижнюю части мышц (см. рис. 1050).

В области тыла стопы мышечные ветви подходят к m. extensor digitorum brevis и m. extensor hallucis brevis;

б) *тыльные пальцевые нервы, nn. digitales dorsales* — концевые ветви глубокого малоберцового нерва. Делятся на два нерва: латеральный нерв большого пальца стопы (разветвляется в коже тыльной поверхности



#### 1049. Распределение ветвей большеберцового и общего малоберцового нервов в задней группе мышц бедра, правого (фотография. Препаратор С. Островского).

(Задняя группа мышц бедра показана со стороны их внутренней поверхности.)


I — полусухожильная мышца; II — длинная головка двуглавой мышцы бедра; III — полуперепончатая мышца; IV — короткая головка двуглавой мышцы бедра.

1 — общее начало задней группы мышц бедра; 2 — верхний нерв полусухожильной мышцы; 3 — соединительная ветвь; 4 — нерв полуперепончатой мышцы; 5 — нерв короткой головки двуглавой мышцы бедра; 6 — нижний нерв полусухожильной мышцы; 7 — общий малоберцовый нерв; 8 — нерв длинной головки двуглавой мышцы бедра; 9 — большеберцовый нерв; 10 — седалищный нерв.

I пальца со стороны его латерального края) и медиальный нерв II пальца (иннервирует кожу тыльной поверхности пальца со стороны его медиального края);

4) *большеберцовый нерв, n. tibialis* ( $L_{IV}$ ,  $L_V$ ,  $S_I$ ,  $S_{II}$ ,  $S_{III}$ ) (см. рис. 1034, 1045—1049), являясь по своему направлению продолжением седалищного нерва, значительно толще его второй ветви — общего малоберцового нерва. Начинается у вершины подколенной ямки, следует почти отвесно к ее дистальному углу, располагаясь в области ямки непосредственно под фасцией, между нею и подколенным сосудами.

Далее, следя между обеими головками икроножной мышцы, ложится на заднюю поверхность подколенной мышцы и в сопровождении задних



**1050. Распределение ветвей седалищного нерва (большеберцового и общего малоберцового нервов) в мышцах голени (фотография. Препаратор С. Островского).**

I — икроножная мышца; II — камбаловидная мышца; III — длинный сгибатель пальцев; IV — задняя большеберцовая мышца; V — длинный сгибатель большого пальца стопы; VI — короткая малоберцовая мышца; VII — длинный разгибатель большого пальца стопы; VIII — длинный разгибатель пальцев; IX — передняя большеберцовая мышца; X — длинная малоберцовая мышца; XI — полошвенная мышца; 1 — седалищный нерв; 2 — медиальные кожные ветви голени; 3 — большеберцовый нерв; 4 — латеральный кожный нерв; 5 — икроножный нерв; 6, 8 — нервы камбаловидной мышцы; 7 — мышечная ветвь; 9 — большеберцовый нерв; 10 — общий малоберцовый нерв; 11 — нерв короткой головки двуглавой мышцы бедра.

большеберцовых сосудов проходит под сухожильной дугой камбаловидной мышцы, будучи здесь прикрыт этой мышцей. Направляясь далее вниз под глубоким листком фасции голени между латеральным краем длинного сгибателя пальцев и медиальным краем длинного сгибателя большого пальца стопы, большеберцовый нерв достигает задней поверхности медиальной лодыжки, где располагается на середине расстояния между нею и пяткочным сухожилием. Пройдя под удерживателем сгибателей, нерв делится на две свои концевые ветви: медиальный подошвенный нерв и латеральный подошвенный нерв.


Ветви большеберцового нерва:

а) *мышечные ветви, rr. musculares*, направляются к следующим мыш-


цам: к головкам икроножной мышцы (ветвь медиальной головки более толстая, чем латеральной); к камбаловидной мышце (передняя и задняя ветви); к подколенной мышце, к подошвенной мышце.

Ветви, подходящие к подколенной мышце, посыпают ветви к капсуле коленного сустава и надкостнице большеберцовой кости;


б) *межкостный нерв голени, n. interosseus cruris* (см. рис. 1046), — довольно длинный нерв, от которого до входления его в толщу межкостной перепонки направляются ветви к стенке большеберцовых сосудов, а после выхода из межкостной перепонки — к надкостнице костей голени, дистальному их соединению и к капсуле голеностопного сустава, к задней большеберцовой мышце, длинному



1051. Нервы стопы, правой.  
(Подошвенная поверхность.)  
(Кожа и частично подкожная  
основа удалены.)



**1052. Нервы стопы, правой.**  
**(Подошвенная поверхность.)**  
**(Мышца, отводящая большой палец стопы, и короткий сгибатель пальцев перерезаны и частично удалены.)**



1053. Кожные нервы стопы, правой. (Тыльная поверхность.)  
(Кожа и подкожная клетчатка удалены; нервы отпрепарированы.)

сгибателю большого пальца стопы, длинному сгибателю пальцев;

в) *медиальный кожный нерв икры, n. cutaneus surae medialis* (см. рис. 1056), отходит в области подколенной ямки от задней поверхности большеберцового нерва, следует под фасцией в сопровождении идущей медиальнее малой подкожной вены между головками икроножной мышцы. Достигнув середины голени, приблизительно на уровне начала пятого сухожилия, иногда выше, прободает фасцию, после чего соединяется с *малоберцовой соединительной ветвью, r. communicans peroneus [fibularis]* (от латерального кожного нерва икры), в один ствол — *икроножный нерв, n. suralis* (см. рис. 1034, 1050). Последний направляется вдоль латерального края пятого сухожилия в сопровождении медиально от него расположенной малой подкожной вены и достигает заднего края латеральной лодыжки, где посыпает в кожу этой области *латеральные пяточные ветви, rr. calcanei laterales*, а также ветви к капсуле голеностопного сустава.

Далее икроножный нерв огибает лодыжку и переходит на латеральную поверхность стопы в виде *латерального тыльного кожного нерва, n. cutaneus dorsalis lateralis*, который разветвляется в коже тыла и латерального края стопы и тыльной поверхности V пальца и отдает соединительную ветвь к промежуточному тыльному кожному нерву стопы;

г) *медиальные пяточные ветви, rr. calcanei mediales* (см. рис. 1051, 1052), проникают через фасцию в области лодыжковой борозды, иногда в виде одного нерва, и разветвляются в коже пятки и медиального края подошвы;

д) *медиальный подошвенный нерв, n. plantaris medialis* (см. рис. 1034, 1047, 1051, 1052, 1056), — одна из двух концевых ветвей большеберцового нерва. Начальные отделы нерва располагаются медиальнее задней большеберцовой артерии, в канале между поверхностным и глубоким листками удерживателя сгибателей. Пройдя канал, нерв направляется в сопровождении медиальной подошвенной артерии под отводящую мышцу большого пальца стопы. Следуя далее вперед между этой мышцей и коротким сгибателем пальцев, он делится на две части — медиальную и латеральную.

Медиальный подошвенный нерв отдает несколько кожных ветвей к коже медиальной поверхности подошвы:

*мышечные ветви* к *m. abductor hallucis, m. flexor digitorum brevis, m. flexor hallucis brevis* и *общие подошвенные пальцевые нервы I, II, III, nn. digitales plantares communes I, II, III* (см. рис. 1051, 1052). Последние идут в сопровождении плюсневых подошвенных артерий, посыпают мышечные ветви к первой и второй (иногда к третьей) червеобразным мышцам и на уровне дистального конца межкостных промежутков прободают подошвенный апоневроз. Отдав здесь тонкие ветви к коже подошвы, они разделяются на *собственные подошвенные пальцевые нервы, nn. digitales plantares proprii*, разветвляющиеся в коже обращенных одна к другой сторон подошвенной поверхности I и II, II и III, III и IV пальцев, и переходят на тыльную поверхность их дистальных фаланг;

е) *латеральный подошвенный нерв, n. plantaris lateralis* (см. рис. 1047, 1051, 1052, 1056), — вторая концевая ветвь большеберцового нерва, значительно тоньше медиального подошвенного нерва. Проходя на подошве в сопровождении латеральной подошвенной артерии между квадратной подошвенной мышцей и коротким сгибателем пальцев, ложится ближе к латеральному краю стопы между коротким сгибателем мизинца и мышцей, отводящей мизинец, где делится на свои концевые ветви: поверхностную и глубокую.

Ветви латерального подошвенного нерва:

*мышечные ветви* отходят от основного ствола до деления его на концевые ветви и направляются к квадратной мышце подошвы и к мышце, отводящей мизинец;

*поверхностная ветвь, r. superficialis*, отдав несколько ветвей к коже подошвы, разделяется на медиальную и латеральную ветви. Медиальная ветвь — *общий подошвенный пальцевой нерв, n. digitalis plantaris communis* (IV и V пальцев), который в сопровождении плюсневой подошвенной артерии проходит в четвертом межкостном промежутке. Подойдя к плюснефаланговому сочленению и послав соединительную ветвь к медиальному подошвенному нерву, он делится на два *собственных подошвенных пальцевых нерва, nn. digitales plantares proprii*. По-

следние разветвляются в коже обращенных одна к другой сторон IV и V пальцев и переходят на тыльную поверхность их ногтевых фаланг. Латеральная ветвь — *собственный подошвенный нерв V пальца*, который разветвляется в коже подошвенной поверхности и латеральной стороны V пальца. Этот нерв нередко отдает мышечные ветви к межкостным мышцам четвертого межплюсневого промежутка и к короткому сгибателю мизинца;


*глубокая ветвь, r. profundus*, в сопровождении подошвенной артерии дуги располагается между слоем межкостных мышц с одной стороны и длинным сгибателем пальцев и косой головкой приводящей мышцы большого пальца стопы — с другой. Она отдает мышечные ветви к этим мышцам, к червеобразным мышцам (II, III, IV) и короткому сгибателю большого пальца стопы (к ее латеральной головке).

Кроме перечисленных нервов, поверхностная и глубокая ветви латерального подошвенного нерва посыпают нервы к капсулам суставов плюсны и к надкостнице плюсневых костей и фаланг.


8. *Половой нерв, n. pudendus* ( $S_1-S_{IV}$ ) (см. рис. 1035, 1038—1041), представляет собой каудальный отдел крестцового сплетения и связан с ним несколькими ветвями. Нерв лежит под нижним краем грушевидной мышцы на передней поверхности копчиковой мышцы; по его передней поверхности проходят в продольном направлении латеральные крестцовые сосуды.

Половой нерв связан также с копчиковым сплетением и с вегетативным нижним подчревным сплетением, благодаря чему своими ветвями принимает участие в иннервации внутренних органов полости малого таза (прямая кишка, мочевой пузырь, влагалище и др.), наружных половых органов, а также мышц диафрагмы таза: мышцы, поднимающей задний проход, и копчиковой мышцы — и кожи области промежности.

Выходит половой нерв из полости малого таза в сопровождении медиально лежащих от него внутренних половых сосудов, через щель под грушевидной мышцей. Далее он ложится на заднюю поверхность седалищной ости, огибает ее и, пройдя через малое седалищное отверстие, возвращается в полость таза, располагаясь



**1054. Области распространения кожных нервов нижней конечности, правой (полусхематично).**  
(Передняя поверхность.)



1055. Области распространения кожных нервов нижней конечности, правой (полусхематично). (Задняя поверхность.)

ниже мышцы, поднимающей задний проход, в седалищно-заднепроходной ямке, где он идет по ее латеральной стенке, в толще фасции внутренней запирательной мышцы. В седалищно-заднепроходной ямке половой нерв делится на свои ветви:


1) *нижние прямокишечные нервы, nn. rectales inferiores*, располагаются наиболее медиально, следуют к промежностной части прямой кишки, наружному сфинктеру заднего прохода и к коже области заднепроходного отверстия;

2) *промежностные нервы, nn. perineales*, следуют в сопровождении сосудов промежности и являются наиболее поверхностными из концевых ветвей полового нерва. От промежностных нервов отходят мышечные ветви к передним отделам наружного сфинктера заднего прохода, к поверхностной поперечной мышце промежности, луковично-губчатой мышце, седалищно-пещеристой мышце и *задние мошоночные нервы, nn. scrotales posteriores* (задние губные нервы, nn. labiales posteriores,— у женщин),—поверхностно лежащая группа ветвей.

Эти нервы направляются к коже области промежности и к коже задней поверхности мошонки (больших половых губ у женщин); соединяются с нижними прямокишечными нервами, а также с промежностными ветвями заднего кожного нерва бедра;

3) *дорсальный нерв полового члена (дорсальный нерв клитора у женщин), n. dorsalis penis (n. dorsalis clitoridis)*, является верхней ветвью полового нерва. Он следует в сопровождении артерии полового члена по внутренней поверхности нижней ветви седалищной и лобковой костей и, проходя через мочеполовую диафрагму, ложится вместе с дорсальной артерией полового члена на спинку полового члена (клитора у женщин), где разветвляется на свои концевые ветви в коже и в пещеристых телях полового члена, достигая его головки (у женщин достигает больших и малых половых губ).

На своем пути нерв посылает ветви к глубокой поперечной мышце промежности, сфинктеру мочеиспускательного канала и к нервному пещеристому сплетению полового члена (клитора).



#### Копчиковое сплетение

*Копчиковое сплетение, plexus coccygeus (S<sub>IV</sub>, S<sub>V</sub>, C<sub>O1</sub>, C<sub>O2</sub>)* (см. рис. 997, 1035, 1038), располагается на передней поверхности сухожильной части копчиковой мышцы и крестцово-осистой связки. Оно связано с половым нервом и с концевым отделом симпатического ствола. От копчикового сплетения отходят следующие нервы:

1. *Копчиковый нерв, n. coccygeus*, отдает ветви к копчиковой мышце, к мышце, поднимающей задний проход, кentralной крестцово-копчиковой мышце (непостоянно).

2. *Заднепроходно-копчиковые нервы, nn. apococcygei*,—несколько (3—5) тонких ветвей, следуют по передней поверхности копчиковой мышцы, между нею и мышцей, поднимающей задний проход, и у верхушки копчика, со стороны его латеральной поверхности, проникают в кожу, разветвляясь в области копчика до заднего прохода.

3. *Соединительная ветвь с непарным узлом симпатического ствола*.

#### 1056. Область распространения кожных нервов стопы, правой (полусхематично). (Подошвенная поверхность.)

# ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Симпатическая часть


209

Парасимпатическая часть

233

Интрамуральные нервные сплетения

241



**1057. Вегетативная [автономная] первая система (схема).**  
(Красным цветом обозначена симпатическая часть, синим — парасимпатическая часть.)

**Вегетативная [автономная] первая система, systema nervosum autonomicum** (рис. 1057), составляет часть нервной системы, осуществляющую иннервацию главным образом внутренностей, сердца и сосудов, т. е. органов, включающих в свой состав гладкую мышечную ткань и железистый эпителий. Она также участвует в иннервации поперечно-полосатой мускулатуры.

Различают центральный, или внутримозговой, отдел, входящий в состав головного и спинного мозга, и периферический, или вненмозговой, отдел автономной нервной системы.

На основании физиологических, фармакологических и отчасти морфологических признаков вегетативную [автономную] нервную систему подразделяют на две части: *симпатическую часть, pars sympathica* (рис. 1058), и *парасимпатическую часть, pars parasympathica* (рис. 1059).

Кроме того, в автономной нервной системе ряд авторов выделяют нервную систему внутренних органов (в стенке желудочно-кишечного тракта), которая непосредственно связана как с симпатической, так и с парасимпатической частью.

### СИМПАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ВЕГЕТАТИВНОЙ [АВТОНОМНОЙ] НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Центральный отдел симпатической части вегетативной нервной системы состоит из многочисленных *многополярных клеток, neurocytes multipolares*, располагающихся в латеральном промежуточном (сером) веществе спинного мозга на протяжении от 8-го шейного до 2—3-го поясничных сегментов (см. рис. 1057, 1059) и образующих в совокупности симпатический центр.

Периферический отдел симпатической части вегетативной [автономной] нервной системы состоит из правого и левого симпатических стволов и нервов, отходящих от этих стволов, а также из образуемых нервами и узлами сплетений, залегающих вне или внутри органов.

Каждый *симпатический ствол, truncus sympathicus* (рис. 1060, 1061; см. рис. 1031, 1058), образован *узлами симпатического ствола, ganglia trunci sympathici*, которые связаны между собой *межузловыми ветвями, rr. interganglionares*.

Правый и левый симпатические стволы лежат по соответствующим сторонам позвоночного столба от уровня основания черепа до вершины копчика, где, заканчиваясь, собираются *непарным узлом, ganglion impar*.

Узлы симпатического ствола представляют собой совокупность различного количества нервных клеток (*neurocytes gangliae autonomicae*), имеют различную величину и преимущественно веретенообразную форму. На протяжении симпатического ствола встречаются одиночные внутристволовые нервные клетки или небольшие *промежуточные узлы, ganglia intermedia*, чаще всего на шейных и поясничных соединительных ветвях. Число узлов симпатического ствола, за исключением шейного отдела, в основном соответствует числу спинномозговых нервов.

Различают 3 *шейных узла, ganglia cervicalia*, 10—12 *грудных узлов, ganglia thoracica*, 4—5 *поясничных узлов, ganglia lumbalia*, 4 *крестцовых узла, ganglia sacralia*, и один *непарный узел, ganglion impar*. Последний залегает на передней поверхности копчика, объединяя оба симпатических ствола.

От каждого узла симпатического ствола отходит два рода ветвей: соединительные ветви и ветви, которые идут к вегетативным (автономным) сплетениям (см. рис. 1057, 1060).

В свою очередь различают два вида соединительных ветвей: белые соединительные ветви и серые соединительные ветви.

Каждая *белая соединительная ветвь, r. communicans albus*, представляет собой совокупность *предузловых нервных волокон, neurofibrae preganglionares*, связывающих спинной мозг с симпатическим узлом. Она содержит миелиновые нервные волокна (отростки нервных клеток боковых рогов спинного мозга), которые проходят через передний корешок к клеткам узла симпатического ствола или, пройдя его, к клеткам узла вегетативного сплетения. Эти волокна, поскольку они заканчиваются на клетках узлов, получили название *предузловых нервных волокон*.

Боковые рога располагаются лишь в пределах от 8-го шейного до 2—3-го поясничных сегментов спинного мозга. Поэтому предузловые волокна для тех узлов симпатических стволов, которые располагаются выше и ниже уровня указанных сегментов, т. е. для

области шеи, нижних отделов поясничной и всей крестцовой области, следуют в межузловых ветвях симпатического ствола.

Каждая *серая соединительная ветвь, r. communicans griseus*, является ветвью, соединяющей симпатический ствол со спинномозговым нервом. Она содержит *безмиелиновые нервные волокна, neurofibrae nonmyelinatae* (отростки клеток узла симпатического ствола), которые направляются в спинномозговой нерв и входят в состав его волокон, достигая желез и кровеносных сосудов сомы.

Эти волокна, поскольку они начинаются от клеток узлов, носят название *послеузловых нервных волокон, neurofibrae postganglionares*.

Ветви, идущие к вегетативным сплетениям, различны у узлов шейного, грудного, поясничного и крестцового отделов симпатического ствола.

### ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ СИМПАТИЧЕСКОГО СТВОЛА

Шейный отдел симпатического ствола (рис. 1062—1066; см. рис. 1057, 1058) залегает впереди поперечных отростков шейных позвонков на поверхности длинной мышцы головы и длинной мышцы шеи, медиально от передних бугорков позвонков и позади сосудисто-нервного пучка шеи, будучи заключен в предпозвоночной пластинке фасции шеи. Выше деления сонной артерии симпатический ствол располагается позади внутренней сонной артерии.

На своем пути шейный отдел симпатического ствола перекрещивается с нижней щитовидной артерией и с подключичной артерией, образуя вокруг последней путем раздвоения хорошо выраженную *подключичную петлю, ansa subclavia*.

В шейном отделе симпатического ствола насчитывается три шейных узла, которые образовались в результате слияния восьми сегментарных симпатических узлов. Это *верхний, средний и нижний шейные узлы, ganglia cervicalia superius, medium et inferius*, причем последний, как правило, сливается с первым грудным узлом, образуя *шейно-грудной (звездчатый) узел, ganglion cervicothoracicum (stellatum)*.

Иногда встречаются промежуточные узлы, и общее число шейных узлов симпатического ствола может достигать пяти-шести.

### Верхний шейный узел

**Верхний шейный узел**, *ganglion cervicalis* (см. рис. 1062, 1063, 1065, 1066), — наиболее крупный из всех шейных узлов, до 2 см длиной и до 0,5 см шириной, веретенообразный, располагается на уровне тел II—III шейных позвонков, достигая иногда вверху I, а внизу IV шейного звонка.

Кзади от узла залегает длинная мышца головы, впереди — ствол внутренней сонной артерии, латерально — ствол блуждающего нерва. От узла отходят соединительные ветви к ряду нервов и узлов, а также нервы к органам и сосудам.

Большая часть этих нервов и узлов входит в состав различных нервных сплетений.

Ветви верхнего шейного узла:

1. **Яремный нерв**, *n. jugularis*, — короткая ветвь, отходит от верхнего полюса верхнего шейного узла и, залегая в наружной оболочке внутренней яремной вены, направляется к яремному отверстию. Здесь яремный нерв отходит от вены и дает две ветви:


1) к верхнему узлу блуждающего нерва;

2) к нижнему узлу языко-глоточного нерва.

2. **Внутренний сонный нерв**, *n. caroticus internus*, берет начало от верхнего полюса верхнего шейного узла, нередко вместе с яремным нервом, направляется вверх, ложится несколько кзади от внутренней сонной артерии, затем образует вокруг нее в сонном канале и на всем дальнейшем ее протяжении широкопетлистую сеть — *внутреннее сонное сплетение*, *plexus caroticus internus*. Это сплетение переходит на разветвления внутренней сонной артерии, образует ряд сплетений и отдает следующие ветви:

1) **сонно-барабанные нервы**, *nn. caroticotympanici*, которые проходят через одноименные каналы и, соединившись с барабанным нервом, входят в барабанное сплетение (см. «Языко-глоточный нерв»); последнее иннервирует слизистую оболочку барабанной полости и слуховой трубы;

2) **глубокий каменистый нерв**, *n. petrosus profundus*, отходит от внутреннего сонного сплетения у выхода внутренней сонной артерии из сонного канала, соединяется с большим каменистым нервом, образуя вместе с ним нерв крыловидного канала, и входит



### 1058. Симпатическая часть вегетативной нервной системы (схема).

1 — truncus sympathicus; 2 — ganglion cervicothoracicum (stellatum); 3 — ganglion cervicale superius; 4 — a. carotis interna; 5 — ganglion cervicalis (superior cervical ganglion); 6 — plexus celiacus; 7 — plexus mesentericus superior; 8 — plexus mesentericus inferior.

в крылонебный узел в качестве его симпатического корешка;

3) **пещеристое сплетение** (часть внутреннего сонного сплетения, соответствующая пещеристой части внутренней сонной артерии) — относительно густое сплетение, образуется тонкими нервами и посыпает ветви:

а) **соединительные ветви** к глазодвигательному, блоковому, отводящему нервам, к тройничному узлу и первой ветви тройничного нерва;

б) **симпатический корешок к ресничному узлу**, *radix sympathicus ad ganglion oculomotorium*

*glion ciliare*. Корешок тянется в виде тонких нервов через верхнюю глазничную щель в полость глазницы, подходит к заднему краю ресничного узла. Составляющие его волокна присоединяются к коротким ресничным нервам, направляются к мышце, расширяющей зрачок, и к стенкам сосудов глаза;

- в) к глазничной мышце, к верхней и нижней мышцам хрящевого века;
- г) к слезной железе;
- д) к гипофизу;
- е) к ряду артерий: глазной, передней и средней мозговым, передней ворсинчатой, образуя нервные сплетения, сопровождающие эти сосуды и их разветвления. Сплетение глазной артерии посыпает нерв, сопровождающий центральную артерию сетчатки.

3. Наружные сонные нервы, *nn. carotici externi*, всего 2—3, иногда до 6 нервов, на уровне шилоподъязычной мышцы направляются к стенке наружной сонной артерии. Здесь они разветвляются на более мелкие ветви, которые, окружив артерию, образуют наружное сонное сплетение, *plexus caroticus externus* (см. рис. 991). В нем различают восходящую и нисходящую части.


Восходящая часть наружного сонного сплетения, поднимаясь по стенке наружной сонной артерии, распределяется по отходящим от нее ветвям, участвуя в образовании сплетений, окружающих одноименные сосуды: 1) верхнего щитовидного, 2) язычного, 3) сплетения по ходу лицевой артерии, от которого отходит в виде 1—2 нервов симпатическая ветвь к поднижнечелюстному узлу, *r. sympathicus ad ganglion submandibulare*, 4) затылочного, 5) заднего ушного, 6) поверхностного височного, 7) верхнечелюстного, 8) менингеального.

Нисходящая часть наружного сонного сплетения спускается по стенке наружной сонной артерии, достигает общей сонной артерии, образуя здесь общее сонное сплетение, *plexus caroticus communis*, сопровождающее артерию на всем ее протяжении.


В месте деления общей сонной артерии к ее нервному сплетению присоединяются тонкие ветви от языко-глоточного и блуждающего нервов, которые вместе со сплетением общей сонной артерии участвуют в иннервации расположенного здесь сонного гломуса (см. т. III, «Эндокринные железы»).

#### 1059. Парасимпатическая часть вегетативной нервной системы (схема).

III — *n. oculomotorius*; VII — *n. facialis*; IX — *n. glossopharyngeus*; X — *n. vagus*; 1 — *ganglion ciliare*; 2 — *ganglion pterygopalatinum*; 3 — *ganglion oticum*; 4 — *ganglion submandibulare*; 5 — *ganglion sublinguale*; 6 — *nuclei parasympathici sacrales*; 7 — *ganglia pelvica*.



4. Верхний шейный сердечный нерв, *n. cardiacus cervicalis superior* (см. рис. 1054, 1062—1066), отходит 2—3 ветвями от верхнего шейного симпатического узла, чаще всего у его нижнего полюса, иногда одна-две его ветви отходят ниже узла. Располагаясь медиальнее симпатического ствола, впереди длинной мышцы шеи и предпозвоночной фасции, основной ствол верхнего шейного сердечного нерва следует вниз, имея впереди себя общую сонную артерию и пересекая нижнюю щитовидную артерию (чаще



спереди). На своем пути верхний шейный сердечный нерв может образовывать соединения с верхним гортанным, возвратным и средним сердечным нервами. Пройдя в полость груди, в верхнее, а затем среднее средостение, правый верхний шейный сердечный нерв располагается впереди плечеголовного ствола, левый — впереди общей сонной артерии.

Оба нерва переходят на переднюю поверхность аорты и легочного ствола и входят в состав сердечного сплетения (см. «Нервы сердца»).

Верхний шейный сердечный нерв посылает ветви к стенкам глотки и трахеи, а также к щитовидной железе; ряд ветвей направляется к общей сонной и нижней щитовидной артериям. В стволе верхнего сердечного нерва имеются скопления нервных клеток или отдельные нервные клетки.

5. Гортанно-глоточные ветви, rr.

*laryngopharyngei* (см. рис. 992), направляются к гортани и к задней стенке глотки вместе с глоточными ветвями языковоглоточного и блуждающего нервов и участвуют вместе с ними в образовании глоточного сплетения, *plexus pharyngeus*.

6. Соединительные ветви, отходящие от верхнего шейного узла, непостоянны:

- 1) к первому-четвертому шейному спинномозговому нерву;
- 2) к подъязычному нерву;
- 3) к нижнему узлу блуждающего нерва;
- 4) к диафрагмальному нерву (представляют собой серые соединительные ветви).

#### Средний шейный узел

Средний шейный узел, *ganglion cervicale medium* (см. рис. 1058, 1063—1066), овальный, значительно меньше верхнего узла, залегает впереди длин-

ной мышцы шеи на уровне поперечного отростка V или VI шейного позвонка, прилегая к нижней щитовидной артерии, чаще спереди.

Тотчас под средним шейным узлом, приблизительно на уровне поперечного отростка VI шейного позвонка, располагается позвоночный узел, *ganglion vertebrale* (непостоянный), имея позади себя позвоночную артерию, а впереди — позвоночную вену.

Ветви среднего шейного узла:

1. Средний шейный сердечный нерв, *n. cardiacus cervicalis medius* (см. рис. 1057, 1061—1064), отходит несколькими ветвями либо от среднего шейного узла, либо непосредственно от симпатического ствола, следует между последним и верхним сердечным нервом вначале позади общей сонной артерии, а затем у латерального ее края и, пройдя впереди или позади подключичной артерии, входит

**1060. Ход волокон спинномозговых нервов и их связь с симпатическим стволом (схема).**

**1061. Симпатические стволы, блуждающие нервы и их ветви; вид спереди (фотография). Препаратор В. Андриенса.**  
(*Органы шеи, грудной и брюшной полостей удалены.*)


1—верхний гортанный нерв; 2—левый блуждающий нерв; 3—верхний шейный узел; 4—верхний шейный сердечный узел; 5—средний шейный узел; 6—средний шейный сердечный нерв; 7—шейно-грудной (звездчатый) узел; 8—нижний шейный сердечный нерв; 9—грудные сердечные ветви (легочно-сердечный нерв); 10—пищеводное сплетение; 11—симпатический ствол; 12—задний блуждающий ствол; 13—левый чревный (внутренносточный) узел; 14—аортальное сплетение; 15—нижний брыжеечный узел; 16—верхнее подчревное сплетение; 17—подчревные нервы; 18—нижнее подчревное (газовое) сплетение; 19—верхний брыжеечный узел; 20—малый чревный (внутренносточный) нерв; 21—большой чревный (внутренносточный) нерв; 22—ветви, соединяющая диафрагмальный узел с чревным узлом; 23—диафрагмальный узел; 24—диафрагмальный нерв; 25—верхние шейные сердечные ветви; 26—ветви, соединяющие диафрагмальный нерв с ветвями плечевого сплетения; 27—правый блуждающий нерв.

в грудную полость; при этом правый располагается в месте деления плечеголовного ствола, левый—у латерального края левой общей сонной артерии, между нею и подключичной артерией. В грудной полости оба средних шейных сердечных нерва участвуют в образовании сердечного сплетения (см. «Нервы сердца»).

По своему ходу средний шейный сердечный нерв посылает ветви к общей сонной артерии и к нижней щитовидной артерии, участвуя в образовании соответствующих сплетений.

Иногда от него отходят тонкие щитовидные ветви, входящие в вещество щитовидной железы. Они иннервируют также и паращитовидные железы.

Средний шейный сердечный нерв имеет соединительные ветви с блуждающим и возвратным нервами, а также ряд соединений с верхним



шейным сердечным нервом, образуя с ним сплетение.

2. Соединительные ветви, отходящие от среднего шейного узла, непостоянны. Среди них различают: 1) соединительные ветви к четвертому-шестому шейным спинномозговым нервам и к диафрагмальному нерву (непостоянны); 2) соединительные ветви к сплетениям, окружающим общую сонную и нижнюю щитовидную артерии (очень тонкие, всего 2—3), причем от сплетения, сопровождающего нижнюю щитовидную артерию, отходят нервы, входящие в паренхиму щитовидной и паращитовидных желез; 3) соединительные ветви к подключичной петле.

#### Шейно-грудной (звездчатый) узел

**Шейно-грудной (звездчатый) узел, *ganglion cervicothoracicum (stellatum)*** (рис. 1067—1069; см. рис. 1057, 1058, 1062—1064), меньше верхнего узла, но больше среднего и позвоночного, неправильной четырехугольной формы. Располагается на уровне поперечного отростка VII шейного позвонка и головки I ребра.

Ветви шейно-грудного узла:


1. Нижний шейный сердечный нерв, *n. cardiacus cervicalis inferior* (см. рис. 1057, 1062—1066, 1068), отходя несколькими ветвями от шейно-грудного узла симпатического ствола, располагается позади подключичной артерии и, залегая справа позади плечеголовного ствола, а слева позади аорты, направляется к сердечному сплетению (см. «Нервы сердца»).

На своем пути нижний сердечный нерв дает соединительные ветви к среднему сердечному нерву.


2. Подключичная петля, *ansa subclavia*,—1—2 нерва, отходящие от шейно-грудного узла и огибающие подключичную артерию сзади, соединяются с ветвями среднего шейного узла (см. рис. 1062—1067).

3. Позвоночный нерв, *n. vertebralis*, в большинстве случаев отходит от шейно-грудного узла, реже от позвоночного узла. Он представлен двумя тонкими стволами, сопровождающими позвоночную артерию; они образуют вокруг указанного сосуда *позвоночное сплетение, plexus vertebralis*.


4. Подключичное сплетение, *plexus subclavius*, образуют 2—3 нерва от шейно-грудного узла, сопровождающие подключичную артерию.



1062. Нервы сердца; вид справа  
(препаратор В. П. Воробьева).  
(Поверхностные мышцы шеи  
и внутренняя яремная вена  
удалены.)




**1063. Нервы сердца; вид слева  
(препаратор В. П. Воробьева).**  
*(Поверхностные мышцы шеи,  
внутренняя яремная вена и часть  
общей сонной артерии удалены.)*




1064. Нервы сердца; вид слева  
(препарат В. Андриеша).

1 — верхний шейный узел; 2 — верхний шейный сердечный нерв; 3 — средний шейный узел; 4 — средний шейный сердечный нерв; 5 — верхняя шейная сердечная ветвь; 6 — шейно-грудной (звездчатый) узел; 7 — нижний шейный сердечный

нерв; 8 — блуждающий нерв; 9 — подключичная петля; 10 — грудные узлы; 11 — грудные сердечные нервы; 12 — грудная сердечная ветвь; 13 — связь нервного сплетения легочного ствола с нервными сплетениями кровеносных сосудов и стенок сердца.



1065. Связи узлов блуждающего и языкоглоточного нервов с симпатическим стволом и сплетениями сонных артерий; вид справа (по препаратам Г. Олейника).



5. Соединительные ветви, отходящие от шейно-грудного узла, непостоянны:

1) серые соединительные ветви к шестому-восьмому шейным спинномозговым нервам содержат послезузловые волокна, которые в составе периферических нервов плечевого сплетения разветвляются в верхней конечности, иннервируя стенки сосудов, железы кожи и мышцы волос;

2) соединительные ветви к диафрагмальному и блуждающему нервам, причем часть волокон, идущих к последнему, направляются к возвратному гортанному нерву;

3) ветви к нижнему щитовидному сплетению, сопровождающему одноименную артерию;

4) ветви к сплетению, которое сопровождает внутреннюю грудную артерию.

#### Грудной отдел симпатического ствола

Грудной отдел симпатического ствола (рис. 1070, 1071; см. рис. 1057, 1061,

1067—1069) залегает по обеим сторонам позвоночного столба, от I до XII грудного позвонка, приблизительно по линии головок ребер; пересекает межреберные сосуды спереди, будучи прикрыт листком внутргрудной фасции и париетальной плеврой.


Медиально от правого симпатического ствола проходит непарная вена, медиально от левого — полунепарная вена.

Грудной отдел симпатического ствола включает в себя 10—12 несколько упрощенной, неправильной треугольной формы узлов, из которых верхние крупнее нижних; наиболее крупным является первый грудной узел.

Межузловые ветви состоят из 1—3 пучков разной длины и толщины. Из латерального края каждого из узлов выходят серые соединительные ветви к спинномозговым, в данном случае межреберным, нервам, а от медиальной стороны отходят ветви на периферию — к органам, сплетениям и т. д. Серые соединительные ветви могут присоединяться не только

**1066. Связи симпатического ствола с лицевым, языкоглоточным, блуждающим и другими нервами; вид сзади.**

**1067. Нервы и сплетения органов грудной полости; вид справа.**  
*(Париетальный листок плевры и внутргрудная фасция удалены; печень и частично диафрагма удалены; правое легкое оттянуто влево.)*



к межреберному нерву, лежащему на уровне данного узла, но и к выше- и нижележащему нерву.

Первый грудной узел (см. рис. 1057, 1058, 1061—1068) располагается позади подключичной артерии, на уровне головки I ребра. По форме он иногда бывает звездчатым, иногда неправильной треугольной формы. Как было отмечено, в большинстве случаев он сливается с нижним шейным узлом, образуя шейно-грудной (звездчатый) узел, или, реже, со вторым грудным симпатическим узлом.


#### Ветви грудных узлов:

1. *Грудные сердечные нервы, nn. cardiaci thoracici* (см. рис. 1064), отходят главным образом от первого грудного узла (иногда от второго, третьего и даже четвертого и пятого грудных узлов). На пути к сердцу между ними и нижним шейным сердечным нервом, а также между ними и сердечными ветвями блуждающего нерва имеются соединительные ветви (см. «Нервы сердца»).

2. *Соединительные ветви* отходят почти от каждого грудного узла симпатического ствола. Среди них различают: 1) соединительные ветви с блуждающим нервом; 2) соединительные ветви с возвратным гортанным нервом; 3) тонкие ветви, отходящие от медиального края верхних 5—6 узлов, принимающие участие в иннервации сосудов и внутренностей, залегающих в грудной полости.

Направляясь медиально, ряд ветвей достигает стенок межреберных сосудов, непарной вены (справа) и полунепарной вены (слева), а также грудного протока. Другие ветви входят в состав *грудного аортального сплетения, plexus aorticus thoracicus*, которое в начальных отделах связано с *сердечным сплетением, plexus cardiacus*, внизу — с *чревным сплетением, plexus celiacus*, и его производными; ряд ветвей вступает в сплетения внутренних органов: пищеводные ветви — в *пищеводное сплетение, plexus esophageus*, легочные ветви, rr. pulmonales, — в *легочное сплетение, plexus pulmonalis*.


Все указанные ветви, расположенные медиальнее симпатического ствола, по своему ходу соединяются между собой различной длины и толщины тонкими нервами с включенными в них разной величины нервными узлами, соединенными в свою очередь продольно идущими нервами, тем са-



#### 1068. Нервы заднего средостения; вид справа (фотография. Препаратор К. Березовского).

1 — соединительные ветви между симпатическим стволом и блуждающим нервом; 2 — правый блуждающий нерв; 3 — плечеголовная вена; 4 — легочные ветви; 5 — правое легкое; 6 — бронхиальные ветви; 7 — пищевод; 8 — нервные ветви к перикарду; 9 — пищеводное сплетение; 10 — диафрагмальный нерв; 11 — задний ствол блуждающих нервов; 12 — диафрагма; 13 — малый внутренний нерв; 14 — большой внутренний нерв; 15 — ветви симпатического ствола к сплетению грудного протока; 16 — грудная аорта; 17 — ветви первого сплетения грудного протока; 18 — грудной проток;


19 — ветви симпатического ствола к сплетению непарной вены; 20 — непарная вена; 21 — соединительные ветви; 22 — соединительные ветви к пищеводному сплетению; 23 — коллатеральный ствол; 24 — нижний сердечный нерв; 25 — шейно-грудной (звездчатый) узел; 26 — подключичная петля; 27 — средний шейный узел симпатического ствола.



**1069. Нервы заднего средостения; вид слева (фотография. Препаратор К. Березовского).**

1 — левый шейно-грудной (звездчатый) узел;  
2 — ветви от шейно-грудного (звездчатого) узла;  
3 — грудной проток; 4 — нервный узел; 5,  
18 — пищевод; 6 — добавочная полунепарная  
вена; 7 — соединительные ветви четвертого  
грудного симпатического узла; 8 — пятый грудной  
симпатический узел; 9 — соединительные ветви  
шестого грудного симпатического узла;  
10 — первые ветви к аортальному сплетению;  
11 — ветви блуждающих нервов к пищеводному  
сплетению; 12 — задний ствол блуждающих  
нервов; 13 — ветви от большого внутренностного  
нерва к аортальному сплетению; 14 — большой

внутренностный нерв; 15 — малый  
внутренностный нерв; 16 — диафрагма; 17 —  
грудная аорта; 19 — передний ствол блуждающих  
нервов; 20 — пищеводная ветвь левого  
блуждающего нерва; 21 — левое легкое;  
22 — ветви аортального сплетения,  
соединяющиеся с пищеводным сплетением;  
23 — дуга аорты; 24 — левый бронх; 25 —  
бронхиальные ветви; 26 — левый блуждающий  
нерв; 27 — левая подключичная артерия;  
28 — подключичная петля.



**1070. Нервы области заднего средостения; вид сзади (фотография. Препаратор К. Березовского). (Позвоночный столб, ребра и сосуды удалены.)**

1 — правый средний шейный узел; 2 — нижний констриктор глотки; 3 — позвоночный узел; 4 — правый шейно-грудной (звездчатый) узел; 5 — нижний шейный сердечный нерв; 6 — пищеводные ветви правого возвратного нерва;

7 — пищевод; 8 — коллатеральный ствол; 9 — аортальное сплетение; 10 — пятый грудной узел правого симпатического ствола; 11 — ветвь к пищеводному сплетению правого блуждающего нерва; 12 — соединительные ветви аортального сплетения; 13 — задний блуждающий ствол; 14 — соединительные ветви девятого грудного узла правого симпатического ствола; 15 — правый большой внутренностный нерв; 16 — диафрагма; 17 — пищеводное отверстие диафрагмы; 18 — левый большой внутренностный нерв; 19 — спинномозговой узел; 20 — ветвь к пищеводному сплетению левого блуждающего нерва; 21 —

соединительные ветви аортального сплетения; 22 — пятый грудной узел левого симпатического ствола; 23 — соединительные ветви четвертого грудного узла симпатического ствола; 24 — дуга аорты (отрезана); 25 — левый возвратный гортанный нерв; 26 — симпатические ветви к аортальному сплетению; 27 — левый шейно-грудной (звездчатый) узел; 28 — левый средний шейный узел симпатического ствола.


мым как бы образуя так называемый коллатеральный ствол (см. рис. 1071).

3. *Большой грудной внутренностный нерв, n. splanchnicus thoracicus major* (см. рис. 1057, 1067—1071), содержит преимущественно предузловые волокна и берет начало 3—5 ветвями от переднемедиальной поверхности пятого-девятого грудного узла. Располагаясь на боковой поверхности тел позвонков, все составляющие его ветви приблизительно на уровне IX—X позвонков соединяются в один ствол. Последний направляется медиально и вниз к поясничной части диафрагмы, пройдя через которую справа вместе с непарной веной, а слева — с полунепарной веной, проникает в брюшную полость, где входит в состав чревного сплетения, *plexus celiacus*. От него отходят нервы к грудному аортальному сплетению, к ветвям, образующим малый грудной внутренностный нерв, и к близлежащим участкам средостенной плевры. В большом внутренностном нерве заглаивают одиночные внутриствольные нервные клетки и довольно часто об разуется небольшой грудной внутренностный узел, *ganglion thoracicus splanchnicum*.

4. *Малый грудной внутренностный нерв, n. splanchnicus thoracicus minor* (см. рис. 1057, 1067—1069), также состоит в основном из предузловых волокон. Он берет начало 2—3 ветвями от десятого и одиннадцатого грудных узлов, следует чаще по тому же направлению, что и большой грудной внутренностный нерв и с ним (реже вместе с симпатическим стволом) проходит через диафрагму в брюшную полость, где делится на ряд ветвей. Меньшая часть ветвей входит в состав чревного сплетения, большая — в состав почечного сплетения — почечная ветвь, *r. renalis* (см. «Нервы почек»).

5. *Низший грудной внутренностный нерв, n. splanchnicus thoracicus imus*, — непостоянная ветвь, берет начало от двенадцатого (иногда от одиннадцатого) грудного узла, следует по ходу малого внутренностного нерва и входит в состав почечного сплетения.

Все три внутренностных грудных нерва входят в состав сплетений, которые принимают участие в иннервации органов брюшной полости: желудка, печени, поджелудочной железы, кишок, селезенки и почек, а также кровеносных и лимфатических сосудов полости груди и живота.



#### 1071. Нервы заднего средостения плода IX мес (фотография). Препарат Б. Смолкиной.

1 — верхний шейный симпатический узел; 2 — блуждающий нерв; 3 — подключичная артерия; 4 — диафрагмальный нерв; 5 — вилочковая железа; 6 — корень удаленного правого легкого; 7 — нервные ветви к перикарду; 8 — пищеводное сплетение; 9 — соединение между симпатическим стволом и ветвью блуждающего нерва; 10 — диафрагма; 11 — ветвь от блуждающего нерва к аортальному сплетению;

12 — малый внутренностный нерв; 13 — большой внутренностный нерв; 14 — ветви от большого внутренностного нерва к аорте; 15 — симпатические ветви к аорте; 16 — коллатеральный ствол и его ветви к аорте и корню легкого; 17 — ветви к дуге аорты; 18 — шейно-грудной узел; 19 — симпатический ствол; 20 — общая сонная артерия.

### Поясничный (брюшной) отдел симпатического ствола


Поясничный (брюшной) отдел симпатического ствола (рис. 1072, 1073; см. рис. 1057, 1061) проходит в брюшную полость между пучками поясничной части диафрагмы и, располагаясь справа позади нижней полой вены, слева — у латеральной поверхности аорты и с обеих сторон — впереди поясничных сосудов, ложится на переднебоковую поверхность тел I—V по-

**1072. Нервы и сплетения органов брюшной и тазовой полостей; вид спереди и немного справа (препаратор Р. Синельникова). (Частично удалены брюшина, желудок, тонкая и толстая кишка; поджелудочная железа и правый мочеточник удалены полностью.)**

ясничных позвонков. В пределах верхних 4 позвонков симпатический ствол располагается у внутреннего края большой поясничной мышцы, а в области V позвонка он залегает несколько латеральнее этого края.

На протяжении симпатических отделов между ними имеется несколько тонких поперечно идущих соединительных ветвей, которые связывают правый и левый симпатические стволы.

В поясничном отделе симпатического ствола имеется 3—5, чаще 4,



овально-удлиненной формы узлов, из которых наиболее крупным и сильно вытянутым является самый нижний. Он может переходить за линию мыса и своим нижним полюсом располагаться в пределах полости малого таза. Иногда в этом отделе симпатического ствола встречаются промежуточные узлы, расположенные на соединительных ветвях.


Ветви поясничной (брюшной) части симпатического ствола:


**1073. Нервы и сплетения органов тазовой полости; вид спереди (препаратор А. Журавлева).**  
*(Сигмовидная кишка и матка с придатками отведены влево; мочевой пузырь разрезан в сагиттальной плоскости.)*

1. Белые соединительные ветви, *rr. communicantes albi* (см. рис. 1060), подходят к медиальному краю двух-трех верхних поясничных узлов симпатического ствола.

2. Серые соединительные ветви, *rr. communicantes grisei* (см. рис. 1061), отойдя от латерального края каждого узла, прободают большую поясничную мышцу и следуют к поясничным нервам.

3. Поясничные внутренностные нервы, *nn. splanchnici lumbales*, образу-





**1074. Нервы и сплетения органов брюшной и тазовой полостей; вид спереди (препаратор Р. Синельникова).**

(Удалены брюшина, большая часть желудка, тонкой и толстой кишки, печени; желудок, двенадцатиперстная кишка и поджелудочная железа отведены влево; прямая кишка и мочевой пузырь оттянуты книзу.)

ются как предузловыми, так и послезузловыми волокнами (отростками клеток поясничных узлов симпатического ствола) и подходят к чревному сплетению и к другим сплетениям брюшной полости.

#### Брюшные вегетативные сплетения

В брюшной полости ветви грудного и поясничного отделов симпатического ствола, состоящие в большей степени из предузловых волокон, подходят к симпатическим узлам, лежащим впереди позвоночника, где предузловые волокна заканчиваются. Упомянутые ветви симпатического ствола, предпозвоночные узлы, соединяющие их нервы и ветви блуждающего нерва образуют вегетативные сплетения брюшной полости. Через эти сплетения к брюшным внутренностям проходят и симпатические, и парасимпатические, и чувствительные волокна, причем к органам подходят симпатические послезузловые, а парасимпатические — предузловые волокна.


**Чревное сплетение**, *plexus celiacus*, с заключенными в нем чревными узлами, *ganglia celiaca*, относится к самым крупным вегетативным сплетениям. Оно очень варьирует как по количеству подходящих к нему нервов и входящих в его состав вегетативных узлов, так и по форме своего мощного конгломерата (рис. 1074—1077; см. рис. 1067).

Чревное сплетение непарное, располагается по сторонам основания чревного ствола, распространяясь латерально почти до обоих надпочечников. Верхние участки сплетения связаны с **грудным аортальным сплетением**, *plexus aorticus thoracicus*, нижние — с **верхним брыжеечным сплетением**, *plexus mesentericus superior*.

#### 1075. Брюшная и правая тазовая части вегетативной [автономной] нервной системы (препаратор Е. Мельмана).

(Плод женского пола VII мес; удалена правая тазовая кость и окружающие ее мышцы; мочевой пузырь и другие органы таза отведены влево; сигмовидная кишка растянута; седалищный нерв отведен вправо.)

1 — правая почка; 2 — узел чревного сплетения; 3 — правое почечное сплетение; 4 —



симпатический ствол; 5 — правый аортально-почечный нерв; 6 — правое тельце брюшного аортального параганглия; 7 — ветвь от симпатического ствола к нижнему брыжеечному и верхнему подчревному сплетениям; 8 — правое яичниково сплетение; 9 — нижнее брыжеечное сплетение; 10 — верхнее подчревное сплетение; 11 — связи между верхним подчревным и верхним прямокишечным сплетениями; 12 — нижний подчревный нерв; 13 — передние, средние и задние ветви нижнего подчревного сплетения; 14 — передняя ветвь третьего крестцового нерва; 15 — тазовые нервы; 16 — ветви от тазового сплетения к матке; 17 — узловая пластинка тазового сплетения; 18 — тазовые мышечные нервы; 19 — ветви полового нерва к наружному сфинктеру заднего прохода; 20 — задний

блуждающий ствол; 21 — верхнее брыжеечное сплетение; 22 — верхняя брыжеечная артерия; 23 — первый узел у основания верхней брыжеечной артерии; 24 — межбрыжеечное сплетение; 25 — нервный ствол к яичниковому сплетению; 26 — левое тельце брюшного аортального параганглия; 27 — сигмовидная кишка; 28 — правый мочеточник; 29 — маточная труба и яичник; 30 — мочевой пузырь; 31 — ветви от тазового сплетения к влагалищу; 32 — ветви нижнего прямокишечного сплетения.

Сплетение представляет собой скопление различной величины и формы чревных узлов, связанных между собой большим количеством различной длины и толщины соединительных ветвей. При концентрированной форме чревного сплетения в нем различают правый и левый чревные узлы. При других формах сплетения количество узлов значительно больше.

К чревному сплетению посыпают свои ветви поясничные нервы: 1) большой грудной внутренностный нерв; 2) малый грудной внутренностный нерв; 3) блуждающий нерв (чревные ветви); 4) поясничные (первый и второй) узлы симпатического ствола; 5) грудное аортальное сплетение; 6) диафрагмальный нерв.

В образовании чревного сплетения в качестве парасимпатической его части принимают участие правый и левый блуждающие нервы. В состав чревного сплетения входит большая часть заднего блуждающего ствола, волокна которого проходят через сплетение транзитно.

От чревного сплетения во все стороны отходит множество нервных ветвей, участвующих в образовании вторичных сплетений; многие из них распространяются по стенке аорты, чревному стволу и его ветвям.


По ходу большинства этих ветвей и образуемых ими вторичных сплетений залегают нервные клетки. Одни из них образуют различной величины узлы, выступающие за пределы ветвей, другие рассеяны в виде отдельных внутриствольных нервных клеток.

С чревным сплетением связан ряд парных и непарных вегетативных сплетений.

#### Парные сплетения:

1. *Надпочечниковое сплетение, plexus suprarenalis* (см. рис. 1072). Большинство ветвей этого сплетения следует от близлежащих узлов чревного сплетения и сопровождает разветвления надпочечных артерий. Часть ветвей к нему отходит от печеночного сплетения и от малых грудных внутренностных нервов.

2. *Почекное сплетение, plexus renalis* (см. рис. 1072, 1074, 1075). В его образовании принимают участие не только *аортопочекные узлы, ganglia aorticorenalia*, почечные узлы, *ganglia renalia*, и ветви чревного сплетения, но и ветви брюшного аортального сплетения, а также часть малого грудного внутренностного нерва и низ-



#### 1076. Чревное и правое нижнее

#### диафрагмальное сплетения

(фотография. Препарат

И. Шапиро).

(Малый сальник перерезан, печень оттянута кверху, желудок — влево.)

1 — воротная вена (перерезана); 2 — печеночное сплетение; 3 — ветви переднего блуждающего ствола к печени; 4 — ветви желудочного сплетения к печени; 5 — желудок; 6 — ветви переднего блуждающего ствола, вступающие в брюшную полость; 7 — левая желудочная артерия; 8 — задний блуждающий ствол; 9 — место соединения ветвей заднего блуждающего ствола с ветвями желудочного сплетения; 10 — ветви заднего блуждающего ствола к желудку; 11 — желудочное сплетение; 12 — ветви заднего блуждающего ствола к чревному сплетению; 13 — чревное сплетение; 14 — диафрагма; 15 — общая печеночная артерия (перерезана); 16 — воротная вена; 17 — общая

желчный проток (перерезан); 18 — узел чревного сплетения; 19 — ветви чревного сплетения к правому надпочечнику; 20 — правая нижняя диафрагмальная артерия; 21 — ветви чревного сплетения к диафрагме; 22 — правый надпочечник; 23 — узлы нижнего диафрагмального сплетения; 24 — ветви нижнего диафрагмального сплетения к надпочечнику; 25 — ветви нижней диафрагмальной артерии к надпочечнику; 26 — ветви правого диафрагмального нерва к поясничной части диафрагмы; 27 — ветвь сплетения правой нижней диафрагмальной артерии к задней поверхности печени; 28 — ветви нижнего диафрагмального сплетения к печени; 29 — диафрагмально-брюшная ветвь правого диафрагмального нерва; 30 — ветвь сплетения нижней диафрагмальной артерии к печеночному сплетению; 31 — правый диафрагмальный нерв; 32 — печень; 33 — нижняя полая вена (перерезана и оттянута кверху).

ший внутренностный нерв (см. «Нервы почек»).

3. Яичковое сплетение, *plexus testicularis* (см. рис. 1075, 1077). Образуется сплетение ветвями, отходящими от брюшного аортального и от почечного сплетений: у мужчин оно сопровождает яичковую артерию и по ней достигает яичка, у женщин — яичниковую артерию и получает название яичникового сплетения, *plexus ovaricus* (см. рис. 1074, 1102) (см. «Нервы матки»).

4. Мочеточниковое сплетение, *plexus uretericus* (см. рис. 1074, 1083). Залегает вокруг мочеточника, соединяясь вверху с ветвями почечного сплетения, а внизу с мочепузырным сплетением.

5. Диафрагмальные узлы, *ganglia phrenica* (см. рис. 1060, 1072, 1076), небольшие по величине, в количестве 2—3 залегают у места входления в диафрагму диафрагмального нерва. Ряд ветвей, отходящих от последнего, проникает в брюшную полость и соединяется с ветвями диафрагмальных узлов, поэтому их описывают как диафрагмальное сплетение, залегающее по ходу диафрагмальных артерий.


Ветви диафрагмального сплетения следуют к надпочечнику, нижней полой вене, а также входят в состав печеночного и желудочного сплетений.

#### Непарные сплетения:

1. Печеночное сплетение, *plexus hepaticus* (рис. 1078—1080; см. рис. 1076). Образуется главным образом нервами, отходящими от чревного сплетения. Кроме того, в нем принимают участие передний блуждающий ствол, а также ветви от диафрагмального сплетения (см. «Нервы печени»).

2. Селезеночное сплетение, *plexus lienalis* (рис. 1081; см. рис. 1072). В образовании сплетения принимают участие ветви чревного сплетения и заднего блуждающего ствола (см. «Нервы селезенки»).


3. Желудочное сплетение, *plexus gastricus* (см. рис. 1077, 1078). Образуется ветвями чревного сплетения и блуждающих нервов. И те, и другие, соединяясь, следуют в виде сплетения по стенкам желудочных артерий, разветвляясь в области входа и малой кривизны желудка (см. «Нервы желудка»), а также по ходу желудочно-двенадцатиперстной артерии и ее ветвей (см. «Нервы желудка»).



**1077. Брюшной отдел вегетативной нервной системы (фотография. Препаратор Е. П. Мельмана).**

1 — узел чревного сплетения; 2 — правая почечная артерия; 3 — аортально-почечный узел; 4 — брюшная часть аорты; 5 — яичковое сплетение; 6 — верхнее подчревное сплетение; 7 — правая

общая подвздошная артерия; 8 — правый подчревный нерв; 9 — тазовое сплетение; 10 — межбрюжечное сплетение; 11 — нижнее брюжечное сплетение; 12 — нижняя брыжечная артерия; 13 — верхняя прямокишечная артерия; 14 — связь верхнего подчревного с верхним прямокишечным сплетением; 15 — левый подчревный нерв.



**1078. Нервы желудка, ворот печени и желчного пузыря; вид спереди (препаратор И. Шапиро).**

5. Панкреатическое сплетение, *plexus pancreaticus* (рис. 1082; см. рис. 1074). В состав сплетения входят ветви чревного, печеночного, верхнего брыжеечного и селезеночного сплетений, а также ветви левого почечного сплетения (см. «Нервы поджелудочной железы»).

**Верхнее брыжеечное сплетение,** *plexus mesentericus superior* (см. рис. 1072, 1074, 1075), мощное. В его образовании принимают участие ветви чревного сплетения и частично брюшное аортальное сплетение. Его главная масса располагается у начала верхней брыжеечной артерии. В этом месте залегают один-два больших верхних брыжеечных узла, *ganglia*

*mesenterica superiora*. Сопровождая разветвления верхней брыжеечной артерии, ветви сплетения достигают поджелудочной железы, тонкой и толстой кишки, образуя в стенке последней хорошо развитое кишечное сплетение, *plexus entericus* (см. «Нервы поджелудочной железы» и «Нервы кишечника»).

**Нижнее брыжеечное сплетение,** *plexus mesentericus inferior* (рис. 1083, 1084; см. рис. 1072, 1074, 1075), связано с предыдущим. Оно залегает вместе с одним-двумя небольшими нижними брыжеечными узлами, *ganglia mesenterica inferiora*, у корня нижней брыжеечной артерии. Сплетение своими довольно крупными петлями

окружает нижнюю брыжеечную артерию, переходит на ее ветви и по последним достигает левого отдела поперечной ободочной кишки, подходит к нисходящей и сigmoidидной ободочной кишке. Спускаясь по верхней прямокишечной артерии, ветви нижнего брыжечного сплетения подходят к стенке верхней части прямой кишки в виде верхних прямокишечных нервов, принимающих участие в образовании *верхнего прямокишечного сплетения*, *plexus rectalis superior*. Последнее имеет соединения со средними и нижними прямокишечными сплетениями (см. «Нервы кишечника»).

Между верхним и нижним брыжечными сплетениями, слева от брюшной аорты, располагается *межбрюжечное сплетение*, *plexus intermesentericus* (см. рис. 1077).

**Брюшное аортальное сплетение**, *plexus aorticus abdominalis* (рис. 1085; см. рис. 1061, 1073, 1074), — это относительно мощное, с различной величины петлями образование, залегает на передней и латеральных поверхностях брюшной аорты между верхней и нижней брыжечными артериями. Вверху брюшное аортальное сплетение соединяется с чревным сплетением, с латеральных сторон — с обоими почечными сплетениями, внизу — с верхним подчревным сплетением, которое является его продолжением. На своем пути оно имеет связи с обоими яичковыми (яичниками) сплетениями (см. рис. 1077), а также с верхним брыжечным и подвздошным сплетениями.

**Верхнее подчревное сплетение**, *plexus hypogastricus superior* (см. рис. 1083, 1085), лежит в пространстве, ограниченном вверху местом деления брюшной аорты на общие подвздошные артерии, по бокам — обеими подвздошными артериями, внизу — на 0,5—1,0 см ниже мыса. Оно представляет собой несколько уплощенную, довольно плотную, вытянутую сверху вниз нервную пластинку, где залегают различной формы и величины нервные узлы. В толще нервных стволов этого сплетения имеется множество внутриствольных нервных клеток.

Ниже мыса, на уровне II—III крестцового позвонка, верхнее подчревное сплетение делится на два колена: более длинное правое, получающее название правого нижнего подчревного (газового) сплетения, и более ко-

роткое левое — левое нижнее подчревное (газовое) сплетение.

Верхнее подчревное сплетение получает ветви от нижнего брыжечного сплетения, брюшного аортального сплетения, ветвей чревного сплетения и от нижних поясничных и первого крестцового узлов обоих симпатических стволов.

От верхнего подчревного сплетения отходят нервы к сплетениям, окружающим общие подвздошные артерии и вены: 1) *подвздошному сплетению*, *plexus iliacus* (см. рис. 1085), правому и левому, и 2) *бедренному сплетению*, *plexus femoralis*, правому и левому.

### Крестцовый отдел симпатического ствола

Крестцовый отдел симпатического ствола (см. рис. 1040, 1057, 1058, 1072—1075) располагается на тазовой поверхности крестца, медиально от крестцовых отверстий. В нем имеется три-четыре продолговато-ovalной формы узла, книзу постепенно уменьшающихся — крестцовые узлы симпатического ствола и концевой непарный узел. Число и величина узлов варьируют.

Между обоими симпатическими стволами в поперечном направлении проходит на передней поверхности крестца ряд тонких нервов, которые связывают правый симпатический ствол с левым.

От крестцовых и непарного узлов симпатического ствола отходят соединительные и внутренностные ветви.

1. *Серые соединительные ветви*, *rr. communicantes grisei*, отходят от латеральной поверхности каждого узла и входят в состав передних ветвей крестцовых и копчикового нервов. Проходящие вниз послеузловые симпатические волокна достигают таким путем сосудов и мышц туловища и нижних конечностей, а также желез кожи и мышц волос.

2. *Крестцовые внутренностные нервы*, *nn. splanchnici sacrales*, отходят преимущественно от медиального края симпатических узлов и в составе сплетений малого таза достигают органов этой полости.

### Вегетативные сплетения малого таза

Симпатические волокна, вступающие в малый таз в составе верхнего под-

чревного сплетения (продолжение брюшного аортального сплетения), а также возникшие в крестцовом отделе симпатического ствола, подходят к органам малого таза вместе с парасимпатическими и чувствительными волокнами, образуя сплетения малого таза.

**Нижнее подчревное сплетение [газовое сплетение]**, *plexus hypogastricus inferior* [*plexus pelvinus*] (см. рис. 1061, 1072—1075, 1077, 1083, 1084), — наиболее мощное из вегетативных сплетений таза. Оно является продолжением непарного верхнего подчревного сплетения, которое соединяется с нижним подчревным сплетением, получившим название *подчревного нерва*, *n. hypogastricus*.

Различают правое и левое нижнее подчревные сплетения, располагающиеся по сторонам прямой кишки, между нею и подчревными сосудами на поверхности диафрагмы таза.

Нижнее подчревное сплетение представляет собой пластинку, в которой имеется задняя (дорсальная) узкая часть, являющаяся продолжением верхнего подчревного сплетения, и передняя (вентральная) широкая часть ромбовидной формы. Вентральная часть сплетения располагается в пространстве, ограниченном снаружи передними ветвями второго и третьего крестцовых нервов; дорсально — участками фасции таза и париетального листка брюшины, которые соответствуют боковой периферии прямой кишки; изнутри и вентрально — боковой поверхностью семенных пузырьков у мужчин и боковой стенкой влагалища у женщин. В вентральной части, в меньшей степени в дорсальной, имеется множество нервных узлов различной величины и формы.

В нижнее подчревное сплетение входят:

нижние отделы верхнего подчревного сплетения, продолжением которого оно является;

крестцовые внутренностные нервы от узлов крестцовой части симпатического ствола (второго и третьего, реже от первого и четвертого);

*тазовые внутренностные нервы [возбуждающие нервы]*, *nn. splanchnici pelvici* [*nn. erigentes*], в составе которых идут парасимпатические волокна (см. «Крестцовый отдел парасимпатической нервной системы»).

От нижнего подчревного сплетения отходит множество различных по

длине и толщине ветвей, которые принимают участие в образовании ряда более мелких вегетативных сплетений.

1. *Среднее прямокишечное сплетение, plexus rectalis medius* (см. рис. 1072, 1074, 1083), образуется за счет средних прямокишечных нервов, отходящих от нижних подчревных сплетений. Часть этих нервов сопровождает среднюю прямокишечную артерию, остальные следуют к верхнему и нижнему прямокишечным сплетениям (см. «Нервы кишечника»).

2. *Нижнее прямокишечное сплетение, plexus rectalis inferior* (см. рис. 1040, 1072, 1074, 1083), образуется ветвями нижних прямокишечных нервов, отходящих от половых нервов, а также ветвями от нижнего подчревного, среднего и верхнего прямокишечных сплетений (см. «Нервы кишечника»).

3. *Мочепузырное сплетение, plexus vesicalis* (см. рис. 1072, 1073, 1083), располагается по обеим сторонам мочевого пузыря в виде парного сплетения и представляет собой соединение нервных узлов и ветвей:

1) верхние нервы мочевого пузыря направляются к верхним отделам мочевого пузыря и частично поднимаются по мочеточнику;


2) нижние нервы мочевого пузыря следуют к нижним отделам мочевого пузыря и к мочеточнику у места впадения его в пузырь.

Оба нерва, подойдя к мочеточникам, переходят в мочеточниковое сплетение (см. рис. 1074).

Мочепузырное сплетение имеет связи у мужчин со сплетением семявыносящего протока, предстательным и пещеристым сплетением, а у женщин — с маточно-влагалищным сплетением (см. «Нервы мочевого пузыря» и «Нервы матки»).

4. *Сплетение семявыносящего протока, plexus deferentialis* (см. рис. 1072) (только у мужчин), сопровождает семявыносящий проток. В образовании сплетения принимают участие ветви от нижнего подчревного и пузырного сплетений. По своему ходу сплетение посыпает ветви к семенным пузырькам.

5. *Предстательное сплетение, plexus prostaticus* (см. рис. 1040, 1072) (только у мужчин), располагается на боковых и задненижней поверхностях предстательной железы; оно образуется ветвями от нижнего подчревного и пузырного сплетений. По ходу его



### 1079. Печеночное сплетение и нервы желчного пузыря; вид спереди (фотография. Препарат И. Шапиро).

1 — печень; 2 — круглая связка печени; 3 — пузырная артерия (левая ветвь); 4 — ворота печени; 5 — левая часть печеночного сплетения; 6 — левая печеночная артерия; 7 — сплетение печеночного протока; 8 — воротная вена; 9 — правая часть печеночного сплетения; 10 — ветви печеночного сплетения к желудку; 11 — правая желудочная артерия; 12 — ветви печеночного сплетения к печеночному и общему желчному протокам; 13 — печеночное сплетение; 14 — ветви печеночного сплетения к двенадцатиперстной кишке; 15 — двенадцатиперстная кишка; 16 — сплетение на передней поверхности общего желчного протока; 17 — печеночное сплетение (оттянуто вправо); 18 — нерв, залегающий с латеральной стороны пузырного протока; 19 — нерв, залегающий с медиальной стороны пузырного протока; 20 — нерв, соединяющий нервы, залегающие на

латеральной и медиальной периферии пузырного протока; 21 — нерв к пузырной артерии; 22 — желчный пузырь; 23 — первое сплетение на стенке желчного пузыря.

ветвей включены небольшой величины нервные узелки. Ряд ветвей предстательного сплетения соединяется с ветвями сплетения семявыносящего протока, ряд их достигает стенки предстательной части мочеиспускательного канала.

6. *Нервы пещеристых тел полового члена, nn. cavernosi penis*, располагаются на тыльной поверхности полового члена, куда они направляются, пройдя через мочеполовую диафрагму. Нервы представляют собой продолжение ветвей предстательного сплетения и несколько ветвей отentralных ветвей крестцовых нервов. На дорсальной поверхности полового члена нервы соединяются с ветвями дорсального нерва полового члена (от полового нерва) и посыпают большой и малые нервы пещеристого тела, которые, прободая белочную оболочку полового члена, разветвляются в его пещеристых телах.

Пещеристое тело клитора иннервируют нервы пещеристых тел клитора, *nn. cavernosi clitoridis*, отходящие непосредственно от нижнего подчревного сплетения.

7. *Маточно-влагалищное сплетение, plexus uterovaginalis* (см. рис. 1073), залегает в окломаточной клетчатке; главная масса сплетения располагается по боковым поверхностям матки и влагалища в виде парного, правого и левого, сплетения, отдавая ряд довольно мощных влагалищных нервов, *nn. vaginales*. Сплетение представляет собой скопление различной величины и формы нервных узлов и ветвей. Последние, следуя по боковой поверхности матки, достигают нижних отделов яичникового сплетения (см. «Нервы матки»).

#### ПАРАСИМПАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ВЕГЕТАТИВНОЙ [АВТОНОМНОЙ] НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

В парасимпатической части автономной нервной системы, как и в симпатической, различают центральный (мозговой) и периферический (внемозговой) отделы (см. рис. 1057, 1059).

Центральный отдел представляет собой скопление клеток, залегающих в различных участках головного и спинного мозга, и делится на головную и крестцовую части.

Периферический отдел состоит из волокон, проходящих в составе ряда черепных и спинномозговых (крестцовых) нервов к перифери-



#### 1080. Печеночное сплетение (фотография. Препарат И. Шапиро).

1—печень; 2—желчный пузырь; 3—печеночное сплетение; 4—сплетение задней поверхности общего желчного протока; 5—двенадцатиперстная кишка; 6, 16—ветви заднего печеночного сплетения на задней поверхности общего желчного протока; 7—общий желчный проток; 8—ветви заднего печеночного сплетения к поджелудочной железе; 9—поджелудочная железа; 10—сосуд к правой доле печени от верхней брыжеечной артерии; 11—нерв, соединяющий сплетение задней поверхности общего желчного протока с верхним брыжеечным сплетением; 12—нервы, окружающие начальный отдел правой печеночной артерии; 13—верхнее брыжеечное сплетение; 14—брюшная аорта (вскрыта); 15—печеночное сплетение; 17—нерв печеночного сплетения; 18—воротная вена; 19—печеночное сплетение; 20—ветвь печеночного сплетения, направляющаяся к печени по задней поверхности воротной вены.

ческим узлам (предузловые волокна); из периферических концевых узлов, *ganglia terminalia*, располагающихся вблизи органов,— это внестенные (экстрамуральные) узлы, или залегающих в стенах органов—это внутристенные (интрамуральные) узлы, отростки клеток которых направляются к исполнительным органам (послеузловые волокна). Парасимпатические волокна проходят внутри стволов III, VII, IX и X пар черепных нервов и в стволах крестцовых спинномозговых нервов.

К периферическим экстрамуральным узлам относят ресничный узел, крылонебный узел, ушной узел, поднижнечелюстной узел, подъязычный узел, а также ряд узлов вегетативных сплетений грудной полости и таза.

К периферическим интрамуральным узлам относят те многочисленные нервно-клеточные скопления, которые залегают в стенках внутренних органов.

#### *Головной отдел парасимпатической нервной системы*

Головной отдел парасимпатической нервной системы в свою очередь подразделяется на среднемозговую

часть, центр которой залегает на дне водопровода мозга, на уровне верхних холмиков крыши среднего мозга, и ромбовидную часть, центры которой располагаются в области моста и продолговатого мозга (см. рис. 1057, 1059).

К среднемозговой части этой системы относятся парасимпатические волокна глазодвигательного нерва (см. рис. 973, 975, 977, 1058, 1089).

Предузловые нервные волокна, идущие в составе глазодвигательного

нерва, возникают от группы очень мелких клеток в добавочном (автономном) ядре глазодвигательного нерва.



В составе глазодвигательного корешка, *radix oculomotoria*, ресничного узла они входят в ресничный узел, на клетках которого заканчиваются; послеузловые волокна проходят в коротких ресничных нервах, *nn. ciliares breves*, и направляются к сфинктеру зрачка и к ресничной мышце.

#### **1081. Селезеночное сплетение (фотография. Препаратор Л. Терновой).**

1 — селезеночное сплетение; 2 — узловатые утолщения в местах соединения нервов; 3 — основные стволы сплетения; 4 — селезеночная артерия; 5 — коллатеральная первая ветвь; 6 — верхнее зональное сплетение; 7 — нижнее зональное сплетение; 8 — селезенка.


#### **1082. Нервы поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки (фотография. Препаратор П. Евдокимова). (Передняя поверхность поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки; переднее сплетение поджелудочной железы.)**

1 — головка поджелудочной железы; 2 — селезеночное сплетение; 3 — хвост поджелудочной железы; 4 — проток поджелудочной железы; 5 — исходящая часть двенадцатиперстной кишки.




**1083. Нижнее брыжеечное, брюшное аортальное, верхнее подчревное и нижнее подчревное сплетения у ребенка 3 лет (фотография. Препарат Б. Смолкиной).**

1—нисходящая ободочная кишка; 2—левая ободочная артерия с сопровождающими ее нервами; 3—сигмовидные артерии и вены с сопровождающими их нервыми сплетениями; 4—сигмовидная ободочная кишка с входящими в ее стенку сосудами и нервами; 5—верхние прямокишечные артерии и вена, окруженные одноименным нервным сплетением; 6—прямая кишка; 7—сосудистые и нервные ветви, идущие в стенку верхней части прямой кишки; 8, 9—нервные ветви, идущие в среднюю и нижнюю части прямой кишки отentralной части нижнего подчревного сплетения; 10—полость правой половины мочевого пузыря; 11—мочепузырное сплетение; 12—вентральная часть правого нижнего подчревного сплетения; 13—соединительная ветвь между вентральной частью нижнего подчревного сплетения и верхним прямокишечным сплетением; 14—мочеточник и нервы, идущие к нему от нижнего подчревного сплетения; 15—ветвь, соединяющая вентральную часть нижнего подчревного сплетения с верхним прямокишечным и сигмовидным сплетениями; 16—правый подчревный нерв; 17—верхнее подчревное сплетение; 18—ветви, соединяющие дорсальную часть верхнего подчревного сплетения с пояснично-крестцовыми и нижним брыжеечным сплетениями; 19—брюшное аортальное сплетение; 20—нижнее брыжеечное сплетение; 21—нижняя брыжеечная артерия; 22—нижняя брыжеечная вена, окруженная нервами; 23—правая почка.



**1084. Нервное сплетение сигмовидной кишки (фотография. Препарат Е. Мельмана). (Сигмовидная кишка растянута.)**

1—нижнее брыжеечное сплетение; 2—сигмовидная артерия; 3—сигмовидное сплетение.



1085. Нервы и сосуды толстой кишки; вид спереди.

К ромбовидной части системы (см. рис. 1058, 1060) относятся:

- 1) парасимпатические (секреторные) волокна лицевого нерва;
- 2) парасимпатические (секреторные) волокна языкоглоточного нерва;
- 3) парасимпатические волокна блуждающего нерва.

Все парасимпатические (секреторные) волокна лицевого нерва принадлежат промежуточному нерву (см. рис. 974, 1058, 1060), возникают в клетках верхнего слюноотделительного ядра и следуют в виде предузловых волокон в двух направлениях:

1) в составе большого каменистого нерва они вступают в крылонебный узел. Часть послеузловых волокон этого узла входит в скуловой нерв и через соединительную ветвь направляется в слезный нерв, достигая слезной железы. Другая часть входит в состав носовых и небных нервов и по ним достигает желез слизистой оболочки полости носа и неба;

2) в составе барабанной струны волокна поступают в язычный нерв (см. «Тройничный нерв»), откуда выходят в поднижнечелюстной и подъязычный узлы. Послеузловые волокна достигают поднижнечелюстной и подъязычной желез, передней язычной железы и желез слизистой оболочки дна полости рта.

Парасимпатические (секреторные) волокна языкоглоточного нерва (см. рис. 974, 1058, 1060) возникают в клетках нижнего слюноотделительного ядра, расположенного в продолговатом мозге, и в виде предузловых волокон следуют через барабанный нерв, барабанное сплетение и малый каменистый нерв и достигают клеток ушного узла, где они переключаются. Отсюда послеузловые волокна через соединительные ветви между ушным узлом и ушно-височным нервом входят в ствол последнего, достигая по его ветвям околоушной железы. Кроме того, послеузловые волокна достигают слизистой оболочки щек и губ, а также зева и корня языка.

Парасимпатические волокна блуждающего нерва (рис. 1086; см. рис. 1057, 1059) возникают в клетках заднего ядра блуждающего нерва, направляются как предузловые волокна в стволе блуждающего нерва и его ветвей до нервных клеток, залегающих в стволе самого блуждающего нерва и в экстра-интрамуральных узлах органов шеи, груди и живота.




#### 1086. Нервы заднего средостения (фотография. Препаратор К. Березовского).

*(Сердце удалено; трахея  
рассечена продольно, ее части  
оттянуты в стороны.)*

1 — левый возвратный гортанный нерв; 2 — левые трахеальные нервные ветви; 3 — левая половина трахеи; 4, 6 — левый блуждающий нерв; 5 — левый главный бронх; 7 — бронхиальные (нервные) ветви; 8 — левая легочная вена; 9 — диафрагма; 10 — отверстие нижней полой вены; 11 — соединительные ветви переднего ствола блуждающих нервов; 12 — соединительные ветви заднего ствола блуждающих нервов; 13 — правое легкое; 14 — правая легочная вена; 15 — соединительные ветви переднего пищеводного сплетения; 16 — правая легочная

артерия; 17 — бронхиальные (нервные) ветви; 18 — правый блуждающий нерв; 19 — правый главный бронх; 20 — пищевод; 21 — пищеводное сплетение; 22 — правая половина трахеи; 23 — правый возвратный гортанный нерв.



1087. Вегетативные узлы головы  
(полусхематично).

В этих узлах они заканчиваются, и послеузловые волокна направляются к органам.

### Парасимпатические узлы головы

Вегетативные узлы головы (рис. 1087) являются частью вегетативной (автономной) нервной системы. Они состоят из клеток, принадлежащих преимущественно парасимпатической части нервной системы; располагаются по ходу ветвей тройничного нерва и связаны с ними соединительными ветвями. К вегетативным узлам головы подходят чувствительные, парасимпатические и симпатические нервы, которые называются корешками.

Волокна парасимпатического корешка заканчиваются на клетках данных узлов. Послеузловые волокна этих клеток вместе с чувствительными и симпатическими волокнами образуют периферические ветви этих узлов.

**I. Ресничный узел**, *ganglion ciliare* (рис. 1088; см. рис. 873—974), вытянутой формы, слегка уплощен, располагается в глубине глазницы между латеральной прямой мышцей глаза и зорительным нервом в толще жировой клетчатки, окружающей глазное яблоко.

Корешки ресничного узла:

1) **носоресничный корешок**, *radix nasociliaris* (чувствительный), от глазного нерва;

2) **глазодвигательный корешок**, *radix oculomotoria* (парасимпатический), от глазодвигательного нерва;

3) **симпатический корешок к ресничному узлу**, *radix sympatheticus*, от внутреннего сонного сплетения.

Из переднего края ресничного узла выходят **короткие ресничные нервы**, *rr. ciliares breves*, всего 15—20. Они направляются вперед, к задней поверхности глазного яблока. Здесь они соединяются с длинными ресничными нервами от носоресничного нерва, вместе с ними прободают белочную оболочку, проникая между нею и соудистой оболочкой. Длинные и короткие ресничные нервы иннервируют оболочки глазного яблока, роговицу и мышцы, причем парасимпатические волокна иннервируют ресничную мышцу и сфинктер зрачка, а к дилататору зрачка подходят симпатические волокна от внутреннего сонного сплетения.

**II. Крылонебный узел**, *ganglion pterygopalatinum* (см. рис. 969, 973—975, 979, 1087), имеет треугольную форму и залегает в жировой клетчатке, выполняющей крыловидно-небную ямку.

Корешки крылонебного узла:

1) чувствительный корешок — **узловые ветви**, *rr. ganglionares*, от верхнечелюстного нерва;

2) парасимпатический корешок — **большой каменистый нерв**, *n. petrosus major* (лицевой корешок), — ветвь лицевого нерва (волокна промежуточного нерва);

3) симпатический корешок — **глубокий каменистый нерв**, *n. petrosus profundus*, — ветвь внутреннего сонного сплетения.

Два последних нерва подходят к крылонебному узлу сзади, проникая в крыловидно-небную ямку через крыловидный канал, где, сливаясь, образуют **нерв крыловидного канала**, *n. canalis pterygoidei*.

Ветви, отходящие от крылонебного узла:

1) **глазничные ветви**, *rr. orbitales*, всего 2—4, проходят через нижнюю глазничную щель в глазницу и, направляясь вверх и кзади, принимают участие в иннервации слизистой оболочки клиновидной пазухи и задних ячеек решетчатой кости.

2) **верхние задние носовые ветви**, *rr. nasales posteriores superiores*, всего 10—15, выходят из крыловидно-небной ямки через клиновидно-небное отверстие, проникают в полость носа и здесь получают названия с учетом топографии:

1) **латеральные верхние задние носовые ветви**, *rr. nasales posteriores superiores laterales* (см. рис. 980), иннервируют слизистую оболочку задних отделов верхней и средней носовых раковин и соответствующую область верхнего и среднего носовых ходов;

2) **медиальные верхние задние носовые ветви**, *rr. nasales posteriores superiores mediales*, иннервируют слизистую оболочку верхней части слизистой оболочки перегородки носа;

3) **носонебный нерв**, *n. nasopalatinus*, направляется кпереди и книзу, залегая между надкостницей сошника и слизистой оболочкой этой области; достигнув резцового канала, проходит через него, заканчиваясь в слизистой оболочке передней части неба (см. рис. 980);

4) **глоточная ветвь**, *r. pharyngeus* (см. рис. 980), направляется несколь-

ко книзу и кзади, заканчиваясь в слизистой оболочке верхнелатеральной поверхности хоан и боковой поверхности глотки в области глоточного отверстия слуховой трубы.

3. **Небные нервы** проходят через большой небный канал и большое и малые небные отверстия к слизистой оболочке носа и неба. Они отдают две ветви:

1) **большой небный нерв**, *n. palatinus major* (см. рис. 979), выходит через большое небное отверстие и иннервирует слизистую оболочку мягкого и твердого неба и десну верхней челюсти. Концевые его ветви соединяются с носонебным нервом. Проходя в большом небном канале, большой небный нерв отдает **задние носовые ветви**, *rr. nasales posteriores inferiores*, которые иннервируют слизистую оболочку среднего и нижнего носовых ходов, нижней носовой раковины и верхнечелюстной пазухи;

2) **малые небные нервы**, *nn. palatini minores*, выходят через малые небные отверстия и иннервируют слизистую оболочку мягкого неба и миндалину.

Кроме указанных ветвей, отходящих от крылонебного узла, следует учитывать послеузловые волокна, которые переходят в слезный нерв и в его составе достигают слезной железы, иннервируя ее (см. «Глазной нерв»).

**III. Ушной узел**, *ganglion oticum* (см. рис. 973, 979, 1087), овальный, располагается на внутренней поверхности нижнечелюстного нерва, у места его выхода из овального отверстия.

Корешки узла:

1) чувствительный корешок отходит от нижнечелюстного нерва;

2) парасимпатический корешок — **малый каменистый нерв**, *n. petrosus minor*, — ветвь языко-глоточного нерва;

3) симпатический корешок — ветвь среднего менингеального сплетения (вокруг средней менингеальной артерии).

Ветви, отходящие от ушного узла:

1. **Соединительная ветвь с ушно-височным нервом**, *r. communicans cum n. auriculotemporalis*, в составе которой идут послеузловые волокна к околоушной железе.

2. **Соединительная ветвь с менингеальной ветвью нижнечелюстного нерва**, *r. communicans cum r. meningea n. mandibularis*, идущая к твердой оболочке головного мозга вместе с менингеальной ветвью нижнече-

**1088. Ресничный узел  
(фотография. Препаратор  
А. Цыбулькина).**

1—ресничный узел; 2—глазодвигательный корешок; 3—нижняя ветвь глазодвигательного нерва; 4—ветвь к нижней косой мышце глаза; 5—дополнительный глазодвигательный корешок; 6—верхняя ветвь глазодвигательного нерва; 7—носоресничный корешок; 8—короткие ресничные нервы; 9—носоресничный нерв.

люстного нерва и иннервирующая соуды твердой оболочки головного мозга.

3. Соединительная ветвь с барабанной струной, *r. communicans cum chorda tympani*.

**IV. Поднижнечелюстной узел, ganglion submandibulare** (рис. 1089; см. рис. 973, 976, 1087), овальный, слегка уплощен, лежит под язычным нервом над поднижнечелюстной железой.

Корешки, входящие в его состав:

- 1) чувствительный корешок—узловые ветви язычного нерва;
- 2) парасимпатический корешок—волокна от барабанной струны, подходящие к узлу в составе узловых ветвей язычного нерва;
- 3) симпатический корешок—ветвь к поднижнечелюстному узлу, *r. sympathetic ad ganglion submandibulare*,—ветвь от сплетения вокруг лицевой артерии.

Ветви, отходящие от поднижнечелюстного узла:


1. Железистые ветви, *rr. glandulares*, отходят от нижнего края узла, иннервируют поднижнечелюстную железу и ее проток.

2. Соединительные ветви с язычным нервом, *rr. communicantes cum n. linguali*, идущие от переднего края узла к язычному нерву и вместе с ним вступающие в толщу языка, где заканчиваются в его слизистой оболочке.

3. Ветви, отходящие от поднижнечелюстного узла и соединяющие его с нервно-узловой цепочкой, которая посыпает ветви к поднижнечелюстной и подъязычной железам, а также к подъязычному узлу.

**V. Подъязычный узел, ganglion sublinguale** (см. рис. 973, 976, 1087),—наименьший из всех вегетативных узлов головы, залегает на наружной поверхности подъязычной железы.

Нервные корешки подъязычного узла те же, что и поднижнечелюстного узла. В него входят подъ-



**1089. Поднижнечелюстной узел  
(фотография. Препаратор  
А. Цыбулькина).**

1—язычный нерв; 2—узловые ветви язычного нерва; 3—поднижнечелюстной узел; 4—поднижнечелюстная слюнная железа; 5—ветви

поднижнечелюстного узла к поднижнечелюстной железе; 6—ветви поднижнечелюстного узла к подъязычной железе; 7—проток поднижнечелюстной железы; 8—подъязычная слюнная железа; 9—язычная артерия; 10—глоточная ветвь язычного нерва.

язычный нерв и ряд других мелких ветвей от язычного нерва.

Ветви, отходящие от подъязычного узла, направляются к подъязычной железе.

### **Крестцовый отдел парасимпатической нервной системы**

Центр крестцового отдела парасимпатической нервной системы (см. рис. 1057, 1059) залегает в сером веществе спинного мозга в области мозгового конуса, в  $S_{II}$ — $S_{IV}$ — $S_V$  в виде парного (правого и левого) парасимпатического крестцового ядра, *nuclei parasympathici sacrales*.

Отростки клеток этого ядра—предузловые нервные волокна, проходят через передние корешки спинного мозга и следуют в составе передних ветвей крестцовых нервов. Пройдя вместе с ними через тазовые крестцовые отверстия, они отделяются от крестцовых нервов и получают название тазовых внутренностных нервов (*возбуждающие нервы*), *nn. splanchnici pelvini* (*nn. erigentes*). Часть их подходит к экстрамуральным тазовым узлам, *ganglia pelvica* (см. рис. 1073, 1078), нижних подчревных сплетений, сплетений тазовых органов, кишки (вверх до сигмовидной ободочной кишки), а другая часть подходит к интрамуральным узлам этих органов. В этих узлах предузловые волокна переключаются на периферические нейроны. Послеузловые волокна достигают мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, части толстой кишки (от левой трети поперечной ободочной кишки до прямой включительно), внутренних и наружных половых органов. Сосудорасширяющие волокна пещеристых тел получают название возбуждающих нервов (см. «Нервы мочевого пузыря»).

Среди внутренностных тазовых нервов можно различить группу, образованную теми из них, которые, отойдя от одной из крестцовых ветвей, не соединяются между собой, а непосредственно следуют к подчревному сплетению, и группу, образованную теми из стволов внутренностных нервов, которые, отойдя от одной из ветвей крестцового сплетения, здесь же у места отхождения соединяются с внутренностными нервами, отошедшими от другой ветви крестцового сплетения.

### **ИНТРАМУРАЛЬНЫЕ НЕРВНЫЕ СПЛЕТЕНИЯ**

В различных слоях стенок внутренних органов залегают внутристеночные (интрамуральные) сплетения, причем некоторые из них могут залегать в соединительной ткани, окружающей органы (рис. 1090, 1091).

Такие интрамуральные нервные сплетения, представляя собой большей частью широко- и узкопетлистые сети, особенно богаты нервно-клеточными скоплениями различной формы и величины в виде интрамуральных узлов или отдельных нервных клеток (иногда).

В образовании интрамуральных сплетений принимают участие и симпатическая, и парасимпатическая часть вегетативной (автономной) нервной системы.

В узлах этих сплетений заканчиваются предузловые парасимпатические волокна, переключаясь на послеузловые парасимпатические нейроны.

Среди многих интрамуральных нервных сплетений особенно хорошо анатомически выявляются внутристеночные сплетения сердца, трахеи, пищевода, двенадцатиперстной, тощей, подвздошной и толстой кишки, мочевого пузыря, матки и других органов.

### **НЕРВЫ ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ**

**Нервы слюнных желез** см. «Головной отдел парасимпатической нервной системы».

### **Нервы сердца**

К сердцу подходят нервы (рис. 1092—1094; см. рис. 1057, 1058, 1062—1064) от 3 шейных и 2—4 верхних грудных узлов симпатических стволов, от шейной и грудной частей блуждающих нервов и их ветвей (от верхних гортанных и возвратных гортанных нервов), а также от правого диафрагмального нерва.

Все нервы, направляясь к сердцу, участвуют в образовании сердечного сплетения, в котором различают внесердечную часть (с поверхностным и глубоким отделами) и внутрисердечную часть. Во внесердечной части по ходу стволов имеются небольшие скопления ганглиозных клеток и относительно часто встречаются 1—3 сердечных узла, *ganglia cardiaca* (см.

рис. 1094, 1095). На самом сердце различные отделы сплетения характеризуются топографическими особенностями, числом, величиной и формой залегающих узлов и соединениями, которые имеются между различными участками этого сплетения.

По В. П. Воробьеву, различают следующие интрамуральные сплетения: два передних продольных, два задних продольных, переднее сплетение предсердий и заднее сплетение левого предсердия.

*Правое переднее продольное и левое переднее продольное сплетения* располагаются своими начальными отделами соответственно справа и слева от основания легочного ствола. В области артериального конуса (легочно-го ствола) нервы проникают под эпикард и разветвляются на соответствующих передней и переднебоковой поверхностях правого и левого желудочков. Ветви этих сплетений проходят в миокард к передним отделам перегородки желудочек и предсердий, к сосудам и эндокарду. Оба сплетения связываются между собой рядом соединительных ветвей.

*Правое заднее продольное и левое заднее продольное сплетения* залегают под эпикардом. *Правое сплетение* располагается по верхней границе между предсердиями, между устьями верхней и нижней полых вен и на задней стенке правого желудочка; оно отдает нервы миокарду и эндокарду латеральной и задней стенок правого предсердия и задней стенки правого желудочка. *Левое сплетение*, его начальные отделы, залегают в толще складки эпикарда. Оно посыпает нервы в мускулатуру и эндокард предсердий и задней стенки желудочек, а также в верхние и задние участки перегородок предсердий и желудочек и к предсердно-желудочковому пучку. Оба сплетения широко соединяются как между собой, так и с близлежащими нервами передних сплетений.

*Переднее сплетение предсердий*, залегая подэпикардиально на передней стенке обоих предсердий, посыпает нервы к их мускулатуре и эндокарду, а также к передней части стенки перегородок предсердий и желудочек.

*Заднее сплетение левого предсердия* располагается подэпикардиально в верхнем отделе задней стенки левого предсердия и посыпает нервы к прилегающим к нему частям стенки этого предсердия. Все 6 сплетений,

являясь частями одного общего сердечного сплетения, имеют различной величины узловые поля и занимают определенную территорию, хотя число входящих в их состав узлов, величина и взаимоотношения последних часто варьируют. По В. П. Воробьеву, узловое поле обоих передних продольных сплетений располагается в области артериального конуса. Узловое поле заднего правого продольного сплетения занимает участок правого предсердия, между верхней и нижней полыми венами, и, ограничиваясь снаружи пограничной бороздой, продолжается на заднюю стенку правого предсердия, где доходит до венечного синуса и соединяется с полем заднего левого продольного сплетения.

Узловое поле заднего левого продольного сплетения начинается у места перехода нервов этого сплетения на левое предсердие и распространяется преимущественно в области задней стенки предсердия, между левыми легочными венами и венечным синусом.

Узловое поле переднего сплетения предсердий невелико и состоит из нескольких узлов, которые занимают середину передней стенки предсердий.

Узловое поле заднего сплетения левого предсердия также невелико. Область этого поля ограничивается задней стенкой левого предсердия между стволами правых и левых легочных вен.


#### *Нервы трахеи*

К трахее подходит (см. рис. 991, 1067, 1086) с обеих сторон ветви нижних гортанных нервов, связанные соединительными ветвями с верхними гортанными нервами, ветви верхних шейных узлов симпатических стволов (через соединительные ветви с ветвями блуждающих нервов), ветви шейно-грудных (звездчатых) узлов (через соединительные ветви с возвратными гортанными нервами) и ветви верхних и средних сердечных нервов. Залегая между трахеей и пищеводом, возвратные гортанные нервы посыпают ветви в задние отрезки кольцевых связок, латеральные отделы перепончатой стенки и достигают многочисленных заложенных на всем ее протяжении узлов.

1090



А



Б

**1090. Нервы желудка**  
**(фотография. Препаратор**  
**Р. Синельникова).**


(Участки тотально окрашенных  
 препаратов — подсерозное  
 и межмышечное нервные  
 сплетения).

А — область дна. Б — область привратника.

**1091. Нервы тонкой кишки**  
**(фотография. Препаратор**  
**Р. Синельникова).**

(Участок тотально окрашенного  
 препарата — межмышечно-  
 кишечное сплетение).

**1091**



### Нервы легких

К легким подходят бронхиальные ветви, *rr. bronchiales* (рис. 1095; см. рис. 1067—1069, 1071, 1086), от обоих блуждающих нервов, нижних шейных и трех-четырех верхних грудных узлов симпатических стволов. Все эти ветви образуют четыре соединенных между собой сплетения, которые составляют *легочное сплетение*, *plexus pulmonalis*, располагающееся в воротах легких и связанное с сердечным сплетением.

По ходу сплетения имеются небольшие скопления ганглиозных клеток. Они либо образуют небольшие узелки, либо рассеяны внутриствольно.

Вступая в легкие, ветви сплетений сопровождают бронхи и сосуды. Внутри легких по ходу этих ветвей залегают мелкие узелки.

### Нервы пищевода

Пищевод получает ветви (см. рис. 1069—1071, 1086, 1095) от обоих блуждающих нервов — *пищеводные ветви*, *rr. esophagei*, от возвратных горланных нервов и симпатических стволов, как от их грудных узлов, так и от межузловых ветвей. Все эти ветви образуют вокруг пищевода мощное *пищеводное сплетение*, *plexus esophageus*, по ходу которого имеются соединительные ветви с близлежащими спле-

тениями других органов грудной полости, особенно с грудным аортальным сплетением. Ветви пищеводного сплетения проникают в толщу стенки пищевода, где входят в состав широкопетлистой сети, расположенной между продольным и круговым слоями мышц стенки пищевода. В стволах этой сети залегают округлые узлы различной величины. Указанное сплетение в области впадения пищевода в желудок переходит в межмышечное сплетение желудка.

### Нервы желудка

К желудку подходят ветви (см. рис. 1058, 1059, 1067, 1071, 1076) от обоих блуждающих стволов. Спускаясь по пищеводу, эти ветви либо переходят непосредственно на желудок, либо достигают его, следя в толще малого сальника. *Желудочные ветви*, *rr. gastrici*, подразделяются на *передние желудочные ветви*, *rr. gastrici anteriores*, образованные в основном левым блуждающим нервом и расположенные на передней стенке желудка, и *задние желудочные ветви*, *rr. gastrici posteriores* — на задней стенке желудка, в состав которых входят главным образом ветви правого блуждающего нерва. Ветви чревных узлов (вегетативных) подходят к желудку, сопровождая его артерии. Желудочные ветви блуждающих стволов

и чревных узлов участвуют в образовании одного общего *желудочного сплетения*, *plexus gastricus*.


Проникая под серозный покров желудка, ветви желудочного сплетения принимают участие в образовании трех сплетений: подсерозного, мышечно-кишечного и подслизистого сплетения.

*Подсерозное сплетение*, *plexus subserosus*, представляет собой широкопетлистую сеть различной длины пучков нервных волокон с заложенными в местах их пересечения узлами, наибольшее количество которых имеется в области малой и большой кривизны.


*Мышечно-кишечное сплетение*, *plexus myentericus*, связанное с подсерозным, также представляет собой широкопетлистую сеть с включенными по ходу пучков нервных волокон различной величины узлами. В области дна желудка петли сплетения широкие (см. рис. 1091, А), а образующие их пучки тонкие; в области тела желудка они несколько толще и в области привратника еще более утолщаются (см. рис. 1091, Б).

*Подслизистое сплетение*, *plexus submucosus*, связанное с межмышечным сплетением, так же как и первые два, представляет собой сеть, но с меньшим количеством клеток.

Все три сплетения, будучи между собой связанными, иннервируют элементы стенок желудка.



**1092. Нервы сердца; вид спереди  
(препаратор В. П. Воробьева).**  
(Удалены легкие у корня, верхняя  
полая вена, аорта и легочный  
ствол у основания.)



1093. Нервы сердца;  
диафрагмальная поверхность  
(препаратор В. П. Воробьева).  
(Эпикард удален; сердце  
растянуто.)

### Нервы кишечника

К кишкам подходят ветви (рис. 1096, 1097; см. рис. 1057, 1058, 1072—1075, 1083—1085) от верхнего и нижнего брыжеевых сплетений, поясничные внутренностные нервы (ветви поясничных узлов симпатических стволов), а также ветви верхнего и нижнего подчревных сплетений, а через последние — ветви от крестцовых узлов пограничных симпатических стволов — крестцовые внутренностные нервы.

Все перечисленные ветви подходят к различным участкам тонкой и толстой кишки, образуя *кишечное сплетение*, *plexus entericus*, которое, проникая в толщу их стенок, принимает участие в образовании *подсерозного, мышечно-кишечного и подслизистого сплетений* (см. рис. 1092).


### Нервы печени и желчного пузыря

Печень получает ветви (рис. 1098; см. рис. 1058, 1059, 1078, 1079) от чревного сплетения, переднего ствола блуждающих нервов (*печеночные ветви*, *rr. hepatici*), от нижних — правого и левого — диафрагмальных узлов. Все ветви, направляясь к печени, участвуют в образовании *печеночного сплетения*, *plexus hepaticus*, которое топографически некоторые авторы разделяют на передние и задние печеночные сплетения.

Оба сплетения, залегая в толще печеноочно-двенадцатиперстно-кишечной связки, направляются к воротам печени, окружая собственную печеночную артерию и ее ветви и располагаясь соответственно на передней поверхности воротной вены (переднее сплетение) и на задней ее поверхности (заднее сплетение).

Большая часть переднего печеночного сплетения следует по ходу собственной печеночной артерии. В своих начальных отделах оно имеет относительно толстые нервы, которые по мере приближения к печени постепенно истончаются. У места деления собственной печеночной артерии на правую и левую ветви переднее печеночное сплетение разделяется на правый и левый пучки, связанные между собой многочисленными стволиками.

Заднее печеночное сплетение, основная масса которого залегает



**1094. Нервы сердца и легких (фотография. Препарат В. Андриеша).**

1 — левый блуждающий нерв; 2 — левая грудная сердечная ветвь; 3 — сердечные узлы; 4 — связь первого симпатического ствола с нервными сплетениями кровеносных сосудов и стенок сердца; 5 — устье верхней полой вены; 6 — правые грудные сердечные ветви; 7 — правый блуждающий нерв; 8 — сердечные нервы симпатического ствола.

в правом отделе печеноочно-двенадцатиперстно-кишечной связки, следует к правой доле печени, располагаясь между воротной веной и общим желчным протоком.

Оба, переднее и заднее, печеночные сплетения широко соединяются между собой.

По ходу печеночного сплетения залегают различной величины и формы нервные узелки. Кроме того, имеется большое количество внутриствольных нервных клеток, либо образующих скопления, либо рассеянных по ходу нервов. В толще печени нервы сопровождают разветвления собственной печеночной артерии и воротной вены (см. рис. 1098).

К желчному пузырю отходят ветви печеночного сплетения, которые следуют главным образом от правой ча-

сти переднего печеночного сплетения. В толще стенки пузыря различают поверхностное сплетение, располагающееся в подсерозном и соединительнотканном слоях, и глубокое сплетение, залегающее между мышечной и слизистой оболочками.

В сети глубокого сплетения имеются небольшие нервные узелки и внутриствольные нервные клетки.

### Нервы поджелудочной железы

К поджелудочной железе следуют ветви (см. рис. 1074, 1082, 1096) от чревного сплетения и расположенных поблизости от него сплетений: печеночного, селезеночного, верхнего брыжеечного и левого почечного.

Ветви от указанных сплетений, войдя в толщу железы, образуют *панкреатическое сплетение*, *plexus pancreaticus*.


Некоторые авторы, принимая во внимание топографию, делят это сплетение на три части:

1) *переднее панкреатическое сплетение* располагается на протяжении хвоста, тела и верхнего отдела головки поджелудочной железы. В его образовании принимают участие ветви чревного, печеночного и селезеночного сплетений. Сплетение представляет собой широкопетлистую сеть, ход его ветвей не совпадает с ходом сосудов железы;

2) *заднее сплетение тела и хвоста поджелудочной железы* образуется ветвями, отходящими от чревного, верхнего брыжеечного, левого почечного и селезеночного сплетений. Только небольшое количество ветвей из селезеночного сплетения следует в сопровождении сосудов железы;

3) *заднее сплетение головки поджелудочной железы*, в которое входит множество ветвей, отходящих от чревного, верхнего брыжеечного и печеночного сплетений. Нервы этих сплетений, направляясь в сторону двенадцатиперстной кишки, соединяются между собой и посыпают ветви к головке железы. Подходя к стенке двенадцатиперстной кишки, часть ветвей направляется к нижней поджелудочно-двенадцатиперстной артерии и об разует вокруг нее сплетение, сопровождающее ее разветвления.

По ходу ветвей заднего сплетения головки поджелудочной железы встречаются небольшие нервные узелки.



### 1095. Нервы ворот легкого; вид сзади (фотография. Препаратор И. Шапиро).

(*Аорта и пищевод перерезаны и оттянуты вверху.*)

1 — пищевод (перерезан и оттянут вверху); 2 — правый блуждающий нерв; 3 — правое легочное сплетение; 4 — правое легкое; 5 — ветвь правого блуждающего нерва на вентральную поверхность пищевода; 6 — ветвь правого блуждающего нерва на дорсальную поверхность пищевода; 7 — перикард; 8 — первое сплетение, образованное ветвями левого и правого блуждающих нервов, расположенного впереди аорты и пищевода; 9 — пищевод; 10 — ветвь левого блуждающего нерва на дорсальную поверхность пищевода; 11 — ветвь левого блуждающего нерва на вентральную поверхность пищевода; 12 — левое легкое; 13 — левое легочное сплетение; 14 — левый блуждающий нерв; 15 — аорта (перерезана и оттянута вверху).

### Нервы селезенки


К селезенке подходит большая часть нервных ветвей (см. рис. 1072, 1078, 1081, 1082) от селезеночного сплетения и в меньшем количестве ветви от левого надпочечникового сплетения и от диафрагмальных узлов.

*Селезеночное сплетение*, *plexus lienalis [splenicus]*, в начальных отделах представляет собой узкопетлистую сеть, окружающую со всех сторон селезеночную артерию. В дальнейшем в сплетении можно различить более крупные и длинные нервы, соединяющиеся между собой рядом коротких ветвей.

На пути к селезенке сплетение отделяет многочисленные ветви к головке и тelu поджелудочной железы и по ходу коротких желудочных артерий — к желудку.

Структура селезеночного сплетения не всегда одинакова, что, по-видимому, зависит от архитектуры сосудов.

По ходу ветвей селезеночного сплетения, особенно в его начальных



отделах, имеются отдельные мелкие узелки и внутриствольные мелкие клетки.

#### **Нервы почек**

К почкам следуют нервы от правого и левого почечных сплетений (см. рис. 1072, 1074, 1075, 1077, 1091). Каждое почечное сплетение, *plexus renalis*, образуется нервами, отходящими от аортально-почечных узлов, нижних отделов чревного сплетения и узлов симпатических стволов (чаще  $T_{12}$ ,  $L_1$ ,  $L_2$ ).

Аортально-почечный узел часто бывает двойным: различают верхний и нижний узлы.

Верхний аортально-почечный узел располагается в верхнем углу, образованном начальной частью почечной артерии и соответствующим краем аорты. К нему подходит ветвь от малого грудного внутренностного нерва, реже — от большого грудного внутренностного нерва или от чревных узлов.

Нижний аортально-почечный узел залегает в нижнем углу, образованном нижним краем начальной части почечной артерии и аортой. Он принимает нижние ветви от малого и низшего грудных внутренностных нервов и иногда ветви от первого поясничного симпатического узла.

#### **1096. Чревное сплетение и нервы двенадцатиперстной кишки (фотография. Препаратор П. Евдокимова).**

(Задняя поверхность головки поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки).

1 — чревное сплетение; 2 — нисходящая часть двенадцатиперстной кишки; 3 — панкреатическое сплетение.

К почечному сплетению, минуя аортально-почечные узлы, подходят ветви грудных внутренностных нервов.

По ходу стволов почечного сплетения имеются небольшие почечные узлы, *ganglia renalia*.

Почечное сплетение соединяется с верхним и нижним брыжеечными сплетениями и с брюшным аортальным сплетением.

От почечного сплетения отходят нервы к сплетениям других органов: к надпочечниковым, мочеточниковому и к яичковому (яичниковому).

#### **Нервы мочевого пузыря**

К мочевому пузырю отходят ветви (рис. 1099; см. рис. 1058, 1072, 1073, 1082) преимущественно от мочепузырного сплетения, *plexus vesicalis*. Сплетение образуется с каждой стороны пузыря ветвями соответствующего нижнего подчревного сплетения, частью ветвей верхнего подчревного сплетения, внутренностными нервами пятого поясничного и первых трех-четырех крестцовых узлов симпатического ствола и внутренностными ветвями первых трех-четырех крестцовых нервов.

Основная часть ветвей мочепузырного сплетения подходит к мочевому

пузырю у места впадения в него мочеточника. Одна группа нервов направляется к верхним отделам пузыря—это верхние пузырные нервы, другая—к нижним отделам пузыря—нижние пузырные нервы. В области впадения мочеточника ветви мочепузырного сплетения образуют петлю, от которой по мочеточнику поднимаются нервы, переходящие в *мочеточниковое сплетение*, *plexus uretericus* (см. рис. 1074, 1083).

Мочепузырное сплетение богато различными по величине и форме нервыми узлами и внутриствольными нервными клетками. Среди узлов сплетения наиболее крупным является узел, располагающийся у места впадения мочеточника; от этого узла следуют ветви к мочевому пузырю, мочеточнику и семявыносящему протоку. Ряд узлов различной величины залегает в области мочепузырного треугольника, меньшее их количество рассеяно по стенкам пузыря. Нервные ветви как от самого мочепузырного сплетения, так и от указанных узлов располагаются в подсерозной клетчатке и, проникая в толщу стенки пузыря, залегают межмышечно, а также в слизистой оболочке.


Мочепузырное сплетение связано множеством соединительных ветвей со средним и нижним прямокишечными сплетениями, сплетением семявыносящего протока, предстательной железы (у мужчин), маточно-влагалищным (у женщин).

### Нервы яичка


К яичку направляются ветви (рис. 1100) от *яичкового сплетения*, *plexus testicularis*, и *сплетения семявыносящего протока*, *plexus deferentialis*. Первое сопровождает яичковую артерию, второе—семявыносящий проток, вблизи ворот яичка они соединяются и в дальнейшем отдают ряд ветвей, проникающих в толщу железы.

### Нервы матки

К матке следуют ветви (рис. 1101; см. рис. 1073, 1075) от общего *маточно-влагалищного сплетения*, *plexus uterovaginalis*. Оно образуется преимущественно нижнепередними отделами нижнего подчревного (газового) сплетения. В нем можно различить отдел, от которого отходят нервы



А



Б


**1097. Нервные узлы и внутриствольные нервные клетки (фотографии. Препараторы Р. Синельникова). (Участки totally окрашенных препаратов.)**

А—верхнее брыжеечное сплетение. Б—панкреатическое сплетение. 1—нервные стволы; 2—внутриствольные нервные клетки; 3—вегетативные узлы; 4—жировая ткань.

к матке, и отдел, посылающий мощные *влагалищные нервы*, *nn. vaginalis*.

Тот отдел маточно-влагалищного сплетения, большинство ветвей которого направляется к матке, образуется несколькими крупными узлами и рядом мелких, располагающихся в некоторых местах сплетения в 2—3 слоя; граница залегания этих узлов не переходит уровня сводов влагалища.

Это относительно крупное сплетение узлов, локализующихся по обеим сторонам матки, залегает в толще хорошо развитой клетчатки так, что



**1098. Внутриорганные нервы печени (фотография). Препаратор А. Азаровой.**

[Печень уложена на верхнюю (диафрагмальную) поверхность, паренхима печени удалена до уровня разветвления воротной вены и печеночной артерии; под отпрепарированные нервы и сосуды для лучшей видимости подложен черный шелк.]

1—левая доля печени; 2—места перекрестов сосудисто-нервных пучков воротной системы с ветвями печеночных вен; 3—группа передних ветвей нервов левой доли; 4—группа ветвей нервов средней части левой доли; 5—группа заднелатеральных ветвей нервов левой доли; 6—группа задних ветвей нервов левой доли; 7—хвостатая доля печени; 8—нервные ветви к хвостатой доле; 9—нижняя полая вена (оттянута книзу); 10—центральная группа ветвей нервов правой доли печени с поперечно идущими ветвями; 11—правая доля печени; 12—ветви печеночной артерии; 13—группа

на нервов, идущих по передней и косой ветвям воротной вены и печеночной артерии; 14—околопузырный нерв правой доли; 15—ворота печени (сосудисто-нервный пучок оттянут кверху); 16—желчный пузырь; 17—квадратная доля печени; 18—нерв по косой вене квадратной доли печени; 19—сети нервов, соединяющих нервы левой доли печени; 20—переднемедиальный нерв левой доли печени.

создается впечатление одного большого узла.

Среди ветвей, отходящих от маточно-влагалищного сплетения и направляющихся к матке, имеются ветви, залегающие в толще широкой связки матки; они достигают маточной трубы и в толще брыжейки яичника — самого яичника. Некоторые из этих ветвей соединяются с ветвями яичникового сплетения, *plexus ovaricus*.

Большая часть ветвей маточно-влагалищного сплетения подходит к латеральному краю матки и распределяется преимущественно по ее передней и задней поверхностям. В начальных своих отделах эти ветви соединяются с ветвями, отходящими от узлов области свода влагалища; в дальнейшем они следуют по длиннику тела матки и достигают ее дна.

### Нервы влагалища

К влагалищу отходят ветви (см. рис. 1075, 1101) от общего маточно-влагалищного сплетения; его нижнепередние отделы получили название *влагалищного сплетения*.

Маточное и влагалищное сплетения представляют собой соединения множества различных по величине и форме узлов и нервных ветвей, образующих относительно густую сеть. Окружая влагалище, *влагалищные нервы, nn. vaginalis*, переходят на его стенки, образуя густую сеть, в петлях которой залегают более мелкие узелки.

Влагалищная часть общего маточно-влагалищного сплетения связана с мочепузырным сплетением, прямыми и кишечными, а через маточный отдел сплетения — также со сплетениями яичников и нервами, окружающими маточные трубы.

### РАЗВИТИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

На ранних стадиях развития эктодерма нервного желобка, а затем и ранней нервной трубы состоит из одного слоя клеток. Затем, в результате митотического деления нейроэпителия, стенка нервной трубы становится многослойной.

По мере дифференцировки нейроэпителия в нем выделяются три слоя. Внутренний — эпендимный слой, из которого развиваются эпендимные клетки, выстилающие центральный канал спинного мозга и стенки желудочков головного мозга. Средний — мантийный (плащевой) — слой богат клетками, из которых образуются нейробласти и спонгиобласти: первые являются источником развития нервных клеток, а вторые — клеток нейроглии. Наружный, краевой, слой беден клетками. Он образован большим количеством отростков клеток и впоследствии становится белым веществом.

Плащевой слой нервной трубы развивается неравномерно. Наиболее интенсивно увеличивается количество нервных клеток в боковых отделах, где затем появляется *пограничная борозда, sulcus limitans*, которая разделяет боковую стенку на заднелатеральную пластинку, *lamina dorsolateralis*, и переднелатеральную пластинку,

*lamina ventrolateralis*. Впоследствии из первой образуются задние столбы серого вещества спинного мозга, а из клеток второй — передние столбы серого вещества.

Масса наружного (краевого) слоя также значительно увеличивается за счет разрастания продольно расположенных отростков нейронов плащевого слоя. Отростки покрыты миелином и образуют белое вещество спинного мозга. Группы волокон белого вещества отделяются друг от друга передними и задними столбами серого вещества, благодаря чему можно различать передние, задние и боковые канатики спинного мозга.

В процессе развития нервной трубы наблюдаются усиленный рост ее боковых отделов и отставание в росте дорсальной и вентральной стенок, при этом утолщенные боковые отделы разделяются пограничной бороздой на две пластинки: основную и крыльевую. Нейробласти основной пластинки образуют двигательные, а крыльевую — чувствительные центры. Между пластинками, в промежуточной зоне, развиваются вегетативные центры.

Неравномерный рост боковых стенок приводит к изменению формы нервной трубы и образованию двух продольных борозд, которые делят спинной мозг на две симметричные половины. Полость трубы по мере развития спинного мозга становится узкой и превращается в центральный канал, выполненный спинномозговой (цереброспинальной) жидкостью.

Вследствие редукции каудальной части спинного мозга образуется тонкий тяж из нервной ткани, который затем становится концевой нитью.

В период внутриутробного развития спинной мозг отстает в темпах роста от позвоночного столба. Так, на третьем месяце внутриутробной жизни спинной мозг занимает весь позвоночный канал, а затем позвоночник растет быстрее, в связи с чем конец спинного мозга перемещается вверху и к моменту рождения находится на уровне III—IV поясничного позвонка.

Головной мозг развивается из расширенного головного отдела нервной трубы, который отличается от туловищного отдела более широкой полостью (см. рис. 871, 873). В результате неравномерного роста этой части трубы образуются выпячивания, которые при посредстве двух пе-

рехватов делятся вначале на три первичных пузыря: передний мозговой пузырь, или *передний мозг, prosencephalon*, средний мозговой пузырь, или *средний мозг, mesencephalon*, и задний мозговой пузырь, или *ромбовидный мозг, rhombencephalon* (см. рис. 869).

В дальнейшем образуется пять мозговых пузырей (см. рис. 870—875), когда передний мозг делится на два пузыря: первый мозговой пузырь, или *конечный мозг, telencephalon*, и второй мозговой пузырь, или *промежуточный мозг, diencephalon*; средний мозг не делится и становится третьим мозговым пузырем; ромбовидный мозг делится на два пузыря, из которых развивается *задний мозг, metencephalon*, и *продолговатый мозг, myelencephalon*.

Одновременно в результате неравномерности роста головного мозга образуется ряд изгибов: теменной — на уровне среднего мозга, мостовой — в области заднего мозга и затылочный — на границе перехода спинного мозга в продолговатый (см. рис. 872, 874).

Развитие серого и белого вещества головного мозга отличается некоторым своеобразием. Так, в спинном мозге серое вещество располагается в центре, а белое — на периферии. В головном мозге нейроны также развиваются около желудочков головного мозга, однако в ряде отделов мозга (конечный мозг и мозжечок) характерна миграция клеток от места своей закладки. В многослойной коре головного мозга большие нейроны, составляющие наиболее внутренний слой, мигрируют первыми, а следующие слои серого вещества образуются более мелкими нейронами, которые мигрируют через другие, уже сформированные слои к периферии.

Вследствие значительного утолщения стенок мозговых пузырей и усложнения рельефа их поверхности меняется форма полости головного конца нервной трубы и образуются желудочки головного мозга, выполненные спинномозговой жидкостью. Желудочки мозга сообщаются между собой и с центральным каналом спинного мозга.

Начальный отдел ромбовидного мозга, его передняя стенка, преобразуется в продолговатый мозг, задняя стенка не дифференцируется, остается тонкой пластинкой и образует нижний мозговой парус. Передняя часть

заднего мозга развивается в мост, а задняя его часть — в мозжечок. Полость ромбовидного мозга превращается в IV желудочек, который посредством отверстия в нижнем мозговом парусе сообщается с подпаутинным пространством.

Кроме того, некоторые авторы выделяют перешеек ромбовидного мозга, представляющий собой на ранних стадиях развития головного мозга наиболее суженную часть, расположенную между ромбовидным и средним мозгом.


*Средний мозг, mesencephalon*, а именно его дорсальная стенка, образует крышу среднего мозга или четверохолмие, а вентральная — ножки мозга. Полость среднего мозга превращается в узкий канал — водопровод мозга, через который сообщаются III и IV желудочки.

*Промежуточный мозг, diencephalon*, отличается интенсивным развитием своих боковых стенок, из которых образуются таламусы. Вентральная его стенка идет на построение гипоталамуса, а из дорсальной стенки развивается шишковидное тело. На большем своем протяжении дорсальная стенка остается недифференцированной и образует эпителиальную пластинку. Полость промежуточного мозга превращается в узкую сагиттально расположенную щель между таламусами — III желудочек, который сообщается с боковыми желудочками.

*Конечный мозг, telencephalon*, образует полушария большого мозга, покрывающие все остальные мозговые пазухи (отсюда название «плащ»), а полость его превращается в два боковых желудочка.

Неравномерное развитие различных отделов полушарий приводит к появлению на их поверхности борозд и извилин (см. рис. 876, 877), причем раньше всех появляются центральная и латеральная борозды и некоторые другие, которые отличаются наибольшим постоянством. По мере роста полушарий углубляется продольная щель большого мозга. В основании полушарий развиваются скопления серого вещества — базальные ядра.

Двигательные корешки спинномозговых нервов развиваются из нервной пластиинки, которая по мере замыкания ее в мозговую трубку становится трехслойной. Средний слой представляет собой скопления нейро-



**1099. Нервы мочевого пузыря и семенных пузырьков. (Задняя поверхность.) (Рисунок с препарата с окрашенными нервами. Препарат Р. Синельникова.)**



бластов, дающих начало серому веществу спинного мозга. Пучки из аксонов распространяются или в толще наружного слоя нервной пластиинки, образуя белое вещество мозга, или покидают пределы мозговой трубы и образуют метамерно расположенные передние корешки, а нейриты, образующие их, врастает в мезодерму, где соединяются с миобластами.

Чувствительные корешки возникают из зачатков спинномозговых узлов, располагающихся по краям медуллярной бороздки. После смыкания мозговой трубы образуются два нейральных гребня, которые посегментно перешнуровываются и на дорсальной стороне зародыша образуют два ряда спинномозговых узлов. Нейробласты, лежащие в них, приобретают вид биполярных нервных клеток; одни отростки их врастает в мозговую трубку и формируют задний корешок, а другие разрастаются вентрально и на 5—6-й неделе сливаются с передними корешками, в результате чего образуются смешанные спинномозговые нервы.

Черепные нервы имеют различное происхождение. Обонятель-

**1100. Нервы яичка, правого.**  
 (Медиальная поверхность.)  
 (Препаратор Б. Нейгаса.)  
 (Оболочки вскрыты и частично  
 удалены.)

**1101. Нервы матки и влагалища.**  
 (Задняя поверхность.) (Рисунок  
 с препарата с окрашенными  
 нервами. Препаратор А. Журавлева.)



ный и зрительный нервы являются по существу продолжением трактов головного мозга; они развиваются из переднего мозга, являясь его выростами. Остальные черепные нервы дифференцируются из спинномозговых. Последние утрачивают свое сегментарное строение, и превращение спинномозговых нервов в черепные связано с развитием органов чувств и жаберных дуг с принадлежащей им мускулатурой. Кроме того, для черепных нервов характерны отсутствие соединений между корешками, а также редукция какого-либо из них, в связи с чем эти нервы являются высокоспециализированными. Так, III, IV, VI пары соответствуют передним корешкам и являются двигательными; V, VII, VIII, IX, X, XI и XII пары представляют собой гомологи задних корешков, они связаны с мышцами, развивающимися из жаберного аппарата. Кроме того, такие нервы, как X и XII пары, являются более сложными по своему происхождению, так как включают в себя несколько спинномозговых нервов.

Центры вегетативной нервной системы в головном и спинном мозге образуются в результате размножения и дифференцировки нейробластов мозговых пузьрей и нервной трубы. Их нейриты по мере роста следуют в составе передних корешков на периферию, где устанавливают связь с узлами симпатического ствола, которые располагаются по бокам позвоночного столба. Узлы симпатического ствола образуются из нейробластов ганглиозной пластинки, мигрирующих по ходу передних корешков спинномозговых нервов. Позднее осуществляется миграция клеток из паравертебральных ганглиев далее на периферию, в результате чего образуются узлы и сплетения вокруг крупных сосудов.

Сходным путем происходит развитие вегетативного отдела нервной системы в области головы. Нейробласты из продолговатого мозга и ганглиозной пластинки мигрируют вдоль ветвей тройничного, блуждающего и других нервов, концентрируясь по их ходу или образуя интрамуральные ганглии.

После рождения как центральная, так и периферическая нервная система претерпевает ряд изменений.

Так, спинной мозг новорожденного имеет ряд особенностей, отличающих его от спинного мозга взрослого. Это относится к его положению в позвоночном канале, длине, ширине, массе, величине отдельных сегментов, развитию щелей и борозд, положению корешков спинномозговых нервов. Имеются некоторые особенности в строении белого и серого вещества спинного мозга. Нижней границей спинного мозга является у новорожденного III поясничный позвонок (у взрослого — I или верхний край II поясничного позвонка). Масса спинного мозга при рождении составляет 3—4 г, к 6 мес почти удваивается, к году — утраивается, к 6 годам достигает 16 г и к 20 годам равна массе спинного мозга взрослого. Длина спинного мозга новорожденного до 15 см, к 10 годам она почти удваивается. Шейное и пояснично-крестцовое утолщения, которые организуются на III месяце внутриутробной жизни одновременно с развитием конечностей, хорошо выражены. Различные участки спинного мозга в процессе роста развиваются неодинаково: больше всего увеличивается грудной отдел, затем шейный и только потом поясничный. После 6 лет спинной мозг растет в поперечном диаметре. Ряд борозд, появляющихся на спинном мозге новорожденного, углубляясь, остается на всю жизнь, некоторые борозды после рождения исчезают.

Особенности головного мозга новорожденного обусловлены недостаточным развитием и слабой дифференцировкой нервной системы. Кора больших полушарий имеет все основные борозды и извилины, однако все они недостаточно резко ограничены: борозды неглубокие, извилистость очень слабая. Имеются указания, что борозды и извилины второго и главным образом третьего порядка развиваются после рождения, особенно интенсивно в течение первого года жизни, а те, которые были у новорожденного, углубляются, становятся более резко выраженными.

У новорожденного по сравнению со взрослым затылочная доля боль-

ших полушарий имеет относительно большие размеры. Число извилин, их форма, топографическое положение претерпевают изменения по мере роста ребенка, причем наибольшие в течение первых 5—6 лет. Лишь к 15—16 годам отмечаются те взаимоотношения, которые характерны для взрослых. Мозжечок у новорожденного несколько уплощен и удлинен, борозды его полушарий также слабо выражены; более развита средняя часть мозжечка — червь.

Масса мозга у новорожденного 380—400 г, т. е. составляет в среднем  $\frac{1}{8}$  массы тела. К концу первого года жизни удваивается и составляет  $\frac{1}{11}$ — $\frac{1}{12}$  массы тела, к 3 годам утраивается, к 5 годам составляет  $\frac{1}{13}$ — $\frac{1}{14}$  массы тела, к 20 годам увеличивается в 4—5 раз.

У взрослого человека масса мозга равна  $\frac{1}{40}$  массы тела.

Одна из особенностей возрастных изменений нервов — их миелинизация. Этот процесс протекает неодинаково в различных нервах: раньше всех миелинируются двигательные нервы, затем смешанные и последними чувствительные. Это относится как к черепным, так и к спинномозговым нервам; в последних раньше миелинируются передние, двигательные корешки, а затем чувствительные.

Имеются указания, что к моменту рождения наиболее миелинизирован преддверно-улитковый нерв. Вообще степень функционирования нерва до известной степени определяется интенсивностью образования миelinовой оболочки. Подобный процесс протекает в зрительном нерве, где в первые дни после рождения усиленно миелинируются волокна. После рождения процесс миелинизации продолжается, проявляя некоторую последовательность в отношении двигательных нервов: лицевой, подъязычный, отводящий, третья ветвь тройничного нерва, глазодвигательный — и в отношении чувствительных нервов: преддверно-улитковый, первая и вторая ветви тройничного, блуждающий, языкоглоточный, зрительный. Миелинизация черепных нервов осуществляется в течение первых 3—4 мес и заканчивается на втором году жизни. Миелинизация спинномозговых нервов продолжается до 3 лет.

# УЧЕНИЕ 2 ОБ ОРГАНАХ ЧУВСТВ ЭСТЕЗИОЛОГИЯ

Орган зрения—Organum visus  
256

Преддверно-улитковый орган—  
Organum vestibulocochleare  
275

Орган вкуса—Organum gustus  
299

Орган обоняния—Organum olfactus  
300

Общий покров—Integumentum commune  
300

**Органы чувств, *organa sensuum* [sensoria]**, или анализаторы, представляют собой сложные нервные приборы, специализированные на восприятие, проведение и анализ нервного возбуждения.

Различные раздражения, исходящие от внешней и внутренней среды организма, воспринимаются рядом рецепторов (экстерорецепторы, интэрорецепторы и проприорецепторы), каждый из которых трансформирует определенное раздражение в нервный импульс.

Возбуждение, возникающее в рецепторе, передается по нервным проводникам к промежуточным центрам, лежащим либо в спинном мозге, либо в стволовой части головного мозга. Здесь имеется связь аффекторных нейроцитов между собой и с эффекторными нейроцитами.

Из промежуточных нервных центров нервное возбуждение передается в кору головного мозга, где происходят высший анализ и синтез возбуждения, возникшего в рецепторе.

Периферический рецептор и нервные проводники, а также нервные центры спинного мозга, мозгового ствола и соответствующие участки коры головного мозга функционально связаны между собой в единую систему анализаторов.

Анализаторы возникли вследствие необходимости быстрой и адекватной реакции организма на раздражители внешней среды. При этом часть анализаторов специализировалась как дистантные (органы обоняния, зрения и слуха), а часть — как контактные (органы вкуса и общей кожной чувствительности).

С анатомо-функциональных позиций каждый анализатор делится на три отдела: 1) периферический; 2) проводниковый и 3) центральный.

Периферический отдел анализатора (рецепторное поле) воспринимает раздражение и трансформирует его в нервное возбуждение. Последнее передается в центр — ядро анализатора. Ядра анализаторов расположены в коре конечного мозга (корковые ядра анализаторов). Проводниковый отдел представлен чувствительными черепными и спинномозговыми нервами.

Периферический отдел каждого анализатора, т. е. рецептор, воспринимает только определенные виды раздражений, вызываемые адекватными раздражителями. Рецепторы

могут возбуждаться под сильным влиянием неспецифических для них, т. е. неадекватных, раздражителей, но возникающее при этом ощущение мадодифференцированно, элементарно и примитивно.

Периферические нервные приборы каждого анализатора вместе со вспомогательными образованиями, обеспечивающими им лучшее восприятие раздражений, называются *органами чувств*.

Учение об органах чувств получило название эстезиологии.

В анатомии изучают следующие органы чувств:

1) орган зрения, *organum visus [visuale]*;

2) орган слуха и равновесия, или преддверно-улитковый орган, *organum vestibulocochleare*:

3) орган вкуса, *organum gustus [gustatorium]*;

4) орган обоняния, *organum olfactus [olfactorium]*;

5) органы кожного чувства, воспринимающие температурные, тактильные и болевые раздражения.

Указанные органы чувств несут в себе рецепторы, воспринимающие раздражения внешнего мира (экстерорецепторы).

Интерорецепторы и проприорецепторы, сигнализирующие о состоянии внутренней среды организма (внутренние органы, мышцы и т. д.), рассматриваются в учебниках гистологии.

## ОРГАН ЗРЕНИЯ

**Орган зрения, *organum visus [visuale]***, или **глаз, *oculus***, состоит из глазного яблока, зрительного нерва и вспомогательных органов глаза: век, слезного аппарата, мышц глазного яблока, сосудов и нервов.

## ГЛАЗНОЕ ЯБЛОКО

**Глазное яблоко, *bulbus oculi*** (рис. 1102—1104), имеет неправильную шаровидную форму. Для осмотра доступен только его передний — меньший — отдел; остальная, большая его часть, залегает в глубине глазницы.

Основную массу глазного яблока образует прозрачное содержимое, в состав которого входит стекловидное тело, хрусталик и водянистая влага. Содержимое глазного яблока

окружено со всех сторон тремя оболочками:

1) наружная — **фиброзная оболочка глазного яблока, *tunica fibrosa bulbi***;

2) средняя — **сосудистая оболочка глазного яблока, *tunica vasculosa bulbi***;

3) внутренняя — **чувствительная оболочка глазного яблока (сетчатка), *tunica sensoria bulbi***.

В глазном яблоке различают: **передний полюс, *polus anterior***, — наиболее выпуклая точка его передней поверхности, и **задний полюс, *polus posterior***, в центре заднего сегмента глазного яблока, несколько кнаружи от места выхода зрительного нерва.

Расстояние между передним и задним полюсами глазного яблока является его наибольшим размером и равно в среднем 24 мм.

Линию, соединяющую оба полюса глазного яблока, называют **наружной осью глазного яблока, *axis bulbi externus*** (геометрическая, сагиттальная, ось глаза).

От наружной оси следует отличать **внутреннюю ось глазного яблока, *axis bulbi internus***. Она равна 21,3 мм и соединяет точку внутренней поверхности фиброзной оболочки, соответствующую ее переднему полюсу, с точкой на сетчатке, соответствующей заднему полюсу глазного яблока.


Наибольший поперечный размер глазного яблока в среднем равен 23,6 мм, а вертикальный — 23,3 мм.

Линия, соединяющая точки наибольшей окружности глазного яблока во фронтальной плоскости, называется **экватором, *equator***. Линии, проведенные перпендикулярно экватору и соединяющие на поверхности яблока оба его полюса, носят название **меридианов, *meridiani***. Вертикальный и горизонтальный меридианы делят глазное яблоко на квадранты.

## Фиброзная оболочка глазного яблока

Наружная оболочка — **фиброзная оболочка глазного яблока, *tunica fibrosa bulbi*** (рис. 1105; см. рис. 1102—1104) — самая прочная из всех трех оболочек. Благодаря ей глазное яблоко сохраняет присущую ему форму.

Передний, меньший, отдел наружной оболочки глазного яблока ( $\frac{1}{6}$  всей оболочки) носит название **роговой оболочки, или роговицы, *cornea***. Роговица является наиболее выпуклой частью глазного яблока и имеет



1102. Глазное яблоко, *bulbus oculi*,  
правое (полусхематично).  
(Горизонтальный разрез.)


вид часового стекла, обращенного своей выпуклой поверхностью назад. В ней различают свободную *переднюю поверхность, facies anterior*, и *заднюю поверхность, facies posterior*, обращенную в переднюю камеру глазного яблока. Наиболее выступающая часть передней поверхности роговицы — *вершина роговицы, vertex cornea*. Периферические отделы роговицы имеют толщину 1,0—1,2 мм, центральный — 0,8—0,9 мм. Горизонтальный диаметр роговицы равен 11—12 мм, вертикальный составляет 10,5—11,0 мм.

Роговица состоит из прозрачной стромы, образующей *собственное вещество роговицы, substantia propria cornea* (см. рис. 1105). К строме с передней и задней поверхностей прилегают *передняя и задняя пограничные пластинки, laminae limitantes anterior et posterior*. Первая является видоизмененным основным веществом ро-

**1103. Глазное яблоко, bulbus oculi, сосудистая оболочка, choroidea.  
(Наружная поверхность.)  
(Часть склеры и роговицы  
разрезана и отвернута.)**

говицы, вторая — производным эндотелия, покрывающего заднюю поверхность роговицы и выстилающего всю переднюю камеру глаза. Эти пограничные пластинки покрыты соответственно *передним и задним эпителием, epithelium anterius et posterius*. Эпителий, покрывающий переднюю поверхность роговицы, без резких границ переходит в фиброзную оболочку глазного яблока. Роговица вследствие гомогенности ткани и отсутствия кровеносных и лимфатических сосудов совершенно прозрачна.

Задний, больший, отдел наружной оболочки глазного яблока ( $\frac{3}{6}$  всей оболочки) составляет *скlera, sclera*. Она является непосредственным продолжением роговицы; наружной границей между склерой и роговицей служит *борозда склеры, sulcus sclerae* (см. рис. 1104, 1105). В этой области располагаются элементы дренажной системы глаза — *трабекулярная се-*



точка [зубчатая связка], *reticulum trabeculare* [*ligamentum pectinatum*]. В отличие от роговицы склеры образована волокнами плотной соединительной ткани с примесью эластических и коллагеновых волокон и непрозрачна. Склера переходит в роговицу постепенно. Коллагеновые волокна склеры, оканчивающиеся у эндотелия роговицы, образуют *роговично-склеральную часть*, *pars corneoscleralis*. На границе между ними имеется полуопозрачный ободок — лимб [край] роговицы, *limbus cornae*.


Склеру составляют *собственное вещество склеры*, *substancia propria sclerae*, передняя поверхность которого покрыта *энсклеральной пластинкой*, *lamina episcleralis*, а внутренняя — *темной пластинкой склеры*, *lamina fusca sclerae*.


Наружная поверхность склеры в переднем отделе покрыта соединительнотканной оболочкой, или *конъюнк-*

*тивой, tunica conjunctiva*, а в заднем — только эндотелием. Внутренняя поверхность склеры, обращенная к сосудистой оболочке, также покрыта эндотелием. Эта большая часть склеры получила название *сосудисто-оболочечная* [*uveальная*] часть, *pars uvealis*.

Толщина склеры одинакова не на всем протяжении. Наиболее тонким участком является то место, где склеру прободают волокна выходящего из глазного яблока зрительного нерва. Здесь образуется *решетчатая пластинка склеры*, *lamina cribrosa sclerae*. Наибольшую толщину склеры имеет в окружности зрительного нерва — от 1,0 до 1,5 мм; кпереди толщина ее уменьшается, достигая у экватора 0,4—0,5 мм; соответственно области прикрепления мышц она снова увеличивается до 0,6 мм. Кроме волокон зрительного нерва, склеру во многих местах прободают артериальные и венозные сосуды и нервы.

#### 1104. Сагиттальный разрез глазницы и глазного яблока.





### 1105. Переднебоковая часть глазного яблока. (Горизонтальный разрез.)

В толще переднего отдела склеры, вблизи края роговицы, на всем его протяжении залегает циркулярно идущий венозный синус склеры, *sinus venosus sclerae* (см. рис. 1105).

#### Сосудистая оболочка глазного яблока

Средняя оболочка — **сосудистая оболочка глазного яблока**, *tunica vasculosa bulbi* (рис. 1106—1108; см. рис. 1102—1105), делится на три неравные части:

1) задняя, большая, часть выстилает  $\frac{2}{3}$  внутренней поверхности склеры и называется *собственно сосудистой оболочкой*, *choroidea*;

2) средняя часть располагается на границе между склерой и роговицей — это *ресничное тело*, *corpus ciliare*;

3) передняя, меньшая, часть просвечивает через роговицу — это *радужная оболочка*, или *радужка*, *iris*.

#### Собственно сосудистая оболочка глазного яблока

**Собственно сосудистая оболочка глазного яблока**, *choroidea*, в передних отделах без резких границ переходит в *ресничное тело*. Границей между ними может служить зубчатый край сетчатки.

Собственно сосудистая оболочка почти на всем протяжении покрыта *надсосудистой пластинкой*, *lamina suprachoroidea*, включающей эндотелий и *пигментный эпителий*, *epithelium pigmentorum*. Вместе с внутренней поверхностью склеры эта пластина ограничивает капиллярное *околососудистое пространство*, *spatium perichoroideale*.

В области диска зрительного нерва сосудистая оболочка имеет отверстие, через которое волокна зрительного нерва выходят из глазного яблока.

Собственно сосудистая оболочка состоит из слоя крупных сосудов — *сосудистой пластиинки*, *lamina vasculosa*, преимущественно вен, между которыми располагаются соединительнотканые волокна (главным образом эластические) и пигментные клетки. Глубже этого слоя залегает слой средних сосудов, менее пигментированный, к которому прилегает густая сеть мелких сосудов и капилляров, образующих *сосудисто-капиллярную пластиинку*, *lamina choroidocapillaris*. Капиллярная сеть особенно хорошо развита в области пятна сетчатки.

Самой глубокой частью собственно сосудистой оболочки является волокнистый бесструктурный слой, называ-

смый базальной пластинкой, *complexus [lamina] basalis*. Сосудистая оболочка в переднем отделе несколько утолщается и без резких границ переходит в ресничное тело.

### Ресничное тело

**Ресничное тело**, *corpus ciliare* (см. рис. 1102, 1104—1107), со стороны внутренней поверхности покрыто базальной пластинкой, *lamina basalis*, являющейся продолжением того же листка собственно сосудистой оболочки.


Основную массу ресничного тела составляют ресничная мышца и строма ресничного тела, состоящая из рыхлой, богатой пигментными клетками соединительной ткани и большого количества сосудов.

В ресничном теле различают ресничную мышцу, ресничный венец и ресничный кружок.

**Ресничная мышца**, *m. ciliaris* (см. рис. 1102, 1105), занимает наружный отдел ресничного тела и непосредственно прилегает к склере. Мышица образована гладкими мышечными волокнами, среди которых различают наружные—меридиональные (продольные) волокна, *fibrae meridionales (longitudinales)*, средние радиальные волокна, *fibrae radiales*, и внутренние циркулярные волокна, *fibrae circulares*.


Меридиональные волокна сильно развиты и образуют мышцу, натягивающую собственно сосудистую оболочку; волокна этой мышцы начинаются от угла передней камеры глазного яблока и от склеры и, направляясь кзади, теряются в сосудистой оболочке. Во время сокращения мышцы подтягиваются вперед передняя часть собственно сосудистой оболочки и задняя часть ресничного тела, при этом уменьшается напряжение ресничного пояска, *zonula ciliaris* (см. рис. 1108).

Круговые волокна принимают участие в образовании круговой мышцы; ее сокращение уменьшает просвет кольца, образуемого ресничным телом, и тем самым приближает место фиксации ресничного пояска к экватору хрусталика. Сокращение вызывает расслабление указанного пояска и увеличение кривизны хрусталика, благодаря чему круговая часть ресничной мышцы получила название мышцы, сжимающей хрусталик.



1106. Сосудистая оболочка, *choroidea*, глазного яблока; передний отдел. (Наружная поверхность.)  
(Большая часть склеры удалена.)

1107. Сосудистая оболочка, *choroidea*, глазного яблока; передний отдел. (Внутренняя поверхность.)



**Ресничный кружок, orbiculus ciliaris** (см. рис. 1107), представляет собой задневнутренний отдел ресничного тела. Он имеет дугообразную форму, переднюю поверхность и без резких границ продолжается кзади в собственно сосудистую оболочку.

**Ресничный венец, corona ciliaris** (см. рис. 1107), занимает передневнутренний отдел ресничного тела. В нем различают радиально идущие небольшие **ресничные складки, plicae ciliares**; кпереди они переходят в **ресничные отростки, processus ciliares**, которых около 70. Они свободно свишают в полость задней камеры глазного яблока. Место перехода поверхности ресничного кружка в ресничный венец имеет вид закругленного края. Этот край является местом прикрепления ресничного пояска, фиксирующего хрусталик.

### Радужка


**Радужка, iris** (см. рис. 1102—1108), представляет собой самый передний отдел сосудистой оболочки. В отличие от остальных отделов радужка непосредственно не прилегает к фиброзной оболочке глазного яблока, а, являясь продолжением переднего отдела ресничного тела, располагается во фронтальной плоскости на некотором отдалении от роговицы.

В центре радужки имеется круглое отверстие — зрачок, pupilla. Зрачок ограничен свободным **зрачковым краем, margo pupillaris**, радужной оболочки. Противоположный край радужки, идущий по всей ее окружности, носит название **ресничного края, margo ciliaris**. Он фиксирован у фиброзной оболочки посредством **гребенчатой связки радужно-роговичного угла, lig. pectinatum anguli iridocornealis**, в толще которой находятся щелевидные пространства **радужно-роговичного угла, spatia anguli iridocornealis**.

Радужка состоит из рыхлой соединительной ткани, сосудов, гладких мышц, множества нервных волокон.

В **строме радужки, stroma iridis**, различают **бессосудистый слой, stratum non vasculosum** (соединительный), и **сосудистый слой, stratum vasculosum**.

Гладкие мышцы радужной оболочки располагаются в двух направлениях: круговом и радиальном. Круговой слой залегает в окружности зрачка и образует **сфинктер зрачка, sphincter pupillae** (см. рис. 1105). Радиально расположенные мышечные волокна образуют **дилататор зрачка, dilatator pupillae**.



**1108. Глазное яблоко, bulbi oculi, правое; вид сверху (схема). (Горизонтальный разрез. Расположение артерий и вен в глазном яблоке.)**

*m. sphincter pupillae* (см. рис. 1105). Радиально расположенные мышечные волокна образуют дилататор зрачка, *dilatator pupillae*.

Передняя поверхность радужки, *facies anterior*, несколько выпуклая кпереди. На передней поверхности радужки в окружности зрачка выделяют внутреннее **малое кольцо радужки, anulus iris minor**, или зрачковую часть, ограниченную снаружи циркулярно идущей неправильной зубчатой линией. Ширина этой части радужки достигает 1 мм.

Остальная часть передней поверхности радужки имеет ширину 3—4 мм и относится к наружному **большому кольцу радужки, anulus iris major**.

**1109. Дно глаза, правого. (При исследовании глазным зеркалом, офтальмоскопия.)**

**1110. Строение сетчатой оболочки глаза (схема).**

1—stratum pigmentosum retinae; 2—слои колбовидных и палочковидных зрительных клеток; 3—membrana limitans gliae externa; 4—stratum granulosum externum; 5—stratum plexiforme externum retinae; 6—stratum granulosum internum; 7—stratum plexiforme internum; 8—stratum ganglionare; 9—stratum fibrarum nerveatum; 10—membrana limitans interna; 11—corpus vitreum.

major, или ресничной части. На поверхности ресничной части радужки имеются непостоянныес углубления, представляющие собой ряд радиальных складок, а также небольшое число круговых складок радужки, *plicae iridis*.



Задняя поверхность, *facies posterior*, соответственно вогнута и покрыта пигментным эпителием, *epithelium pigmentosum*, который обуславливает цвет глаз.


#### Внутренняя [чувствительная] оболочка глазного яблока

Внутренняя [чувствительная] оболочка глазного яблока, *tunica interna [sensoria] bulbi*, называемая сетчаткой, *retina* (рис. 1109—1110; см. рис. 1102, 1105, 1108), имеет сложное строение. Наружная ее поверхность на всем протяжении прилегает к сосудистой оболочке, а внутренняя — к стекловидному телу.

В сетчатке различают две неравные части: большую заднюю, воспринимающую световые раздражения, — это зрительная часть сетчатки, *pars optica retinae* (см. рис. 1102, 1105). Она простирается до ресничного тела и оканчивается зубчатым краем, *ora serrata*, сетчатки, и меньшую переднюю, не содержащую светочувствительных элементов. Она соответственно частям сосудистой оболочки делится на ресничную и радужную части сетчатки.

Зрительная часть сетчатки состоит из слоев, различимых лишь микроскопически. Наружный слой зрительной части сетчатки — пигментная часть, *pars pigmentosa*, анатомически более тесно связан с сосудистой оболочкой и рыхло — с остальной





частью сетчатки. Поэтому при вскрытии глазного яблока вслед за истечением стекловидного тела происходит отслойка сетчатки без пигментной части.

**Внутренняя нервная часть, pars nervosa,** состоит из ряда слоев (см. рис. 1110): 1) **фотосенсорный слой, stratum photosensorium**, прилежит к пигментной части и содержит **фоторецепторы, photoreceptores**, представленные верхушечными частями палочковидных зрительных клеток, *cellulae opticae bacilliformes* (световоспринимающих), и колбочковидных зрительных клеток, *cellulae opticae coniformes* (цветовоспринимающих); 2) **наружная глиальная пограничная мембрана, membrana limitans gliae externum**; 3) **наружный ядерный слой, stratum nucleare externum**, образован теми частями колбочек и палочек, в которых залегают ядра; 4) **наружный сетчатый слой, stratum plexiforme externum**, содержит концевые сферулы палочек и ножки колбочек; 5) **внутренний ядерный слой, stratum nucleare internum**, 6) **внутренний сетчатый слой, stratum plexiforme internum**; 7) **гангиозный слой, stratum ganglionare**; 8) **слой нервных волокон, stratum neurofibrarum** (волокна зри-

### 1111. Ход волокон и связей зрительного нерва (полусхематично). (Проекция волокон на поверхность полушария.)

тельного нерва); 9) **внутренний пограничный слой, stratum limitans internum**, окружает слой нервных волокон и прилегает к стекловидному телу.

На поверхности зрительной части сетчатки заметно хорошо выраженное овальное возвышение — **диск зрительного нерва, discus nervi optici** (см. рис. 1102, 1109). Здесь собираются аксоны мультиполярных нервных клеток сетчатки, которые, прободая склеру, образуют ствол зрительного нерва.

Дальнейший путь проведения нервных импульсов до коркового конца зрительного анализатора (рис. 1111) подробно описан в разделе «Черепные нервы» (см. «Зрительный нерв»).

В центре диска зрительного нерва имеется углубление **диска, excavatio disci** (см. рис. 1102), являющееся местом входа и выхода сосудов, кровоснабжающих сетчатку. В области диска находится участок сетчатки, лишенный светочувствительных элементов (так называемое слепое пятно). На 3—4 мм кнаружи от диска зрительного нерва в сетчатке имеется пятно, *macula* (см. рис. 1110), — место наилучшего видения (ранее его называли «желтое пятно»). Глазное яблоко всегда устанавливается в такое положение

жение, чтобы рассматриваемый предмет находился на продолжении зрительной оси, *axis opticus*, соединяющей центр роговицы с пятном сетчатки. Пятно имеет форму круга или овала с небольшим углублением в центре—центральной ямкой, *fovea centralis* (см. рис. 1102, 1109). В области пятна располагаются только колбочки. Задние отделы зрительной части сетчатой оболочки содержат множество колбочек и палочек; переди число колбочек уменьшается и у зубчатого края сетчатки они отсутствуют.

Часть сетчатки, которая выстилает внутреннюю поверхность ресничного тела—ресничная часть сетчатки, *pars ciliares retinae*, и заднюю поверхность радужки—радужковая часть сетчатки, *pars iridica retinae*, состоит из двух слоев: наружного и внутреннего. Наружный пигментный слой является продолжением пигментной части сетчатки, а внутренний состоит из эпителиальных клеток и содержит пигмент.

Указанные слои сетчатки здесь соединены более прочно, чем в области зрительной части сетчатки, и переходят один в другой в области зрачкового края радужки.

### Светопреломляющие среды глазного яблока

Светопреломляющие среды глазного яблока составляют прозрачное ядро глаза. Сюда относятся стекловидное тело, хрусталик и водянистая влага в передней и задней камерах. Первые два образования заполняют стекловидную камеру глазного яблока, *camera vitrea bulbi*.

**Стекловидное тело**, *corpus vitreum* (см. рис. 1103, 1105), снаружи покрыто тонкой прозрачной стекловидной мембраной, *membrana vitrea*, и занимает большую часть полости глазного яблока. Оно состоит из совершенно прозрачной студенистой массы, лишенной сосудов и нервов,—стекловидной стромы, *stroma vitreum*. В ее состав входят нежная сеть переплетающихся тонких волокон и богатая белками жидкость—стекловидная влага, *humor vitreus*. Передняя поверхность стекловидного тела обращена к задней поверхности хрусталика и несет на себе соответственно ее форме чашеобразную стекловидную ямку, *fossa hyaloidea*. К ней подходит стекловидный канал, *canalis hyaloideus*,

представляющий собой остаток сосудисто-эмбриональной ткани. В канале иногда залегает артерия стекловидного тела, *a. hyaloidea*.

Остальная часть стекловидного тела прилегает к внутренней поверхности сетчатки и ее форма приближается к шаровидной.

**Хрусталик**, *lens*, имеет форму двояковыпуклой линзы (см. рис. 1102, 1104, 1107). Задняя поверхность хрусталика, *facies posterior lentis*, более выпуклая, прилежит к стекловидному телу, а передняя поверхность, *facies anterior lentis*, обращена к радужке.

Различают передний и задний полюсы хрусталика, *polus anterior et posterior lentis*,—наиболее выпуклые центральные точки передней и задней его поверхностей.

Линия, соединяющая передний и задний полюсы хрусталика, носит название оси хрусталика, *axis lentis*, и равна в среднем 3,6 мм.

**Вещество хрусталика**, *substancia lentis*, совершенно прозрачно и, так же как стекловидное тело, не содержит сосудов и нервов.

Основная масса хрусталика состоит из волокон хрусталика, *fibrae lentis*, представляющих собой вытянутые в длину шестиугольные эпителиальные клетки.

Периферические отделы хрусталика покрыты со стороны его передней и задней поверхностей капсулой хрусталика, *capsula lentis*. Последняя представляет собой гомогенную прозрачную оболочку, более толстую на передней поверхности хрусталика, где под ней располагается эпителий хрусталика, *epithelium lentis*.

Вещество хрусталика имеет неодинаковую плотность: в центре оно более плотное и носит название ядра хрусталика, *nucleus lentis*, а по периферии менее плотное—это кора хрусталика, *cortex lentis*.

Хрусталик, располагаясь между стекловидным телом и радужкой, фиксируется своим периферическим закругленным краем, называемым экватором хрусталика, *equator lentis*, к ресничному телу посредством натянутых тонких волокон пояска, *fibrae zonulares*. Они внутренним концом вплетаются в капсулу хрусталика, а наружные концы начинаются от ресничного тела. Совокупность указанных волокон образует вокруг хрусталика связку—ресничный поясок, *zonula ciliaris* (см. рис. 1102, 1105). Между волокнами ресничной связки

находятся лимфатические пространства пояска, *zonula zonularia*.

**Водянистая влага**, *humor aquosus*,—прозрачная бесцветная жидкость, заполняет переднюю и заднюю камеры глазного яблока—щелевидные полости, располагающиеся впереди и позади радужки.

**Задняя камера глазного яблока**, *camera posterior bulbi* (см. рис. 1102, 1104, 1105), ограничена сзади передней поверхностью хрусталика, ресничным пояском и ресничным телом; впереди—задней поверхностью радужки. В полость задней камеры свободно свисают ресничные отростки. Задняя камера сообщается с пространствами пояска, *spatia zonularia*.

**Передняя камера глазного яблока**, *camera anterior bulbi*, образована спереди задней вогнутой поверхностью роговицы, сзади—передней поверхностью радужки.

Передняя и задняя камеры глазного яблока сообщаются между собой через зрачок.


Водянистая влага продуцируется сосудами ресничного тела и радужки. Отток водянистой влаги осуществляется по следующим путям: из задней камеры водянистая влага поступает в переднюю, откуда через пространства радужно-роговичного угла оттекает в систему извитых вортикоидных вен. Кроме того, из названных камер влага может оттекать в венозный синус склеры, откуда в составе венозной крови поступает в ресничные и конъюнктивальные вены.

### ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГЛАЗА


К **вспомогательным органам глаза**, *organa oculi accessoria*, относят брови, веки, конъюнктиву, слезный аппарат и мышцы глазного яблока.

### Веки


**Веки**, *palpebrae* (греч. *blepharon*), верхнее веко, *palpebra superior*, и нижнее веко, *palpebra inferior* (рис. 1112—1117), представляют собой складки кожи, ограничивающие спереди глазное яблоко. Когда веки сомкнуты, они полностью закрывают глазное яблоко; при разомкнутых веках их края ограничивают щель век (глазная щель), *rima palpebrarum*; верхнее веко больше нижнего.




**1112. Веки, palpebrae, правый глаз; вид спереди.  
(Веки в сомкнутом состоянии, передняя поверхность век.)**



**1113. Веки, palpebrae, правый глаз; вид спереди.  
(Глазная щель открыта.)**



**1114. Веки, palpebrae, правый глаз; вид спереди.  
(Верхнее веко сильно оттянуто  
кверху, нижнее веко отвернуто,  
виден нижний свод конъюнктивы.)**



**1115. Верхний и нижний хрящи век, tarsi palpebrarum superior et inferior, правый глаз; вид спереди.  
(Кожа и круговая мышца глаза  
удалены.)**

В каждом веке различают переднюю и заднюю поверхности век и два края, образующие щель век.



*Передняя поверхность века, facies anterior palpebrae*, как верхнего, так и нижнего, выпуклая и покрыта кожей, в которой залегает множество сальных и потовых желез. Верхнее веко вверху ограничено бровью, supercilium. Бровь представляет собой валикообразное возвышение кожи вдоль верхнего края глазницы. Она более выпуклая в медиальных отделах и истончается в наружных. Поверхность брови обильно покрыта небольшими волосками. Когда верхнее веко поднято, его кожа на уровне верхнего края глазницы образует заметную верхнюю бороздку.

Нижнее веко отделено от щеки слабо выраженной бороздкой под веком. При опущенном веке его кожа на уровне нижнего края глазницы, как и в области верхнего века, образует нижнюю бороздку. Глазничный край века является местом перехода его кожных покровов в кожу смежных областей.

По внутреннему краю поверхности век иногда видна слабо выраженная вертикальная веконосовая складка, plica palpebronasalis, имеющая несколько вогнутую форму и огибающая изнутри медиальную связку век.

Свободный край века имеет толщину до 2 мм. Этот край века на большем своем протяжении дугообразно изогнут кпереди, лишь в медиальном отделе изогнутость исчезает. Здесь края верхнего и нижнего век приобретают изогнутость соответственно кверху и книзу и, соединяясь друг с другом при помощи медиальной спайки век, commissura palpebrarum medialis, образуют закругленный медиальный угол глаза, angulus oculi medialis. С медиальной стороны веки, соединяясь в медиальную спайку век, commissura palpebrarum lateralis, образуют острый латеральный угол глаза, angulus oculi lateralis.

Между краями верхнего и нижнего век, у внутреннего угла глаза, располагается розоватого цвета возвышение, называемое слезным мясцом, caruncula lacrimalis, вокруг которого находится слезное озеро, lacus lacrimalis. Кнутри от слезного мясца располагается небольшая вертикальная складка конъюнктивы, называемая полулунной складкой конъюнктивы, plica semilunaris conjunctivae, явля-



### 1116. Железы хряща верхнего века, правого (фотография). Препаратор В. Харитоновой). (Участок тотально окрашенного препарата; вид со стороны конъюнктивы.)

1 — латеральный край верхнего хряща века, II — медиальный край верхнего хряща века. 1 — верхний край верхнего хряща века; 2 — слепые концы желез хряща века; 3 — фолликулы ресниц; 4 — протоки желез.

### 1117. Железы хряща нижнего века, правого (фотография). Препаратор В. Харитоновой). (Участок тотально окрашенного препарата; вид со стороны конъюнктивы.)

1 — медиальный край нижнего хряща века; 2 — латеральный край нижнего хряща века; 3 — добавочные слезные железы; 4 — протоки желез; 5 — слепые концы желез хряща века.

ящаяся рудиментарным третьим веком.

Край века переходит в переднюю и заднюю поверхности века, отделяясь от них соответственно передним и задним краем века, limbus palpebrales anterior et posterior. Передний край века несколько закруглен. Позади него из толщи века выходит множество волосков — ресницы, cilia, загнутых у нижнего века вниз, а у верхнего — вверх. Тут же открываются выводные протоки сальных и видоизмененных потовых желез, связанных с волосяными сумками ресниц.

Края верхнего и нижнего век у медиального угла глаза на уровне наружной периферии слезного мясца несут на себе небольшое возвышение — слезный сосочек, papilla lacrimalis (рис. 1118; см. рис. 1113, 1115). Здесь начинаются верхний и нижний слезные каналы, canaliculi lacrimales (см. рис. 1118), которые открываются на

вершине сосочков все хорошо заметными отверстиями — слезными точками, *puncta lacrimalia*.

Задний край века переходит непосредственно в заднюю поверхность века, *facies posterior palpebrae*.

Задняя поверхность века вогнутая и на всем протяжении покрыта конъюнктивой века, *tunica conjunctiva palpebrarum* (см. рис. 1104, 1114). Конъюнктива начинается от заднего края века и, дойдя до глазничного края верхнего и нижнего века, заворачивает назад и переходит на глазное яблоко. Эту часть конъюнктивы называют конъюнктивой глазного яблока, *tunica conjunctiva bulbi*. Покрывая передние отделы глазного яблока, конъюнктива достигает лимба роговицы, образуя у места перехода склеры в роговицу кольцо конъюнктивы, *anulus conjunctivae*. Со склерой конъюнктива глазного яблока соединена рыхло.

Переход конъюнктивы века в конъюнктиву глазного яблока образует верхний и нижний своды конъюнктивы, *fornices conjunctivae superior et inferior* (см. рис. 1104, 1114, 1115), которые вместе с другими отделами конъюнктивы ограничивают конъюн-


ктивальный мешок, *saccus conjunctivalis*, открытый спереди по линии глазной щели и замкнутый при закрытых глазах.

В области верхнего и нижнего сводов конъюнктива образует ряд складок. В толще конъюнктивы залегают одиночные конъюнктивальные железы, *glandulae conjunctivales*.

Часть века, расположенная между кожным покровом и конъюнктивой, состоит из ряда образований. Непосредственно под кожей залегает круговая мышца глаза. В верхнем веке, позади указанной мышцы, располагается сухожилие мышцы, поднимающей верхнее веко, *m. levator palpebrae superioris* (см. рис. 1105, 1116); эта мышца начинается от надкостницы верхней стенки глазницы впереди зрачка идет вперед и вблизи верхнего края глазницы переходит в плоское сухожилие. Последнее, вступая в толщу верхнего века, делится на две пластинки: *поверхностную пластинку*, *lamina superficialis*, которая располагается вначале позади круговой мышцы глаза, а затем, прободая ее своими волокнами, направляется к коже века, и глубокую пла-

### 1118. Слезная железа, *glandula lacrimalis*, и носослезный канал, *canalis nasolacrimalis*, правые; вид спереди.

(Кожные покровы верхнебоковой части верхнего века рассечены и отведены; носослезный канал отпрепарирован и вскрыт.)



стинку, *lamina profunda*, прикрепляющуюся к верхнему краю хряща верхнего века. Глубже круговой мышцы глаза и ближе к свободному краю залегают соответственно *верхний хрящ века*, *tarsus superior*, и *нижний хрящ века*, *tarsus inferior* (см. рис. 1115), который несколько уже, чем верхний. Они образованы волокнистой хрящевой тканью и отличаются прочностью. В хряще века различают заднюю и переднюю поверхности и по два края — глазничный и свободный.

Задняя поверхность хрящевой пластиинки вогнута соответственно выпуклой поверхности глазного яблока и плотно сращена с конъюнктивой века, что обусловливает гладкую поверхность конъюнктивы в этой области.

Передняя поверхность хрящей века выпуклая и соединена с круговой мышцей глаза посредством рыхлой соединительной ткани.

Свободные края верхнего и нижнего хрящей век сравнительно ровные и обращены друг к другу. Глазничные края дугообразно изогнуты, причем у верхнего хряща века эта изогнутость выражена сильнее. Длина свободного края хряща века равна 20 мм, толщина 0,8—1,0 мм; высота верхнего века составляет 10—12 мм, нижнего — 5—6 мм.

Глазничные края хрящей фиксированы у соответствующего края глазницы посредством *фасции глазницы*, *fascia orbitalis*, и мышц верхнего и нижнего хрящей век.

В области медиального и латерального углов глаза хрящи век соединяются между собой и фиксируются у соответствующих костных стенок глазницы посредством *медиальной и латеральной связок век*, *ligamenta palpebrarum mediale et laterale* (см. рис. 1115).

Латеральная связка века разделена *латеральным швом века*, *raphe palpebralis lateralis*, расположенным горизонтально.

Хрящи век, располагаясь вблизи свободного края века, придают этой его части известную плотность, благодаря чему ее называют хрящевой частью века в отличие от остальной части века, менее плотной и называемой глазничной частью века.

К хрящам век подходят соответственно небольшие верхняя и нижняя мышцы хрящей век. Особенностью этих мышц является то, что, будучи построенными из гладкой мышечной

ткани, они присоединяются к скелетным мышцам, прикрепляясь вместе с ними к хрящам века. *Верхняя мышца хряща века*, *m. tarsalis superior*, присоединяясь к мышце, поднимающей верхнее веко, фиксируется к внутренней поверхности верхнего края верхнего хряща, а *нижняя мышца хряща века*, *m. tarsalis inferior*, соединяясь с волокнами нижней прямой мышцы, фиксируется к нижнему краю нижнего хряща века (см. рис. 1104).

В хрящевых пластинках верхнего и нижнего век залегают своеобразно измененные сальные железы — *железы хряща века*, *glandulae tarsales*; в верхнем веке их 27—40, в нижнем 17—22 (см. рис. 1116, 1117).

Выходные протоки этих желез открываются в интермаргинальном пространстве ближе к заднему краю, а главные отделы направлены в сторону глазничного края века и соответственно конфигурации хрящей век изогнуты в сагиттальной плоскости. Концевые части главных отделов желез не выходят за пределы хрящей. В верхнем веке железы не занимают всей хрящевой пластиинки, а оставляют свободным ее верхний край; в нижнем веке они занимают всю хрящевую пластиинку.

В верхнем веке железы неодинаковы по длине на всем протяжении хрящевой пластиинки; в среднем отделе длина желез больше. В нижнем веке нет таких резких отличий в размерах желез.

На свободном крае век между ресницами открываются также протоки потовых *ресничных желез*, *glandulae ciliares*, а к волосяным фолликулам ресниц подходят *сальные железы*, *glandulae sebaceae*.

Кроме указанных желез, в нижнем и верхнем хрящах век встречаются непостоянные слезные хрящевые железы.

### Слезный аппарат

К *слезному аппарату*, *apparatus lacrimalis*, относят слезные железы и слезовыводящие пути, слезные канальцы, слезный мешок и носослезный проток (рис. 1119—1121; см. рис. 1118).

*Слезная железа*, *glandula lacrimalis*, залегает в верхнелатеральном углу глазницы в ямке слезной железы и выделяет *слезу*, *lacrima*. Через тело слезной железы проходит сухожилие мышцы, поднимающей верхнее веко,

которое делит железу на две неравные части: большую верхнюю глазничную часть, *pars orbitalis*, и меньшую вековую часть, *pars palpebralis*.

Глазничная часть слезной железы имеет две поверхности: верхнюю, выпуклую, которая прилегает к костной ямке слезной железы, и нижнюю, вогнутую, к которой примыкает нижняя часть слезной железы. Эта часть слезной железы отличается плотностью строения; длина железы вдоль верхнего края глазницы равна 20—25 мм; переднезадний размер 10—12 мм.

Вековая часть слезной железы располагается несколько спереди и книзу от предыдущей и залегает непосредственно над сводом мешка конъюнктивы.

Железа состоит из 15—40 сравнительно обособленных долек; длина железы вдоль верхнего края 9—10 мм, переднезадний размер 8 мм и толщина 2 мм.

*Выходные каналы*, *ductuli excretorii*, у глазничной части слезной железы (всего 3—5) проходят через участок вековой части слезной железы, принимают в свой состав часть ее выходных протоков и открываются на конъюнктиве верхнего свода.

Вековая часть слезной железы имеет, кроме того, от 3 до 9 отдельных выходных протоков, которые, так же как и предыдущие, открываются в латеральном участке верхнего свода конъюнктивы.

Кроме указанных крупных слезных желез, в конъюнктиве имеются также небольшие *добавочные слезные железы*, *glandulae lacrimales accessoriae* (от 1 до 22), которые могут залегать в верхнем и нижнем веках (см. рис. 1121). Добавочные слезные железы встречаются в области слезного мясца, где расположены и сальные железы.

Слеза, поступив из слезных желез в конъюнктивальный мешок, омывает глазное яблоко и собирается в *слезном озере*, *lacus lacrimalis*.

Кроме того, описывается *слезный ручей*, *rivus lacrimalis*, представляющий собой канал, образованный наружной поверхностью глазного яблока и передними краями закрытых век. При таком положении век задние их края не соприкасаются и слеза оттекает по образовавшемуся щелевидному ручью к слезному озеру. Из слезного озера слеза через слезные каналы следует в слезный мешок, откуда через *носослезный канал*,

*canalis nasolacrimalis*, поступает в нижний носовой ход (см. рис. 1118).

Каждый (верхний и нижний) слезный каналец, *canaliculus lacrimalis*, начинается у медиального угла глаза на вершине слезного сосочка слезной точкой и делится на две части: вертикальную и горизонтальную. Вертикальная часть слезных каналцев имеет длину 1,5 мм; она направляется соответственно вверх и вниз и, постепенно суживаясь, заворачивает в медиальную сторону, принимая горизонтальное направление. Горизонтальная часть слезных каналцев имеет длину 6—7 мм. Начальный отдел горизонтальной части каждого канала несколько расширяется в сторону своей выпуклой поверхности, образуя небольшое выпячивание — ампулу слезного канальца, *ampulla canaliculi lacrimalis* (см. рис. 1118). Следуя в медиальном направлении, оба канальца снова суживаются и впадают в слезный мешок каждый отдельно или предварительно соединившись.


Слезный мешок, *saccus lacrimalis*, залегает в костной ямке слезного мешка, целиком повторяя ее форму. Он имеет верхний слепой, несколько суженный конец — свод слезного мешка, *fornix sacci lacrimalis*.

Нижний конец слезного мешка также несколько сужен и без резких границ переходит в носослезный проток, *ductus nasolacrimalis*. Последний залегает в одноименном канале верхней челюсти, имеет длину 12—14 мм, диаметр 3—4 мм и открывается в переднем отделе нижнего носового хода под нижней носовой раковиной.


#### Мышцы глазного яблока и фасции глазницы

Мышцы глазного яблока, *mm. bulbi* (рис. 1122—1124; см. рис. 1104), приводят в движение глазное яблоко. Различают четыре прямые мышцы глазного яблока: 1) верхнюю прямую мышцу, *m. rectus superior*, 2) нижнюю прямую мышцу, *m. rectus inferior*; 3) медиальную прямую мышцу, *m. rectus medialis*; 4) латеральную прямую мышцу, *m. rectus lateralis*, и две косые мышцы: 1) верхнюю косую мышцу, *m. obliquus superior*; 2) нижнюю косую мышцу, *m. obliquus inferior*.


Все мышцы глазного яблока, за исключением нижней косой, начинаются в глубине глазницы в окружности зрительного нерва и верхней глазнич-



1119



1120



1121

**1119. Сальные железы слезного мясца (фотография. Препаратор В. Харитоновой).**

(Изолированные железы из тотально окрашенного препарата слезного мясца.)

1 — фолликул волоса; 2 — сальные железы.

**1120. Слезные железы (фотография. Препаратор В. Харитоновой).**

1 — глазничная часть слезной железы; 2 — вековая часть слезной железы; 3 — железистые дольки; 4 — протоки.

**1121. Добавочные слезные железы, ребенок 5 лет (фотография. Препаратор В. Харитоновой).**


(Участок тотально окрашенного препарата области свода конъюнктивы верхнего века.)

1 — добавочные слезные железы; 2 — глазничная часть слезной железы; 3 — лимфатические фолликулы.


ной щели. Начальные отделы мышц окружают зрительный нерв и срастаются здесь своими сухожилиями, образуя общее сухожильное кольцо, *anulus tendineus communis*, соединяющееся с наружной оболочкой зрительного нерва.


Каждая из четырех прямых мышц следует вдоль соответствующей стени глазницы и, прободая влагалище глазного яблока, *vagina bulbi*, подходит к глазному яблоку. Здесь мышцы вплетаются своими короткими сухожилиями в склеру по линии, находящейся впереди экватора глазного яблока и отстоящей на 7—8 мм от края роговицы. Латеральная прямая мышца у места прикрепления переходит в сухожильное растяжение латеральной прямой мышцы, *lacertus m. recti lateralis*, большинство пучков которого вплетается в склеру, а некоторые идут вперед и кнаружи, прикрепляясь к медиальной стенке глазницы.

1122



1123





1124

**1122. Мышцы глаза, mm. oculi; вид сверху.**

(Горизонтальный разрез. Мышца, поднимающая верхнее веко, слева полностью, справа частично удалена; зрительные тракты отпрепарированы.)

**1123. Мышцы глаза, mm. oculi, правого; вид спереди.**

(Оставлены начальные участки мышц; видно отношение мышц к зрительному нерву.)

**1124. Мышцы глаза, mm. oculi, правого; вид спереди.**

В толще начальной части наружной прямой мышцы залегает *глазничная мышца, m. orbitalis*, представляющая собой пучок гладких (неисчерченных) мышечных волокон.

*Верхняя косая мышца, m. obliquus superior*, идет от края зрительного канала, следует вперед вдоль медиальной стенки глазницы над медиальной прямой мышцей. Вблизи верхнего края глазницы у блоковидной ямки мышца переходит в длинное, цилиндрической формы сухожилие, окруженное *влагалищем сухожилия верхней косой мышцы, vagina tendinis musculi obliqui superioris*. Затем оно переходит через блок, *trochlea*, и, поворачивая обратно кзади и кнаружи, проходит между верхней прямой мышцей и глазным яблоком, прикрепляясь к нему позади экватора, на расстоянии 18 мм от края роговицы.

*Нижняя косая мышца, m. obliquus inferior*, начинается в медиальном отделе глазницы от слезного гребешка, прилегающей поверхности верхней челюсти и подглазничного края. Мышца направляется назад и кнаружи, проходит между нижней стенкой глазницы и нижней прямой мышцей, прикрепляясь на латеральной поверхности глазного яблока позади экватора.

Латеральная и медиальная прямые

мышцы врашают глазное яблоко каждой в свою сторону. Верхняя прямая мышца вращает глазное яблоко кверху и несколько кнаружи. Нижняя прямая мышца, являясь антагонистом предыдущей, вращает глазное яблоко вниз и несколько внутрь. Верхняя косая мышца вращает глазное яблоко вниз и кнаружи, нижняя косая мышца — кнаружи и кверху.

Глазное яблоко занимает передний отдел глазницы и отделено от остальной ее части *влагалищем глазного яблока, vagina bulbi*, которое соединяется с *мышечными фасциями, fasciae musculares*, глазного яблока и оболочкой зрительного нерва. Влагалище связано со склерой посредством ряда перемычек и ограничивает вместе с ее поверхностью *эписклеральное пространство, spatium episclerale*.

В передних отделах глазницы влагалище глазного яблока соединяется с *глазничной перегородкой, septum orbitale*, ограничивающей полость глазницы спереди.

Позади влагалища глазного яблока и глазной перегородки в глазнице находится *жировое тело глазницы, corpus adiposum orbitae*, через которое проходят нервы. Меньшая часть жирового тела располагается вне конуса, образованного совокупностью мышц глазного яблока, между ними

и покрытыми надкостницей глазницами, *periorbita*, костными стенками глазницы; большая часть залегает внутри этого конуса, в окружности зрительного нерва.

### Кровеносные сосуды глазного яблока

Глазное яблоко кровоснабжается ветвями **глазной артерии**, *a. ophthalmica* (см. рис. 1103, 1108). Глазная артерия посыпает к глазному яблоку ресничные артерии, которые кровоснабжают фиброзную и сосудистую оболочки, а также центральную артерию сетчатки, разветвляющуюся в сетчатой оболочке. Кроме того, глазная артерия посыпает ряд ветвей к мышцам глазного яблока, слезной железе и другим образованиям орбиты (см. т. II «Ангиология»).

1. **Длинные задние ресничные артерии**, *aa. ciliares posteriores longae*, всего две, подходят к глазному яблоку по сторонам зрительного нерва. Прободая склеру, они вступают в околососудистое пространство и направляются по наружной и внутренней поверхности глазного яблока к ресничному телу. Здесь артерии делятся на восходящие и нисходящие ветви, которые следуют по ресничному краю радужки, соединяются между собой и с передними ресничными артериями, образуя **большой артериальный круг радужки**, *circulus arteriosus iridis major*. Последний посыпает веточки к ресничной мышце, а также в радужку, где у зрачкового края образуется **малый артериальный круг радужки**, *circulus arteriosus iridis minor*.

Кроме того, от длинных задних ресничных артерий отходят возвратные артерии, которые соединяются с короткими задними ресничными артериями.

2. **Короткие задние ресничные артерии**, *aa. ciliares posteriores breves* (см. рис. 1108), начинаются от глазной артерии 4—6 ветвями. Направляясь к глазному яблоку, они разветвляются и подходят к его задней периферии в количестве 18—20. Здесь короткие задние ресничные артерии посыпают ветви к склере и наружному влагалищу зрительного нерва. Затем указанные артерии прободают склеру в окружности выхода зрительного нерва и вступают в толщу сосудистой оболочки, где образуют сеть капилляров, залегающую в сосудис-

то-капиллярной пластинке. В окружности зрительного нерва короткие задние ресничные артерии соединяются между собой и с ветвями центральной артерии сетчатки и образуют в толще склеры **сосудистый круг зрительного нерва**, *circulus vasculosus n. optici*.

3. **Передние ресничные артерии**, *aa. ciliares anteriores* (см. рис. 1108), начинаются из артерий четырех прямых мышц, проходят к краю роговицы, где отдают **эпиклеральные артерии**, *aa. episclerales*, к передним отделам склеры, и **передние конъюнктивальные артерии**, *aa. conjunctivales anteriores*, к конъюнктиве глазного яблока, а затем, прободая склеру, вступают в толщу ресничной мышцы, кровоснабжают ее и посыпают ветви в состав большого артериального круга радужки.

4. **Центральная артерия сетчатки**, *a. centralis retinae* (см. рис. 1104, 1107, 1108), начинается от глазной артерии, направляется к зрительному нерву и на расстоянии 15—20 мм от глазного яблока входит в его толщу. Следуя по оси нерва, артерия в области его диска достигает сетчатки и разветвляется на две ветви: верхнюю и нижнюю. Каждая из них на поверхности диска зрительного нерва (иногда в его толще) образует **сосудистый круг зрительного нерва**, от которого отходят концевые ветви:

1) **верхняя артериола пятна**, *arteriola macularis superior*, направляется вверх и латерально;

2) **нижняя артериола пятна**, *arteriola macularis inferior*, также направляется латерально, но идет горизонтально, достигая пятна;

3) **медиальная артериола сетчатки**, *arteriola medialis retinae* — сравнительно небольшой сосуд, направляется медиально и несколько вверх;

4) **верхняя носовая артериола сетчатки**, *arteriola nasalis retinae superior*, направляется вертикально вверх;

5) **нижняя носовая артериола сетчатки**, *arteriola nasalis retinae inferior*, направляется вниз и несколько медиально;

6) **верхняя височная артериола сетчатки**, *arteriola temporalis retinae superior* — мощный сосуд, направляется вверх и латерально;

7) **нижняя височная артериола сетчатки**, *arteriola temporalis retinae inferior*, направляется вниз и латерально.

В области пятна имеется хорошо развитая сеть сосудов, а в центральной ямке сосуды отсутствуют.

Все артериолы сетчатки сопровождаются одноименными венулами (см. рис. 1108, 1109), среди которых различают **верхнюю и нижнюю вену сетчатки**, *venulae musculares superior et inferior*; **медиальную вену сетчатки**, *venula medialis retinae*; **верхнюю и нижнюю носовые вену** сетчатки, *venulae nasales retinae superior et inferior*; **верхнюю и нижнюю височные вену** сетчатки, *venulae temporales retinae superior et inferior*. Венулы собираются в **центральную вену** сетчатки, *v. centralis retinae*, впадающую в верхнюю глазную вену или, реже, в пещеристый синус. Центральные вены сетчатки залегают вместе с одноименной артерией в толще зрительного нерва.

Венозная кровь от глазного яблока оттекает по передним и задним ресничным венам.

**Передние ресничные вены**, *vv. ciliares anteriores*, начинаются от вен ресничной мышцы, принимая по пути сосуды из венозного синуса склеры, который также сообщается с пространствами радужно-роговичного угла. Прободая склеру, эти вены принимают в свой состав **эпиклеральные вены**, *vv. episclerales*, и **конъюнктивальные вены**, *vv. conjunctivales*, и впадают в вены мышц глазного яблока.

**Задние ресничные вены**, *vv. ciliares posteriores*, принимают кровь из задних отделов глазного яблока.

**Вортикоzные вены**, *vv. vorticose* (см. рис. 1103, 1108), всего 4—6, образуются вдоль экватора в толще сосудистой оболочки. Они собирают венозную кровь из собственно сосудистой оболочки, ресничного тела и радужки. Вортикоzные вены впадают в глазные вены, которые в свою очередь анатомозируют с венами лица.

### Нервы глазного яблока

К глазному яблоку подходят длинные и короткие ресничные нервы, которые берут начало от носоресничного нерва (от тройничного нерва) и ресничного узла (см. рис. 971, 972—974, 1088, 1103, 1106). Достигнув заднего отдела глазного яблока, ресничные нервы прободают склеру, ложатся между нею и сосудистой оболочкой и отдают к этим оболочкам небольшие нервные стволы.

По ходу этих нервов в области ресничной мышцы образуется ресничное


сплетение, включающее нервные клетки; ветви сплетения направляются к радужке и ресничной мышце.

Кожа век получает нервы от первой (верхнее веко) и второй (нижнее веко) ветвей тройничного нерва.

### РАЗВИТИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ

Эмбриональная закладка органа зрения — глаза (рис. 1125) — происходит на 3-й неделе внутриутробного периода, а развитие глаза заканчивается в первые школьные годы. Глаз состоит из нескольких образований, каждое из которых развивается из разных эмбриональных элементов. Так, хрусталик возникает из эктодермального эпителия области головы. Сетчатка закладывается из стенки переднего мозгового пузыря. Склера и сосудистая оболочка развиваются из окружающей мезенхимы. Мышцы, приводящие в движение глаз, возникают из клеток мезенхимы. Веки развиваются из участков кожи. У новорожденного в связи с недоразвитием полости глазницы глазное яблоко с окружающими его образованиями не полностью располагается в орбите, а выступает несколько книзу, выпячивается. Сравнительные размеры глазного яблока новорожденного и взрослого соответственно следующие: поперечный диаметр 16,7 и около 24 мм, продольный диаметр — 17,3 и около 24,3 мм. Глазное яблоко наиболее интенсивно развивается в первые 5—7 лет после рождения.

Различные образования глазного яблока имеют определенные особенности, обусловленные возрастом. Так, у новорожденного и ребенка первых лет жизни хрусталик более прозрачен, по форме более выпуклый, чем у взрослого; роговица немногим толще; сосудистая оболочка тоньше у новорожденного, чем у взрослого; мало пигментирована радужка; очень тонкая скlera у новорожденного пластична и растяжима. По мере роста ребенка указанные особенности отдельных образований глазного яблока, в частности форма роговицы и хрусталика, их выпуклость, меняются, что происходит к 9—12 годам; это в значительной степени приближает глазное яблоко растущего ребенка к состоянию органа зрения у взрослого человека.




### 1125. Развитие глаза.

А — эмбрион 14 сомитов. Б — эмбрион 4,5 мм. В — эмбрион 5 мм. Г — эмбрион 7 мм. Д — 8,5-недельный эмбрион длиной 33 мм. Е — 9,5-недельный эмбрион длиной 48 мм. 1 — стена переднего мозга; 2 — глазная бороздка; 3 — глазной пузирь; 4 — хрусталиковая плаэма; 5 — хрусталиковый пузирек; 8 — хрусталик; 6 — пигментный слой; 7 — чувствительный слой; 9 — роговица; 10 — веко; 11 — передняя камера; 12 — зрительный нерв; 13 — центральная артерия сетчатки; 16 — закладка глазной мышцы; 15 — мышцы глазного яблока; 14 — стекловидное тело; 18 — конъюнктива; 17 — край радужки.

### ПРЕДДВЕРНО-УЛИТКОВЫЙ ОРГАН

*Преддверно-улитковый орган, organum vestibulocochlearis* (рис. 1126), объединяет два анализатора: орган слуха и орган равновесия.

Орган слуха состоит из трех частей: наружного уха — звукоулавливающей части; среднего уха — звукопередающей части и внутреннего уха — звукоизлучающей части. Внутреннее ухо объединяет орган собственного слуха, воспринимающий и дифференцирующий звуковые раздражения, и орган статического чувства, реагирующий на положение тела



**1126. Наружное, среднее и внутреннее ухо, правое.  
(Фронтальный распил через наружный слуховой проход.)**

в пространстве и изменение равновесия (т. с. чувства земного притяжения — гравитации).

#### НАРУЖНОЕ УХО

К **наружному уху**, *auris externa* (рис. 1127—1131; см. рис. 1126), относят **ушную раковину**, *auricula*, и **наружный слуховой проход**, *meatus acusticus externus*.

#### Ушная раковина

**Ушная раковина**, *auricula* (см. рис. 1127), образована кожной складкой. В ее толще находится хрящ ушной раковины.

В середине латеральной поверхности ушной раковины расположено **наружное слуховое отверстие**, *porus acusticus externus*.

*acusticus externus*. Спереди оно ограничено небольшим выступом — **козелком**, *tragus*. Выше козелка, отделенный от него передней вырезкой уха, *incisura anterior auris*, косо вверх и вперед проходит **ножка завитка**, *crus helicis*, которая продолжается в **завиток**, *helix*, оформляющий верхний и задний края ушной раковины. Нижний конец завитка получил название **хвоста завитка**, *cauda halicis*.

Передняя поверхность завитка представляет собой неглубокий желобок, переходящий в расположенную кпереди от него и открытую латерально борозду — **ладью**, *scapha*. Спереди ладья ограничена хорошо выраженным гребнем — **противозавитком**, *anthelix*. Вверху противозавиток разделяется на **ножки противозавитка**, *crura antheliceis*, между которыми имеется углубление — **треугольная ямка**, *fossa triangularis*. Внизу противозавиток посередством задней борозды **ушной раковины**, *sulcus auricularis posterior*, отделяется от довольно значительного выступа — **противокозелка**, *antitragus*.

Противокозелок ограничивает снизу **наружное слуховое отверстие** и отделяется от козелка глубокой **межкозелковой вырезкой**, *incisura intertragica*. Противозавиток и его нижняя ножка сзади и сверху, козелок спереди и противокозелок снизу ограничиваются **раковиной уха**, *concha auriculae*. Ножка завитка разделяет раковину уха на верхнее углубление — **челюк раковины**, *cumba conchae*, и нижнее углубление — **полость раковины**, *cavitas conchae*.

У некоторых людей на месте перехода заднего края ушной раковины в верхний край имеется **буторок ушной раковины**, *tuberculum auriculae*. Иногда на верхнем крае ушной раковины наблюдается **верхушка ушной раковины**, *apex auriculae*. Непостоянно встречается также небольшой **надкозелковый бугорок**, *tuberculum supratragicum*, положение которого соответствует названию.

Нижняя часть ушной раковины не имеет хрящевого остова, содержит в кожной складке развитый слой жировой клетчатки и носит название

**1127. Ушная раковина, auricula, правая, пожилого мужчины; вид спаружи.**

**1128. Хрящ ушной раковины, cartilago auriculae, правой; наружная поверхность; вид спереди.**

долики ушной раковины (мочка), lobulus auriculae.

Кожа ушной раковины покрыта волосками. Растительность больше выражена на козелке и противокозелке, а также на выпуклой поверхности раковины. В толще кожи залегают сальные и потовые железы (см. рис. 1130). На латеральной поверхности ушной раковины кожа соединяется с хрящом ушной раковины болееочно, чем на медиальной, где она несколько подвижна.



Медиальная поверхность ушной раковины несет на себе ряд бороздок и возвышений, соответствующих рельефу ее наружной поверхности. Наружный край медиальной поверхности раковины закруглен соответственно загибающемуся кпереди краю завитка.

Кнутри от него имеется возвышение, соответствующее ладье и называемое *возвышением ладьи*, eminentia scaphae.

Впереди от него залегают два других возвышения: одно из них, большее, соответствует раковине уха и называется *возвышением раковины*, eminentia conchae, другое, меньшее, соответствует треугольной ямке и называется *возвышением треугольной ямки*, eminentia fossae triangularis. Последнее отделено от возвышения раковины небольшой поперечной бороздкой противозавитка, sulcus anthellicis transversus, которая снизу переходит в ямку противозавитка, fossa anthellicis.

*Хрящ ушной раковины*, cartilago auriculae (см. рис. 1128, 1129), построен из эластичной хрящевой ткани и по форме в основном соответствует ушной раковине.

Передненижнюю часть хряща ушной раковины составляет *пластинка козелка*, lamina tragi, — хрящевой скелет козелка. Хрящевой завиток имеет на своей ножке небольшой выступ — *ость завитка*, spina helicis. Хвост хрящевого завитка отделяется от про-



тивокозелка противокозелково-закрученной щелью, *fissura antitragohelicina*.

На медиальной поверхности козелка начинается вырезка хряща слухового прохода, *incisura cartilaginis meatus acustici*, которая продолжается кзади и кверху в конечную вырезку уха, *incisura terminalis auris*. Обе эти вырезки отделяют медиальную часть хряща ушной раковины — *перешеек хряща уха*, *isthmus cartilaginis auris*, от хряща слухового прохода.

Хрящ ушной раковины прикрепляется к височной кости посредством трех связок ушной раковины, *ligamenta auricularis*:

1) передняя связка ушной раковины, *ligamentum auriculare anterior*, идет от пластинки козелка к корню скуловой дуги;

2) верхняя связка ушной раковины, *ligamentum auriculare superius*, идет от

ости завитка к костной части наружного слухового отверстия;

3) задняя связка ушной раковины, *ligamentum auriculare posterius*, идет от возвышения раковины к сосцевидному отростку.

Отдельные части хряща соединены между собой посредством мышц ушной раковины, *mm. auriculares*. Кроме того, к ушной раковине прикрепляется ряд мышц, начинающихся на kostях черепа: передняя, верхняя и задняя ушные мышцы.

К собственным мышцам ушной раковины относятся следующие:

1. Большая мышца завитка, *m. helicis major*, начинаясь на ости за-

витка, направляется вверх по переднему краю хряща и прикрепляется в передних отделах завитка; часть пучков достигает возвышения треугольной ямки.


2. Малая мышца завитка, *m. helicis minor*, начинается, как и предыдущая, на ости завитка, направляется по наружной поверхности раковины вниз и назад и прикрепляется к ножке завитка.

3. Козелковая мышца, *m. tragicus*, располагается на наружной поверхности пластинки козелка.

4. Противокозелковая мышца, *m. antitragicus*, начинается на наружной поверхности заднего участка противокозелка, идет назад и кверху, прикрепляясь к основанию хвоста завитка.

5. Косая мышца ушной раковины, *m. obliquus auriculae*, залегает на меди-

### 1129. Хрящ ушной раковины и наружный слуховой проход, правый; вид сзади. (Задняя поверхность.)



альной поверхности ушной раковины и идет от возвышения треугольной ямки к возвышению раковины уха.

6. Поперечная мышца ушной раковины, *m. transversus auriculae*, располагается ниже косой мышцы. Она начинается от возвышения раковины уха и прикрепляется к возвышению ладьи.

7. Пирамидальная мышца ушной раковины, *m. pyramidalis auricularis*, представляет собой поверхностный пучок, отходящий от козелковой мышцы и заканчивающийся на ости завитка ушной раковины.

8. Мышица вырезки завитка, *m. incisurae helicis*, натянута между хвостом завитка и наружным краем противокозелково-завитковой щели, заполняя верхнюю часть последней.

Все эти мышцы иннервируются ветвями лицевого нерва (п. *facialis*).


#### Наружный слуховой проход

Наружный слуховой проход, *meatus acusticus externus* (см. рис. 1126), является непосредственным продолжением ушной раковины. Он представляет собой изогнутую трубку, которая вначале идет назад и кверху, а затем направляется вперед и вниз и слепо заканчивается у барабанной перепонки, *membrana tympani*.

Длина наружного слухового прохода составляет 3,5 см. Внутренняя поверхность наружного слухового прохода выстлана кожей. В ней залегают сальные железы, волосяные мешочки, а также железы, выделяющие ушную серу, которые называются железами ушной серы, *glandulae ceruminosae* (см. рис. 1131). Число волосков и желез уменьшается по мере приближения к барабанной перепонке, и в самой глубокой части наружного слухового прохода железы и волоски отсутствуют. Кожа наружного слухового прохода сращена с подлежащей надхрящницей и с надкостницей.


Стенка наружного слухового прохода в начальном отделе ( $\frac{1}{3}$ ) состоит из хряща и соединительной ткани, образующих хрящевой наружный слуховой проход, *meatus acusticus externus cartilagineus*, а на всем остальном протяжении ( $\frac{2}{3}$ ) образована костным веществом височной кости, составляющим костную часть наружного слухового прохода.

Хрящ слухового прохода, *cartilago meatus acusticus*, является непосред-



1130. Железы кожи ушной раковины (препаратор М. Черняховского).  
(Участок тотально окрашенного препарата кожи ушной раковины.)

1131. Железы кожи наружного слухового прохода (фотография. Препаратор М. Черняховского).



ственным продолжением хряща ушной раковины. Он желобовато изогнут и образует только нижнюю и переднюю стенки слухового прохода; остальные стенки: задняя и верхняя—образованы соединительной тканью. Хрящевая часть наружного слухового прохода соединена с костной при помощи плотной соединительной ткани.

Эта связка соединяет внутренний край хрящевой части слухового про-

хода с наружным слуховым отверстием височной кости.

В костной части наружного слухового прохода различают 4 стенки, из которых верхняя образована чешуйчатой частью височной кости, а остальные—её барабанной частью.

Длина стенок наружного слухового прохода неодинакова. Нижняя стенка длиннее верхней и образует с барабанной перепонкой острый угол, а верхняя—тупой.

### Барабанная перепонка

**Барабанная перепонка**, *membrana tympani* (греч. *myrinx*) (рис. 1132; см. рис. 1126), находится на границе между наружным и средним ухом и фактически является одной из стенок среднего уха (барабанной полости), наклонена вперед и вниз.


Она образована соединительной тканью, которая со стороны наружного слухового прохода покрыта **кожным слоем**, *stratum cutaneum*, а со

### 1132. Барабанная перепонка, среднее и внутреннее ухо.

А — барабанная перепонка, правая; вид спереди.  
Б — барабанная перепонка, молоточек и наковальня, правые; вид изнутри. В — барабанная полость, преддверие лабиринта и костная улитка.

стороны среднего уха — **слизистым слоем**, *stratum mucosum*.

По периферии барабанная перепонка утолщена, образуя край барабанной перепонки. На большей части своего протяжения этот край фиксирован посредством **волокнисто-хрящевого кольца**, *anulus fibrocartilagineus*, в барабанной борозде, *sulcus tympanicus*. Эта большая часть барабанной перепонки, более плотно натянутая, называется **натянутой частью**, *pars tensa*. Вверху на неболь-



шом протяжении у барабанной вырезки барабанная перепонка менее напряжена, образуя *ненатянутую часть*, *pars flaccida*. Последняя отделена от остальной части барабанной перепонки посредством передней и задней молоточковых складок. Обе они начинаются от *молоточкового выступа*, *prominentia mallearis*, образованного рукояткой молоточка, и идут соответственно вперед и назад к *большой и малой осям*, *spinae tympanica major et minor*, барабанной части височной кости.

Наружная поверхность барабанной перепонки несколько вогнута внутрь и имеет вид воронки, центральная часть которой фиксирована у рукоятки молоточка и называется *пупком барабанной перепонки*, *umbra membranae tympani*.

Рукоятка молоточка располагается с внутренней стороны барабанной перепонки и просвечивает через ее толщу, обусловливая наличие на ее наружной поверхности *молоточковой полоски*, *stria mallearis*. Последняя простирается от пупка до места соединения барабанной перепонки с наружным отростком молоточка, т. е. до молоточкового выступа.

## СРЕДНЕЕ УХО

В состав *среднего уха*, *auris media* (см. рис. 1126), входят барабанная полость, слуховые косточки и слуховая труба.

### Барабанная полость

**Барабанная полость**, *cavitas tympanica* (рис. 1133—1135; см. рис. 74—76), представляет собой щелевидную полость в толще основания пирамиды височной кости. Она выстлана слизистой оболочкой, которая покрывает шесть ее стенок и продолжается сзади в слизистую оболочку ячеек сосцевидного отростка височной кости, а впереди — в слизистую оболочку слуховой трубы.

Наружная *перепончатая стенка*, *paries membranaceus*, барабанной полости на большем протяжении образуется внутренней поверхностью барабанной перепонки, выше которой в образовании указанной стенки принимает участие верхняя стенка костной части слухового прохода.

Внутренняя *лабиринтная стенка*, *paries labyrinthicus*, барабанной поло-

сти является в то же время наружной стенкой преддверия внутреннего уха.

В верхнем отделе этой стенки имеется небольшое углубление — ямочка окна преддверия, *fossula fenestrae vestibuli*, в которой имеется окно преддверия, *fenestra vestibuli* (см. рис. 1140, 1142), — овальное отверстие, прикрытое основанием стремени.

Впереди ямочки окна преддверия на внутренней стенке оканчивается перегородка мышечно-трубного канала в виде *улиткового отростка*, *processus cochleariformis*.

Ниже окна преддверия располагается округлое возвышение — мыс, *promontorium*, на поверхности которого имеется вертикально идущая борозда мыса, *sulcus promontorii*.

Книзу и сзади от мыса расположена воронкообразная ямочка окна улитки, *fossula fenestrae cochleae*, где расположено круглое окно улитки, *fenestra cochleae* (см. рис. 1140).

Ямочку окна улитки ограничивает сверху и сзади костный валик — подставка мыса, *subiculum promontorii*.

Окно улитки закрыто *вторичной барабанной перепонкой*, *membrana tympani secundaria* (см. рис. 1147). Она прикрепляется к шероховатому краю этого отверстия — гребешку окна улитки, *crista fenestrae cochleae*.

Над окном улитки и позади мыса находится небольшое углубление, называемое *барабанной пазухой*, *sinus tympani*.

Верхняя *покрышечная стенка*, *paries tegmentalis*, барабанной полости образована костным веществом соответствующего участка каменистой части височной кости, получившим благодаря этому название *крыши барабанной полости*, *tegmen tympani*. В этом месте барабанная полость образует обращенное кверху надбарабанное углубление, *recessus epitympanicus*, а наиболее глубокий ее участок получил название *купольной части*, *pars cupularis*.

Нижняя стенка (дно) барабанной полости называется *яремной стенкой*, *paries jugularis*, благодаря тому, что костное вещество этой стенки принимает участие в образовании яремной ямки. Эта стенка неровная и содержит воздухоносные *барабанные ячейки*, *cellulae tympanicae*, а также отверстие барабанного канальца. Яремная стенка несет небольшой *шиловидный выступ*, *prominentia styloidea*, являющийся основанием шиловидного отростка.

Задняя *сосцевидная стенка*, *paries mastoideus*, барабанной полости имеет отверстие — *вход в пещеру*, *aditus ad antrum*. Он ведет в *сосцевидную пещеру*, *antrum mastoideum*, которая в свою очередь сообщается с *сосцевидными ячейками*, *cellulae mastoideae*.

На медиальной стенке входа располагается возвышение — *выступ латерального полукружного канала*, *prominentia canalis semicircularis lateralis*, ниже него имеется идущий дугообразно спереди назад и книзу *выступ лицевого канала*, *prominentia canalis facialis*.

В верхнем медиальном отделе этой стенки находится *пирамидальное возвышение*, *eminentia pyramidalis*, с заложенной в его толще *стременной мышцей*, *m. stapedius*.

На поверхности пирамидального возвышения располагается небольшое углубление — *ямка наковални*, *fossa incudis*, в которую входит короткая ножка наковални.

Несколько ниже ямки наковални, на передней поверхности пирамидального возвышения, под выступом лицевого нерва располагается задняя пазуха, *sinus posterior*, а ниже, над шиловидным выступом открывается барабанная апертура канальца барабанной струны, *apertura tympanica canaliculi chordae tympani*.

Передняя *сонная стенка*, *paries caroticus*, барабанной полости несет на себе *барабанные ячейки*, *cellulae tympanicae*. Нижний отдел ее образован костным веществом задней стенки канала внутренней сонной артерии, выше которого располагается *барабанное отверстие слуховой трубы*, *ostium tympanicum tubae auditivae*.

Клиницисты барабанную полость условно делят на три отдела: нижний, средний и верхний.

К *нижнему отделу* барабанной полости (*hypotympanum*) относят часть ее между нижней стенкой барабанной полости и горизонтальной плоскостью, проведенной через нижний край барабанной перепонки.

*Средний отдел* барабанной полости (*mesotympanum*) занимает большую часть барабанной полости и соответствует той ее части, которая ограничена двумя горизонтальными плоскостями, проведенными через нижний и верхний края барабанной перепонки.

*Верхний отдел* барабанной полости (*epitympanum*) находится между верх-

**1133. Среднее ухо и слуховая труба (фотография. Препаратор Д. Розенгауза).**

(Удалены чешуйчатая часть и участок сосцевидной части; наружный слуховой проход и барабанная полость вскрыты.)

1—покрышечная стенка барабанной полости; 2—полукружное возвышение; 3—надбарабанное углубление; 4—сосцевидная пещера; 5—наковальня; 6—наружный слуховой проход; 7—молоточек; 8—барабанная полость; 9—глоточное отверстие слуховой трубы; 10—слуховая труба; 11—мышечно-трубный канал; 12—канал сонной артерии; 13—внутренняя сонная артерия; 14—тело клиновидной кости; 15—тройничное вдавление.

**1134. Железы слизистой оболочки слуховой трубы, правой (фотография. Препаратор Д. Розенгауза).**

(Тотально окрашенный препарат слизистой оболочки слуховой трубы.)

1—латеральное скопление желез; 2—перешеек слуховой трубы; 3—медиальное скопление желез; 4—глоточное скопление желез.

**1135. Изолированная железа слизистой оболочки слуховой трубы (фотография. Препаратор Д. Розенгауза).**

1—железистая часть; 2—выводные протоки; 3—главный выводной проток; 4—железистая долбка по ходу протока.


ней границей среднего отдела и крышей барабанной полости.

### Слуховая труба


**Слуховая труба, tuba auditiva** (см. рис. 1127, 1133—1135), соединяет полость глотки с полостью среднего уха. Она начинается на верхнебоковой стенке глотки *глоточным отверстием слуховой трубы, ostium pharyngeum tubae auditivae*, направляется назад вверх и несколько кнаружи и открывается на сонной (передней) стенке барабанной полости.

Слуховая труба имеет длину 3,5—4,0 см. В ней различают две части: большую ( $\frac{2}{3}$  трубы) *хрящевую часть слуховой трубы, pars cartilaginea tubae auditivae*, и меньшую *костную часть слуховой трубы, pars ossea tubae auditivae*, залегающую в толще каменистой части височной кости.


Хрящевая часть трубы образована гиалиновым и отчасти волокнистым хрящом, имеющим форму желоба.



1133



1134



1135

Этот хрящ более широк в области глоточного отверстия трубы (ширина 1 см и толщина 2,5 мм), занимает только медиальную и верхнюю стороны трубы и лишь небольшую часть латеральной стенки. С латеральной и нижней сторон хрящ отсутствует; вместо него в этой части трубы имеется фиброзная ткань, образующая *перепончатую пластинку*, *lamina membranacea*.

Та часть хряща слуховой трубы, *cartilago tubae auditiva*, которая служит медиальной стенкой слуховой трубы, носит название *медиальной пластинки [хряща]*, *lamina [cartilaginea] medialis*, а часть, образующая латеральную стенку, — *латеральной пластинки [хряща]*, *lamina [cartilaginea] lateralis*. Иногда часть хряща трубы, которая загибается с ее медиальной стенки на латеральную, называют крючком трубы.

Хрящевая часть трубы наиболее широкая в области глоточного отверстия, где утолщение края хряща вместе со складкой слизистой оболочки образует трубный валик. Щелевидная полость трубы кзади несколько суживается и на границе с костной частью образует *перешеек слуховой трубы*, *isthmus tubae auditiva*. За ним начинается костная часть трубы. Просвет костной части трубы постепенно расширяется в сторону внутреннего, или барабанного, отверстия слуховой трубы. Верхняя стенка хрящевой части трубы фиксирована у основания черепа: в передних отделах — в борозде слуховой трубы, а в задних — в соединительной ткани, заполняющей клиновидно-каменистую щель.

Костная часть слуховой трубы имеет просвет трехгранной формы; ее стенки образованы костным веществом пирамиды височной кости, ограничивающим полуканал слуховой трубы; в костном веществе имеются *воздухоносные ячейки*, *cellulae pneumaticae*.

Внутренняя поверхность трубы выстилана *слизистой оболочкой*, *tunica mucosa*, которая в области глоточного отверстия переходит в слизистую оболочку глотки, а в области барабанного отверстия — в слизистую оболочку барабанной полости. В области глоточного отверстия слуховой трубы она имеет наибольшую толщину, а в сторону среднего уха постепенно истончается.

Слизистая оболочка, выстилающая костную часть трубы, сращена с над-

костницей, в области хрящевой части имеет хорошо развитый подслизистый слой. Слизистая оболочка слуховой трубы содержит *трубные железы*, *glandulae tubariae*, только в области хрящевой части и в области глоточного отверстия трубы. Они располагаются здесь на всем ее протяжении и образуют три слоя; больше всего желез залегает в слизистой оболочке передних отделов трубы (см. рис. 1134, 1135).

На остальном протяжении хрящевой трубы железы располагаются в области передней и задней стенок, где они образуют два ряда. В области перепонки встречаются одиночные железы.

В слизистой оболочке трубы имеется небольшое количество лимфатических узелков, располагающихся вблизи глоточного отверстия трубы и в области перепонки.

### Слуховые косточки

**Слуховые косточки**, *ossicula auditus [auditoria]* (рис. 1136—1139; см. рис. 1126), залегают в барабанной полости. Это три небольшие косточки, которые в соответствии с их формой получили название молоточек, наковалня и стремя. Указанные косточки соединяются между собой *суставами слуховых косточек*, *articulationes ossicularium auditus*, и расположены между наружной и внутренней стенками барабанной полости, прикрепляясь к ним рядом *связок слуховых косточек*, *ligamenta ossicularium auditus*.

### Молоточек

**Молоточек**, *malleus* (см. рис. 1126, 1132, 1136, 1137), прилегает к наружной стенке барабанной полости и непосредственно срастается с барабанной перепонкой.

Различают *головку молоточка*, *caput mallei*, *шейку молоточка*, *collum mallei*, *руковатку молоточка*, *manubrium mallei*, *передний отросток*, *processus anterior*, и *латеральный отросток*, *processus lateralis*.

Головка молоточка располагается в верхнем отделе барабанной полости. Она является наиболее массивной частью молоточка, имеет овальную, расширяющуюся к одному концу форму и на своей задней и отчасти внутренней поверхностях несет по-

крытоую хрящом седловидную суставную поверхность молоточка. Нижний отдел головки несколько суживается и переходит в шейку молоточка, которая соединяет головку с рукояткой молоточка.

Рукоятка молоточка представляет собой изогнутый костный стерженек, который отклоняется несколько кнутри. Нижний конец рукоятки молоточка сращен с барабанной перепонкой. В месте этого соединения соединительнотканые волокна барабанной перепонки вплетаются в надкостницу молоточка, а на ее наружной поверхности образуется воронкообразное углубление — *пупок барабанной перепонки*, *umbra membraneae tympani*.

У основания рукоятки молоточка от него отходят два отростка. Один из них — *передний отросток*, *processus anterior*, начинается от шейки, идет вперед и несколько кнаружи и вступает в каменисто-барабанную щель. Другой — *латеральный отросток*, *processus lateralis*, направляется кнаружи и своим концом плотно прилегает к барабанной перепонке, обусловливая образование на ее наружной поверхности *молоткового выступа*, *prominentia mallearis*.

Молоточек в известной мере фиксирован в барабанной полости посредством связок.

1. *Верхняя связка молоточка*, *ligamentum mallei superius*, идет от крыши барабанной полости вертикально вниз к головке молоточка.

2. *Латеральная связка молоточка*, *ligamentum mallei laterale*, начинается от верхней стенки наружного слухового прохода и направляется к шейке молоточка. Ее рассматривают как участок ненатянутой части барабанной перепонки.

3. *Передняя связка молоточка*, *ligamentum mallei anterius*, начинается от клиновидной ости, идет к барабанно-каменистой щели и прикрепляется к переднему отростку и шейке молоточка.

К внутренней периферии основания рукоятки молоточка прикрепляется сухожилие мышцы, напрягающей барабанную перепонку, *m. tensor tympani*. Мышца начинается в окружности наружного отверстия мышечно-трубного канала, от каменистой части височной кости, большого крыла клиновидной кости и хряща слуховой трубы. Пройдя через костный канал, мышца вступает в барабанную полость и достигает рукоятки молоточка.

Иннервируется мышца *n. musculi tensoris tympani* (от третьей ветви тройничного нерва).

### Наковальня

**Наковальня, incus** (см. рис. 1126, 1132, 1136, 1138), имеет тело наковальни, *corpus incudis*, и два отростка, называемых короткой ножкой, *crus breve*, и длинной ножкой, *crus longum*.

Тело наковальни помещается в верхнем отделе барабанной полости, позади головки молоточка. Оно фиксировано у крыши барабанной полости посредством *верхней связки наковальни, ligamentum incudis superius*.

Передняя поверхность тела наковальни несет покрытую хрящом седловидную суставную поверхность. Она сочленяется с соответствующей суставной поверхностью молоточка и образует *наковальне-молотковый сустав, articulatio incudomallearis*, относящийся к седловидным суставам. Капсула сустава прикрепляется по краям суставных поверхностей. В полости сустава находится суставной диск, который фиксируется у медиальной и отчасти верхней периферии суставной капсулы.

Задняя периферия тела наковальни продолжается в короткий отросток — короткую ножку.


*Короткая ножка, crus breve*, направляется назад и, конусообразно сужаясь, прикрепляется посредством задней связки наковальни, *ligamentum incudis posterius*, к задней стенке барабанной полости в области ямки наковальни.

*Длинная ножка, crus longum*, отойдя от тела, направляется вниз и располагается в среднем отделе барабанной полости медиальнее рукоятки молоточка. Нижний конец длинной ножки истончается и загибается внутрь. На его свободной поверхности имеется небольшой чечевицеобразный отросток, *processus lenticularis*, суставная поверхность которого сочленяется со стременем.

### Стремя

**Стремя, stapes** (см. рис. 1126, 1132, 1136, 1139), состоит из головки стремени, *caput stapedis*, основания стремени, *basis stapedis*, передней ножки, *crus anterius*, и задней ножки, *crus posterius*.

Головка стремени имеет на своей задней поверхности покрытую хря-



щом несколько вогнутую суставную поверхность головки стремени. Эта поверхность вместе с суставной поверхностью на чечевицеобразном отростке наковальни образует *наковальне-стременной сустав, articulatio incudostapedia*, приближающийся по строению к шаровидному.

К головке стремени вблизи отхождения задней ножки прикрепляется сухожилие *стременной мышцы, t. stapedius*. Мышца начинается в углублении на пирамидальном возвышении и, выйдя из него, направляется к стремени.

Иннервируется мышца *n. stapedius* (*n. facialis*).

Передний отдел головки переходит в переднюю и заднюю ножки стремени; между головкой и ножками имеется несколько суженный участок.

Задняя ножка несколько изогнута и более массивна, чем почти прямая передняя ножка.

Периферические концы обеих ножек соединяются с основанием стремени и ограничивают вместе с ним замкнутое кольцо.

Внутренняя поверхность кольца несет на себе бороздку, к которой прикрепляется мембрана стремени, *membrana stapedis*.

Основание стремени имеет два края: верхний — выпуклый и нижний — вогнутый, которые спереди и сзади дугообразно загибаются и переходят один в другой. Свободная

**1136. Слуховые косточки, ossicula auditus, правые; вид сверху и изнутри.**

**1137. Молоточек, malleus, правый.**  
А — вид спереди. Б — вид сзади. В — вид изнутри.

**1138. Наковальня, incus, правая.**  
А — вид снаружи. Б — вид спереди. В — вид изнутри.


**1139. Стремя, stapes, правое.**  
А — вид сверху. Б — вид снизу. В — вид сбоку.

поверхность основания стремени покрыта хрящом. Основание стремени фиксировано в окне преддверия посредством соединительнотканых волокон *кольцевидной связки стремени, ligamentum anulare stapedis*, образующей барабанно-стременной синдесмоз, *syndesmosis tympanostapedia*.


### Слизистая оболочка барабанной полости

**Слизистая оболочка барабанной полости, tunica mucosa cavitatis tympani**, выстилает барабанную полость и покрывает все входящие в ее состав образования, формируя при этом ряд складок и карманов.


1137



1138



1139



Складки слизистой оболочки барабанной полости:

1. *Передняя молоточковая складка, plica mallearis anterior*, простирается от рукоятки до большой барабанной ости. Она образована участком слизистой оболочки, которая перебрасывается через передний отросток молоточка, переднюю связку молоточка и передний отдел барабанной струны.

2. *Задняя молоточковая складка, plica mallearis posterior*, натянута между рукояткой молоточка и краем барабанной вырезки. Эта складка покрывает латеральную связку молоточка и задний отдел барабанной струны.

3. *Складка наковални, plica incudis*, идет от задней стенки барабанной полости вниз к наковални, где заканчивается у чечвицеобразного отростка.

4. *Складка стремени, plica stapedis*, натянута между пирамидальным возвышением, краем окна преддверия и сухожилием стременной мышцы.

5. *Складка барабанной струны, plica chordae tympani*, образована слизистой оболочкой, приподнятой барабанной струной, проходящей горизонтально на уровне шейки молоточка.

Слизистая оболочка барабанной полости, перебрасываясь с одного образования на другое, ограничивает ряд углублений.

1. *Верхнее углубление барабанной перепонки, recessus membranae tympani superior*, находится кнутри от ненатянутой части барабанной перепонки. Оно ограничено снаружи указанной частью барабанной перепонки, изнутри — головкой и шейкой молоточка и телом наковални; нижней границей является короткий отросток молоточка, верхней — верхняя связка молоточка.

2. *Переднее углубление барабанной перепонки, recessus membranae tympani anterior*, ограничено снаружи барабанной перепонкой, внутри — передней складкой молоточка.

3. *Заднее углубление барабанной перепонки, recessus membranae tympani posterior*, находится между барабанной перепонкой и задней складкой молоточка.

Переднее и заднее углубления барабанной перепонки отделены одно от другого рукояткой молоточка и внизу сообщаются со средним отделом барабанной полости.

## ВНУТРЕННЕЕ УХО

*Внутреннее ухо, auris interna* (рис. 1140—1150; см. рис. 1126, 1132), залегает в толще пирамиды височной кости. В нем различают две части: костный лабиринт и перепончатый лабиринт.

### Костный лабиринт

*Костный лабиринт, labyrinthus osseus* (см. рис. 1132, 1140—1145), делят на 3 части: среднюю, или центральную, называемую *преддверием, vestibulum*, переднюю — *улитку, cochlea*, и заднюю, в состав которой входят три полукружных канала, *canales semicirculares*.

Стенки костного лабиринта выстланы соединительнотканной оболочкой. Костный лабиринт наполнен жидкостью, называемой *перилимфой, perilymptha*, в которой находится перепончатый лабиринт, наполненный в свою очередь *эндолимфой, endolympha*.

### Преддверие

*Преддверие, vestibulum*, находится между барабанной полостью и внутренним слуховым проходом и представлено полостью овальной формы.

Наружная стенка преддверия является внутренней стенкой среднего уха. На ней со стороны внутреннего уха находится окно преддверия, прикрытое со стороны среднего уха основанием стремени.

Внутренняя стенка преддверия образует дно внутреннего слухового прохода. На ней имеются два углубления — *сферическое и эллиптическое углубление, recessus sphericus et ellipticus*, отделенные один от другого вертикально идущим гребнем преддверия, *crista vestibuli*, который вверху заканчивается небольшим возвышением — *пирамидой преддверия, pyramis vestibuli*.

Поверхность пирамиды и окружающего ее костного вещества продырявлена множеством небольших отверстий — *решетчатыми пятнами, maculae cribrosae*. *Верхнее решетчатое пятно, macula cribrosa superior*, сообщает преддверие с внутренним слуховым проходом, где ему соответствует верхнее поле преддверия.

Книзу и кзади от гребня преддверия имеется небольшое отверстие, от

которого начинается узкий каналец — *водопровод преддверия, aqueductus vestibuli*, заканчивающийся на задней поверхности пирамиды височной кости *наружным отверстием водопровода преддверия, apertura externa aquaeductus vestibuli*.

*Сферическое углубление, recessus sphericus*, находится кпереди и книзу от гребня преддверия. Оно округлое и несет на своей внутренней стенке множество отверстий, которые образуют *среднее решетчатое пятно, macula cribrosa media*, соответствующее нижнему преддверному полю на дне внутреннего слухового прохода. В задненижнем отделе сферического углубления на его внутренней стенке имеется небольшая ямка — *улитковое углубление, recessus cochlearis*, являющееся местом залегания слепого конца перепончатой улитки.


*Эллиптическое углубление, recessus ellipticus*, находится кзади и кверху от гребня преддверия и имеет продолговатую форму. В его стенах открывается 5 отверстий трех костных полукружных каналов.

### Костные полукружные каналы

*Костные полукружные каналы, canales semicirculares ossei* (см. рис. 1126, 1132, 1140, 1141), занимают задненижний отдел костного лабиринта и лежат в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.

Различают *латеральный (горизонтальный) полукружный канал, canalis semicircularis lateralis*, *передний (сагittalный) полукружный канал, canalis semicircularis anterior*, и *задний (фронтальный) полукружный канал, canalis semicircularis posterior*.


Костные каналы имеют вид дугообразно изогнутых трубок. В каждом полукружном канале различают два конца — *костные ножки, crura ossae*, соединенные дугообразно изогнутой частью канала. Одна из ножек каждого канала расширена — образует *костную ампулу, ampulla ossea*, и называется *ампулярной костной ножкой, crus osseum ampullaris*, другая, нерасширенная, — это *простая костная ножка, crus osseum simplex*. Простые костные ножки переднего и заднего полукружных каналов соединяются, образуя *общую костную ножку, crus osseum commune*. Поэтому три полукружных канала от-




1140. Костный лабиринт, *labyrinthus osseus*, правый; вид с наружной стороны и спереди.

1141. Костный лабиринт, *labyrinthus osseus*, правый; вид с наружной стороны и немного снизу.

(Полукружные каналы, преддверие и основной завиток улитки вскрыты.)





крываются в преддверие пятью отверстиями.

Костных ампул (см. рис. 1140—1142) три, по числу костных полукуружных каналов: передняя костная ампulla, задняя костная ампulla и латеральная костная ампulla.

**Латеральный полукуружный канал, canalis semicircularis lateralis,** имеет длину 14—16 мм. Его латеральная костная ампulla, *ampulla ossea lateralis*, открывается впереди и кнаружи от окна преддверия; простая костная ножка открывается в преддверие между отверстиями общей ножки и ампулярной части заднего полукуружного канала. Выпуклая часть латерального полукуружного канала вдается в барабанную полость, образуя на внутренней стенке верхнего отдела барабанной полости возвышение латерального полукуружного канала.

**Передний полукуружный канал, canalis semicircularis anterior** (см. рис. 1126, 1140, 1141), имеет длину 18—20 мм. Передняя костная ампulla, *ampulla ossea anterior*, переднего полукуружного канала открывается в преддверие рядом с ампулярной частью латерального полукуружного ка-

нала, тотчас над окном преддверия. Простая костная ножка этого канала соединяется с одноименной костной ножкой заднего канала и образует общую костную ножку, которая открывается в заднем отделе преддверия на его внутренней стенке, кзади и кверху от внутреннего отверстия водопровода улитки.

Выпуклая часть переднего полукуружного канала направлена кверху и обусловливает образование на передней поверхности каменистой части височной кости дугообразного возвышения.

**Задний полукуружный канал, canalis semicircularis posterior** (см. рис. 1126, 1140, 1141), имеет длину 22 мм. Его задняя костная ампulla, *ampulla ossea posterior*, открывается в области задненижней стенки преддверия, где находится *нижнее решетчатое пятно, macula cribrosa inferior*, которому соответствует одиночное отверстие внутреннего слухового прохода.

#### Улитка

**Улитка, cochlea** (см. рис. 1126, 1140, 1141, 1143—1146), начинается в передненижнем отделе наружной стенки

**1142. Внутренний слуховой проход, meatus acusticus internus, и улитковый лабиринт, labyrinthus cochlearis, правый.**  
(*Внутренний слуховой проход и спиральный канал улитки вскрыты.*)

**1143. Костная улитка, cochlea, правая; вид снизу.**




А — стержень и костная спиральная пластинка.  
Б — костная улитка частично вскрыта.


**1144. Костная улитка, cochlea, правая.**

А — стена костной улитки. Б — костная спиральная пластинка. В — стержень улитки.

**1145. Костная улитка, cochlea, правая.**  
(*Срединный распил.*)

преддверия, где имеется углубление, которому соответствует со стороны барабанной полости мыс. Отсюда начинается канал улитки. Он спирально загибается и образует  $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$  витка, вследствие чего его называют спиральным каналом улитки, *canalis*





*spiralis cochlea*. Стенки канала образованы костным веществом этой части лабиринта и покрыты слуховыми зубчиками, *dentes acustici*, представляющими собой фибрillлярные утолщения, разделенные бороздками, особенно плотно покрывающими верхнюю часть спирального канала улитки.

Начальная часть канала улитки отделена от барабанной полости медиальной стенкой последней, обуславливая образование на ней мыса.

Первый виток улитки называют основным, второй — средним и последний — верхушечным завитком.

Улитка имеет коническую форму. Различают основание улитки, *basis cochleae*, шириной 7—9 мм и верхушку — купол улитки, *cipula cochleae*. Расстояние от основания до верхушки равно 4—5 мм. Основание улитки обращено медиально к внутреннему слуховому проходу, верхушка — латерально, в сторону барабанной полости и мышечно-трубного канала.

Спиральный канал улитки имеет длину 28—30 мм; он слепо заканчивается в области верхушки пирамиды. Диаметр просвета канала не везде

#### 1146. Строение костного и перепончатого лабиринтов улитки, правой. (Срединный разрез проходит через стержень улитки.)

одинаков: в начальном отделе он широкий (6 мм), по мере приближения к верхушке улитки постепенно суживается, составляя 2 мм.

В соответствии с ходом спирального канала в центре улитки имеется конусообразная ось улитки, называемая стержнем, *modiolus*. Стержень состоит из губчатой костной ткани и образует внутреннюю стенку спирального канала. Его широкая часть, или основание стержня, *basis modiolii*, обращено к внутреннему слуховому проходу и имеет множество отверстий, которые переходят в продольные каналы стержня, *canales longitudinales modiolii*, образующие продырявленный спиральный путь, *tractus spiralis foraminosus*. Продольные каналы оканчиваются в спиральном канале стержня, *canalis spiralis modiolii*. Вер-

хушка стержня не доходит до вершины улитки, а переходит в тонкую костную пластинку стержня, *lamina modiolii*. Эта пластина служит промежуточной стенкой между вторым и третьим завитками улитки.

Завитки улитки отделены один от другого промежуточной стенкой, которая образована костным веществом улитки. В полость спирального канала на всем его протяжении вдается костная спиральная пластина, *lamina spiralis ossea* (см. рис. 1145). Она отходит от стержня улитки и, направляясь в сторону периферической стенки спирального канала, заканчивается, не доходя до нее, на середине поперечника канала.

Спиральная пластина начинается на внутренней стенке преддверия вблизи окна улитки. Поднимаясь к вершине улитки, спиральная пластина заканчивается в области последнего завитка изогнутым краем — крючком спиральной пластины, *hamulus laminae spiralis*.

Основание спиральной пластины толще, чем его свободный край, и содержит на всем протяжении спиральный канал стержня. Последний соединяется

нен посредством продольных каналов стержня с отверстиями в области основания улитки и посредством спиральной щели, проходящей на всем протяжении спиральной пластинки,— со спиральным органом.

Кроме костной спиральной пластинки, в улитке различают еще *вторичную спиральную пластинку*, *lamina spiralis secundaria*. Она представляет собой небольшой костный гребешок шириной 0,5 мм, который находится на наружной стенке основания завитка улитки и заканчивается на середине его длины.


От свободного края костной спиральной пластинки к противоположной стенке улитки на всем протяжении натянута *спиральная мембрана*, *membrana spiralis*, она является частью перепончатой улитки (см. ладее).

Костная спиральная пластинка вместе с улитковым протоком делит полость спирального канала на две части, или лестницы: верхнюю, называемую лестницей преддверия, и нижнюю—барабанную лестницу (см. рис. 1143—1148).

Обе лестницы объединяются в *перилимфатическое пространство*, *spatium perilymphaticum*, к которому относят также *перилимфатический проток*, *ductus perilymphaticus*, представляющий собой удлиненную часть перилимфатического пространства, углубляющегося в водопровод преддверия.

*Лестница преддверия*, *scala vestibuli*, начинается в переднем отделе преддверия, поднимается по верхней поверхности спиральной пластинки до верхушки улитки, где в области *крючка спиральной пластинки*, *hamulus laminae spiralis*, переходит в барабанную лестницу. Место перехода лестницы преддверия в барабанную лестницу называется *геликотрема*, *helicotrema*, и представляет собой небольшое отверстие.

*Барабанская лестница*, *scala tympani*, начинается в области геликотремы, идет по нижней поверхности спиральной пластинки в сторону основания улитки. Совершив  $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$  оборота, барабанская лестница слепо заканчивается в области начального отдела завитка улитки. Здесь на наружной стенке барабанной лестницы располагается окно улитки, которое затянуто вторичной барабанной перепонкой. Передний край окна улитки ограничен гребешком окна улитки, впереди



### 1147. Костный и перепончатый лабиринты, правые (полусхематично).

которого в области дна барабанной лестницы начинается водопровод улитки, *aqueductus cochleae*, представляющий собой узкий костный канал, связывающий перилимфатическое пространство улитки с подпаутинным пространством.

Указанный канал начинается воронкообразным расширением и, пройдя через толщу пирамиды височной кости, заканчивается на ее нижней поверхности *наружным отверстием канальца улитки*, *apertura externa canalici cochleae*, спереди от яремной ямки.

#### Перепончатый лабиринт

**Перепончатый лабиринт**, *labyrinthus membranaceus* (см. рис. 1146—1150), имеет фактически те же части, что и костный. В нем различают *эллиптический мешочек*, *utriculus*, и *сферический мешочек*, *sacculus*, залегающие в преддверии костного лабиринта; *перепончатые полукружные протоки*,

*ductus semicirculares*, и *улитковый проток*, *ductus cochlearis*.

Перепончатый лабиринт располагается внутри костного. Все части перепончатого лабиринта по размерам меньше соответствующих отделов костного, поэтому между их стенками имеется полость, называемая перилимфатическим пространством, выполненная лимфоподобной жидкостью—перилимфой. Полость перепончатого лабиринта заполнена эндолимфой.

Стенка перепончатого лабиринта состоит из трех слоев: наружного соединительнотканного, среднего—основной мембранны и внутреннего—эпителиального.

Перепончатая улитка, или *улитковый проток*, *ductus cochlearis*, является местом распределения периферических аппаратов улитковой части преддверно-улиткового нерва. Она относится к органу слуха и образует *спиральный орган*, *organum spirale*.

Перепончатые полукружные каналы, а также эллиптический и сферический мешочки являются местом распределения периферических аппаратов преддверной части того же нерва и составляют вестибулярный аппарат, являясь органом равновесия.

### Улитковый проток

**Улитковый проток**, *ductus cochlearis* (см. рис. 1146—1149, 1152), располагается внутри спирального канала костной улитки и соответственно его ходу образует  $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$  оборота. Канал улитки трехгранный и имеет два слепых конца. Один конец находится в начальном отделе улитки в области преддверия и носит название *слепого преддверного выпячивания*, *сесим vestibulare*, другой — в области вершины улитки — *слепое выпячивание купола*, *сесим cupulare*.

Улитковый проток располагается в наружном отделе спирального канала улитки, между свободным краем костной спиральной пластинки и наружной стенкой улитки; вместе с первым он отделяет лестницу преддверия от барабанной лестницы.

Полость протока улитка сообщается посредством *соединяющего протока*, *ductus reuniens*, с полостью сферического мешочка и ограничена тремя

стенками. Наружная стенка соединяется с *наружной стенкой костной улитки*, *paries externus cochlea*, вторая обращена в полость лестницы преддверия и называется *преддверной стенкой улиткового протока* [*преддверная мембрана*], *paries vestibularis ductus cochlearis* [*membrana vestibularis*]. Третья стенка находится на границе с барабанной лестницей — это *барабанная стенка улиткового протока* [*спиральная мембрана*], *paries tympanicus ductus cochlearis* [*membrana spiralis*].

Она является как бы продолжением костной спиральной пластинки и носит название *базилярной пластинки*, *lamina basilaris*.


Наружная стенка улиткового протока соединена с надкостницей, выстилающей внутреннюю поверхность


полости костной улитки. Она состоит из трех слоев: наружного — соединительнотканного, являющегося продолжением *спиральной связки* [*спиральный гребень*], *ligamentum spirale* [*crista spirale*], посредством которой базилярная пластинка фиксирована у наружной стенки улитки; среднего — *сосудистой полоски*, *stria vascularis*, сосуды которой продуцируют эндолимфу, и внутреннего, представляющего собой эпителий, выстилающий полость улиткового протока.

Межу надкостницей костной улитки и наружной стенкой улиткового протока проходит *выступающий суд*, *vas prominens*, который образуется от соединения двух каналцев, отходящих от сферического и эллиптического мешочеков, и впадает в водопровод преддверия.

Преддверная стенка улиткового протока начинается на поверхности костной спиральной пластинки, которая обращена в полость лестницы

1148. Разрез через основной завиток улитки (полусхематично).





преддверия. Направляясь в сторону наружной стенки улитки, преддверная мембрана образует с костной спиральной пластинкой угол  $45^\circ$ . Эта стенка улиткового протока самая тонкая, состоит из соединительной основы, покрытой эпителием.

Другая стенка улиткового протока — базилярная пластина — патянула между свободным краем костной спиральной пластиинки и наружной стенки улитки, где она фиксирована посредством спиральной связки улитки к базилярному гребешку, *crista basilaris*. Кроме базилярной пластиинки, в образовании этой стенки протока улитки принимает участие самый наружный отдел костной спиральной пластиинки, который входит в полость улиткового протока.

У места соединения спиральной связки улитки с базилярной пластиинкой располагается спиральный выступ, *prominentia spiralis*, имеющий сосуды. Кнутри от него находится наружная спиральная борозда, *sulcus spiralis externus*.


В толще базилярной пластиинки, под спиральным органом, располагается спиральный сосуд, *vas spirale*, представляющий собой капилляр, получающий артериолы, подходящие к нему через костную спиральную пластиинку, и мелкие вены от спиральной связки улитки.

Утолщенный край костной спиральной пластиинки, *limbus laminae spiralis osseae*, дополняется здесь соедини-

1149. Перепончатый лабиринт, *labyrinthus membranaceus*, правый (слепок).

1150. Полукружный канал.

(Поперечный разрез).  
1 — ductus semicircularis; 2 — epithelium ductus semicircularis; 3 — trabecula perilymphatica; 4 — ductus perilympaticus; 5 — arteria.



тельнотканными и эпителиальными элементами. От него в полость улиткового канала свободно свисает гребешок, или губа *преддверного края*, *labium limbi vestibulare*, которая продолжается в *покровную мембрану*, *membrana tectoria*. В том месте, где базилярная пластина соединяется с костной спиральной пластинкой, край последней вытянут в барабанный гребень, или губу *барабанного края*, *labium limbi timpanicum*.

Указанные две губы отделены одна от другой *внутренней спиральной бороздой*, *sulcus spiralis internus*. Край барабанной губы продырявлен *отверстиями нервов*, *foramina nervosa*, которыми открывается в улитковый проток спиральная щель костной спиральной пластиинки.

На всем протяжении стенки в полости улиткового протока располагается *спиральный орган*, *organum spirale*. Он находится кнаружи от губы барабанного края, сложно устроен и представлен тремя группами эпителиальных клеток, среди которых различают внутренние и наружные волосковые сенсорные (слуховые) клетки. Спиральный орган покрыт *сетчатой мембрани*, *membrana reticularis*, представляющей сложный комплекс мембран, окаймляющий верхнюю поверхность клеток спирального органа.

Спиральный орган — место залегания рецепторного аппарата улитковой части преддверно-улиткового нерва (см. рис. 1146, 1148). К спиральному органу в толще костной спиральной пластиинки подходят дендриты клеток, образующих *спиральный узел улитки*, *ganglion spirale cochlearis*, аксоны этих клеток составляют улитковый корешок.

### Сферический и эллиптический мешочки

**Сферический и эллиптический мешочки**, *sacculus et utriculus* (см. рис. 1147, 1149, 1152), расположены в полости костного преддверия и залегают соответственно в сферическом и эллиптическом углублениях.

Сферический мешочек сообщается с улитковым протоком, а эллиптический — с полостью трех полукружных перепончатых протоков. Кроме того, указанные мешочки сообщаются между собой следующим образом: от сферического мешочка отходит небольшой проток, который соединяет-

ся с протоком, отходящим от эллиптического мешочка, — это *проток эллиптического и сферического мешочек*, *ductus utriculosaccularis*. Последний переходит в *эндолимфатический проток*, *ductus endolymphaticus*, который проходит через каменистую часть височной кости и заканчивается на ее задней поверхности *эндолимфатическим мешком*, *saccus endolymphaticus*. Концевая часть эндолямфатического протока имеет изогнутое утолщение — *сосудистую полоску*, *stria vascularis*, находящуюся в контакте с твердой мозговой оболочкой. Между сферическим и эллиптическим мешочками и костными стенками преддверия находится перилимфатическое пространство, заполненное перилимфой. Перилимфатическое пространство пронизано соединительнотканными тяжами, идущими от их стенок к стенкам костного преддверия. От наружной стенки костного преддверия поверхность мешочек отделена широкой перилимфатической щелью, называемой перилимфатической цистрой преддверия. В местах вхождения нервов медиальная поверхность сферического и эллиптического мешочек фиксирована к соответствующей стенке преддверия.

Сферический мешочек имеет округлую, несколько сплющенную форму. Его внутренний конец несколько расширен, а наружный, равномерно суживаясь, переходит в *соединяющий проток*, *ductus reuniens*. Последний соединяет полость сферического мешочка с полостью улиткового канала.

На внутренней поверхности переднемедиальной стенки сферического мешочка находится  *пятно сферического мешочка*, *macula sacci*, где располагаются окончания сферически-мешотчатого нерва. Стенка мешочка в этом месте утолщена, беловатого цвета вследствие присутствия *статоконий*, *statoconia*, и *мембранны статокония*, *membrana statoconiorum*, и содержит чувствительные, или волосковые, сенсорные клетки, *cellulae sensoriae pilosae*.

Эллиптический мешочек продолговатый. На его внутренней поверхности, занимая часть нижней, передней и отчасти наружной стенок, располагается  *пятно эллиптического мешочка*, *macula utriculi*, являющегося местом разветвления эллиптически-мешотчатого нерва.


Этот участок длиной до 3 мм и шириной до 2,5 мм отличается беловатым цветом в результате присутствия статоконий, богатых известковыми кристаллами и содержащих на своей поверхности волосковые сенсорные клетки. Статоконии укреплены мембраной статоконий, представляющей собой тонкую слизистую оболочку, выстилающую внутреннюю поверхность пятна эллиптического мешочка. Область пятна со стороны наружной поверхности отделена от остальной части эллиптического мешочка небольшим перехватом и обозначается как *эллиптическое углубление*, *recessus ellipticus* (см. рис. 1141); оно соединяется с полукружными протоками.

### Полукружные протоки

**Полукружные протоки**, *ductus semicirculares* (см. рис. 1148, 1150, 1151, 1153), всего три: *передний*, *латеральный* и *задний*, *ductus semicirculares anterior*, *lateralis et posterior*, залегают в полости соответствующих костных полукружных каналов. Повторяя форму последних, каждый полукружный проток имеет изогнутую часть и два конца — *перепончатые ножки*, *crura membranacea*. Одна из ножек оканчивается ампулообразным расширением — эта *ампулярная перепончатая ножка*, *crus membranaceum ampullaris*, другая непосредственно открывается в эллиптический мешочек *простой перепончатой ножкой*, *crus membranaceum simplex*. Нерасширенные концы переднего и заднего полукружных протоков соединяются вместе, образуя *общую перепончатую ножку*, *crus membranaceum commune*, которую считают задним выпячиванием эллиптического мешочка.

Стенки полукружных протоков соединяются с костными стенками этой части улитки посредством соединительнотканых тяжей (см. рис. 1150). Сама стенка полукружного протока образуется двумя слоями: наружным, являющимся *собственной мембрани полукружного протока*, *membrana propria ductus semicircularis*, и представляющим собой подэпителиальный слой соединительной ткани, и внутренним слоем — *базальной мембрани полукружного протока*, *membrana basalis ductus semicircularis*, несущей *эпителий полукружного протока*, *epithelium ductus semicircularis*.

Полукружные протоки располагаются эксцентрично по отношению



к костным стенкам, таким образом, что выпуклая, или наружная, стена полукружных протоков прилегает к костным стенкам и прочно соединяется с ними. Перилимфатическое пространство полукружных каналов находится со стороны вогнутой поверхности полукружных протоков.

Ампулярные перепончатые ножки полукружных протоков широко сообщаются с полостью эллиптического мешочка. На наружной поверхности каждой перепончатой ампулы: передней, задней и латеральной, *ampulla membranaceae anterior, posterior et lateralis*, — имеется поперечно идущая ампулярная бороздка, *sulcus ampullaris*. Указанные бороздки являются местом выхода нервов каждой ампулы.

На внутренней поверхности ампулы бороздка соответствует ампулярный гребешок, *crista ampullaris*, занимающий  $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$  окружности ампулы. Поверхность гребешков покрыта рецепторами анализатора равновесия — волосковыми сенсорными клетками, где начинаются волокна переднего, латерального и заднего ампулярных нервов.

### 1151. Ход волокон слухового нерва (полусхематично). (Проекция волокон на поверхность полушария.)

#### Внутренний слуховой проход

**Внутренний слуховой проход**, *meatus acusticus internus* (см. рис. 996, 1142), начинается на задней поверхности каменистой части височной кости **внутренним слуховым отверстием**, *porus acusticus internus*. Направляясь назад и несколько книзу, он заканчивается дном внутреннего слухового прохода, *fundus meatus acustici interni*.

Дно внутреннего слухового прохода образует наружную стенку некоторых отдалов внутреннего уха (основание стержня преддверия). В самом верхнем отделе дна есть небольшое углубление — **поле лицевого нерва**, *area nervi facialis*, от которого берет начало канал лицевого нерва.

Кнаружи от поля лицевого нерва находится участок костного вещества, продырявленный множеством отверстий, образующих **верхнее преддверное поле**, *area vestibularis superior*, ко-

торому соответствует верхнее решетчатое пятно на внутренней стенке преддверия. Указанные отверстия ограничены внизу **поперечным гребнем**, *crista transversa*.

Ниже поперечного гребня в переднем отделе дна внутреннего слухового прохода находится углубление — **поле улитки**, *area cochleae*, в области которого имеется ряд спирально расположенных мелких отверстий, ведущих в продырявленный спиральный путь улитки. Позади поля улитки находится **нижнее преддверное поле**, *area vestibularis inferior*. Оно содержит группу отверстий, соответствующих среднему решетчатому пятну стенки преддверия.

В задненижнем отделе дна внутреннего слухового прохода расположено **одиночное отверстие**, *foramen singulare*; ему соответствует нижнее решетчатое пятно стенки преддверия (см. рис. 1141).

#### Преддверно-улитковый нерв

**Преддверно-улитковый нерв**, *n. vestibulocochlearis* (рис. 1151; см. рис. 996, 1146), состоит из двух частей: улиткового и преддверного корешков.

**Улитковый корешок, radix cochlearis**, начинается от спирального узла улитки, который залегает в спиральном канале стержня. Периферические отростки нервных клеток узла направляются через отверстия нервов к спиральному органу.

Центральные отростки клеток спирального узла идут через продольные каналы стержня и выходят из улитки через отверстия продырявленного спирального пути и центральное отверстие улитки, попадая во внутренний слуховой проход. Здесь центральные отростки спирального узла соединяются и образуют улитковый корешок.

Волокна, составляющие улитковый корешок, заканчиваются в улитковых ядрах: заднем и переднем (второй нейроцит). Волокна, возникающие в заднем ядре, идут по поверхности ромбовидной ямки в составе мозговых полосок, а затем в области средней линии погружаются в мозговое вещество, переходят на противоположную сторону и, направляясь вверх, доходят до подкорковых слуховых центров.

Волокна, возникающие в переднем ядре, погружаются в вещество мозга. Большая часть их заканчивается на клетках заднего ядра трапециевидного тела противоположной (большинство волокон) и своей сторон.

Волокна, начинаящиеся в ядре трапециевидного тела, вместе с меньшей частью волокон переднего и улиткового ядер и с волокнами заднего улиткового ядра (второй нейроцит) поднимаются кверху, образуют с каждой стороны латеральную петлю, которая заканчивается в подкорковых слуховых центрах — нижних холмиках крыши среднего мозга и в медиальном коленчатом теле. В последнем начинаются новые волокна, которые через внутреннюю капсулу направляются к слуховой области коры — к средней части верхней височной извилины. Преддверный корешок начинается от преддверного узла, который лежит на дне внутреннего слухового прохода. Здесь от него отходит небольшая **улитковая соединительная ветвь, r. communicans cochlearis**.

В преддверном узле различают две части — **верхнюю и нижнюю, pars rostral [superior] et pars canalis [inferior]**. Периферические отростки нервных клеток верхней части этого узла вступают в верхнее преддверное поле внутреннего слухового прохода и через верхнее решетчатое пятно следуют во внутреннее ухо, где распределяются

в пятно эллиптического мешочка и в верхнем и латеральном ампулярных гребешках, образуя **эллиптически-мешотчато-ампулярный нерв, n. utriculoampullaris, передний ампулярный нерв, n. ampullaris anterior, и латеральный ампулярный нерв, n. ampullaris lateralis** (рис. 1152; см. рис. 1148, 1149).

Периферические отростки нервных клеток нижней части преддверного узла вступают в нижнее преддверное поле и в одночное отверстие внутреннего слухового прохода.

Та часть нижней ветви, которая вступает в нижнее преддверное поле, называется **сферически-мешотчатым нервом (верхняя часть), n. saccularis (pars rostral)**. Он вступает через среднее решетчатое пятно во внутреннее ухо и направляется к пятну сферического мешочка. Через одночное отверстие и нижнее решетчатое пятно во внутреннее ухо входит **задний ампулярный нерв, n. ampullaris posterior**, который разветвляется в ампулярных гребешках и главным образом в ампулярном гребешке задней перепончатой ампулы.

Центральные отростки нервных клеток преддверного узла образуют преддверный корешок. Отойдя от узла, преддверный корешок тотчас соединяется с улитковым корешком и образует преддверно-улитковый нерв. Этот нерв идет по внутреннему слуховому проходу (см. рис. 1151), а затем через внутреннее слуховое отверстие вступает в полость черепа и входит в толщу продолговатого мозга, кнутри от нижних мозжечковых ножек. Здесь, делясь на две ветви — восходящую и нисходящую, заканчивается в ядрах нерва преддверия: 1) в медиальном вестибулярном ядре, 2) в верхнем вестибулярном ядре, 3) в латеральном вестибулярном ядре, 4) в нижнем вестибулярном ядре.

Волокна, возникающие в верхнем вестибулярном ядре, по нижним мозжечковым ножкам достигают мозжечка и, как правило, заканчиваются на клетках ядра шатра и шаровидного ядра. Кроме того, ядра преддверного нерва имеют связи с рядом черепных нервов и со спинным мозгом (см. «Проводящие пути спинного и головного мозга»).

#### НЕРВЫ НАРУЖНОГО И СРЕДНЕГО УХА

**Нервы наружного уха.** К передней поверхности ушной раковины подходят следующие нервы:

1) передняя ветвь большого ушного нерва — ветвь шейного сплетения (см. рис. 984, 999—1002);

2) ушная ветвь блуждающего нерва;

3) передние ушные нервы от ушно-височного нерва (см. рис. 976, 1001).

К задней поверхности ушной раковины направляется задняя ветвь большого ушного нерва.

Кроме указанных нервов, являющихся двигательными, к ушной раковине подходят ветви лицевого нерва:

1) задний ушной нерв соединяется с ушной ветвью блуждающего нерва и посыпает ветви к верхней и задней ушным мышцам и к мелким мышцам ушной раковины;

2) височные ветви лицевого нерва обеспечивают иннервацию передней ушной мышцы и мелких мышц ушной раковины.

К наружному слуховому проходу подходят нервы наружного слухового прохода от ушно-височного нерва и ушная ветвь от блуждающего нерва.

**Нервы среднего уха.** К слизистой оболочке среднего уха подходят следующие нервы:

1) от барабанного сплетения, которое образовано в основном за счет барабанного нерва (ветвь языко-глоточного нерва);

2) от соединительной ветви лицевого нерва с барабанным сплетением;

3) сонно-барабанные нервы, отходящие от внутреннего сонного сплетения.

**Нервы барабанной перепонки.** Со стороны наружного уха к барабанной перепонке подходят следующие нервы:

1) нервы наружного слухового прохода от ушно-височного нерва, отдающие ветвь барабанной перепонки, *r. membranae tympani*;


2) ушные ветви блуждающего нерва образуют барабанное сплетение барабанной перепонки; для кожи и собственной пластинки барабанной перепонки из его ветвей образуется второе, подэпителиальное, сплетение.

Со стороны среднего уха к барабанной перепонке подходят ветви барабанного сплетения (см. рис. 987, 989).

**Нервы слуховой трубы.** К слуховой трубе подходят следующие нервы:

1) ветвь слуховой трубы от барабанного сплетения (см. рис. 987);

2) ветви от глоточного сплетения.



#### СОСУДЫ ПРЕДДВЕРНО-УЛИТКОВОГО ОРГАНА

**Сосуды наружного уха.** Наружную поверхность ушной раковины кровоснабжают передние ушные ветви поверхностной височной артерии, внутреннюю поверхность — ушная ветвь затылочной артерии и задняя ушная ветвь наружной сонной артерии.

Венозная кровь оттекает по однотипным венам: по передним ушным венам в заниженчелюстную вену и по задним ушным венам в наружную яремную вену.

**Сосуды наружного слухового прохода.** К наружному слуховому проходу подходят передние ушные ветви от поверхностной височной артерии и глубокая ушная артерия от верхнечелюстной артерии.

Венозная кровь оттекает в систему верхнечелюстной вены.

**Сосуды среднего уха.** К среднему уху подходят следующие артерии:

1) передняя барабанная артерия от верхнечелюстной артерии, вступающая в барабанную полость через барабанно-каменистую щель;

2) нижняя барабанная артерия — ветвь восходящей глоточной артерии,

#### 1152. Кровеносные сосуды лабиринта, правого; вид изнутри (схема по V. F. Siebemann).

проникает в барабанную полость через барабанный каналец;

3) верхняя барабанная артерия от средней менингальной артерии направляется в барабанную полость через расщелину большого каменистого нерва;

4) сонно-барабанные ветви от внутренней сонной артерии вступают в барабанную полость через одноименные отверстия в задней стенке внутреннего сонного канала;

5) шилососцевидная артерия от задней ушной артерии входит через шилососцевидное отверстие в канал лицевого нерва и посыпает в барабанную полость через каналы барабанной струны заднюю барабанную артерию, а также стремянную ветвь к одноименной мышце и сосцевидные ветви к слизистой оболочке яичек сосцевидного отростка.


Ветви указанных сосудов, соединяясь между собой, образуют в слизистой оболочке барабанной полости

густую артериальную сеть. В глубоких слоях слизистой оболочки располагаются более крупные артерии, а в поверхностных — преимущественно капиллярная сеть.

**Сосуды слуховой трубы.** К слуховой трубе подходят глоточные ветви восходящей глоточной артерии, артерия крыловидного канала, каменистая ветвь от средней менингальной артерии; ветви нижней барабанной артерии идут к костной части трубы.

Вены среднего уха несут кровь в верхнечелюстные вены, в средние менингальные вены, во внутреннюю яремную вену и в глоточное сплетение.

**Сосуды барабанной перепонки.** К барабанной перепонке подходят: со стороны наружного слухового прохода — ветвь глубокой ушной артерии, а также ряд других артерий кожи наружного слухового прохода; со стороны среднего уха — ветви передней барабанной артерии и другие артерии, переходящие на барабанную перепонку из смежных отделов слизистой оболочки. Указанные артерии, разветвляясь в барабанной перепонке, образуют две сети кровеносных



### 1153. Развитие преддверно-улиткового органа.

1 — эндолимфатический проток; 2 — закладка внутреннего уха; 3 — закладка слуховых косточек; 4 — закладка височной кости; 5 — закладка наковальни; 6 — закладка молоточка; 7 — закладка стремечка; 8 — закладка наружного слухового прохода; 9 — зародыш полости среднего уха; 10 — слуховая труба; 11 — эллиптический мешочек; 12 — сферический мешочек; 13 — стремечко в преддверном окне; 14 — улитка; 15 — окно улитки; 16 — барабанная перепонка; 17 — ушная раковина; 18 — молоточек; 19 — наковальня; 20 — полукружные каналы.

сосудов: наружную в кожном слое и внутреннюю — в слизистой оболочке барабанной перепонки.

Соответственно артериям вены образуют венозные сплетения, при этом вены наружной поверхности соединяются с венами внутренней поверхности барабанной перепонки.

**Сосуды внутреннего уха, vasa auris internae** (см. рис. 1152).

1. Артерия лабиринта является ветвью базилярной артерии. Она вступает во внутренний слуховой проход, где делится на улитковую ветвь и преддверные ветви.

Улитковая ветвь, *r. cochlearis*, посылает ветви к первому обороту завитка улитки и, направляясь по оси улитки, отдает ветви к спиральному узлу улитки и к костной спиральной пластинке, к среднему и верхушечному завиткам и к надкостнице (эндосту), выстилающей барабанную лестницу. На своем пути она образует множество артериальных клубочков улитки, *glomeruli arteriosi cochleae*, расположенных в подэпителиальном слое лестницы преддверия.

Преддверные ветви, *rr. vestibulares*, кровоснабжают перепончатое пред-

дверие и надкостницу (эндост) преддверия.

2. Шилососцевидная артерия в лицевом канале отдает небольшую ветвь, которая, вступив в среднее ухо, через окно улитки направляется к улитке.

Венозная кровь оттекает от внутреннего уха в вены лабиринта.

**Вены лабиринта, vv. labyrinthi** (см. рис. 1152). Эти вены собирают кровь от стенок внутреннего слухового прохода, слухового нерва и спиральных вен улитки, от канальца улитки и водопровода преддверия; они впадают в нижний каменистый синус.

1. *Вена канальца улитки, v. canaliculi cochleae*, собирает венозную кровь из вены спиральной пластинки, вен спиральной связки улитки и спирального узла (передняя и задняя спиральные вены располагаются в барабанной лестнице), а также из вен эллиптического и сферического мешочеков. Вена канальца улитки идет по канальцу улитки и впадает в верхнюю луковицу внутренней яремной вены.

2. *Вена водопровода преддверия, v. aqueductus vestibuli*, формируется из вен полукружных протоков и эллиптического мешочка. Она выходит из каменистой части височной кости по водопроводу преддверия и впадает в верхний каменистый синус.

3. *Сpirальная вена стержня, v. spiralis modiolii*, собирает кровь от стержня улиткового протока, залегает в базилярной пластинке и впадает в вены лабиринта.

4. *Преддверные вены, vv. vestibulares*, представлены несколькими мелкими венами, отводящими кровь от стенок преддверия и подходящими к венам лабиринта.


#### РАЗВИТИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДДВЕРНО-УЛИТКОВОГО ОРГАНА

Развитие преддверно-улиткового органа начинается в начале 3-й недели внутриутробного периода (рис. 1153).

Перепончатый лабиринт физиологически развивается раньше всех образований уха. В эмбриогенезе он закладывается в виде слуховой ямки энтодермы вблизи первого жаберного кармана; в дальнейшем края ямки срастаются и образуется слуховой пузырек, погружающийся в толщу мезенхимы. Путем образования различной формы выпячиваний, складок, отшнуровывания форма пузырька усложняется, образуя перепончатый лабиринт. Мезенхима, окружающая зачаток внутреннего уха, формирует соединительную ткань, а затем хрящевой покров, на месте которого возникают костный лабиринт и перилимфатические пространства.

Барабанная полость развивается из дистальной части первого жаберного кармана, а слуховая труба — из его проксимальной части. Слуховые kostочки развиваются из первой и второй жаберных дуг.

Наружное ухо формируется из мезенхимы стенок первой жаберной бо-



#### 1154. Вкусовая луковица.

1 — первые вкусовые волокна; 2 — вкусовая почка (чашечка); 3 — вкусовые клетки; 4 — поддерживающие клетки; 5 — вкусовое отверстие (пора).

розды (углубление энтодермы, соответствующее первому жаберному карману).

Высота ушной раковины у новорожденного незначительно превосходит ширину, у взрослого высота почти вдвое больше ширины. Наружный слуховой проход у новорожденного узкий, но относительно длинный. Положение барабанной перепонки у новорожденного в связи с недоразвитием височной кости и барабанного кольца и положением наружного слухового прохода значительно более косое, чем у взрослого.

Слуховые kostочки у новорожденного соответствуют величине их у взрослого, однако в теле наковални и в головке молоточка еще имеются хрящевые участки. Слуховая труба короче и шире, чем у взрослого, ее глоточное отверстие располагается на уровне твердого неба, а с возрастом поднимается до уровня заднего конца нижней раковины, иногда несколько выше. Отличия внутреннего уха у новорожденного и взрослого очень незначительны и касаются преимущественно процесса окостенения и развития некоторых образований, например костного лабиринта.

#### ОРГАН ВКУСА

*Орган вкуса, organum gustus [gustatorium]*, объединяет периферические аппараты вкусового анализатора, располагающиеся в полости рта.

Рецепторы, воспринимающие вкусовые раздражения, представлены вкусовыми почками, а верхушкой достигает свободной поверхности эпителия, где открывается небольшим *вкусовым отверстием (порой)*, *porus gustatorius*.

Общее число вкусовых почек у взрослого человека колеблется от 2000 до 2500. Благодаря наличию специализированных вкусовых клеток они способны избирательно чувствовать качество пищи с учетом ее вкусовых оттенков: сладкое, горькое, кислое, соленое.

Вкусовая почка состоит из трех видов клеток: *вкусовых клеток, cellulae gustatoriae*, занимающих центральный отдел почки, а также *поддерживающих и базальных клеток, cellulae sustentaculares et basales*, располагающихся на периферии.

Пища, растворенная слюной, заходит во вкусовые отверстия почек, раздражая нервные окончания, заложенные во вкусовых клетках.

Вкусовые почки расположены главным образом в слизистой оболочке языка: в составе желобовидных, листовидных, грибовидных сосочков.

Одиночные вкусовые почки локализуются в слизистой оболочке передней поверхности мягкого неба, надгортанника и задней стенки глотки.

Вкусовые раздражения, воспринимаемые вкусовыми почками, передаются по ветвям языко-глоточного нерва и барабанной струны к ядрам мозгового ствола, а отсюда к области коркового конца вкусового анализатора, который находится рядом с корковым концом обонятельного анализатора — область крючка (gyrus hippocampalis) (рис. 1155, 1156).

Ход центральных волокон, начинающихся от нервных окончаний общей и специальной чувствительности языка, см. «Черепные нервы» (VII, IX и X пары).


## ОРГАН ОБОНИЯНИЯ

*Орган обоняния, organum olfactus [olfactorium]*, представляет собой периферический аппарат обонятельного анализатора. Он располагается в слизистой оболочке носа, где занимает область верхнего носового хода и задненеверхнего отдела перегородки, получившую название обонятельной области слизистой оболочки носа, *regio olfactoria tunicae mucosae nasi* (рис. 1157).

Этот отдел слизистой оболочки носа отличается от остальных ее участков своей толщиной и желтовато-коричневой окраской, содержит обонятельные железы, *glandulae olfactoriae*.

Эпителий слизистой оболочки обонятельной области носит название обонятельного эпителия, *epithelium olfactoriun*. Он является непосредственно рецепторным аппаратом обонятельного анализатора и представлен тремя видами клеток: обонятельными нейросекреторными клетками, *cellulae neurosensoriae olfactoriae*, поддерживающими клетками, *cellulae sustentaculares*, и базальными клетками, *cellulae basales*.

Обонятельные клетки веретенообразные и заканчиваются на поверхности слизистой оболочки обонятельными пузырьками, снабженными ресничками. Противоположный конец каждой обонятельной клетки продолжается в нервное волокно. Такие волокна, соединяясь в пучки, образуют обонятельные нервы (см. рис. 980), которые, вступив в полость черепа через отверстия решетчатой пластинки решетчатой кости, передают раз-



### 1155. Иннервация слизистой оболочки языка; вкусовые поля слизистой оболочки языка (схема).

[Желтым цветом обозначена область иннервации верхним горланным нервом (ветвь блуждающего нерва); сиреневым цветом — область иннервации языко-глоточным нервом; розовым цветом — область иннервации барабанной струной (ветвь лицевого нерва).]

1 — надгортанник; 2 — язычные фолликулы; 3 — желобоватые сосочки; 4 — нитевидные сосочки; 5 — грибовидные сосочки; 6 — конические сосочки; 7 — листовидные сосочки.

дражения первичным центром обоняния, а оттуда к корковому концу обонятельного анализатора (рис. 1158).

## ОБЩИЙ ПОКРОВ

### КОЖА


*Кожа, cutis* (рис. 1159—1164), образует общий покров, *integumentum somaticum*, тела, в котором заложены чувствительные нервные окончания, потовые и сальные железы, мышцы, волосы и ногти.

Кожа выполняет защитную функцию, участвует в теплорегуляции и обмене веществ, является органом выделения и дыхания и обширной поверхностью рецепции.

Кожа состоит из двух слоев: эпидермиса и собственно кожи [дермы], *corium* (греч. *derma*), которая переходит в подкожную основу (клетчатку), *tela subcutanea*.

Эпидермис, *epidermis*, — производное наружного зародышевого листка, образует самый наружный слой кожи. Толщина его варьирует от 0,07 до 0,4 мм; наибольшей толщины эпидермис достигает в области подошвы.

Эпидермис состоит из многослойного (плоского) эпителия. В наружном роговом слое, *stratum corneum*, постоянно происходит ороговение. Самый глубокий слой эпидермиса, состоящий из 5—15 рядов клеток, носит название росткового, или зародышевого, слоя. Ряд клеток этого слоя, имеющих призматическую форму и прилегающих непосредственно к собственно коже, выделяется как базальный слой (цилиндрический), *stratum basale* (*cylindricum*). В нем в процессе деления клеток появляются новые слои эпидермиса, постепенно замещающие клетки самого по-



**1156. Ход вкусовых волокон (полусхематично).  
(Проекция волокон на поверхность полушария.)**


**1157. Обонятельная область, *regio olfactoria* (схема).**  
(Окрашенный участок слизистой оболочки боковой стенки правой половины полости носа и правой поверхности перегородки носа.)


верхностного ороговевшего слоя эпидермиса.

В ростковом слое имеется пигмент, его количество обуславливает разный цвет кожи.

Над ростковым слоем залегает *шиповатый слой*, *stratum spinosum*, над которым расположен *зернистый слой*, *stratum granulosum*, состоящий из нескольких рядов клеток, содержащих в протоплазме гранулы кератогиалина.

Над зернистым слоем располагается блестящий слой, *stratum lucidum*, образованный 3—4 рядами клеток, заполненных особым блестящим веществом элеидином.





Самый поверхностный слой эпидермиса — *роговой слой*, *stratum corneum* (см. рис. 1159), состоит из плоских ороговевших клеток. Последние превращаются в чешуйки, которые на поверхности эпидермиса постепенно слущиваются, заменяясь новыми клетками, происходящими из лежащих глубже слоев эпидермиса.

Между эпидермисом и собственно кожей залегает *базальный слой*, *stratum basale*.

*Собственно кожа [дерма], corium [dermis]* — производное мезодермы, состоит из волокнистой соединительной ткани. Волокна переплетаются между собой в различном направлении и образуют густую сеть, в которой залегают сосуды, нервы, мышцы, железы, волосы и ногти.

Собственно кожу образуют два слоя: 1) *сосочковый*, *stratum papillare*, и 2) *сетчатый*, *stratum reticulare*.

Сосочковый слой состоит из рыхлой соединительной ткани; свое название он получил потому, что несет на своей поверхности *сосочки*, *papillae*, выдающиеся в эпидермис. Между сосочками располагаются межсосочковые бороздки. В сосочках залегают *нервные окончания*, *terminaciones nervorum*, кровеносные и лимфатические капилляры, которые затем соединяются с подсосочковыми

### 1158. Проводящие пути обонятельного мозга; медиальная поверхность (полусхематично). (Проекция волокон на поверхность полушария.)

сетями, а те в свою очередь с дерматальными кровеносными, лимфатическими и нервными сплетениями.

Кожа богата эластическими и коллагеновыми волокнами, они направляются от фасций в подкожную клетчатку и собственно кожу. Эластические волокна образуют под сосочками сплетение, которое посыпает к последним тонкие сети и отдельные волоконца, обуславливая эластичность кожи (см. рис. 1160, 1161). Сплетение окружает сетью также сальные железы и волосяные мешочки. Эластическая ткань кожи больше развита в местах, подвергающихся давлению (ладони, подошвы, кожа в области суставов).

В собственно коже находится также гладкомышечная ткань. Гладкие мышечные волокна направляются главным образом к волосяным сумкам (влагалищам) и сальным железам в качестве мышц, поднимающих волосы, *mm. arrectores pilorum* (см. рис. 1159). Сокращение мышечных

волокон обусловливает появление «гусиной кожи» (*cutis anserina*) и выделение секрета кожных желез. Волосы ресниц, *cilia*, бровей, *supercilia*, ноздрей мышц не имеют. В коже молочки и вокруг соска молочной железы нет гладких мышечных клеток. Эти клетки не связаны с волосяными сумками, а образуют мышечный слой, залегающий в сосочковом слое и частично в подкожной клетчатке.

Собственно кожа в своих глубоких слоях без резкой границы переходит в *подкожную основу*, *tela subcutanea*, состоящую из коллагеновых и эластических волокон соединительной ткани, которые образуют широкопетлистую сеть; ее петли заполнены рыхлой соединительной тканью, содержащей большое количество жировых клеток. Последние группируются в жировые дольки. Крупные скопления этих дольек образуют *жировые отложения*, *panniculi adiposi*. Пучки соединительной ткани, окружающие дольки, носят название *удерживателей кожи*, *retinacula cutis* (см. рис. 1159). В них проходят сосуды и нервы.

Наличие рыхлой соединительной ткани в подкожной основе и степень соединения ее с подлежащими тканями обуславливает подвижность кожи и возможность образования складок. В области ладони и подошвы кожа

малоподвижна, так как соединена с подлежащими апоневрозами плотными соединительноткаными тяжами, между которыми образуются ячейки, заполненные жировыми дольками. Подкожная клетчатка у различных индивидуумов и на разных местах тела развита неодинаково, что зависит от обмена веществ, пола, возраста и профессии.

Жировая ткань может откладываться в большом количестве в области молочных желез, передней брюшной стенки и бедер. Наибольшее количество ее содержится в области ягодиц и на подошвах стоп. В области щек скопление подкожного жира имеет вид заключенного в соединительнотканную капсулу *жирового тела щеки*, *corpus adiposum buccae* (см. т. I, рис. 338).

В некоторых участках кожи жир постоянно отсутствует: например, в области век, ушных раковин, сосков молочных желез, кожи мошонки и полового члена.

В месте соединения I и II копчиковых позвонков на коже образуется непостоянных размеров углубление — *копчиковая ямочка*, *fovea coccygea*, дно которой срастается с костной поверхностью. Между дном ямочки и верхушкой копчика натянут небольшой фиброзный тяж — *удерживатель хвоста*, *retinaculum caudae*.

Поверхность кожи неровная, так как имеет множество складок — *борозды кожи*, *sulci cutis*, и возвышений — *гребешков кожи*, *cristae cutis* (см. рис. 1162—1164). Складки кожи подразделяются на постоянные и непостоянны.

К числу постоянных крупных складок кожи относятся веки, ушные раковины, крайняя плоть, половые губы и др. Складки имеются также в об-

ласти суставов: например, локтевая складка, паховая складка и др.


Непостоянные складки кожи образуются в местах слабого развития подкожной основы при сокращении мышц: например, поперечные складки на коже лба, вертикальная складка между бровями, в области век и др.

Поверхность кожи несет на себе ряд борозд: носогубную, подбородочно-губную, локтевые борозды и др.

Поверхность эпидермиса покрыта большим количеством тонких бороздок, располагающихся в различных направлениях и образующих поля ромбической и треугольной формы, на которых различают гребешки кожи, отделенные бороздками. В гребешках сосочки собственно кожи располагаются парными параллельными рядами. На вершинах гребешков открываются отверстия протоков потовых желез (см. рис. 1159).


На ладонной поверхности кистей и стоп отмечаются выступы кожи, содержащие много жира, соединитель-

### 1159. Вертикальный разрез кожи (полусхематично).



**1160. Основные направления натяжения соединительнотканых волокон в коже — линии натяжения и расщепления кожи, или «линии Лангерса» (левая половина), и точки раздражения, или двигательные точки (правая половина) (схема). (Передняя поверхность.)**

1—m. temporalis; 2—m. masseter; 3—platysma; 4—m. sternocleidomastoideus; 5—m. omohyoideus; 6—m. sternothyroideus; 7—m. levator scapulae; 8—m. trapezius; 9—m. sternothyroideus; 10—m. deltoideus (часть, начинающаяся от ключицы); 11—m. deltoideus (часть, начинающаяся от акромиона); 12—m. pectoralis major; 13—m. coracobrachialis; 14—m. triceps brachii (caput longum); 15—m. biceps brachii; 16—m. brachialis; 17—m. pronator teres; 18—m. brachioradialis; 19—m. flexor carpi radialis; 20—m. flexor digitorum superficialis; 21—m. flexor pollicis longus; 22—m. abductor pollicis longus; 23—m. abductor pollicis brevis; 24—m. flexor pollicis brevis; 25—m. opponens pollicis; 26—m. abductor digiti minimi; 27—m. palmaris longus; 28—m. obliquus externus abdominis; 29—m. rectus abdominis; 30—m. tensor fasciae latae; 31—m. pectineus; 32—m. sartorius; 33—m. adductor longus; 34—m. rectus femoris; 36—m. gracilis; 36—m. vastus lateralis; 37—m. adductor magnus; 38—m. vastus medialis; 39—m. peroneus longus; 40—m. tibialis anterior; 41—m. extensor digitorum longus; 42—m. peroneus brevis; 43—m. extensor hallucis longus; 44—m. extensor digitorum brevis; 45—m. interossei dorsales; 46—m. extensor hallucis brevis; 47—m. abductor hallucis; 48—m. soleus; 49—m. gastrocnemius (caput mediale).




нотканых тяжей и нервов; они носят название *осязательных валиков*, *toruli tactiles* (см. рис. 1165). Осязательные валики, или подушечки, находятся на ладонной поверхности дистальных фаланг пальцев, над пястно-фаланговыми суставами, на возвышениях большого пальца и мизинца. В области осязательных валиков пальцев рисунок гребешков кожи очень сложен и имеет вид петель, дуг и завитков. Кроме того, этот рисунок строго индивидуален и с возрастом не изменяется. Постоянство и индивидуальность этих рисунков позволяют использовать отпечатки пальцев (дактилоскопия) для установления личности (см. рис. 1162—1164).

#### Железы кожи

**Железы кожи, glandulae cutis** (рис. 1165; см. рис. 1130, 1131, 1159), по своему строению подразделяются на сальные, потовые железы и молочные.

**1161. Основные направления натяжения соединительнотканых волокон в коже — линии натяжения и расщепления кожи или («линии Лангера» (левая половина), и точки раздражения, или двигательные точки (правая половина) (схема). (Задняя поверхность.)**

1—m. infraspinatus; 2—m. teres minor; 3—m. deltoideus (часть, начинающаяся от ости лопатки); 4—m. deltoideus (часть, начинающаяся от акромиона); 5—m. teres major; 6—m. triceps brachii (caput longum); 7—m. triceps brachii (caput laterale); 8—m. brachioradialis; 9—m. extensor carpi radialis longus; 10—m. anconeus; 11—m. supinator; 12—m. extensor carpi radialis brevis; 13—m. extensor carpi ulnaris; 14—m. extensor digitorum communis; 15—m. abductor pollicis longus; 16—m. extensor pollicis brevis; 17—m. adductor pollicis; 18—mm. interossei dorsales; 19—m. abductor digiti minimi; 20—m. extensor indicis; 21—m. extensor pollicis longus; 22—m. extensor digiti minimi proprius; 23—m. flexor digitorum profundus; 24—m. flexor carpi ulnaris; 25—m. triceps brachii (caput mediale); 26—m. latissimus dorsi; 27—m. gluteus medius; 28—m. gluteus maximus; 29—m. adductor magnus; 30—m. biceps femoris (caput longum); 31—m. semitendinosus; 32—m. biceps femoris (caput breve); 33—m. soleus; 34—m. flexor hallucis longus; 35—m. abductor digiti minimi; 26—m. flexor digitorum brevis; 37—m. gastrocnemius; 39—m. semimembranosus.



1. *Сальные железы, glandulae sebaceae*, относятся к голокринным железам, в которых железистые клетки во время секреции разрушаются. По форме это простые ветвящиеся альвеолярные железы; они залегают в коже на всей поверхности тела, за исключением кожи ладоней и подошв.

Сальные железы связаны с фолликулами волоса, *folliculi pili*, куда открываются выводные протоки сальных желез, *ductus glandulae sebaceae*. В каждую волосистую сумку открывается от 1 до 3 сальных желез.

В области век, красной каймы губ, сосков молочных желез, головки полового члена (клитора), внутренней поверхности крайней плоти и задне-проходного отверстия, т. е. в тех местах, где волосы отсутствуют, сальные железы открываются непосредственно на поверхности кожи. Жировое вещество, которое выделяют сальные железы, служит смазкой кожи и волос и предупреждает их высыхание.

1162



1162. Отпечаток кожных гребешков, *cristae cutis*, и кожных борозд, *sulci cutis*. (Правая кисть, ладонная поверхность.)

1163. Отпечаток пальцевого узора кожи. Указательный палец правой руки.

1164. Борозды, *sulci*, гребешки, *cristae*, и отверстия кожи пальца. (Ладонная поверхность.)

1 — *sulci cutis*; 2 — *cristae cutis*; 3 — *pori sudoriferi*.

1165. Железы кожи верхнего века (фотография. Препаратор В. Харитоновой). (Участок препарата тотально окрашенной кожи века.)

1 — потовые железы (клубочек); 2 — выводной проток потовой железы; 3 — сальные железы.


1163



1164



1165



2. Потовые железы, *glandulae sudoriferae*, относятся к мерокринным железам, во время секреции их железистые клетки не разрушаются. Мерокринные железы по характеру скрета в свою очередь подразделяются на эккринные и апокринные.

Эккринные железы — это простые мерокринные, выделяющие жидкий секрет. Апокринные железы не являются типичными мерокринными, так как во время секреции их железистые клетки частично отторгаются, но не погибают.

Потовые железы рассеяны почти по всей поверхности тела и особенно многочисленны на ладонях и подошвах. В области красной каймы губ, головки полового члена и внутреннего листка крайней плоти железы отсутствуют.

Потовые железы залегают на границе собственно кожи и подкожной основы или в самой подкожной основе. Они относятся к простым трубчатым железам, имеют форму клубочков, состоящих из многократно извитой трубы. Стенка трубы выстлана одним слоем кубического эпителия, вокруг которого в продольном направлении располагаются гладкие мышечные волокна.


Выводной проток потовой железы — потовый проток, *ductus sudoriferus*, в области эпидермиса имеет извилистый ход и открывается на гребешке кожи отверстием — потовой порой, *porus sudoriferus*.

Апокринные железы располагаются преимущественно в коже лобка, подмышечных впадин, паховых сгибов, околососковых кружков и больших половых губ. Они выделяют скрет, имеющий специфический запах. Выделением скрета потовых желез — потоотделением — кожа участует в теплорегуляции организма и выделении из организма вредных продуктов обмена.

3. Молочные железы, *tattha*, являются также кожными образованиями. По своему происхождению они представляют собой видоизмененные потовые железы (подробнее см. II том).

### Ногти

**Ноготь**, *unguis* (греч. *onychos*) (рис. 1166—1168) — производное эпидермиса. Ногти — несколько выпуклые в поперечнике роговые пластинки, покрывающие с тыльной стороны ди-



**1166. Ногти, правая кисть.**  
(На большом пальце удален участок кожи с подкожной клетчаткой, видна мякотная подушечка — осязательный валик.)

стальные фаланги пальцев верхних и нижних конечностей.

Ногти начинают развиваться на III месяце внутриутробного периода. У доношенных плодов они несколько выдаются над концами фаланг.

Различают тело ногтя, *corpus unguis*, корень ногтя, *radix unguis*, и четыре края: свободный край, *margo liber*, выступающий у верхушки пальцев; скрытый край, *margo occultus*, в области проксимального отдела ногтя; два боковых, латеральных, края, *margines laterales*.


Ноготь лежит в ложе ногтя, *matrix unguis*, образованном соединительной тканью собственно кожи и ростковым слоем эпидермиса. На поверхности ногтевого ложа имеются продольно идущие гребешки ложа ногтя, *cristae matricis unguis*. Ногтевое ложе в проксимальном отделе и с боков ограничивает край ногтевого ложа —

перионихий, *perionyx*, отделенный бороздой, более глубокой в том месте, где в нее погружается корень ногтя. Над бороздой возвышается валик ногтя, *vallum unguis*. В области корня ногтя располагается надногтевая пластинка — эпонихий, *eponyxium*, представляющий собой роговой слой, покрывающий ногтевую лунку. Кроме того, в области корня ногтя эпидермис кожи несколько утолщен; в том месте, где он отделяется от ложа ногтя, образуется подногтевая пластинка — гипонихий, *hyponychium*.

Ростковый эпителий ногтевого ложа, за счет которого происходит рост ногтя, особенно сильно развит в области корня ногтя. Этот участок просвечивает сквозь ногтевую пластинку в виде светлого полумесяца и носит название луночки, *lunula*.


### Волосы

**Волосы**, *pili* (греч. *trichos*) (см. рис. 1159, 1160) — производные эпидермиса, появляются на III месяце внутриутробного периода, покрывают всю кожу, за исключением ладоней, подошв, красной каймы губ, малых



**1167. Ноготь, unguis, и дистальная фаланга.**

(Продольный разрез через дистальную фалангу и ноготь указательного пальца.)



**1168. Ноготь, unguis, и дистальная фаланга.**

(Поперечный разрез через дистальную фалангу и ноготь указательного пальца.)

половых губ, головки полового члена и внутреннего листка крайней плоти.

Первичные волосы тонкие, имеют вид пушка. В дальнейшем пушок замещается более толстыми вторичными, или постоянными, волосами. К постоянным волосам относятся пушковые волосы тела, или *пушок, lanugo, волосы головы, capilli, брови, supercilia, и ресницы, cilia*. В период полового созревания под влиянием деятельности органов внутренней секреции (половых желез) появляются третичные волосы: на лице — борода, *barba*, и усы;  *волосы подмышки, hirci, волосы лобка, pubes; волосы ноздрей, vibrissae*, и в наружном слуховом проходе —  *волосы уха, tragi*.


По отношению к поверхности кожи волосы, как правило, располагаются наклонно и имеют определенное направление, в основном совпадающее с линиями Лангера (см. рис. 1160, 1161), образуя *дорожки волос, flumina pilorum*. Волосы располагаются группами (по 2—7 волос), идущими одна за другую. Так как линии расположения на некоторых участках кожи спиралевидны, повторяющие их рисунок волосы образуют *завихрения волос, vortices pilorum*, растут веерообразно, особенно вокруг центра. Волосы наружного слухового прохода, ресниц и ноздрей располагаются перпендикулярно. Иногда дорожки волос создают так называемые *перекрестья волос, cruces pilorum*, в ряде случаев определяющие границы областей кожи.

Выделяют *корень волоса, radix pili*, залегающий в коже, и *стержень волоса, scapus pili* — часть, находящаяся над кожей. Корень волоса по отношению к поверхности кожи расположен под углом. Утолщенная часть его носит название *луковицы волоса, bulbus pili*, в которую снизу погружается *сосочек волоса, papilla pili*. Волосянной сосочек представляет собой видоизмененный сосочек кожи, несущий сосуды.

Рост волоса происходит за счет *матрикса волоса, matrix pili* — ростковых клеток, покрывающих волосянной сосочек. При нарушении питания клеток образование новых клеток прекращается, при этом клетки луковицы подвергаются ороговению, луковица принимает вид колбы и отделяется от сосочка, волос отмирает и выпадает, новый волос формируется уже за счет нового сосочка.

Корневая часть волос окружена внутренним и наружным корневыми

1169. Области распространения кожных нервов; вид спереди (схема).



влагалищами, они являются продолжением росткового слоя эпидермиса.

Вокруг корневого влагалища располагается *фолликул волоса*, *folliculus pilis*, состоящий из кожного эпителия и соединительной ткани. Соединительная ткань волосяной сумки образует два слоя: продольный наружный и круговой внутренний. К наружному слою прикрепляются мышцы, поднимающие волосы, *tt. arrectores pilorum*; при их сокращении стержень волоса поднимается.

Волос состоит из *мозгового вещества*, *medulla pili*, коры волоса, *cortex pili*, и кутикулы, *cuticula pili*. Мозговое вещество залегает по оси волоса. В пушковых волосах оно отсутствует.

Корковое вещество образует главную массу волоса и состоит из вытянутых роговых клеток, окружающих волос. Корковое вещество содержит пигмент, от которого зависит цвет волос.


Кутикула покрывает волос снаружи и состоит из безъядерных роговых чешуйек, *squamae*, расположенных в виде черепицы.

#### Сосуды кожи

*Сосуды кожи* происходят частично из мышечных, частично из собственных кожных артерий. Анастомозируя между собой, они образуют на границе между подкожной клетчаткой и собственно кожей *дермальную артериальную сеть*, *rete arteriosum cutaneum*. От этой сети артериальные ветви направляются к клубочкам потовых желез, к сосочкам волос и подкожной клетчатке.

От кожной сети отходят в вертикальном направлении сосуды в вышележащие слои кожи, где они разветвляются, анастомозируя между собой и образуя *подсосочковую артериальную сеть*, *rete arteriosum subpapillare*. Эта сеть питает волосяные фолликулы, выводные протоки потовых желез, сальные железы, посыпает мелкие артерии к сосочкам дермы, в которых они распадаются на артериальные капилляры, переходящие в более широкие венозные капилляры; последние переходят в вены кожи.

Артериальные сети кожи развиты в различных ее участках неодинаково. Наиболее мощного развития они достигают на подошвах, ладонях и ягодицах.



Вены образуют в коже 4 сплетения: первое венозное сплетение образуется из посткапилляров сосочеков волос, желез и мышц; второе — *поверхностное подсосочковое венозное сплетение*, *plexus venosus subpapillaris superficialis*; глубже находится третье — *глубокое подсосочковое венозное сплетение*, *plexus venosus subpapillaris profundus*; четвертое сплетение залегает на границе собственно кожи и подкожной основы — это *глубокое дермальное венозное сплетение*, *plexus venosus dermatis profundus*. Вены, выходящие из этого сплетения, проходят через подкожную клетчатку и соединяются в более крупные подкожные венозные стволы.


Лимфатическое русло кожи складывается прежде всего из двух сетей лимфатических капилляров — поверхностной, или субэпидермальной, и глубокой. От поверхностной лимфатической сети в сосочки собственно кожи отходят слепые капиллярные выросты. Глубокая лимфатическая сеть кожи, *rete lymphocapillare cutis profundum*, переходит в лимфокапиллярные сосуды. Последние, анастомозируя между собой, формируют в сетчатом слое дермы (и на ее границе с подкожной основой) внутрикожное сплетение лимфатических сосудов, от которого начинаются экстраорганные лимфатические сосуды.

#### Нервы кожи

Кожа иннервируется (рис. 1169—1171) множеством нервов — чувствительных, двигательных, сосудодвигательных и секреторных.

Нервы, подходящие к коже, образуют сплетение в собственно коже — *дермальное нервное сплетение*, *plexus nervorum dermatis*, которое в сосочковом слое представляет собой более густое нервное сплетение из *нервных окончаний кожи*, *terminaciones nervi cutis*.

Окончания чувствительных нервов залегают в эпидермисе, в собственно коже и подкожной основе всей кожи. Болевые ощущения воспринимаются нервыми окончаниями, находящимися в эпидермисе. В эпидермисе также встречаются осязательные клетки. В сосочках собственно кожи имеются *осязательные тельца*, *corpuscula tactus*. Они овальные и окружены единичнотканной оболочкой. Нервные волокна, входя в осязательные тельца, спирально изгибаются. Наибольшее количество этих телец находят-



#### 1171. Зоны отраженных болей при заболеваниях внутренних органов (зоны Захарына — Геда).

1 — сердце; 2 — желудок, поджелудочная железа; 3 — тонкая кишка; 4 — мочевой пузырь; 5 — мочеточник; 6 — почки; 7 — печень; 8 — печень (капсула); 9 — легкие и бронхи; 10 — мочеполовая система; 11 — матка.

иннервирующие гладкие мышцы, сосуды и кожные железы (см. рис. 1060).

Каждый спинномозговой нерв распределается в пределах отдельной кожной зоны. При этом сегментарные зоны чувствительной иннервации располагаются на кожном покрове полосами (см. рис. 1169, 1170). Знание кожных сегментов имеет большое значение для клинициста.

Чувствительные нервы, отходящие от сплетений (шейного, плечевого, пояснично-крестцового), и ветви тройничного нерва иннервируют участки кожи, не соответствующие сегментам. Это явление получило название *периферической иннервации* (см. рис. 1005, 1025, 1026, 1029, 1030, 1054, 1056, 1069, 1070).

На коже имеются участки, где возникают отраженные боли при заболеваниях некоторых внутренних органов. Эти участки представляют собой зоны рефлекторных нарушений поверхности (зоны Захарына — Геда) (см. рис. 1171). Боли локализуются в определенных кожных участках, соответствующих тем сегментам спинного мозга, куда поступают аfferентные волокна из пораженного органа.

дятся на ладонных поверхностях пальцев стоп и кистей; особенно много их в области мякотных подушечек пальцев.

В подкожной основе, надкостнице и суставах имеются крупные овальные нервные *пластинчатые тельца*, *corpuscula lamellosa*, размером от 2 до 4 мм. Эти тельца образованы пластинками, концентрически расположеннымися вокруг центрального стержня, содержащего осевой цилиндр нервного волокна; последний заканчивается утолщением.

Кроме чувствительных волокон, от соответствующих спинномозговых нервов в коже имеются симпатические и секреторные нервные волокна,

## ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

В русском предметном указателе и в Index terminorum прямым светлым шрифтом указаны номера страниц, полужирным курсивом — номера рисунков.

Анализатор двигательный  
сочетанного поворота  
головы и глаз 84 **950**  
— зрительный 84 **950**  
— письменных знаков 84 **950**  
— обонятельный 84 **950**  
— речи письменной 84 **950**  
— устной 84  
— слуховой 84 **950**  
— речевых сигналов 84 **950**  
— чувствительный 84  
Аппарат слезный 270

Бахромка гиппокампа 48  
Борозда(ы) базилярная 69  
— бульбарно-мостовая 68  
— височная верхняя 35  
— нижняя 35  
— поперечные 36  
— внутритеменная 32  
— гипotalамическая 58  
— гиппокампа 36, 56  
— глазничные 36  
— заднелатеральная 23, 79  
— затылочная поперечная 35  
— затылочно-височные 37  
— коллатеральные 37  
— латеральная 31  
— лобная верхняя 31  
— нижняя 31  
— мозолистого тела 36  
— носовая 37  
— обонятельные 36  
— островка круговая 36  
— переднелатеральная 23, 79  
— поводка 58  
— пограничная 80  
— подтеменная 36  
— позадиоливная 79  
— полулунаная 35  
— постцентральная 32  
— поясная 36  
— предцентральная 31  
— промежуточная задняя 23  
— срединная 80  
— задняя 23, 79  
— теменно-затылочная 32, 36  
— центральная 31  
— островка 36  
— шпорная 36  
Бугорок лицевой 80  
— таламуса передний 58

Веки 265 **1112—1114**  
— края 268, 269  
— поверхности 268  
— хрящи 270 **1115—1117**  
Венец лучистый 93  
Вещество вторичное висцеральное 27  
— продырявленное 67  
— промежуточное латеральное 27

— — центральное 27  
— — студенистое 26, 27  
Возвышение(я) коллатеральное 56  
— медиальные 80  
Волокна височно-мостовые 51, 67, 70  
— дугообразные наружные 79  
— — — задние 91  
— — — передние 91  
— — концевой пластиинки 56  
— корково-красноядерные 51, 93  
— корково-мостовые 91, 93  
— корково-покрышечные 51  
— корково-ретикулярные 51  
— корково-спинномозговые 51, 67, 70  
— корково-таламические 51, 93  
— корково-ядерные 67, 70  
— лобно-мостовые 93  
— моста 69, 70  
— мостомозжечковые 70, 91  
— нервные ассоциативные 39  
— безмиelinовые 108, 209  
— двигательные 108  
— миelinовые 108  
— проекционные 39  
— чувствительные 108  
— паравентрикулярные 62  
— перивентрикулярные 65  
— супраоптические 62  
— таламо-теменные 51  
— теменно-височно-мостовые 93  
Волосы 307, 309

Гипоталамус 50, 56, 60 **924**  
Гипофиз 60  
Гиппокамп 56  
Грануляции паутинной оболочки 104

Диафрагма седла 99  
Доля(и) височная 30, 32, 35  
— затылочная 30, 32, 34, 36  
— лобная 30, 31, 36  
— мозжечка 71—73  
— островковая 30, 36  
— теменная 30, 32, 36  
Древо жизни мозжечка 74

Железа(ы) слезная 270 **1118, 1120**  
— добавочная 270 **1121**  
— кожи 304, 305, 307  
— шишковидная 60  
Желудочки боковые 52 **899, 900, 910, 915**  
— головного мозга 10 **913—916**  
Жидкость спинномозговая 10, 80, 104

Извилина зубчатая 36  
— ленточная 36, 42  
— лобная верхняя 31  
— — — медиальная 36  
— — — нижняя 31  
— — — средняя 31

— надкраевая 32  
— островка 36  
— парагиппокампальная 37  
— паратерминальная 36  
— постцентральная 32  
— поясная 36  
— предцентральная 31  
— прямая 36  
— угловая 32  
— язычная 37  
Извилины височные 35  
— — поперечные 36  
— глазничные 36

Капсула внутренняя 50 **951, 952**  
— — строение 51  
— — — наружная 50  
— — самая 50

Кожа 300 **1159**  
— строение 302, 303

Колено лицевого нерва 126  
Кольцо сухожильное 113  
Конус мозговой 30  
Кора мозжечка 74  
Корешок(ки) глазодвигательный 116  
— двигательный 116  
— задний (чувствительный) 23  
— зрительного тракта латеральный 67  
— — — медиальный 67  
— спинномозговые 139  
— черепные 139  
— чувствительный 116  
Крыша среднего мозга 66  
— IV желудочка 80

Лента желудочка IV 80  
— сосудистая 56  
— таламуса 58

Луковица обонятельная 36 **1154**  
Лучистость(и) зрительная 52, 91  
— мозолистого тела 46  
— полосатого тела 93  
— слуховая 52, 89  
— таламические задние 52, 91  
— — — передние 51, 91  
— — — центральные 51, 91

Место голубоватое 80  
Метаталамус 58, 60  
— тело коленчатое латеральное 60  
— — — медиальное 60

Мозг большой 27, 29 **886, 887, 891—894, 898, 901—903, 909**  
— — — борозды 29  
— — — извилины 29  
— — — кора 29, 37 **895**  
— — — — древняя 37  
— — — — новая 37  
— — — — средняя 37  
— — — — старая 37

- — — строение 37  
 — — — полупария 30 **896, 897, 907**  
 — — ядра 38  
 — головной 10, 27 **870—877, 884, 888, 889, 923, 925**  
 — задний 10, 68, 75 **931**  
 — конечный 10 **885**  
 — обонятельный 29  
 — передний 10  
 — продолговатый 10, 75 **928, 941, 942**  
 — промежуточный 10, 56 **918**  
 — ромбовидный 10, 68 **945**  
 — спинной 10, 18 **878—882**  
 — — вещество белое 23, 24  
 — — — серое 23, 24  
 — — канатики 24  
 — — сегменты 23 **995**  
 — — часть грудная 23  
 — — — копчиковая 23  
 — — — крестцовая 23  
 — — — поясничная 23  
 — — — шейная 23  
 — — утолщение пояснично-крестцовое 22  
 — — — шейное 22  
 — средний 10, 65 **926, 945**  
 — — крыша 66  
 — холмики 66  
**Мозжечок** 27, 71, **929, 930, 933—940**  
 — вещество белое 74  
 — — серое 75  
 — строение внешнее 71  
 — структуры новые 74  
 — часть древняя 74  
 — старая 74  
**Мост** 68 **932**  
 — части 69
- Намет мозжечка** 99 **958Б**
- Нейрон(ы)** 10  
 — ассоциативный 10  
 —afferентный 10  
 — вставочный 10  
 — эффекторный 10  
 — эффеरентный 10  
**Нерв(ы)** 10, 27  
 — альвеолярные верхние 119  
 — — — ветви 120  
 — альвеолярный нижний 125  
 — барабанной перепонки 296  
 — барабанный 132  
 — — ветви 132  
 — бедренно-половой 186  
 — — ветви 186  
 — бедра кожный задний 190  
 — — — ветви 190  
 — — латеральный 186  
 — бедренно-половой 186  
 — — ветви 186  
 — бедренный 187 **1045**  
 — — ветви 187  
 — блуждающий 29, 110, 133, 140 **1061, 1064—1066, 1068, 1069, 1071, 1086, 1094, 1095**  
 — — ветви брюшного отдела 138  
 — — — головного отдела 137  
 — — — грудного отдела 138  
 — — — шейного отдела 137  
 — — ядра 82  
 — большеберцовый 198 **1050**  
 — — ветви 199 **1049**  
 — вегетативные 108  
 — верхнечелюстной 119  
 — — ветви менингеальная 119  
 — височные глубокие 122  
 — влагалища 251 **1101**  
 — глазного яблока 274  
 — глазной 116  
 — глазодвигательный 27, 110, 114, 140  
 — — — ветви 115  
 — — — ядра 82  
 — — голени межкостный 199 **1046—1048**  
 — — гортанный верхний 137 **1061**  
 — — — ветви 137, 138  
 — — — возвратный 138 **1070, 1086**  
 — — — ветви 138  
 — — — нижний 138  
 — — — грудной длинный 156  
 — — — латеральный 162  
 — — — медиальный 163  
 — — — грудные 143, 174 **1009, 1064**  
 — — — ветви 174 **1064**  
 — — — грудоспинной 168  
 — — — диафрагмальные 152 **1002—1006, 1061, 1071, 1076**  
 — — — ветви 155 **1076**  
 — — — добавочные 155  
 — — — добавочный 29, 110, 138, 140  
 — — — жевательный 122  
 — — — желудка 243 **1078, 1090**  
 — — — заднепроходно-копчиковые 206  
 — — — запирательный 187 **1037**  
 — — — ветви 187  
 — — — внутренний 189  
 — — — добавочный 187  
 — — — затылочный большой 146  
 — — — малый 147  
 — — — третий 146  
 — — — зрительный 27, 110, 112, 140 **970, 1111**  
 — — — часть внутриглазничная 112  
 — — — — внутриканальцевая 113  
 — — — — внутричерепная 113  
 — — — — глазничная 113  
 — — — икры кожный латеральный 203  
 — — — — ветви 203  
 — — — — медиальный 203  
 — — — — ветви 203  
 — — — каменистый большой 128  
 — — — малый 132  
 — — — кишечника 246  
 — — — кожи 311 **1169, 1170**  
 — — — кожный тыльный медиальный 193  
 — — — — промежностный 195  
 — — — концевой 112  
 — — — копчиковый 143, 181, 206  
 — — — крестцовые 143, 181, 188  
 — — — ветви 188 **1075**  
 — — — крыловидного канала 128  
 — — — крыловидный латеральный 122  
 — — — медиальный 123  
 — — — легких 243  
 — — — лицевой 29, 110, 126, 140 **983—985, 987**  
 — — — ветви 130 **984**  
 — — — ядра 82  
 — — — лобный 116  
 — — — локтевой 162 **1015**  
 — — — ветви 163 **1017, 1020, 1021**  
 — — — лопатки дорсальный 156  
 — — — лучевой 171 **1020**  
 — — — малоберцовый глубокий 195  
 — — — ветви 198  
 — — — общий 193 **1049, 1050**  
 — — — ветви 193  
 — — — поверхностный 193  
 — — — ветви 193 **1049**  
 — — — матки 249 **1101**  
 — — — межреберно-плечевые 165, 176  
 — — — межреберные 176 **1027, 1032**  
 — — — ветви 178—181  
 — — — мочевого пузыря 248 **1099**  
 — — — мышечно-кожный 158 **1009**  
 — — — мышцы, напрягающей барабанную перепонку 123  
 — — — небную занавеску 123  
 — — — надблоковый 116  
 — — — надглазничный 117  
 — — — надключичные 149  
 — — — латеральные 152  
 — — — медиальные 149  
 — — — промежуточные 149  
 — — надлопаточный 158  
 — — ветви 158 **1013**  
 — — наружного слухового прохода 124  
 — — небный(е) большой 121  
 — — малые 121  
 — — нижнечелюстной 122  
 — — ветвь менингеальная 122  
 — — ноги подкожный 187  
 — — — ветви 187, 188  
 — — носоресничный 118  
 — — обонятельные 27, 110, 111, 140  
 — — отводящий 29, 110, 125, 140  
 — — пальцевой подошвенный общий 203  
 — — пальцевые ладонные общие 163, 167  
 — — — собственные 163, 167  
 — — — подошвенные собственные 203  
 — — — — ветви 203  
 — — — — тыльные 163, 198  
 — — — печени и желчного пузыря 246  
 — — пищевода 243  
 — — плеча кожный задний 171  
 — — — латеральный верхний 171  
 — — — — нижний 171  
 — — — — медиальный 165  
 — — поджелудочной железы 247  
 — — подключичный 156  
 — — подлопаточный 167  
 — — подмышечный 168 **1022**  
 — — подошвенный латеральный 203  
 — — — ветви 203  
 — — — медиальный 203  
 — — — ветви 203  
 — — подлокотный 118  
 — — подбородочный 125  
 — — подвздошно-паховый 185  
 — — ветви 186  
 — — подвздошно-подчревный 185  
 — — ветви 185  
 — — подглазничный 119  
 — — ветви век нижние 119  
 — — — губные 119  
 — — — носовые внутренние 119  
 — — — — наружные 119  
 — — подзатылочный 146  
 — — подреберный 176 **1032**  
 — — подъязычный 29, 110, 139, 140 **1003**  
 — — ветви 140 **958Б, 994**  
 — — ядра 82  
 — — половой 203  
 — — ветви 206  
 — — почек 248  
 — — поясничные 143, 181  
 — — ветви 183  
 — — преддверно-улитковый 29, 110, 130, 140, 293  
 — — ветви 296  
 — — ядра 82  
 — — предплечья кожный задний 171 **1023**  
 — — — латеральный 162  
 — — — медиальный 165  
 — — — межкостный задний 166  
 — — — передний 173  
 — — промежуточно-лицевой 127  
 — — промежуточный 110, 126  
 — — ресничные длинные 118  
 — — решетчатый задний 118 **978**  
 — — передний 118 **978**  
 — — — ветви носовые 118  
 — — седалищный 190 **1049, 1050**  
 — — ветви 191, 193 **1050**  
 — — селезенки 247  
 — — сердца 241 **1062—1064, 1092—1094**  
 — — скелевой 121  
 — — — ветви 121  
 — — слезный 117

- слуховой трубы 296 **989**
- сонно-барабанные 132
- спинномозговые 13, 23, 108, 143 **996, 997, 1060**
- срединный 165 **1009, 1015, 1017, 1021**
- ветви 166 **1009, 1017**
- стременний 128
- трахеи 242
- тройничный 29, 110, 116, 140 **973—975**
- ядра 116
- уха наружного 296
- среднего 296
- ушно-височный 123 **984**
- ветви 124
- ушной большой 147 **984**
- задний 130
- ушные передние 125
- челюстно-подъязычный 125
- черепные 13, 108, 140 **967, 968**
- ядра 82 **945, 946**
- шеи поперечный 148
- шейные 143, 146 **990—992, 1001, 1061**
- ветви 146
- щечный 122
- ягодичный верхний 190 **1042**
- нижний 190 **1043**
- ягодиц верхние 183
- нижние 190
- языкоглоточный 29, 110, 131, 140 **1065, 1066**
- ветви 132
- ядра 82
- язычный 125 **1089**
- ветви 125 **1089**
- яичка 249 **1100**
- Нить(и) концевая (спинномозговая)** 20
- внутренняя 20
- наружная 21
- корешковые 23
- Ногти** 307 **1166—1168**
- Ножки гиппокампа** 56
- мозга 13, 67 **927**
- мозжечковые верхние 68, 75
- нижние 74, 79
- средние 69, 75
- Области гипоталамуса** 60, 61
- Оболочка мягкая** 95
- головного мозга 106 **962**
- спинного мозга 106
- паутинная 95, 104
- головного мозга 104 **961, 962**
- спинного мозга 104 **960**
- слизистая барабанной полости 284
- складки 286
- твердая 95
- головного мозга 97 **957**
- спинного мозга 96
- Оболочки мозговые** 95 **954—956**
- Ограда** 38
- Олива** 79
- Орган(ы) вкуса** 399
- глаза вспомогательные 265
- зрения 256
- обоняния 300
- преддверно-улитковый 275 **1153**
- сосуды 297—299
- равновесия 275
- слуха 275
- спиральный 130
- субкомиссуральный 65
- субфорникальный 65
- чувств 256
- Основы сосудистые** 106 **943**
- Островок см. Доля островковая** **890**
- Отверстие межжелудочковое** 55, 65
- Отдел симпатического ствола грудной 218
- — — ветви грудных узлов 218, 220, 223
- — — крестцовый 231
- — — ветви 231
- — — сплетения 231, 233
- — — поясничный 224
- — — ветви 225
- — — сплетения непарные 229—231
- — — парные 228, 229
- — — шейный 209
- — — ветви узла шейного верхнего 210—212
- — — — среднего 212, 213
- — — — шейно-грудного 213, 218
- Парус мозговой верхний** 68, 80
- — нижний 80
- Перекрест верхних мозжечковых ножек** 68
- волокон нервов блоковых 68, 116
- — зрительных 113
- зрительный 60
- пирамид 77
- покрышки 68
- чувствительный 88
- Перепонка барабанная** 280, 281 **1132**
- Перешеек ромбовидного мозга** 68
- Периневрий** 108
- Петля латеральная** 89
- медиальная 89
- спинномозговая 88
- тройничная 89
- чечевичеобразная 93
- шейная 152
- Пирамида** 77
- Пластина прикрепленная** 56
- таламуса 58
- Подушка** 58
- Покрышка лобно-теменная** 34
- среднего мозга 67
- Поле гипоталамическое латеральное** 61
- лицевого нерва 127
- покрышечное 66
- предзрительное 61
- самое заднее 82
- Полоска(и) концевая** 56
- обонятельная латеральная 36
- медиальная 36
- продольные латеральные 42
- медиальные 42
- Полость тройничная** 101, 116
- Пояс** 40
- Предклинье** 36
- Пространство влагалища зрительного нерва** внутреннее 113
- — — наружное 113
- межвлагалищное 113
- подпаутинное 104, 105 **915, 964**
- субдуральное 95, 104
- эпидуральное 95
- Проход слуховой наружный, строение** 276, 279 **1129**
- — — хрящ 279
- Пути(ь) полушарий ассоциативные** 39 **905, 906**
- восходящий слухового анализатора 89
- восходящие мозжечка 91 **953**
- — — спинного и головного мозга 84 **947**
- гипоталамо-гипофизарный 62
- зубчато-таламический 68, 91
- корково-мостовой 51
- корково-спинномозговой латеральный 93
- — — передний 93
- корково-ядерный 51
- красноядерно-спинномозговой 68, 93
- лобно-мостовой 51
- луковично-ретикулярно-спинномозговой 94
- мозжечково-красноядерный 91
- мозжечково-ядерный 91
- mostoretikuлярно-спинномозговой 94
- нервные ассоциативные 84
- афферентные 84
- эфферентные 84
- исходящие мозжечка 91 **953**
- головного и спинного мозга 91 **948, 949**
- оливомозжечковый 91
- оливоспинномозговой 95
- оливоулитковый 95
- поводково-межножковый 60
- покрышечно-бульбарный 93
- покрышечно-спинномозговой 68, 93
- покрышечный центральный 94
- преддверно-спинномозговой 93
- проводящие мозжечка 91 **952**
- спинного и головного мозга 84
- ретикулярно-спинномозговой 94
- спинномозговой тройничного нерва 116
- спинно-мозжечковый задний 86, 91
- — — передний 87, 91
- спинно-оливный 87
- спинно-покрышечный 88
- спинно-ретикулярный 88
- спинно-таламический латеральный 87
- — — передний 87
- среднемозговой тройничного нерва 116
- ядерно-мозжечковый 91
- Пучок дугообразный** 91
- клиновидный 79, 86, 88
- краевой борозды 94
- крючковидный 40
- переднего мозга медиальный 61
- плечевого сплетения задний 156, 167
- — — латеральный 156, 158
- — — медиальный 156, 162
- продольный верхний 40
- — — нижний 40
- таламический 60
- теменно-затылочно-мостовой 52
- тонкий 79, 86, 88
- сосцевидно-покрышечный 50
- сосцевидно-таламический 50
- чечевичеобразный 93
- Пучки пирамидные** 93
- Радужка** 262
- края 262
- поверхности 262, 263
- Раковина ушная** 276 **1127**
- — мышцы 278
- — строение 276
- — хрящ 277, 288 **1128, 1129**
- Рецепторы** 108
- Рог задний** 56 **915**
- нижний 56 **915**
- передний 56 **915**
- Свод** 47 **911, 912**
- лента 48, 56
- ножки 48
- столбы 50
- тело 47
- Серп большого мозга** 99
- мозжечка 99
- Сетчатка** 263
- часть зрительная 263
- — — пигментная 263
- Синус(ы) затылочный** 103 **958Б**
- каменистый верхний 103
- — — нижний 103

- клиновидно-теменной 103
- межпещеристые 102
- пещеристый 102
- поперечный 101 **958Б**
- прямой 102 **958Б**
- сагиттальный верхний 101
- нижний 101
- сигмовидный 102
- твердой мозговой оболочки 95
- Система нервная 10 868**
  - анимальная 13
  - вегетативная 13, 209 **1057**
  - — — часть парасимпатическая 233 **1059**
    - — — — отдел головной 234, 237
    - — — — — ветви 239, 240
    - — — — — узлы 239, 240
    - — — — — крестцовый 241
    - — — — — узлы 241
    - — — — — симпатическая 209 **1058**
    - — — — — отдел периферический 209
    - — — — — ветви межузловые 209
    - — — — — узлы 209
    - — — — — периферическая 13
    - — — — — центральная 13, 18
  - Скорупа 38
  - Сосуды кожи 310**
  - Спайка(и) нижних холмиков 66**
    - передняя 46
    - свода 47, 48
    - супраоптические 62
    - эпиглазматическая 65
  - Сплетение(я) аортальное брюшное 231 **1070, 1083****
    - базиллярное 103
    - барабанное 132
    - брыжеечное верхнее 230 **1075, 1080, 1097**
      - нижнее 230 **1075, 1083, 1084**
    - глоточное 137
    - зубное верхнее 120
    - нижнее 125
    - копчиковое 206
    - — — ветви соединительные 206
    - крестцовое 189 **1038**
    - легочное 138 **1095**
    - малого таза 231
    - нервные 108
    - околоушное 130
    - пищеводное 138 **1061, 1068, 1071**
    - плечевое 146, 155 **1007—1009**
      - — — часть надключичная 155, 156
      - — — подключичная 156, 158
    - подчревное верхнее 231 **1061, 1075, 1077**
      - нижнее 231 **1061**
      - позвоночное 145
      - поясничное 184 **1033**
      - — — ветви 184
      - — — пояснично-копчиковое 181
      - — — пояснично-крестцовое 184 **1034**
      - — — сосудистое IV желудочка 80
      - — — сосудистые 106
      - — — чревное 227 **1076, 1096**
      - — — шейное 146 **998, 999, 1009, 1076**
      - — — ветви мышечные 152
    - Ствол головного мозга 27
    - добавочного нерва 139
      - — — ветви 139
      - — — спинномозгового нерва 143 **1031**
    - Струна барабанная 128
  - Таламус 50, 58**
    - верхний 58
    - нижний 58
  - Тело(а) миндалевидное 38, 39**
  - мозолистое 40 **908**
  - — — валик 41
  - — — клов 41
  - — — колено 41
  - — — ствол 41
  - — — полосатое 38
  - — — ресничное 261
  - — — сосцевидные 50, 60, 61
  - — — стекловидное 265
  - — — трапециевидное 71
  - Тельца пластинчатые 163
  - Тракт зрительный 113 **970**
    - — — коленчато-корковый 91
    - — — обонятельный 36
    - — — подушково-корковый 91
  - Третий (III) желудочек 62 **919, 920****
  - Треугольник блуждающего нерва 82**
    - — — коллатеральный 56
    - — — обонятельный 36
    - — — подъязычного нерва 82
  - Углубление зрительное 65**
    - — — надшишковидное 65
    - — — шишковидное 65
  - Узел крылонебный 121, 239 **979****
    - — — ветви 239
    - — — поднижнечелюстной 240
    - — — ветви 240 **1089**
    - — — подъязычный 240
    - — — ветви 240
    - — — преддверный 130
    - — — ресничный 239 **1088**
    - — — ветви 239
    - — — улитковый 130
    - — — ушной 122, 239
    - — — ветви 239
    - — — спинномозговые 23, 108, 143
  - Утолщение барабанное 132**
  - Ухо внутреннее 275, 286 **1126, 1132****
    - — — строение 286, 288, 290—295
    - — — наружное 275, 276 **1126**
      - — — среднее 275, 281 **1126, 1132, 1133**
      - — — строение 281—284
  - Формация ретикулярная 27, 71, 79**
  - Хрусталик 265**
  - Цистерна(ы) латеральная ямки большого мозга 106**
    - — — межножковая 106
    - — — мозжечковая 106
    - — — мозолистого тела 106
    - — — моста боковая 106
    - — — средняя 106
    - — — обходящая 106
    - — — подпаутинные 105
    - — — перекреста 106
  - Червь мозжечка 71**
  - Четвертый желудочек 80 **943****
    - — — апертуры 80
  - Шар бледный латеральный 38**
    - — — медиальный 38
  - Шов моста 71**
  - Шов продолговатого мозга 79**
  - Шпора птичья 56**
  - Щель сосудистая 56**
    - — — срединная задняя
    - — — передняя 77
  - Эндоневрий 108**
  - Эпиневрий 108 **966****
  - Эпителамус 58, 60**
  - поводки 60
  - спайка 60
  - тело шишковидное 60
  - Яблоко глазное 256 **1102—1105, 1108****
    - — — камеры 265
    - — — мышцы 271, 273
    - — — оболочка сосудистая 256, 260 **1103, 1106**
      - — — фиброзная 256
      - — — чувствительная 256, 263
      - — — сосуды кровеносные 274
  - Ядра(о) базальные 29, 38 **904****
  - блокового нерва 82, 116
  - блуждающего нерва заднее 82, 133, 137
  - вестибулярное верхнее 82
  - — — латеральное 82
  - — — медиальное 82
  - — — нижнее 82
  - — — вставочное 79
  - — — гипоталамуса 60, 61
  - — — двигательного анализатора 84
  - — — двигательное 82, 114, 116
  - — — двойное 82, 133
  - — — диафрагмального нерва 27
  - — — добавочного нерва 27, 82, 138
  - — — добавочное 82, 114
  - — — дугообразные 79
  - — — заднелатеральное 26
  - — — заднемедиальное 27
  - — — зубчатое 75
  - — — клиновидное 79
  - — — комиссуральное 79
  - — — красные 68
  - — — крестцовые парасимпатические 27, 241
  - — — лицевого нерва 126
  - — — метаталамуса 60
  - — — мозжечка 75
  - — — моста 70, 71
  - — — мостовидное 82, 116
  - — — нижнего холмика 66
  - — — одиночного пути 82, 131, 133
  - — — околоодиночного пути 79
  - — — оливное добавочное заднее 79
  - — — медиальное 79
  - — — нижнее 79
  - — — отводящего нерва 82, 125
  - — — парамедианное заднее 79
  - — — переднелатеральное 26
  - — — переднемедиальное 26
  - — — подъязычного нерва 139
  - — — поясничное дорсальное 27
  - — — преддверно-улиткового нерва 82, 130
  - — — предкрышечные 66
  - — — пробковое 75
  - — — промежуточное 68
  - — — слезное 82
  - — — слюноотделительное 82
  - — — верхнее 82, 127
  - — — нижнее 82, 132
  - — — собственное заднего рога 27
  - — — спинномозговое 82, 116
  - — — среднемозгового пути 82
  - — — среднемозгового пути тройничного нерва 116
  - — — таламуса 58, 60
  - — — тонкое 79
  - — — улитковое заднее 82
  - — — переднее 82
  - — — хвостатое 38
  - — — центральное 27
  - — — чечевичеобразное 38
  - — — шаровидное 75
  - — — шатра 75
  - — — эпителамуса 60
- Ямка ромбовидная 69, 80 **944****

## INDEX TERMINORUM

- Adhesio interthalamica 58 919, 920, 923, 925*B*, 939, 954  
 Amiculum olivare 79  
 Ansa cervicalis 152 976, 1001, 1002, 1010, 1065  
 — subclavia 209, 213 988, 1031, 1062, 1063  
 Anthelix 276  
 Apertura mediana ventriculi quarti 80 943  
 Aperturas laterales ventriculi quarti 80 943  
 Apparatus lacrimalis 270  
 Arachnoidea 95, 104  
 — mater encephali 104 954, 961, 962  
 — spinalis 104 954, 955, 956  
 Arbor vitae cerebelli 74  
 Archaeocerebellum 74  
 Archocortex 37  
 Area amygdaloidea anterior 39  
 — cochleae 1142, 1144*B*, 1146  
 — hypothalamicæ lateralis 61  
 — n. facialis 127 1142  
 — postrema 82 944  
 — preoptica 61 922  
 — pretectalis 66 930  
 — subcallosa 36 891, 892  
 Arteria ophthalmica 274 1103, 1108  
 — rami 274  
 Auricula 276 1127  
 Auris externa 276 1126  
 — interna 286 1126  
 — media 281 1126  
 Axis bulbi externus 256 1102  
 — internus 256  
 — opticus 1102

Bulbus oculi 256 970, 1111, 1122, 1124  
 — equator 256  
 — meridiani 256  
 — polus anterior 256  
 — — — posterior 256  
 — olfactorius 36 893, 961, 967—971, 1157, 1158

Calcar avis 56 899, 900, 902, 909, 910, 912, 919  
 Caliculus gustatorius 299  
 Camera anterior bulbi 256 1102, 1105  
 — posterior bulbi 256 1102, 1104, 1105

Canales semicirculares ossei 286, 288 1126, 1132*B*  
 Canalis centralis 23, 24 881, 882, 913, 1060  
 Capilli 309  
 Cartilago auriculae 277  
 — meatus acusticus 279 1126  
 Cauda equina 143 879, 1031  
 Cavitas epiduralis 95 955, 956  
 — subarachnoidea 104, 105 955, 956, 963  
 — tympanica 281 1126  
 — — — epitympanum 281  
 — — — hypotympanum 281  
 — — — mesotympanum 281  
 Cavum trigeminale 101 971  
 Cerebellum 71 871, 873—875, 877, 889, 902, 905, 913, 919, 923, 925*B*, 947—949, 954, 959, 961, 962, 1111  
 Cerebrum 29  
 Chiasma opticum 60, 113 871, 872, 877, 893, 923, 930, 940, 954, 970, 971, 1111, 1122  
 Chorda tympani 128 973, 979, 1132*B*  
 Choroidea 260 1102—1108  
 Cilia 309 1112  
 Cisterna cerebellomedullaris 961, 962  
 — chiasmatis 961, 962  
 Cisternæ subarachnoideæ 105, 106  
 Cochlea 288 1126, 1140, 1141, 1143, 1144, 1151  
 — basis 290 1144  
 — cupula 290 1143  
 Colliculi caudales 66 878, 923, 929, 930, 939, 946  
 — rostrales 66 923, 930, 939, 946  
 Colliculus facialis 80 944, 945  
 Columna griseæ 24  
 Columnæ fornici 50 900—902, 911, 912, 919, 923, 929  
 Commissura epithalamicæ 60, 65 912, 939, 952  
 — fornici 47, 48 899—901, 910—912, 919  
 — habenularum 60 919, 929, 939  
 — rostral 46 877, 902, 911, 912, 919, 923, 954  
 Commissuræ supraopticae 62  
 Concha auriculae 276 1127  
 — nasalis 979  
 Confluens sinuum 103 959, 968  
 Conus medullaris 20 878  
 Corium [derma] 302  
 Cornea 256 1102—1104, 1108, 1113, 1122, 1124  
 Cornu 24, 56 881, 882, 899, 901, 902, 910, 913, 914, 917, 919, 920, 965, 1060  
 Corpora mamillaria 60 872, 930, 940  
 Corpus amygdaloïdem 39  
 — callosum 40 877, 898—900, 903, 906, 909, 910, 912, 919, 920, 925*B*, 947, 948  
 — ciliare 261 1102, 1104—1108  
 — geniculatum laterale 60 893, 930, 940, 946, 970  
 — mediale 60 930, 940, 946, 970  
 — medullare cerebelli 71 923, 937, 939, 940  
 — puneale 60 873, 877, 879, 919, 923, 929, 939, 954  
 — striatum 38 871, 873, 891, 900, 939  
 — trapezoïdeum 71  
 — vitréum 265 1102  
 Corpulcus lamellosa 163  
 Cortex cerebelli 71, 74  
 — cerebri 29, 37 898, 907, 917, 948  
 Crura fornici 48  
 Cuneus 36 892, 906  
 Cutis 300 963, 1168

Decussatio lemniscorum medianum 88  
 — nervorum trochlearium 68, 116 932  
 — peduncularum cerebellarium rostrum 68  
 — pyramidum 77 878, 925*B*, 928, 967  
 Decussationes segmenti 68 927*B*, 952  
 Diaphragma sellæ 99 957, 968  
 Diencephalon 10, 56, 251, 252 870, 871—875  
 Discus n. optici 264 1102, 1109  
 Ductus cochlearis 292 1146, 1148, 1149, 1152  
 — semicirculares 294 1147, 1149, 1150, 1152  
 Dura mater 95, 96  
 — — — encephali 97 954, 959, 963, 971, 979, 986, 1122, 1147  
 — — — spinalis 96 879, 953, 955, 956, 988

Eminentia arcuata 986  
 — collateralis 56 910  
 — mediales 80 944  
 Encephalon 27 868, 963  
 Endoneurium 108  
 Epidermis 300 1167  
 Epineurium 108  
 Epithalamus 58, 60 873

Falx cerebelli 99  
 — cerebri 99 954, 957, 963, 968  
 Fasciculi proprii 24 880, 882  
 — pyramidae 93 925*B*  
 Fasciculus arcuatus 91  
 — cuneatus 79, 86, 88 879—882, 943—945, 947  
 — gracilis 79, 86, 88 879—882, 943—945, 947  
 — lenticularis 93 952  
 — mammillotegmentalis 50  
 — mamillothalamicus 50 891, 902, 911, 920, 1158  
 — parietooccipitopontinus 52 949, 951  
 — prosencephalicus medialis 61

— thalamicus 60  
 Fibrae arcuatae externæ 91 930, 940  
 — — — externæ ventrales [anteriores] 79 888, 942  
 — — — internæ 88  
 — corticonucleares 67, 70, 93 948, 949  
 — corticopontinae 67, 70, 93 927*B*, 953  
 — corticoreticulares 93  
 — corticorubrales 51, 93 948  
 — corticospinales 51, 67, 70 948, 949, 951  
 — corticotectales 51  
 — corticothalamicæ 51, 93  
 — frontopontinae 93  
 — parietotemporopontinae 93 927*B*  
 — periventriculares 65  
 — pontis longitudinales 70 932  
 — — — transversæ 69 932, 940  
 — pontocerebellares 70, 91 949, 953  
 — reticulares 51  
 — striae terminalis 56  
 — temporopontinae 51 951  
 — thalamoparietales 51  
 Filum terminale externum (durale) 21, 97 879  
 — — — internum 20  
 — — — (spinale) 20 878, 879  
 Fimbria hippocampi 48, 56 901, 902, 910, 912, 917, 919, 1158  
 Fissura chooroidea 56 873, 910  
 — longitudinalis cerebri 29 887, 893, 901, 909, 920, 925*B*  
 — mediana ventralis (anterior) 23 880, 881, 892, 965*A*, 1060  
 — transversa cerebri 29 871, 962  
 Fissuræ cerebelli 71 929, 933  
 Folia cerebelli 71 929, 933  
 Foramen interventriculare 55, 65 873, 913  
 Forceps frontalis 46  
 — occipitalis 46 899, 910  
 Formatio reticularis 27, 71, 79 881, 882, 917, 927*B*, 942  
 Fornix 47 877, 920, 962, 1111, 1118, 1158  
 — conjunctivæ 1104, 1118  
 Fossa lateralis cerebri 30, 31, 36 875, 905  
 — rhomboidea 69, 80 878, 879, 947, 1111  
 Fovea caudalis 80 944  
 — centralis maculae 1102, 1109  
 — — — rostral 80 944  
 Funiculi medullæ spinalis 24

Ganglia mesenterica inferiora 230  
 — — — superiora 230  
 — pelvica 241 1059  
 — phrenica 229 1074  
 — renal 248  
 — spinalia 108  
 — terminalia 233  
 — trunci sympathicæ 209 1063  
 Ganglion cervicale medium 209, 212 992, 993, 998, 1058, 1062, 1065, 1067  
 — — — rami 213  
 — cervicalis 209, 210 973, 988, 991, 1031, 1057, 1067, 1087  
 — — — rami 212  
 — — — — cervicothoracicum (stellatum) 209, 213 988, 993, 1031, 1057, 1058, 1062, 1063, 1092  
 — — — rami 213, 218  
 — — — — ciliare 239 972, 973, 1059, 1087, 1111  
 — — — — radices 239  
 — — — — cochleare 130  
 — — — — oticum 122, 239 973, 1059, 1087  
 — — — — radices 239  
 — — — — rami 239  
 — — — — radices 239  
 — — — — pterygopalatinum 121, 239 969, 973, 975, 979, 1059, 1087  
 — — — — radices 239





