Nome: Cognome: Matricola:

1) L'Unione Europea ha fissato ambiziosi obiettivi sulla riduzione delle emissioni di CO_2 , che richiedono la progressiva dismissione delle centrali elettriche basate su combustibili fossili. La diminuzione di capacità produttiva non potrà però essere interamente compensata dalle fonti rinnovabili (eolico, solare) nei tempi richiesti; pertanto l'agenzia per lo sviluppo energetico Energie deve aprire delle nuove centrali nucleari in una regione della Francia. Individua per questo un insieme S di siti candidati all'apertura di una centrale: ciascuna delle centrali $s \in S$, se costruita, avrà una potenza in uscita pari a m_s Megawatt/ora e dovrà inviare v_s camion al mese contenenti sue scorie nucleari, altamente radioattive, ad un deposito posto in un'ulteriore località d utilizzando la rete stradale, rappresentata da un grafo orientato G = (N, A) in cui $S \subset N$ e $d \in N \setminus S$. L'agenzia censisce l'insieme C dei principali centri abitati della regione, e stima per ciascun arco $(i, j) \in A$ della rete stradale la distanza d_{ij} intercorrente tra di esso ed il più vicino centro abitato $h \in C$. L'agenzia stima che la probabilità di manifestazioni NIMBY (not in my backyard) in qualsiasi centro abitato sia inversamente proporzionale alla distanza minima a cui i camion passeranno da esso e direttamente proporzionale al numero di camion che passeranno per l'arco a distanza minima. Pertanto vuole mantenere il più bassa possibile ovunque la probabilità di proteste minimizzando il massimo del rapporto tra il numero di camion che passano su un arco e la distanza dello stesso dal più vicino centro abitato. Si vuole formulare in termini di PLI il problema di decidere dove aprire le p centrali elettriche e come inviare le scorie dalle centrali aperte al deposito d in modo da massimizzare la funzione obiettivo descritta con il vincolo che la capacità complessiva delle centrali aperte sia di almeno M Megawatt/ora.

Per descrivere il problema introduciamo per ciascun $s \in S$ la variabile binaria

$$y_s = \left\{ egin{array}{ll} 1 & {
m se} \ {
m l'agenzia} \ {
m decide} \ {
m di} \ {
m altrimenti} \end{array}
ight.$$
 $s \in S$

Notiamo che vale $0 < \underline{d} = \min\{d_{ij} : (i, j) \in A\} \le d_{ij} \le \max\{d_{ij} : (i, j) \in A\} = \overline{d}, 0 < \underline{v} = \min\{v_s : s \in S\} \le \sum_{s \in S} v_s = V$, e quindi la funzione obiettivo è limitata inferiormente da $\underline{v}/\overline{d}$ e superiormente da V/\underline{d} . Introduciamo anche la variabile z che rappresenta la funzione obiettivo. Parte della formulazione è riportata qua sotto:

$$\min \ z$$

$$y_s \in \{0, 1\}$$

$$s \in S$$

domanda a) Selezionare tra i vincoli, le funzioni obiettivo e gli ulteriori gruppi di variabili seguenti tutti quelli necessari a completare la formulazione.

$$\boxed{\mathbf{B}} \quad f_{ij} \ge 0 \qquad (i, j) \in A$$

$$\begin{array}{|c|c|} \hline \mathbf{C} & \sum_{(j,i)\in A} g_{ji} - \sum_{(i,j)\in A} g_{ij} = \begin{cases} -\sum_{s\in S} y_s & i=d \\ y_s & s\in S \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} i \in N$$

$$\boxed{\mathbf{D}} \quad g_{ij} \le f_{ij} \le V g_{ij} \qquad (i, j) \in A$$

$$\boxed{\mathbf{E}} \quad \underline{v}g_{ij} \le f_{ij} \le Vg_{ij} \qquad (i, j) \in A$$

$$\begin{bmatrix}
\mathbf{F}
\end{bmatrix} \sum_{(j,i)\in A} f_{ji} - \sum_{(i,j)\in A} f_{ij} = \begin{cases}
-\sum_{s\in S} v_s y_s & i = d \\
v_s y_s & s \in S \\
0 & \text{altrimenti}
\end{cases} i \in N$$

$$\boxed{\mathbf{G}} \quad \sum_{s \in S} m_s y_s = M$$

$$\boxed{\mathbf{H}} \quad \sum_{s \in S} m_s y_s \ge M$$

$$\boxed{\mathbf{I}} \quad g_{ij}d_{ij} - V(1 - g_{ij}) / \underline{d} \le z \qquad (i, j) \in A$$

$$\boxed{\mathbf{J}} \quad f_{ij}d_{ij} - V(1 - g_{ij}) / \bar{d} \leq z \qquad (i, j) \in A$$

$$\boxed{\mathbf{K}} \quad f_{ij} \le z d_{ij} \qquad (i, j) \in A$$

$$\boxed{\mathbf{L}} \quad f_{ij}g_{ij} / d_{ij} \le z \qquad (i, j) \in A$$

$$\boxed{\mathbf{M}} \quad f_{ij}d_{ij} - (V - f_{ij}) / \underline{d} \leq z \qquad (i, j) \in A$$

$$\boxed{\mathbf{N}} \quad z \leq \underline{v} / \overline{d}$$


domanda b) Si indichi infine come modificare il modello qualora si decida che la funzione obiettivo non debba essere il massimo del rapporto tra il numero di camion e la distanza (ossia la massima probabilità di di proteste) ma il numero stimato di protestanti dato dalla somma delle probabilità della protesta scatenata dal passaggio su ciascun arco (i, j) moltiplicata per la popolazione (nota) p_{ij} della città $h \in C$ di distanza minima dall'arco e quindi preoccupata per tale passaggio.

Nome:

Cognome:

Matricola:

2) Per il problema del dell'albero dei cammini minimi di radice 5 e la corrispondente soluzione (archi evidenziati) mostrati in figura, si risponda alle seguenti domande:



- Quale delle seguenti affermazioni sull'albero a destra è corretta?
- Sostituendo l'arco (3,5) con l'arco (4,7) si ottiene un altro albero che ha lo stesso costo di quello dato
- d = [4, 6, 3, 1, 0, 1, 3] è il vettore delle etichette relative all'albero
- III Il costo dell'albero è 11
- Qual è l'insieme di tutti gli archi che non soddisfano le corrispondenti condizioni di Bellman?

$$\boxed{\mathbf{I}} \{ (5,2), (4,6), (4,7) \}$$

$$\boxed{\text{II}}$$
 $\{(5,2)\}$

$$[III] \{ (5,2), (4,7) \}$$

Qual è il minor numero di archi da sostituire nell'albero per ottenere un albero dei cammini minimi?

Qual è il vettore di etichette di un albero dei cammini minimi?

$$\boxed{1}$$
 $d = [4, 6, 3, 1, 0, 1, 3]$

$$\boxed{\text{III}} \ d = [1, 3, 3, 1, 0, 1, 1]$$


Modificare poi il costo del minor numero possibile di archi fuori dall'albero dato affinché quello dato sia l'unico albero dei cammini minimi. Giustificare la risposta.

Nome:

Cognome:

Matricola:

3) Per il problema del flusso massimo dal nodo 9 al nodo 1 ed il corrispondente flusso mostrati in figura, si risponda alle seguenti domande:



A Il flusso mostrato è:

I ammissibile di valore 10

II non ammissibile

B Ponendo $x_{75} = 0$ si ottiene un flusso:

I ammissibile di valore 10

II non ammissibile

III ammissibile di valore 8

C Considerando il flusso ammissibile di valore più alto tra quelli descritti nei due punti precedenti, quale dei seguenti cammini è aumentante per il problema di flusso massimo:

 $\boxed{1} \quad 9 \to 5 \to 4 \to 2 \to 1$

 $\boxed{\text{II}} \ \ 8 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow 1$

 $\boxed{\text{III}} \ 9 \to 5 \to 7 \to 4 \to 2 \to 1$

D | Quale dei seguenti tagli (N_s, N_t) mostra che il valore del flusso massimo non può essere superiore a 10:

 $I N_s = \{9\}$

 $II N_s = \{6, 9\}$

III entrambi

 $oxed{E}$ Quale dei seguenti tagli (N_s, N_t) è saturo:

 $I N_t = \{ 9 \}$

 $II N_t = \{7, 8, 9\}$

III nessuno dei due

F A partire dal flusso ammissibile di valore massimo noto dai punti precedenti si esegua l'algoritmo di Edmons&Karp: il numero di iterazioni (visite del grafo residuo) necessarie per terminare è:

I 1

II 2

III 3

G Con riferimento all'esecuzione di cui alla domanda precedente, il taglio (N_s, N_t) individuato dall'algoritmo è:

 $I N_s = \{5, 9\}$

 $III N_s = \{5, 7, 8, 9\}$

III nessuno dei due


H Si discuta se sia possibile diminuire la capacità di un singolo arco affinché quello determinato dall'algoritmo di Edmons&Karp non sia l'unico taglio di capacità minima. Giustificare la risposta.

Nome:

Cognome:

Matricola:

Si consideri l'applicazione dell'algoritmo del Simplesso Duale, per via geometrica, al problema di PL rappresentato nella figura qui accanto. Si noti che A_3 , A_4 ed A_6 sono collineari (non tutti con lo stesso verso), e separatamente A_5 e c sono collineari.



A Per $B = \{1, 2\}$ si può afferare che

I è una base primale ammissibile

II è una base primale degenere

IIIentrambe le cose sono vere

Per $B = \{4, 5\}$ si può afferare che

è una base duale ammissibile

 $|\operatorname{II}|$ è una base duale degenere

III entrambe le cose sono vere

|C| Per $B = \{2, 5\}$ si può afferare che

I è una base primale ammissibile

|II|è una base duale ammissibile

|III|entrambe le cose sono vere

D Per $B = \{3, 4\}$ si può afferare che

I è una base primale ammissibile

II è una base duale ammissibile

non è una base

Se la base corrente fosse $B = \{4, 5\}$ e si scegliesse k = 1, per $\eta_B = A_k A_B^{-1}$ si avrebbe

 $| I | \eta_4 > 0$

 $|\Pi|$ $\eta_5 > 0$

III entrambe le cose

Se la base corrente fosse $B = \{4, 5\}$ e si scegliesse k = 6, per $\eta_B = A_k A_B^{-1}$ si avrebbe

 $\boxed{1}$ $\eta_4 > 0$

II $\eta_5 > 0$

III entrambe le cose

Se la base corrente fosse $B = \{1, 4\}$ e si scegliesse k = 5, si avrebbe

 $| II | \eta_4 > 0$

IIIentrambe le cose

 $_{\rm H}$ Si descriva l'esecuzione dell'algoritmo a partire dalla base $B = \{1, 4\}$, discutendo tutti i passi effettuati. Si discuta inoltre l'unicità della soluzione primale e duale ottenuta. Si giustifichino geometricamente tutte le risposte

5) Per il problema dello zaino qui accanto, si consideri il seguente metodo "Branch and Bound": la soluzione ammissibile di partenza è ottenuta utilizzando l'algoritmo greedy basato sui rendimenti (costi unitari) non crescenti, la valutazione superiore è ottenuta risolven-

do il rilassamento continuo, la ramificazione viene eseguita sull'eventuale variabile frazionaria della soluzione ottima del rilassamento e l'albero di enumerazione è visitato in ampiezza.

Qual è l'ordinamento delle variabili per rendimento (costo unitario) non crescente?

$$I = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$$

$$\boxed{\text{II}} \{x_2, x_4, x_3, x_1\}$$

$$\boxed{\text{III}} \{ x_3, x_1, x_2, x_4 \}$$

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

La soluzione ottima del rilassamento continuo del problema è a componenti intere

La soluzione ottima del rilassamento continuo è a componenti intere se il lato destro del vincolo viene posto a 8

La soluzione ammissibile di partenza cambia se il lato destro del vincolo viene posto a 9

Quali sono le valutazioni inferiore \underline{z} e superiore \bar{z} calcolate dall'algoritmo al nodo radice?

$$I \ \underline{z} = 6, \, \bar{z} = 11/2$$

$$|\overline{\mathbf{II}}| \ \underline{z} = 5, \ \overline{z} = 5$$

$$\boxed{\text{III}} \ \underline{z} = 5, \, \bar{z} = 11/2$$

Su quali variabili l'algoritmo ramifica prima di terminare?

$$I x_4$$

$$II$$
 x_4, x_3

Ε Quali sono le migliori valutazione superiore ed inferiori globali $z \leq z(P) \leq \bar{z}$ disponibili quando l'algoritmo ha finito di visitare i primi due nodi dell'albero delle decisioni (la radice ed i suoi figli)?

$$\boxed{1}$$
 $z=5, \bar{z}=5$

II
$$z = 5, \bar{z} = 16/3$$

$$\overline{\text{III}} \ z = 9, \, \bar{z} = 9$$

Quali sono tutte le soluzioni ammissibili esplorate dall'algoritmo?

$$\boxed{\text{II}} [1, 1, 1, 0] \qquad \boxed{\text{II}} [1, 1, 1, 0], [1, 1, 0, 1]$$

$$[III]$$
 [1, 1, 1, 0], [1, 1, 0, 1], [1, 0, 1, 1]

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

L'algoritmo chiude almeno un nodo per otimalità (la soluzione ottima del rilassamento continuo è intera)

L'algoritmo chiude tutti i nodi per ottimaliltà (la soluzione ottima del rilassamento continuo è intera)

L'algoritmo chiude due nodi per la sola valutazione superiore $(z \geq \bar{z}(P_i))$, ma la soluzione ottima del rilassamento continuo non è intera)

Н È possibile modificare il peso del terzo elemento in modo tale che l'algoritmo termini direttamente al nodo radice? Se sì, in che modo? Giustificare la risposta.