

Évaluation – Droites

Rappel. Une droite non verticale a une équation réduite de la forme

$$y = mx + p,$$

où m est le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'origine.

1 Deux points de coordonnées connues

Déterminer l'équation réduite de la droite passant par les deux points donnés.

1. $A(-1; 3)$ et $B(3; 11)$.

2 Un point et le coefficient directeur connu

Déterminer l'équation réduite de la droite passant par le point donné et ayant pour coefficient directeur m .

1. $A(-2; 4)$, $m = -2$.

3 Un point et l'ordonnée à l'origine connus

Déterminer l'équation réduite de la droite passant par le point donné et dont l'ordonnée à l'origine est p .

1. $A(-1; 5)$, $p = 2$.


4 Droite parallèle à une droite donnée

On donne l'équation d'une droite d et un point A n'appartenant pas à d . Déterminer l'équation réduite de la droite d' parallèle à d et passant par A .

1. $d : y = -x + 3$, $A(2; 5)$.

5 À partir d'un graphique

Le graphique ci-dessous représente une droite d dans un repère orthonormé. Déterminer graphiquement deux points de d , puis en déduire son équation réduite.



6 Tracer une droite dans un repère

Dans le repère ci-dessous, tracer la droite d passant par le point $A(1; 2)$ et de coefficient directeur $m = -2$. Donner ensuite son équation réduite.

