Allaitement artificiel : RAPPELS !!!



Un agneau réussi = Marge en plus

Un objectif de 15 % de mortalité maximum est possible !!!



Laisser sous la mère une **portée équilibrée**



Séparation **après prise de colostrum avant 12h** et soin de base



Effectuer une **période d'apprentissage**



Sevrage: vers **10 à 12 kg de poids vif** (environ 6 semaines) quand l'agneau consomme autour de **200 g d'aliment par jour**

Comment s'équiper ?

Un équipement adapté !!!

Bâtiment adapté	•Sec, propre et sans courant d'air •Éloigné des mères
Matériel nécessaire	•Thermomètre, balance électronique, verre à mesure, produits de nettoyage et désinfection •Matériel de remplacement (tétines, tuyaux…)
Deux méthodes	•Au seau •A la louve artificielle

- **Nettoyage minutieux et régulier du matériel indispensable !!!**

- **Réglages quotidien de la machine obligatoire (concentration en lait et température) en fonction de la fiabilité de la louve!!!**

Le choix du lait: une décision importante !!!


Caractéristiques :

- APPETANT
- Energie : 20 à 30% de matières grasses
- Matières Azotées : optimum de 25% de MAT
- Acides Aminés Indispensables
- Bonne digestibilité : fraction importante d'Acide Gras Courts (ex : huile de Coprah)

Les points clefs pour réussir !

Un point primordial : la prise de colostrum !!!





Effets :

- Maintien de la température corporelle
- Stimule la résistance aux infections
- Effet laxatif, avec élimination du méconium et stimulation de la motricité intestinale

Méthode :

- Colostrum de la mère avant séparation ou colostrum congelé (ovin, bovin, caprin) ou artificiel à reconstituer de bonne qualité
- Dans les 6 à 12h après la naissance ***(passage de la paroi intestinale)***

Deux lots pour réussir la mise en route!!!

- Un lot en apprentissage : **au chaud (18-20°C)** avec des lampes infrarouges **en petit lot** (laisser quelques agneaux habitués permet de stimuler les nouveaux arrivés)
- Un lot des démarrés : **regroupés par gabarit** à partir de 8-15 jours d'âge avec une température de 15°C (maximum 20 à 30 agneaux)

IMPORTANT !!!

- **Eau** à volonté et propre
- **Paille** de qualité dans des râteliers à renouveler tous les jours
- **Aliment 1er âge dès la deuxième semaine** en petite quantité et à renouveler régulièrement
- **Argile** pour la sécurité digestive et comme protection pour l'ecthyma
- Surveiller que la **dilution** de la poudre de lait s'effectue à une **température entre 45 et 50 °C** (pour la dilution des matières grasses)
- Attention à la **longueur des tuyaux** de la louve: le lait froid rebute les agneaux

ATTENTION ! Ces agneaux sont plus sensibles aux :

- Pathologies infectieuses dont des colibacilloses les premiers jours
- Troubles digestifs
- Parasites (strongyloides et coccidies): prévoir un traitement anti-coccidien

→ **Surveillance accrue et réaction rapide**

Sources: OS Romane