

Análisis Matemático II

Soluciones a los ejercicios del tema 14

1. En cada uno de los siguientes casos, probar que la función f es integrable en el conjunto A y calcular su integral:

- a) $A = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 > 1, y > 0 \}$
$$f(x, y) = \frac{x + y}{(x^2 + y^2)^\alpha} \quad \forall (x, y) \in A \quad (\alpha \in \mathbb{R}, \alpha > 3/2)$$
- b) $A = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 < x^2 + y^2 < 1, z > 1 \}$
$$f(x, y, z) = z^\alpha (x^2 + y^2)^\beta \quad \forall (x, y, z) \in A \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha < -1 < \beta)$$
- c) $A = \{ (x, y, z) \in (\mathbb{R}^+)^3 : x^2 + y^2 + z^2 > 1 \}$
$$f(x, y, z) = \frac{xyz}{(x^2 + y^2 + z^2)^4} \quad \forall (x, y, z) \in A$$

Solución

a) Usamos un cambio de variable a coordenadas polares, considerando el conjunto

$$E =]1, +\infty[\times]0, \pi[$$

y la función $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$g(\rho, \theta) = \rho f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) = \frac{\rho^2 (\cos \theta + \sin \theta)}{\rho^{2\alpha}} \quad \forall (\rho, \theta) \in E$$

Usando el teorema de Tonelli, comprobamos que $g \in \mathcal{L}_1(E)$, ya que

$$\begin{aligned} \int_E |g(\rho, \theta)| d(\rho, \theta) &\leq 2 \int_E \rho^{2-2\alpha} d(\rho, \theta) = 2 \int_0^\pi \left(\int_1^{+\infty} \rho^{2-2\alpha} d\rho \right) d\theta \\ &= 2\pi \left[\frac{\rho^{3-2\alpha}}{3-2\alpha} \right]_1^{+\infty} = \frac{2\pi}{2\alpha-3} < \infty \end{aligned}$$

El teorema de cambio de variable nos dice que $f \in \mathcal{L}_1(A)$ y que la integral de f sobre A coincide con la de g sobre E , que calculamos usando el teorema de Fubini:

$$\begin{aligned} \int_A f(x, y) d(x, y) &= \int_E g(\rho, \theta) d(\rho, \theta) = \int_E \rho^{2-2\alpha} (\cos \theta + \sin \theta) d(\rho, \theta) \\ &= \int_0^\pi \left(\int_1^{+\infty} \rho^{2-2\alpha} d\rho \right) (\cos \theta + \sin \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2\alpha-3} \int_0^\pi (\cos \theta + \sin \theta) d\theta = \frac{2}{2\alpha-3} \end{aligned}$$

b) Usamos el cambio de variable a coordenadas cilíndricas, considerando el conjunto

$$E =]0, 1[\times]-\pi, \pi[\times]1, +\infty[$$

y la función $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$g(\rho, \theta, z) = \rho f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z) = z^\alpha \rho^{2\beta+1} \quad \forall (\rho, \theta) \in E$$

El teorema de cambio de variable para funciones medibles positivas, junto con el de Tonelli, nos dicen que $f \in \mathcal{L}_1(A)$, pues de hecho se tiene

$$\begin{aligned} \int_A f(x, y, z) d(x, y, z) &= \int_E g(\rho, \theta, z) d(\rho, \theta, z) = \int_E z^\alpha \rho^{2\beta+1} d(\rho, \theta, z) \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_0^1 \rho^{2\beta+1} \left(\int_1^{+\infty} z^\alpha dz \right) d\rho \right) d\theta \\ &= 2\pi \left[\frac{z^{\alpha+1}}{\alpha+1} \right]_1^{+\infty} \left[\frac{\rho^{2\beta+2}}{2\beta+2} \right]_0^1 = -\frac{\pi}{(\alpha+1)(\beta+1)} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

c) Usamos el cambio de variable a coordenadas esféricas, considerando el conjunto

$$E =]1, +\infty[\times]-\pi, \pi[\times]-\pi/2, \pi/2[$$

y la función $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$\begin{aligned} g(r, \theta, \varphi) &= r^2 \cos \varphi f(r \cos \theta \cos \varphi, r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \varphi) \\ &= \frac{\cos \theta \sin \theta \cos^3 \varphi \sin \varphi}{r^3} \quad \forall (r, \theta, \varphi) \in E \end{aligned}$$

Usando el teorema de Tonelli, comprobamos que $g \in \mathcal{L}_1(E)$, ya que

$$\begin{aligned} \int_E |g(r, \theta, \varphi)| d(r, \theta, \varphi) &\leq \int_E \frac{d(r, \theta, \varphi)}{r^3} = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_1^{+\infty} \frac{dr}{r^3} \right) d\theta \right) d\varphi \\ &= 2\pi^2 \left[-\frac{1}{2r^2} \right]_1^{+\infty} = \pi^2 < \infty \end{aligned}$$

El teorema de cambio de variable nos dice que $f \in \mathcal{L}_1(A)$. Para calcular su integral escribimos $A = A_+ \uplus A_0 \uplus A_-$ donde $A_0 = \{(x, y, z) \in A : x = 0\}$, mientras que

$$A_+ = \{(x, y, z) \in A : x > 0\} \quad \text{y} \quad A_- = \{(x, y, z) \in A : x < 0\}$$

El conjunto A_0 tiene medida nula, por estar contenido en un plano, y es claro que

$$A_- = \{(-x, y, z) : (x, y, z) \in A_+\} \quad \text{y} \quad f(-x, y, z) = -f(x, y, z) \quad \forall (x, y, z) \in A_+$$

Deducimos que

$$\int_{A_0} f = 0 \quad \text{y} \quad \int_{A_-} f = - \int_{A_+} f$$

con lo que la aditividad de la integral nos permite concluir que

$$\int_A f = \int_{A_0} f + \int_{A_+} f + \int_{A_-} f = 0 \quad \blacksquare$$

2. En cada uno de los siguientes casos, estudiar la integrabilidad de la función f en el conjunto A :

$$a) \quad A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}, \quad f(x,y) = \frac{\sin x \sin y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \quad \forall (x,y) \in A$$

$$b) \quad A = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z > x^2 + y^2\} \\ f(x,y,z) = (x^3 + y^3) \cos(xy) e^{-z} \quad \forall (x,y,z) \in A$$

$$c) \quad A = \mathbb{R}^3, \quad f(x,y,z) = \frac{1}{(1 + x^2 + y^2 + z^2)^\alpha} \quad \forall (x,y,z) \in A \quad (\alpha \in \mathbb{R}^+)$$

Solución

a) Descomponemos el conjunto A en la forma $E = A_1 \uplus A_2$ donde

$$A_1 = \{(x,y) \in A : x^2 + y^2 \geq 1\} \quad \text{y} \quad A_2 = \{(x,y) \in A : x^2 + y^2 < 1\}$$

para estudiar por separado la integrabilidad de f en A_1 y A_2 . Para el primero se tiene claramente que

$$|f(x,y)| \leq \frac{1}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \quad \forall (x,y) \in A_1$$

Usamos un cambio de variable a coordenadas polares, considerando el conjunto

$$E_1 = [1, +\infty[\times]-\pi, \pi[$$

El teorema de cambio de variable para funciones medibles positivas, junto con el teorema de Tonelli nos dicen que

$$\begin{aligned} \int_{A_1} |f(x,y)| d(x,y) &\leq \int_{A_1} \frac{d(x,y)}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \int_{E_1} \frac{d(\rho, \theta)}{\rho^2} \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_1^{+\infty} \frac{d\rho}{\rho^2} \right) d\theta = 2\pi \left[-\frac{1}{\rho} \right]_1^{+\infty} = 2\pi < \infty \end{aligned}$$

Para trabajar en el conjunto A_2 usamos una acotación diferente. Del teorema del valor medio se deduce que $|\sin t| \leq |t|$ para todo $t \in \mathbb{R}$, y obtenemos que

$$|f(x, y)| \leq \frac{|xy|}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \quad \forall (x, y) \in A_2$$

Usamos ahora el cambio de variable a coordenadas polares, considerando el conjunto

$$E_2 =]0, 1[\times]-\pi, \pi[$$

El teorema de cambio de variable para funciones medibles positivas, junto con el teorema de Tonelli nos dicen ahora que

$$\begin{aligned} \int_{A_2} |f(x, y)| d(x, y) &\leq \int_{A_2} \frac{|xy| d(x, y)}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \int_{E_2} \frac{\rho |\rho \cos \theta| |\rho \sin \theta|}{\rho^3} d(\rho, \theta) \\ &\leq \int_{E_2} d(\rho, \theta) = 2\pi < \infty \end{aligned}$$

Hemos probado que f es integrable en A_1 y en A_2 , luego $f \in \mathcal{L}_1(A)$. ■

c) Usamos el cambio de variable a coordenadas esféricas, considerando el conjunto

$$E = \mathbb{R}^+ \times]-\pi, \pi[\times]-\pi/2, \pi/2[$$

El teorema de cambio de variable para funciones medibles positivas, junto con el teorema de Tonelli, nos dicen que

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^3} f &= \int_E \frac{r^2 \cos \varphi d(r, \theta, \varphi)}{(1 + r^2)^\alpha} = \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\int_0^{+\infty} \frac{r^2 \cos \varphi dr}{(1 + r^2)^\alpha} \right) d\varphi \right) d\theta = \\ &= \left(\int_{-\pi}^{\pi} d\theta \right) \left(\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \varphi d\varphi \right) \left(\int_0^{+\infty} \frac{r^2 dr}{(1 + r^2)^\alpha} \right) = 4\pi \int_0^{+\infty} \frac{r^2 dr}{(1 + r^2)^\alpha} \end{aligned}$$

Por tanto, $f \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^3)$ si, y sólo si, $h \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^+)$, donde $h(r) = r^2 (1 + r^2)^{-\alpha}$ para todo $r \in \mathbb{R}^+$.

Definiendo $h(0) = 0$ convertimos h en una función continua, luego localmente integrable, en \mathbb{R}_0^+ . En particular h es integrable en el intervalo $[0, 1]$, luego será integrable en \mathbb{R}^+ si, y sólo si, lo es en $J = [1, +\infty[$. En esta nueva semirrecta podemos usar el criterio de comparación con la función $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(r) = r^{2-2\alpha}$ para todo $r \in J$, que es localmente integrable y no se anula en J . Se tiene claramente que

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \frac{|h(r)|}{|g(r)|} = \lim_{r \rightarrow +\infty} \frac{r^{2\alpha}}{(1 + r^2)^\alpha} = 1$$

y el criterio de comparación nos dice que h es integrable en J si, y sólo si, lo es g , pero sabemos que esto equivale a que se tenga $2 - 2\alpha < -1$, es decir, $\alpha > 3/2$.

Concluimos de esta forma que $f \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^3)$ si, y sólo si, $\alpha > 3/2$. ■

3. Calcular el volumen de la llamada *bóveda de Viviani*:

$$B = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (2x - 1)^2 + 4y^2 \leq 1, \ x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, \ z \geq 0 \}$$

Solución

El volumen de B coincide con el de la subgráfica de la función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, donde

$$A = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : (2x - 1)^2 + y^2 \leq 1 \} \quad y$$

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} \quad \forall (x, y) \in A$$

ya que la diferencia entre ambos conjuntos tiene medida nula. Por tanto, se tiene

$$\lambda_3(B) = \int_A \sqrt{1 - x^2 - y^2} \, d(x, y)$$

Para calcular esta integral doble, usaremos el cambio de variable a coordenadas polares, por lo que deberemos encontrar el conjunto de las coordenadas polares de los puntos de A . Si $\rho \in \mathbb{R}^+$ y $\theta \in]-\pi, \pi[$, se tiene que $(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \in A$ si, y sólo si,

$$\begin{aligned} 1 &\geq (2\rho \cos \theta - 1)^2 + 4\rho^2 \sin^2 \theta \\ &= 4\rho^2 \cos^2 \theta - 4\rho \cos \theta + 1 + 4\rho^2 \sin^2 \theta \\ &= 4\rho^2 - 4\rho \cos \theta + 1 = 4\rho(\rho - \cos \theta) + 1 \end{aligned}$$

lo que equivale a que se tenga $\rho \leq \cos \theta$. Además, esta desigualdad sólo es posible cuando $\cos \theta \geq 0$, es decir, cuando $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$. Por tanto, el conjunto de las coordenadas polares de los puntos de A viene dado por

$$E = \{ (\rho, \theta) : -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2, \ 0 < \rho \leq \cos \theta \}$$

Usando ya el teorema de cambio de variable, junto con el de Tonelli, obtenemos

$$\begin{aligned} \lambda_3(B) &= \int_A \sqrt{1 - x^2 - y^2} \, d(x, y) = \int_E \rho \sqrt{1 - \rho^2} \, d(\rho, \theta) \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\int_0^{\cos \theta} \rho \sqrt{1 - \rho^2} \, d\rho \right) d\theta = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left[-\frac{1}{3} (1 - \rho^2)^{3/2} \right]_0^{\cos \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{3} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (1 - |\sin \theta|^3) \, d\theta = \frac{\pi}{3} - \frac{1}{3} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} |\sin \theta|^3 \, d\theta \\ &= \frac{\pi}{3} - \frac{2}{3} \int_0^{\pi/2} \sin^3 \theta \, d\theta = \frac{\pi}{3} - \int_0^{\pi/2} (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta \, d\theta \\ &= \frac{\pi}{3} - \frac{2}{3} \left[\frac{\cos^3 \theta}{3} - \cos \theta \right]_0^{\pi/2} = \frac{3\pi - 4}{9} \end{aligned}$$

■