



BRUGNOLI
ASSESSORIA
E CONSULTORIA

Exames e Orientações Pré-Operatórias para Procedimentos de Ortopedia

Este documento detalha os exames pré-operatórios e orientações específicas para cada procedimento de ortopedia listado, conforme fornecido. As recomendações são baseadas nas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA, 2017), no Checklist de Segurança Cirúrgica da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2009), nas normativas do Ministério da Saúde do Brasil, nos protocolos do SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS), e nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). Quando diretrizes específicas não estão disponíveis, as recomendações seguem práticas clínicas padrão para avaliação pré-operatória.

Exames e Orientações Gerais

Os seguintes requisitos pré-operatórios gerais se aplicam a todos os procedimentos, salvo especificações contrárias:

- Histórico Médico: Coleta completa, incluindo comorbidades, alergias, medicações e cirurgias prévias.
- Exame Físico: Avaliação pelo cirurgião ortopedista e anestesiológico.
- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros, conforme SBA (2017).
- Consentimento Informado: Termo assinado explicando riscos, benefícios e alternativas, conforme Código de Ética Médica (CFM).

Exames Padrões

- Hemograma completo
- Coagulação (TP/INR, TTPA)
- Glicemia de jejum e HbA1c (para diabéticos)
- Uréia
- TGO / TGP
- Eletrólitos (sódio, potássio, creatinina)
- Eletrocardiograma (ECG)
- Radiografia de tórax
- Ressonância magnética
- Tomografia Computadorizada
- Angiotomografia
- Angioressonância
- Risco cirúrgico
- Raio X

Avaliação Anestésica: Classificação ASA (American Society of Anesthesiologists) pelo anestesiológico.

Higiene: Banho com sabonete antisséptico na noite anterior e no dia da cirurgia, especialmente para procedimentos com implantes.

Alongamento/Encurtamento Miotendinoso (Média Complexidade)

Código: 0408060018

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Ressonância Magnética (0207030030): Avaliar musculatura e tendões envolvidos.
- Ultrassonografia de Tecidos Moles (0205020062): Avaliar integridade tendinosa.
- Avaliação Fisioterapêutica: Para planejamento de reabilitação pós-operatória.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes, conforme SBA (2017).
- Higiene: Banho antisséptico na região afetada.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada devido ao risco de sangramento.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Fortalecimento muscular para otimizar recuperação.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo perioperatório. SBOT: Protocolos para cirurgia de tecidos moles.

Alongamento e/ou Transporte Ósseo de Ossos Longos (Alta Complexidade)

Código: 0408060034

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG, radiografia de tórax.

Específicos:

- Tomografia Computadorizada (0206030029): Planejamento do transporte ósseo.
- Cintilografia Óssea (0208050035): Avaliar viabilidade óssea e infecção.
- Avaliação Vascular: Doppler arterial (0205010040) para garantir irrigação adequada.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina e vancomicina para procedimentos prolongados.
- Higiene: Banho antisséptico na região afetada.
- Profilaxia de Tromboembolismo: Heparina de baixo peso molecular, conforme SBA (2017).
- Planejamento de Reabilitação: Discussão com fisioterapeuta.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Profilaxia de tromboembolismo. SBOT: Protocolos para transporte ósseo.

Artrodese de Médias/Grandes Articulações de Membro Inferior (Média Complexidade)

Código: 0408050039

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG, radiografia de tórax.

Específicos:

- Ressonância Magnética (0207030030): Avaliar articulação e tecidos adjacentes.
- Radiografia da Articulação: Para planejamento cirúrgico.
- Avaliação Cardiológica: Ecocardiograma (0205010032) para pacientes com risco.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região afetada.
- Profilaxia de Tromboembolismo: Meias de compressão e/ou heparina.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada com hematologista.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de artrodeses. SBOT: Protocolos para cirurgias articulares.

Artrodese de Médias/Grandes Articulações de Membro Superior (Média Complexidade)

Código: 0408020032

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Ressonância Magnética (0207030030): Avaliar articulação do ombro ou cotovelo.
- Radiografia da Articulação: Planejamento cirúrgico.
- Eletroneuromiografia (0211050083): Se suspeita de lesão nervosa.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região afetada.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Para manter amplitude de movimento.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo perioperatório. SBOT: Protocolos para membro superior.

Artrodese de Pequenas Articulações (Média Complexidade)

Código: 0408060050

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Radiografia da Mão/Pé: Avaliar articulação afetada.
- Ressonância Magnética (0207030030): Se necessário para tecidos moles.
- Avaliação Reumatológica: Para pacientes com artrite.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 6 horas para sólidos (anestesia local ou regional), 8 horas para geral.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região afetada.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de pequenas articulações. SBOT: Protocolos para cirurgias de mão/pé.

Artroplastia de Joelho (Não Convencional) (Alta Complexidade)

Código: 0408050047

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG, radiografia de tórax.

Específicos:

- Ressonância Magnética do Joelho (0207030030): Avaliar cartilagem e ligamentos.
- Tomografia Computadorizada (0206030029): Planejamento do implante.
- Avaliação Cardiológica: Ecocardiograma (0205010032) devido ao risco de tromboembolismo.
- Cultura de Secreção: Se suspeita de infecção prévia.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina e vancomicina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico no joelho.
- Profilaxia de Tromboembolismo: Heparina de baixo peso molecular, conforme SBA (2017).
- Fisioterapia Pré-Operatória: Fortalecimento do quadríceps.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Profilaxia de tromboembolismo. SBOT: Protocolos para artroplastias.

Artroplastia de Revisão ou Reconstrução do Quadril (Alta Complexidade)

Código: 0408040076

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG, radiografia de tórax.

Específicos:

- Tomografia Computadorizada do Quadril (0206030029): Avaliar desgaste do implante.
- Cintilografia Óssea (0208050035): Suspeita de infecção ou soltura.
- Avaliação Cardiológica: Ecocardiograma (0205010032) para risco tromboembólico.
- Cultura de Aspiração Articular: Se suspeita de infecção.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina e vancomicina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região do quadril.
- Profilaxia de Tromboembolismo: Heparina e meias de compressão.
- Planejamento de Reabilitação: Discussão com fisioterapeuta.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de revisões articulares. SBOT: Protocolos para artroplastias.

Artroplastia Escápulo-Umeral (Não Convencional) (Alta Complexidade)

Código: 0408010037

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG, radiografia de tórax.

Específicos:

- Ressonância Magnética do Ombro (0207030030): Avaliar manguito rotador.
- Tomografia Computadorizada do Ombro (0206030029): Planejamento do implante.
- Eletroneuromiografia (0211050083): Se suspeita de lesão nervosa.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região do ombro.
- Profilaxia de Tromboembolismo: Heparina para pacientes com risco.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Para manter mobilidade.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de artroplastias. SBOT: Protocolos para ombro.

Artroplastia Total de Conversão do Quadril (Alta Complexidade)

Código: 0408040068

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG, radiografia de tórax.

Específicos:

- Tomografia Computadorizada do Quadril (0206030029): Avaliar osso e implante prévio.
- Cintilografia Óssea (0208050035): Suspeita de infecção.
- Avaliação Cardiológica: Ecocardiograma (0205010032) para risco tromboembólico.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina e vancomicina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região do quadril.
- Profilaxia de Tromboembolismo: Heparina e meias de compressão.
- Planejamento de Reabilitação: Discussão com fisioterapeuta.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Profilaxia de tromboembolismo. SBOT: Protocolos para artroplastias.

Artroplastia Total de Joelho - Revisão/Reconstrução (Alta Complexidade)

Código: 0408050055

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG, radiografia de tórax.

Específicos:

- Tomografia Computadorizada do Joelho (0206030029): Avaliar implante e osso.
- Cintilografia Óssea (0208050035): Suspeita de infecção ou soltura.
- Cultura de Aspiração Articular: Se suspeita de infecção.
- Avaliação Cardiológica: Ecocardiograma (0205010032).

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina e vancomicina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico no joelho.
- Profilaxia de Tromboembolismo: Heparina e meias de compressão.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Fortalecimento muscular.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de revisões articulares. SBOT: Protocolos para artroplastias.

Artroplastia Total Primária do Joelho (Alta Complexidade)

Código: 0408050063

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG, radiografia de tórax.

Específicos:

- Ressonância Magnética do Joelho (0207030030): Avaliar cartilagem e ligamentos.
- Tomografia Computadorizada (0206030029): Planejamento do implante.
- Avaliação Cardiológica: Ecocardiograma (0205010032) para risco tromboembólico.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico no joelho.
- Profilaxia de Tromboembolismo: Heparina e meias de compressão.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Fortalecimento do quadríceps.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Profilaxia de tromboembolismo. SBOT: Protocolos para artroplastias.

Artroplastia Total Primária do Quadril Não Cimentada/Híbrida (Alta Complexidade)

Código: 0408040092

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG, radiografia de tórax.

Específicos:

- Tomografia Computadorizada do Quadril (0206030029): Planejamento do implante.
- Ressonância Magnética do Quadril (0207030030): Avaliar tecidos moles.
- Avaliação Cardiológica: Ecocardiograma (0205010032) para risco tromboembólico.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região do quadril.
- Profilaxia de Tromboembolismo: Heparina e meias de compressão.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Fortalecimento muscular.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Profilaxia de tromboembolismo. SBOT: Protocolos para artroplastias.

Descompressão com Esvaziamento Medular por Brocagem/Via Corticotomia (Média Complexidade)

Código: 0408060093

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG, radiografia de tórax.

Específicos:

- Ressonância Magnética da Coluna (0207030027): Avaliar compressão medular.
- Tomografia Computadorizada da Coluna (0206030029): Planejamento cirúrgico.
- Eletroneuromiografia (0211050083): Avaliar função nervosa.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região da coluna.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada com hematologista.
- Avaliação Neurológica: Para documentar déficits pré-operatórios.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de cirurgias de coluna. SBOT: Protocolos para descompressão medular.

Discectomia Cervical/Lombar/Lombo-Sacra por Via Posterior (1 Nível c/ Microscópio) (Alta Complexidade)

Código: 0408030380

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG, radiografia de tórax.

Específicos:

- Ressonância Magnética da Coluna (0207030027): Avaliar hérnia de disco.
- Tomografia Computadorizada da Coluna (0206030029): Planejamento cirúrgico.
- Eletroneuromiografia (0211050083): Avaliar compressão nervosa.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região da coluna.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada com hematologista.
- Avaliação Neurológica: Documentar déficits motores ou sensitivos.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de cirurgias de coluna. SBOT: Protocolos para discectomia.

Discectomia Cervical/Lombar/Lombo-Sacra por Via Posterior (Dois ou Mais Níveis c/ Microscópio) (Alta Complexidade)

Código: 0408030410

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG, radiografia de tórax.

Específicos:

- Ressonância Magnética da Coluna (0207030027): Avaliar múltiplos níveis.
- Tomografia Computadorizada da Coluna (0206030029): Planejamento cirúrgico.
- Eletroneuromiografia (0211050083): Avaliar compressão nervosa.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região da coluna.
- Profilaxia de Tromboembolismo: Heparina para procedimentos prolongados.
- Avaliação Neurológica: Documentar déficits pré-operatórios.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de cirurgias de coluna. SBOT: Protocolos para discectomia.

Discectomia Cervical/Lombar/Lombo-Sacra por Via Posterior (Um Nível) (Alta Complexidade)

Código: 0408030399

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG, radiografia de tórax.

Específicos:

- Ressonância Magnética da Coluna (0207030027): Avaliar hérnia de disco.
- Tomografia Computadorizada da Coluna (0206030029): Planejamento cirúrgico.
- Eletroneuromiografia (0211050083): Avaliar compressão nervosa.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região da coluna.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada com hematologista.
- Avaliação Neurológica: Documentar déficits pré-operatórios.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de cirurgias de coluna. SBOT: Protocolos para discectomia.

Fasciectomy (Média Complexidade)

Código: 0408060140

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Ultrassonografia de Tecidos Moles (0205020062): Avaliar fáscia.
- Ressonância Magnética (0207030030): Se suspeita de envolvimento profundo.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 6 horas para sólidos (anestesia local ou regional), 8 horas para geral.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região afetada.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Para manter mobilidade.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de tecidos moles. SBOT: Protocolos para fasciectomy.

Fasciotomia de Membros Superiores (Média Complexidade)

Código: 0408020105

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Ultrassonografia Doppler (0205010040): Avaliar fluxo vascular.
- Ressonância Magnética (0207030030): Avaliar compartimentos musculares.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 6 horas para sólidos (anestesia local ou regional), 8 horas para geral.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região afetada.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada devido ao risco de sangramento.
- Avaliação Vascular: Para descartar síndrome compartimental.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de fasciotomias. SBOT: Protocolos para membros superiores.

Manipulação Articular (Média Complexidade)

Código: 0408060158

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Radiografia da Articulação: Avaliar alinhamento.
- Ressonância Magnética (0207030030): Avaliar tecidos moles.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 6 horas para sólidos (anestesia local ou sedação), 8 horas para geral.
- Profilaxia Antibiótica: Não necessária, salvo infecção prévia.
- Higiene: Banho antisséptico na região afetada.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Para orientar mobilidade pós-procedimento.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de manipulações articulares. SBOT: Protocolos para manipulação.

Ostectomia de Ossos da Mão e/ou do Pé (Média Complexidade)

Código: 0408060166

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Radiografia da Mão/Pé: Planejamento cirúrgico.
- Ressonância Magnética (0207030030): Avaliar tecidos adjacentes.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 6 horas para sólidos (anestesia local ou regional), 8 horas para geral.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região afetada.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de ostectomias. SBOT: Protocolos para mão/pé.

Osteotomia da Pelve (Alta Complexidade)

Código: 0408040157

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG, radiografia de tórax.

Específicos:

- Tomografia Computadorizada da Pelve (0206030037): Planejamento cirúrgico.
- Ressonância Magnética da Pelve (0207030022): Avaliar tecidos moles.
- Avaliação Cardiológica: Ecocardiograma (0205010032) para risco tromboembólico.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região pélvica.
- Profilaxia de Tromboembolismo: Heparina e meias de compressão.
- Planejamento de Reabilitação: Discussão com fisioterapeuta.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Profilaxia de tromboembolismo. SBOT: Protocolos para osteotomias pélvicas.

Osteotomia de Ossos da Mão e/ou do Pé (Média Complexidade)

Código: 0408060182

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Radiografia da Mão/Pé: Planejamento cirúrgico.
- Ressonância Magnética (0207030030): Avaliar tecidos adjacentes.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 6 horas para sólidos (anestesia local ou regional), 8 horas para geral.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região afetada.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de osteotomias. SBOT: Protocolos para mão/pé.

Osteotomia de Ossos Longos Exceto da Mão e do Pé (Média Complexidade)

Código: 0408060190

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG, radiografia de tórax.

Específicos:

- Tomografia Computadorizada (0206030029): Planejamento cirúrgico.
- Ressonância Magnética (0207030030): Avaliar tecidos moles.
- Avaliação Vascular: Doppler arterial (0205010040) para irrigação.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região afetada.
- Profilaxia de Tromboembolismo: Meias de compressão para pacientes com risco.
- Planejamento de Reabilitação: Discussão com fisioterapeuta.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de osteotomias. SBOT: Protocolos para ossos longos.

Reconstrução de Tendão Patelar/Tendão Quadrícipital (Média Complexidade)

Código: 0408050136

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Ressonância Magnética do Joelho (0207030030): Avaliar extensão da lesão.
- Ultrassonografia do Joelho (0205020062): Avaliar tendões.
- Radiografia do Joelho: Descartar fraturas associadas.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico no joelho.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Para manter mobilidade.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de reconstruções tendinosas. SBOT: Protocolos para joelho.

Reconstrução Ligamentar Extra-Articular do Joelho (Média Complexidade)

Código: 0408050152

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Ressonância Magnética do Joelho (0207030030): Avaliar ligamentos.
- Radiografia do Joelho: Avaliar alinhamento.
- Teste de Estresse Articular: Sob anestesia, se necessário.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico no joelho.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Fortalecimento muscular.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de reconstruções ligamentares. SBOT: Protocolos para joelho.

Reconstrução Ligamentar Intra-Articular do Joelho (Cruzado Anterior) (Média Complexidade)

Código: 0408050160

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Ressonância Magnética do Joelho (0207030030): Confirmar lesão do LCA.
- Radiografia do Joelho: Avaliar alinhamento.
- Teste de Lachman/Pivot Shift: Documentar instabilidade.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico no joelho.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Fortalecimento do quadríceps.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de reconstruções ligamentares. SBOT: Protocolos para LCA.

Reconstrução Ligamentar Intra-Articular do Joelho (Cruzado Posterior c/ ou s/ Anterior) (Média Complexidade)

Código: 0408050179

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Ressonância Magnética do Joelho (0207030030): Confirmar lesão do LCP.
- Radiografia do Joelho: Avaliar alinhamento.
- Teste de Gaveta Posterior: Documentar instabilidade.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico no joelho.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Fortalecimento muscular.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de reconstruções ligamentares. SBOT: Protocolos para LCP.

Reconstrução Osteoplástica do Quadril (Média Complexidade)

Código: 0408040165

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG, radiografia de tórax.

Específicos:

- Tomografia Computadorizada do Quadril (0206030029): Planejamento cirúrgico.
- Ressonância Magnética do Quadril (0207030030): Avaliar tecidos moles.
- Avaliação Cardiológica: Ecocardiograma (0205010032) para risco tromboembólico.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região do quadril.
- Profilaxia de Tromboembolismo: Heparina e meias de compressão.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Fortalecimento muscular.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Profilaxia de tromboembolismo. SBOT: Protocolos para quadril.

Reparo de Rotura do Manguito Rotador (Inclui Procedimentos Descompressivos) (Média Complexidade)

Código: 0408010142

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Ressonância Magnética do Ombro (0207030030): Avaliar extensão da rotura.
- Ultrassonografia do Ombro (0205020062): Avaliar tendões.
- Radiografia do Ombro: Descartar alterações ósseas.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região do ombro.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Para manter mobilidade.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de cirurgias de ombro. SBOT: Protocolos para manguito rotador.

Ressecção de Cisto Sinovial (Média Complexidade)

Código: 0408060212

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Ultrassonografia de Tecidos Moles (0205020062): Avaliar cisto.
- Ressonância Magnética (0207030030): Confirmar diagnóstico.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 6 horas para sólidos (anestesia local ou regional), 8 horas para geral.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região afetada.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de cistos sinoviais. SBOT: Protocolos para tecidos moles.

Ressecção de Elemento Vertebral Posterior/Postero-Lateral Distal a C2 (até 2 Segmentos) (Alta Complexidade)

Código: 0408030542

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG, radiografia de tórax.

Específicos:

- Ressonância Magnética da Coluna (0207030027): Avaliar lesão vertebral.
- Tomografia Computadorizada da Coluna (0206030029): Planejamento cirúrgico.
- Eletroneuromiografia (0211050083): Avaliar função nervosa.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região da coluna.
- Profilaxia de Tromboembolismo: Heparina para procedimentos prolongados.
- Avaliação Neurológica: Documentar déficits pré-operatórios.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de cirurgias de coluna. SBOT: Protocolos para coluna.

Ressecção Simples de Tumor Ósseo/de Partes Moles (Média Complexidade)

Código: 0408060310

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG, radiografia de tórax.

Específicos:

- Ressonância Magnética (0207030030): Avaliar extensão do tumor.
- Tomografia Computadorizada (0206030029): Planejamento cirúrgico.
- Biópsia Prévia: Confirmar natureza do tumor (benigno/maligno).
- Cintilografia Óssea (0208050035): Avaliar disseminação.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região afetada.
- Avaliação Oncológica: Para tumores malignos.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de tumores ósseos. SBOT: Protocolos para tumores.

Retirada de Corpo Estranho da Coluna Toraco-Lombo-Sacra por Via Posterior (Alta Complexidade)

Código: 0408030607

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG, radiografia de tórax.

Específicos:

- Ressonância Magnética da Coluna (0207030027): Localizar corpo estranho.
- Tomografia Computadorizada da Coluna (0206030029): Planejamento cirúrgico.
- Cultura de Secreção: Se suspeita de infecção associada.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região da coluna.
- Profilaxia de Tromboembolismo: Heparina para procedimentos prolongados.
- Avaliação Neurológica: Documentar déficits pré-operatórios.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de cirurgias de coluna. SBOT: Protocolos para coluna.

Retirada de Fio ou Pino Intra-Ósseo (Média Complexidade)

Código: 0408060352

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Radiografia da Região Afetada: Localizar material de síntese.
- Cintilografia Óssea (0208050035): Se suspeita de infecção.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 6 horas para sólidos (anestesia local ou regional), 8 horas para geral.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região afetada.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de retirada de material. SBOT: Protocolos para síntese óssea.

Retirada de Fixador Externo (Média Complexidade)

Código: 0408060360

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Radiografia da Região Afetada: Avaliar consolidação óssea.
- Cintilografia Óssea (0208050035): Se suspeita de infecção.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 6 horas para sólidos (anestesia local ou sedação), 8 horas para geral.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região afetada.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Para planejamento de reabilitação.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de fixadores externos. SBOT: Protocolos para fixação.

Retirada de Placa e/ou Parafusos (Média Complexidade)

Código: 0408060379

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Radiografia da Região Afetada: Localizar material de síntese.
- Cintilografia Óssea (0208050035): Se suspeita de infecção.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 6 horas para sólidos (anestesia local ou regional), 8 horas para geral.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região afetada.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de retirada de material. SBOT: Protocolos para síntese óssea.

Revisão Cirúrgica do Pé Torto Congênito (Média Complexidade)

Código: 0408050349

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Radiografia do Pé: Avaliar deformidade.
- Ressonância Magnética do Pé (0207030030): Avaliar tecidos moles.
- Avaliação Neurológica: Descartar alterações neuromusculares.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região do pé.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Para planejamento de reabilitação.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de deformidades congênitas. SBOT: Protocolos para pé torto.

Revisão de Artrodese/Tratamento Cirúrgico de Pseudartrose da Coluna Toraco-Lombo-Sacra Posterior (Alta Complexidade)

Código: 0408030631

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG, radiografia de tórax.

Específicos:

- Ressonância Magnética da Coluna (0207030027): Avaliar pseudartrose.
- Tomografia Computadorizada da Coluna (0206030029): Planejamento cirúrgico.
- Cintilografia Óssea (0208050035): Suspeita de infecção.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região da coluna.
- Profilaxia de Tromboembolismo: Heparina para procedimentos prolongados.
- Avaliação Neurológica: Documentar déficits pré-operatórios.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de cirurgias de coluna. SBOT: Protocolos para pseudartrose.

Tenólise (Média Complexidade)

Código: 0408060441

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Ultrassonografia de Tecidos Moles (0205020062): Avaliar tendão.
- Ressonância Magnética (0207030030): Avaliar aderências.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 6 horas para sólidos (anestesia local ou regional), 8 horas para geral.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região afetada.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Para planejamento de mobilidade.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de tenólise. SBOT: Protocolos para tendões.

Tenomiorrafia (Média Complexidade)

Código: 0408060450

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Ultrassonografia de Tecidos Moles (0205020062): Avaliar lesão tendinosa.
- Ressonância Magnética (0207030030): Confirmar extensão da lesão.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 6 horas para sólidos (anestesia local ou regional), 8 horas para geral.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região afetada.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Para planejamento de reabilitação.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de tenomiorrafia. SBOT: Protocolos para tendões.

Tenotomia/Desinserção (Média Complexidade)

Código: 0408060468

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Ultrassonografia de Tecidos Moles (0205020062): Avaliar tendão.
- Ressonância Magnética (0207030030): Avaliar tecidos adjacentes.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 6 horas para sólidos (anestesia local ou regional), 8 horas para geral.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região afetada.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Para planejamento de mobilidade.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de tenotomia. SBOT: Protocolos para tendões.

Tenoplastia ou Enxerto de Tendão Único (Média Complexidade)

Código: 0408060476

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Ressonância Magnética (0207030030): Avaliar tendão e área doadora.
- Ultrassonografia de Tecidos Moles (0205020062): Avaliar integridade.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região afetada e doadora.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Para planejamento de reabilitação.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de tenoplastia. SBOT: Protocolos para tendões.

Tenorrafia Única em Túnel Ósteo-Fibroso (Média Complexidade)

Código: 0408060484

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Ressonância Magnética (0207030030): Avaliar tendão e túnel.
- Ultrassonografia de Tecidos Moles (0205020062): Avaliar lesão.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 6 horas para sólidos (anestesia local ou regional), 8 horas para geral.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região afetada.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Para planejamento de mobilidade.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de tenorrafia. SBOT: Protocolos para tendões.

Tratamento Cirúrgico da Síndrome do Impacto Sub-Acromial (Média Complexidade)

Código: 0408010231

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Ressonância Magnética do Ombro (0207030030): Avaliar espaço subacromial.
- Ultrassonografia do Ombro (0205020062): Avaliar tendões.
- Radiografia do Ombro: Descartar alterações ósseas.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região do ombro.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Para manter mobilidade.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de cirurgias de ombro. SBOT: Protocolos para impacto subacromial.

Tratamento Cirúrgico de Dedo em Gatilho (Média Complexidade)

Código: 0408020326

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Ultrassonografia da Mão (0205020062): Avaliar bainha tendinosa.
- Radiografia da Mão: Descartar alterações ósseas.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 6 horas para sólidos (anestesia local), 8 horas para geral.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região da mão.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Para orientar mobilidade pós-operatória.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de dedo em gatilho. SBOT: Protocolos para mão.

Tratamento Cirúrgico de Fratura/Lesão Fisária da Extremidade Proximal do Úmero (Média Complexidade)

Código: 0408020334

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Tomografia Computadorizada do Ombro (0206030029): Avaliar fratura.
- Ressonância Magnética do Ombro (0207030030): Avaliar tecidos moles.
- Radiografia do Ombro: Planejamento cirúrgico.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região do ombro.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Para planejamento de reabilitação.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de fraturas. SBOT: Protocolos para úmero.

Tratamento Cirúrgico de Fratura da Clavícula (Média Complexidade)

Código: 0408010150

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Radiografia da Clavícula: Avaliar tipo de fratura.
- Tomografia Computadorizada da Clavícula (0206030029): Para fraturas complexas.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região da clavícula.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Para planejamento de mobilidade.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de fraturas. SBOT: Protocolos para clavícula.

Tratamento Cirúrgico de Hálux Valgus c/ Osteotomia do Primeiro Osso Metatarsiano (Média Complexidade)

Código: 0408050659

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Radiografia do Pé: Avaliar ângulo do hálux valgus.
- Ressonância Magnética do Pé (0207030030): Avaliar tecidos moles.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região do pé.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Para planejamento de reabilitação.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de hálux valgus. SBOT: Protocolos para pé.

Tratamento Cirúrgico de Infecção em Artroplastia das Médias/Pequenas Articulações (Média Complexidade)

Código: 0408060611

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG, radiografia de tórax.

Específicos:

- Cintilografia Óssea (0208050035): Confirmar infecção.
- Cultura de Aspiração Articular: Identificar patógeno.
- Ressonância Magnética (0207030030): Avaliar extensão da infecção.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Antibióticos específicos com base na cultura.
- Higiene: Banho antisséptico na região afetada.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.
- Avaliação Infectológica: Para manejo antibiótico.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de infecções articulares. SBOT: Protocolos para infecções.

Tratamento Cirúrgico de Luxação/Fratura-Luxação Acrômio-Clavicular (Média Complexidade)

Código: 0408010185

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Radiografia do Ombro: Avaliar luxação.
- Tomografia Computadorizada do Ombro (0206030029): Para fraturas associadas.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região do ombro.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Para planejamento de mobilidade.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de luxações. SBOT: Protocolos para acrômio-clavicular.

Tratamento Cirúrgico de Luxação Recidivante/Habitual de Articulação Escápulo-Umeral (Média Complexidade)

Código: 0408010215

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Ressonância Magnética do Ombro (0207030030): Avaliar labrum e cápsula.
- Tomografia Computadorizada do Ombro (0206030029): Avaliar defeitos ósseos.
- Radiografia do Ombro: Avaliar instabilidade.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região do ombro.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Fortalecimento do manguito rotador.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de luxações. SBOT: Protocolos para ombro.

Tratamento Cirúrgico de Mão ou Pé em Fenda/Dedo Bífido/Macrodactilia/Polidactilia (Alta Complexidade)

Código: 0408060646

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG, radiografia de tórax.

Específicos:

- Radiografia da Mão/Pé: Avaliar anomalia.
- Ressonância Magnética (0207030030): Avaliar tecidos moles.
- Avaliação Genética: Para síndromes associadas.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região afetada.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.
- Planejamento de Reabilitação: Discussão com fisioterapeuta.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de deformidades congênitas. SBOT: Protocolos para mão/pé.

Tratamento Cirúrgico de Pé Torto Congênito (Média Complexidade)

Código: 0408050764

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.

Específicos:

- Radiografia do Pé: Avaliar deformidade.
- Ressonância Magnética do Pé (0207030030): Avaliar tecidos moles.
- Avaliação Neurológica: Descartar alterações neuromusculares.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região do pé.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Para planejamento de reabilitação.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de deformidades congênitas. SBOT: Protocolos para pé torto.

Tratamento Cirúrgico de Pé Torto Congênito Inverterado (Alta Complexidade)

Código: 0408050772

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG, radiografia de tórax.

Específicos:

- Radiografia do Pé: Avaliar deformidade.
- Ressonância Magnética do Pé (0207030030): Avaliar tecidos moles.
- Avaliação Neurológica: Descartar alterações neuromusculares.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região do pé.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada caso a caso.
- Planejamento de Reabilitação: Discussão com fisioterapeuta.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de deformidades congênitas. SBOT: Protocolos para pé torto.

Tratamento Cirúrgico de Polidactilia Articulada (Alta Complexidade)

Código: 0408060662

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG, radiografia de tórax.

Específicos:

- Radiografia da Mão/Pé: Avaliar estrutura óssea e articulações do dedo supranumerário.
- Ressonância Magnética (0207030030): Avaliar tecidos moles, ligamentos e tendões.
- Avaliação Genética: Para investigar síndromes associadas (ex.: trissomia 13, sindactilia).
- Ultrassonografia de Tecidos Moles (0205020062): Avaliar vascularização do dedo supranumerário.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes, conforme SBA (2017).
- Higiene: Banho antisséptico na região da mão/pé afetada.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada devido ao risco de sangramento.
- Planejamento de Reabilitação: Discussão com fisioterapeuta para mobilidade pós-operatória.
- Avaliação Multidisciplinar: Envolvimento de geneticista e cirurgião plástico, se necessário.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo perioperatório. SBOT: Protocolos para deformidades congênitas da mão/pé. OMS (2009): Checklist de segurança cirúrgica.

Tratamento Cirúrgico de Pseudartrose/Retardo de Consolidação/Perda Óssea da Diáfise do Fêmur (Alta Complexidade)

Código: 0408050799

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG, radiografia de tórax.

Específicos:

- Tomografia Computadorizada do Fêmur (0206030029): Avaliar extensão da pseudartrose ou perda óssea.
- Cintilografia Óssea (0208050035): Identificar atividade metabólica e possível infecção.
- Ressonância Magnética (0207030030): Avaliar tecidos moles e medula óssea.
- Avaliação Nutricional: Albumina e pré-albumina para cicatrização óssea.
- Cultura de Tecido: Se suspeita de osteomielite associada.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina e vancomicina 30-60 minutos antes, devido ao risco de infecção.
- Higiene: Banho antisséptico na região do fêmur.
- Profilaxia de Tromboembolismo: Heparina de baixo peso molecular e meias de compressão, conforme SBA (2017).
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada com hematologista.
- Suplementação Nutricional: Vitamina D e cálcio para otimizar consolidação.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Profilaxia de tromboembolismo e manejo de infecções. SBOT: Protocolos para pseudartrose e consolidação óssea. OMS (2009): Checklist de segurança cirúrgica.

Tratamento Cirúrgico de Pseudartrose/Retardo de Consolidação/Perda Óssea da Diáfise Tibial (Alta Complexidade)

Código: 0408050861

Exames Pré-Operatórios

Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG, radiografia de tórax.

Específicos:

- Tomografia Computadorizada da Tíbia (0206030029): Avaliar pseudartrose ou perda óssea.
- Cintilografia Óssea (0208050035): Identificar infecção ou atividade metabólica.
- Ressonância Magnética (0207030030): Avaliar tecidos moles e medula óssea.
- Cultura de Tecido: Se suspeita de osteomielite.
- Avaliação Vascular: Doppler arterial (0205010040) para confirmar irrigação.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina e vancomicina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região da tíbia.
- Profilaxia de Tromboembolismo: Heparina de baixo peso molecular e meias de compressão.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada com hematologista.
- Suplementação Nutricional: Vitamina D e cálcio para consolidação óssea.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Profilaxia de tromboembolismo e infecções. SBOT: Protocolos para pseudartrose tibial. OMS (2009): Checklist de segurança cirúrgica.

Tratamento Cirúrgico de Pseudo-Retardo/Consolidação/Perda Óssea ao Nível do Carpo (Média Complexidade)

Código: 0408020601

Exames Pré-Operatórios

- Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.
- Específicos:
 - Tomografia Computadorizada do Carpo (0206030029): Avaliar consolidação e perda óssea.
 - Ressonância Magnética do Carpo (0207030030): Avaliar tecidos moles e medula óssea.
 - Cintilografia Óssea (0208050035): Suspeita de infecção ou baixa atividade metabólica.
 - Radiografia do Carpo: Planejamento cirúrgico.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 6 horas para sólidos (anestesia local ou regional), 8 horas para geral.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região do carpo.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada devido ao risco de sangramento.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Para planejamento de mobilidade pós-operatória.
- Suplementação Nutricional: Vitamina D e cálcio, se necessário.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo perioperatório. SBOT: Protocolos para carpo e consolidação óssea. OMS (2009): Checklist de segurança cirúrgica.

Tratamento Cirúrgico de Retardo de Consolidação da Pseudartrose de Clavícula/Escápula (Média Complexidade)

Código: 0408010223

Exames Pré-Operatórios

- Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.
- Específicos:
 - Tomografia Computadorizada da Clavícula/Escápula (0206030029): Avaliar pseudartrose.
 - Cintilografia Óssea (0208050035): Suspeita de infecção ou baixa atividade metabólica.
 - Radiografia da Clavícula/Escápula: Planejamento cirúrgico.
 - Ressonância Magnética (0207030030): Avaliar tecidos moles adjacentes.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região da clavícula/escápula.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada devido ao risco de sangramento.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Para planejamento de mobilidade do ombro.
- Suplementação Nutricional: Vitamina D e cálcio para consolidação.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo perioperatório. SBOT: Protocolos para pseudartrose de clavícula/escápula. OMS (2009): Checklist de segurança cirúrgica.

Tratamento Cirúrgico de Rotura de Menisco com Sutura Meniscal Uni/Bicompartimental (Média Complexidade)

Código: 0408050888

Exames Pré-Operatórios

- Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.
- Específicos:
 - Ressonância Magnética do Joelho (0207030030): Confirmar tipo e localização da rotura meniscal.
 - Radiografia do Joelho: Avaliar alinhamento articular e descartar fraturas.
 - Avaliação Artroscópica Prévia: Se necessário para planejamento.
- Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de cirurgias artroscópicas. SBOT: Protocolos para lesões meniscais. OMS (2009): Checklist de segurança cirúrgica

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região do joelho.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada devido ao risco de sangramento.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Fortalecimento do quadríceps para otimizar recuperação.
- Preparo Articular: Evitar atividades de impacto 48 horas antes.

Tratamento Cirúrgico de Rotura do Menisco com Meniscectomia Parcial/Total (Média Complexidade)

Código: 0408050896

Exames Pré-Operatórios

- Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.
- Específicos:
 - Ressonância Magnética do Joelho (0207030030): Avaliar extensão da rotura meniscal.
 - Radiografia do Joelho: Descartar alterações ósseas ou desalinhamento.
 - Avaliação Artroscópica Prévia: Se necessário para confirmar indicação.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região do joelho.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada devido ao risco de sangramento.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Fortalecimento muscular para recuperação pós-operatória.
- Preparo Articular: Evitar atividades de impacto 48 horas antes.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de cirurgias artroscópicas. SBOT: PrProtocolos para meniscectomia**Tratamento Cirúrgico de Síndrome Compressiva em Túnel Ósteo-Fibroso ao Nível do Carpo (Média Complexidade)**. OMS (2009): Checklist de segurança cirúrgica.

Tratamento Cirúrgico de Síndrome Compressiva em Túnel Ósteo-Fibroso ao Nível do Carpo (Média Complexidade)

Código: 0403020123

Exames Pré-Operatórios

- Padrão: Hemograma, coagulação, glicemia/HbA1c, eletrólitos, ECG.
- Específicos:
 - Eletroneuromiografia (0211050083): Confirmar compressão do nervo mediano (síndrome do túnel do carpo).
 - Ultrassonografia do Punho (0205020062): Avaliar espessamento do ligamento transversal.
 - Ressonância Magnética do Punho (0207030030): Se suspeita de outras patologias associadas.
 - Radiografia do Punho: Descartar alterações ósseas.

Orientações Pré-Operatórias

- Jejum: 6 horas para sólidos (anestesia local ou regional), 8 horas para geral.
- Profilaxia Antibiótica: Cefazolina 30-60 minutos antes.
- Higiene: Banho antisséptico na região do punho.
- Suspensão de Anticoagulantes: Avaliada devido ao risco de sangramento.
- Fisioterapia Pré-Operatória: Orientação para mobilidade pós-operatória.
- Evitar Movimentos Repetitivos: 48 horas antes para reduzir inflamação.

Base Legal: Portaria MS nº 1.820/2009: Procedimentos ortopédicos no SIGTAP. Diretrizes SBA (2017): Manejo de síndromes compressivas. SBOT:Protocolos para síndrome do túnel do carpo. tibial. OMS (2009): Checklist de segurança cirúrgica.