

# Transformações

por Rossana B Queiroz




**UNISINOS**  
Nossa sala de aula  
é o mundo.

Matemática

# UMA RÁPIDA REVISÃO

# Trigonometria

- Círculo Trigonométrico



## Unidades de medida

Grau: divisão da circunferência em 360 partes.

Radiano: um arco de um rad é igual ao raio


tação Gráfica






UNISINOS  
Nossa sala de aula  
é o mundo.

# Trigonometria

- Círculo canônico



# Trigonometria



$$\sin \theta = y/r$$

$$\cos \theta = x/r$$

$$\tan \theta = y/x$$

$$x = r \cos \theta = y / \tan \theta$$

$$y = r \sin \theta = x \tan \theta$$

$$r = y / \sin \theta = x / \cos \theta$$

$$\sin^{-1}(y/r) = \theta$$

$$\cos^{-1}(x/r) = \theta$$

$$\tan^{-1}(y/x) = \theta$$

é o mundo.

# Matrizes

Linhas

$A_{m \times n}$

Colunas

$$= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$



# Operações com Matrizes

## Adição

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}$$

$$C = A + B$$

$$C = \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}$$

Obs: A e B devem ser do mesmo tamanho.



# Operações com Matrizes

## Multiplicação de matriz por escalar

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad B = 3 * A \quad B = 3 * \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 3 * a_{11} & 3 * a_{12} & 3 * a_{13} \\ 3 * a_{21} & 3 * a_{22} & 3 * a_{23} \\ 3 * a_{31} & 3 * a_{32} & 3 * a_{33} \end{bmatrix}$$



# Operações com Matrizes

## Multiplicação de matrizes

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{bmatrix}$$

$$C_{m \times n} = A_{m \times k} \cdot B_{k \times n}$$

$$C_{2 \times 2} = A_{2 \times 3} \cdot B_{3 \times 2}$$

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix}$$

\*

Obs:  $A_n$  e  $B_m$  devem ser do mesmo tamanho.



UNISINOS  
Nossa sala de aula  
é o mundo.

# Operações com Matrizes

## Matriz transposta

Ocorre a troca entre os elementos m e n das matrizes.

$$A_{m \times n} = A^t_{n \times m}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \boxed{2} & 3 & \boxed{a_{12}} \\ \boxed{5} & 0 & \boxed{a_{22}} \\ \boxed{8} & 6 & \boxed{a_{32}} \end{bmatrix} \quad A^t = \begin{bmatrix} \boxed{a_{11}} & \boxed{a_{12}} & \boxed{a_{13}} \\ \boxed{a_{21}} & \boxed{a_{22}} & \boxed{a_{23}} \end{bmatrix}$$

# Resumo de Operações com Matrizes

**Adição**

$$C = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & a_{13} + b_{13} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & a_{23} + b_{23} \\ a_{31} + b_{31} & a_{32} + b_{32} & a_{33} + b_{33} \end{bmatrix}$$

**Subtração**

$$C = \begin{bmatrix} a_{11} - b_{11} & a_{12} - b_{12} & a_{13} - b_{13} \\ a_{21} - b_{21} & a_{22} - b_{22} & a_{23} - b_{23} \\ a_{31} - b_{31} & a_{32} - b_{32} & a_{33} - b_{33} \end{bmatrix}$$

**Obs: A e B devem ser do mesmo tamanho.**

**Multiplicação  
de matriz por  
escalar**

$$B = n * \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

**Multiplicação  
de matrizes**

$$C = \begin{bmatrix} a_{11} \cdot b_{11} + a_{12} \cdot b_{21} + a_{13} \cdot b_{31} & a_{11} \cdot b_{12} + a_{12} \cdot b_{22} + a_{13} \cdot b_{32} \\ a_{21} \cdot b_{11} + a_{22} \cdot b_{21} + a_{23} \cdot b_{31} & a_{21} \cdot b_{12} + a_{22} \cdot b_{22} + a_{23} \cdot b_{32} \end{bmatrix}$$


$$C_{m \times n} = A_{m \times k} \cdot B_{k \times n}$$



# Transformações Geométricas

## Translação


- A operação de translação movimenta todos os pontos de um polígono.
  - Ex.: translação no eixo x



# Transformações Geométricas

## Translação


- A operação de translação movimenta todos os pontos de um polígono.
  - Ex.: translação no eixo y



# Transformações Geométricas

## Translação

- A operação de translação movimenta todos os pontos de um polígono.
  - Ex.: translação nos eixos  $x$  e  $y$



# Transformações Geométricas

## Translação


- Adição de um deslocamento às coordenadas dos vértices

$$\begin{aligned}x_t &= x + T_x \\ y_t &= y + T_y\end{aligned}$$

# Transformações Geométricas

## Escala

- A operação de escala muda as dimensões de um polígono.
  - Ex.: escala uniforme




$$E_x = E_y$$



# Transformações Geométricas

## Escala

- A operação de escala muda as dimensões de um polígono.
  - Ex.: escala não uniforme



# Transformações Geométricas

## Escala

- Multiplica-se um fator de escala às coordenadas


$$\begin{aligned}x_e &= x * E_x \\ y_e &= y * E_y\end{aligned}$$

# Transformações Geométricas

## Rotação

$$\begin{aligned}(x,y) \\ r &= (x^2 + y^2)^{1/2} \\ x &= r \cdot \cos(\alpha) \\ y &= r \cdot \sin(\alpha) \\ x' &= r \cdot \cos(\alpha + \theta) \\ y' &= r \cdot \sin(\alpha + \theta)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x' &= r \cdot \cos(\alpha + \theta) \\ y' &= r \cdot \sin(\alpha + \theta)\end{aligned}$$




# Transformações Geométricas

## Rotação

$$\begin{aligned}(x,y) \\ r &= (x^2 + y^2)^{1/2} \\ x &= r \cdot \cos(\alpha) \\ y &= r \cdot \sin(\alpha) \\ x' &= r \cdot \cos(\alpha + \theta) \\ y' &= r \cdot \sin(\alpha + \theta)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x' &= r \cdot \cos(\alpha) \cdot \cos(\theta) - r \cdot \sin(\alpha) \cdot \sin(\theta) \\ y' &= r \cdot \sin(\alpha) \cdot \cos(\theta) + r \cdot \cos(\alpha) \cdot \sin(\theta)\end{aligned}$$




# Transformações Geométricas

## Rotação

$$\begin{aligned}(x,y) \\ r &= (x^2 + y^2)^{1/2} \\ x &= r \cdot \cos(\alpha) \\ y &= r \cdot \sin(\alpha) \\ x' &= r \cdot \cos(\alpha + \theta) \\ y' &= r \cdot \sin(\alpha + \theta)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x' &= x \cdot \cos(\theta) - y \cdot \sin(\theta) \\ y' &= y \cdot \cos(\theta) + x \cdot \sin(\theta)\end{aligned}$$





# Transformações Geométricas

## Rotação


- Faz o uso da trigonometria
- Os pontos formam um ângulo  $\alpha$  em **relação à origem**. Quando aplicamos uma rotação, adicionamos um ângulo  $\theta$  à  $\alpha$ , e com isso precisamos recalcular a posição dos pontos conforme esse novo ângulo  $\alpha + \theta$

$$\begin{aligned}x_r &= x \cdot \cos(\theta) - y \cdot \sin(\theta) \\y_r &= y \cdot \cos(\theta) + x \cdot \sin(\theta)\end{aligned}$$

# Pivot da Rotação



# Pivot da Rotação




$$x' = (x - x_p) \cdot \cos(\theta) - (y - y_p) \cdot \sin(\theta) + x_p$$

$$y' = (x - x_p) \cdot \sin(\theta) + (y - y_p) \cdot \cos(\theta) + y_p$$



# Outras transformações


## Reflexão



Eixo X

$$x' = x$$


$$y' = -y$$



Origem

$$x' = -x$$

$$y' = -y$$



Eixo Y

$$x' = -x$$

$$y' = y$$



UNISINOS  
Nossa sala de aula  
é o mundo.

# Outras transformações

## Deslizamento (Shearing)

$$\begin{aligned}x_s &= x + S_x \\ y_s &= y + S_y\end{aligned}$$



# Resumo das Transformações

## Translação

$$\begin{aligned}x_t &= x + T_x \\ y_t &= y + T_y\end{aligned}$$

## Escala

$$\begin{aligned}x_e &= x * E_x \\ y_e &= y * E_y\end{aligned}$$

## Rotação

$$\begin{aligned}x_r &= x.\cos(\theta) - y.\sin(\theta) \\ y_r &= y.\cos(\theta) + x.\sin(\theta)\end{aligned}$$

## Forma Matricial

### Translação

$$\begin{aligned}P' &= P + T = \\ [x \quad y] &+ [T_x \quad T_y]\end{aligned}$$

### Escala

$$\begin{aligned}P' &= P \cdot S = \\ [x \quad y] &\cdot \begin{bmatrix} S_x & 0 \\ 0 & S_y \end{bmatrix}\end{aligned}$$

### Rotação

$$\begin{aligned}P' &= P \cdot S = \\ [x \quad y] &\cdot \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}\end{aligned}$$

# Coordenadas Homogêneas

- Adiciona uma terceira coordenada:  $w$
- O ponto 2D vira um vetor com 3 coordenadas:  $\begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix}$
- Homogeneizar: dividir  $x$ ,  $y$  e  $w$  por  $w$ , sendo  $w = 1$ .
- Pontos homogeneizados:  $\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

# Transformações (2D) Homogêneas

- Matrizes 3x3
- Ponto: matriz 3x1

$$T(T_x, T_y) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ T_x & T_y & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$E(E_x, E_y) = \begin{bmatrix} E_x & 0 & 0 \\ 0 & E_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

# Vetores e Matrizes

- Podem representar **Pontos 2D/3D, Distâncias** ou **Direções**
- Podem ser multiplicados por uma **matriz de transformação**
  - Rotação
  - Escala
  - Translação
- Após a multiplicação, um novo vetor **transformado** é criado

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_x & a_y & a_z \end{bmatrix}$$



# Matrizes Homogêneas

- Matriz que combina várias transformações numa única **matriz 4x4**
- Também chamada de Matriz de Modelo: **Model Matrix**
  - Antiga GL\_MODELVIEW
- A 4ª linha/coluna é usada para a **translação**

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & T_x \\ 0 & 1 & 0 & T_y \\ 0 & 0 & 1 & T_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$




# Tipos de Vetores

- **vec2**: ponto 2D (x,y) ou coordenada de textura (s,t)
- **vec3**: ponto ou direção 3D (x,y,z)
- **vec4**: ponto 4D (x,y,z,1.0) ou direção 4D (x,y,z,0.0)
- Lembre-se que uma **matriz 4x4** só pode ser transformada por um **vetor 4D** e uma **matriz 3x3** por um **vetor 3D**





# Matrizes



0	4	8	12
1	5	9	13
2	6	10	14
3	7	11	15

Indices of Column-Order  
Memory

- Armazena-se a matriz 4x4 como um array **unidimensional**


Ex: `float matrix[16];`

- O shader espera receber os valores nesta ordem: **ordem de colunas**

- Podemos enviar esse array ao shader usando o método `glUniform`, onde ele aparecerá como `uniform mat4`

# Ordenação por Linhas x Colunas

- Existem 2 layouts de matrizes:
  - Ordenados por linhas
  - Ordenados por **colunas**



# Multiplicação Matriz x Vetor

Matrix \* Vector

$$\begin{bmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by + cz + dw \\ ex + fy + gz + hw \\ ix + jy + kz + lw \\ mx + ny + oz + pw \end{bmatrix}$$



# Composição de Transformações

- Para realizar uma composição de transformações, basta efetuar uma multiplicação de matrizes.
  - Ex.: Composição de uma rotação com uma translação  
 $M = R.T$
- Multiplicação das matrizes não é comutativa:  
A ordem das operações influencia diretamente.
  - Rotação seguida de translação é diferente de translação seguida de rotação.

# Transformações (3D) Homogêneas

## Translation, Scaling, and Rotation

column order  $T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & T_x \\ 0 & 1 & 0 & T_y \\ 0 & 0 & 1 & T_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$   $S = \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & S_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$  (column-order)

$R_y = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & 0 & \sin(\theta) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$  (column-order)

$R_z = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$  (column-order)

Disponível em:

[antongerdelan.net/teaching/3dprog1/maths\\_cheat\\_sheet.pdf](http://antongerdelan.net/teaching/3dprog1/maths_cheat_sheet.pdf)

# GLM

- Biblioteca auxiliar para trabalhar com matemática (*header-only*)
  - <https://glm.g-truc.net/0.9.8/index.html>

```
#include <glm/glm.hpp>
#include <glm/gtc/matrix_transform.hpp>
#include <glm/gtc/type_ptr.hpp>
```




# Referências

- <https://learnopengl.com/#!Getting-started/Transformations>



# Referências

## Anton's OpenGL 4 Tutorials



**Anton Gerdelan**

Ebook para Kindle

Muitos materiais online disponíveis em:

<http://antongerdelan.net/opengl/>



**UNISINOS**  
Nossa sala de aula  
é o mundo.



# Referências bibliográficas

- Slides sobre CG dos professores: Christian Hofsetz, Cristiano Franco, Marcelo Walter, Soraia Musse, Leandro Tonietto e Rafael Hocevar.