ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM- BẢNG ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

ĐÁP ÁN PHẦN I

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đề 1	**D**	**D**	**B**	**B**	**D**	**C**	**A**	**C**	**B**	**A**	**A**	**C**
Đề 2	**C**	**D**	**C**	**A**	**B**	**C**	**B**	**C**	**D**	**A**	**C**	**C**
Đề 3	**D**	**A**	**B**	**A**	**A**	**C**	**A**	**A**	**C**	**C**	**A**	**B**
Đề 4	**B**	**C**	**C**	**D**	**C**	**A**	**D**	**C**	**D**	**B**	**A**	**B**

ĐÁP ÁN PHẦN II



CÂU 1	CÂU 2	CÂU 3	CÂU 4
a) Đúng	a) Đúng	a) Đúng	a) Đúng
b) Đúng	b) Đúng	b) Sai	b) Sai
c) Sai	c) Sai	c) Sai	c) Đúng
d) Đúng	d) Sai	d) Đúng	d) Đúng



ĐÁP ÁN PHẦN III



Câu	1	2	3	4	5	6
Trả lời	5	9	3	4.5	10	22

ĐÁP ÁN CHI TIẾT PHẦN III.

	Câu 1. Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có hai điểm cực trị $M(x_1;y_1), N(x_2;y_2)$. Tính giá trị biểu thức $d=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+5}$.	$M(x_1;y_1)=(-1;3)$ $N(x_2;y_2)=(1;-1)$ nên ta có $d=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+5}$ $\Leftrightarrow d=\sqrt{(-1-1)^2+(-1-3)^2+5}=\sqrt{25}=5$

Phần III		
	Câu 2: Cho hàm số $y=\dfrac{2x^2+3x-4}{x+1}$ có phương trình đường tiệm cận xiên là $y=ax+b$ Hãy tính tổng $S=a^2+3b+2$.	Ta có: $y=\dfrac{2x^2+3x-4}{x+1}$ =2x+1-$\dfrac{5}{x+1}$ nên phương trình đường tiệm cận xiên là: $y=2x+1\Rightarrow a=2,b=1$ Vậy $S=a^2+3b+2=2^2+3.1+2=9$
	Câu 3. Cho hàm số $y=\dfrac{ax+b}{x+c}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới (với a, b, c là các số nguyên).  Tính giá trị của biểu thức $S=ab+bc+7a^2$.	Ta có TCĐ: $x=-c=1\Rightarrow c=-1$ TCN: $y=a=-1\Rightarrow a=-1$ Đồ thị hàm số cắt trục $0y$ 0y tại điểm có tung độ bằng $y=-2$ nên ta có $y=-2=\dfrac{b}{c}\Leftrightarrow b=-2c=-2.(-1)=2$ Vậy ta có: $S=ab+bc+7a^2=$ $=-1.2+2.(-1)+7.(-1)^2$ $=3$

Phần III	**Câu 4:** Cho hàm số $y=\dfrac{ax^2+bx+c}{dx+e}$ có đồ như hình bên dưới. Đồ thị có tâm đối xứng là $I\left(x_0;y_0\right)$. Tính khoảng cách từ tâm đối xứng $I\left(x_0;y_0\right)$ đến điểm cực tiểu của đồ thị hàm số (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục)  	Ta có: $I\left(x_0;y_0\right)=\left(-1;0\right)$, điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $A=\left(1;4\right)$ Vậy khoảng cách cần tìm là $d=AI=\sqrt{\left(-1-1\right)^2+\left(0-4\right)^2}=\sqrt{20}$ $\Leftrightarrow d=4.472$ Vì yêu cầu làm tròn kết quả đến hàng phần chục nên ta có $d=4.5$.
	Câu 5: Một hộp có dạng hình hộp chữ nhật không nắp được làm từ một mảnh các tông theo mẫu như hình vẽ. Hộp có đáy là một hình vuông cạnh x cm, chiều cao h cm và có thể tích 500 cm^3.  	Thể tích của hộp là: $V=x^2h=500\left(cm^3\right)$ Do đó $h=\dfrac{500}{x^2},x>0$ Diện tích của mảnh các tông dùng làm hộp là: $S(x)=x^2+4hx=x^2+\dfrac{2000}{x},x>0$ $S'(x)=2x-\dfrac{2000}{x^2}=\dfrac{2\left(x^3-1000\right)}{x^2},$ $S'(x)=0\Leftrightarrow x=10$ Bảng biến thiên

	Giá trị của x để diện tích của mảnh các tông nhỏ nhất bằng bao nhiêu?	 Vậy muốn tốn ít nguyên liệu nhất, ta lấy độ dài cạnh đáy hình hộp là x = 10 (cm). **Đáp số:** x = 10 (cm).
	Câu 6: Một chất điểm chuyển động biết quãng đường biểu diễn theo quỹ đạo có phương trình $s(t)=t^3-6t^2+34t$ (trong đó quãng đường s tính bằng mét (m), thời gian t tính bằng giây (s)). Tìm tốc độ (vận tốc) nhỏ nhất của chất điểm (đơn vị (m/s)).	Ta có $v(t)=s'(t)=3t^2-12t+34$. $v'(t)=6t-12 \Rightarrow v'(t)=0 \Leftrightarrow t=2$  Vậy vận tốc nhỏ nhất bằng 22m/s

----------HẾT----------

PHÊ DUYỆT CỦA BGH PHÓ HIỆU TRƯỞNG	TỔ CHUYÊN MÔN TỔ PHÓ CM	GIÁO VIÊN RA ĐỀ
Nguyễn Thuỳ Giao	Lê Bá Lâm	Ký bởi: Nguyễn Xuân Chính Thời gian ký: 23/10/2026 07:42:41 Nguyễn Xuân Chính