

Lista de Verificación de Síntomas Depresivos (PHQ-9)

Versión informativa del Cuestionario de Salud del Paciente (Patient Health Questionnaire-9), un instrumento de cribado breve utilizado internacionalmente para identificar la presencia y severidad de síntomas depresivos.

■ **ESTO NO ES UN DIAGNÓSTICO.** El PHQ-9 es una herramienta de autoevaluación y cribado, no un instrumento diagnóstico. Un puntaje alto no confirma depresión, y un puntaje bajo no la descarta. Solo un profesional de salud mental puede realizar una evaluación y diagnóstico completos.

¿Qué es el PHQ-9?

El PHQ-9 es un cuestionario de 9 preguntas basado directamente en los criterios diagnósticos para el trastorno depresivo mayor del DSM. Fue desarrollado por los doctores Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams y Kurt Kroenke, y validado en estudios con miles de pacientes en Estados Unidos. Es uno de los instrumentos de cribado de depresión más usados en el mundo, tanto en atención primaria como en investigación clínica, y está disponible de forma gratuita para uso clínico y educativo.

¿Para qué sirve y qué no hace?

- **Sí sirve para:** identificar la presencia y severidad de síntomas depresivos en las últimas dos semanas, y orientar si conviene buscar una evaluación profesional.
- **No sirve para:** diagnosticar depresión por sí solo, determinar la causa de los síntomas, ni reemplazar una entrevista clínica.
- Se usa habitualmente como primer paso de cribado, seguido de una evaluación profesional si el puntaje lo sugiere.

Instrucciones

Durante las últimas **dos semanas**, ¿con qué frecuencia le han molestado los siguientes problemas? Para cada uno, marca la opción que mejor describa tu experiencia:

0	1	2	3
Nunca	Varios días	Más de la mitad de los días	Casi todos los días

1. Poco interés o placer en hacer las cosas.	0	1	2	3
2. Se ha sentido decaído(a), deprimido(a) o sin esperanzas.	0	1	2	3
3. Ha tenido dificultad para quedarse o permanecer dormido(a), o ha dormido demasiado.	0	1	2	3
4. Se ha sentido cansado(a) o con poca energía.	0	1	2	3
5. Sin apetito o ha comido en exceso.	0	1	2	3

Marca el número que corresponda a tu respuesta para cada pregunta (continúa en la página siguiente).

Continuación

6. Se ha sentido mal con usted mismo(a) — o que es un fracaso, o que se ha fallado a usted mismo(a) o a su familia.	0	1	2	3
7. Ha tenido dificultad para concentrarse en cosas, tales como leer el periódico o ver la televisión.	0	1	2	3
8. Se ha movido o hablado tan despacio que otras personas podrían notarlo, o lo contrario — ha estado tan inquieto(a) o agitado(a) que se ha estado moviendo mucho más de lo normal.	0	1	2	3
9. Ha tenido pensamientos de que estaría mejor muerto(a), o de lastimarse de alguna manera.	0	1	2	3

Sobre la pregunta 9: si marcaste cualquier opción distinta de "Nunca" en esta pregunta, es importante que hables con un profesional de salud o una línea de apoyo lo antes posible, independientemente de tu puntaje total. En la última página de este documento encontrarás líneas de ayuda disponibles.

Pregunta adicional sobre funcionamiento

Esta pregunta no se suma al puntaje, pero ayuda a entender el impacto de los síntomas en tu vida diaria:

"Si marcaste cualquiera de estos problemas, ¿qué tan difícil te ha resultado hacer tu trabajo, ocuparte de las cosas en casa, o llevarte bien con otras personas?"

Nada difícil	Algo difícil	Muy difícil	Extremadamente difícil
--------------	--------------	-------------	------------------------

Cómo calcular tu puntaje

Suma los números que marcaste en las preguntas 1 a 9 (la pregunta sobre funcionamiento no se incluye en la suma). El resultado va de **0 a 27 puntos**.

Guía de interpretación

Puntaje	Severidad	Orientación general
0 - 4	Mínima o ausente	Cribado negativo; no se sugieren síntomas significativos.
5 - 9	Leve	Observar; considerar hábitos de autocuidado y seguimiento.
10 - 14	Moderada	Se recomienda consultar con un profesional de salud.
15 - 19	Moderadamente severa	Se recomienda evaluación profesional oportuna.
20 - 27	Severa	Se recomienda buscar apoyo profesional cuanto antes.

Estos rangos son orientativos y provienen de la validación original del instrumento. Independientemente del puntaje obtenido, si sientes que estos síntomas están afectando tu vida, tu trabajo o tus relaciones, vale la pena hablarlo con un profesional.

Limitaciones importantes

- El puntaje puede verse afectado por otras condiciones médicas, duelo reciente, o factores situacionales que no son depresión clínica.
- El cuestionario no explora la historia completa de la persona, algo esencial para un diagnóstico correcto.
- Un profesional puede necesitar herramientas adicionales para confirmar o descartar un diagnóstico.

Cuándo buscar ayuda profesional

- Si tu puntaje es de 10 o más.
- Si marcaste cualquier opción en la pregunta 9, sin importar el puntaje total.
- Si los síntomas han durado más de dos semanas de forma constante.
- Si sientes que ya no puedes manejar tu día a día como antes.
- Si las personas cercanas a ti han notado cambios preocupantes en tu ánimo o comportamiento.

Buscar ayuda es un signo de fortaleza, no de debilidad. Un psicólogo, psiquiatra o médico general puede orientarte sobre los siguientes pasos.

Líneas de apoyo

Colombia	Línea 106 (salud mental, 24 horas) · Línea 123 (emergencias)
México	Línea de la Vida: 800 911 2000
Argentina	Línea Nacional de Salud Mental: 0800 999 0091
Estados Unidos	988 Suicide & Crisis Lifeline
Otro país	Busca "línea de salud mental" + tu país, o acude a tu servicio de emergencias local

Recuerda: este documento es una versión informativa del PHQ-9 con fines educativos y de autoconocimiento. No reemplaza una evaluación, diagnóstico o tratamiento profesional. Si tú o alguien que conoces está en riesgo inmediato, contacta una línea de emergencia o acude al servicio de urgencias más cercano.

Material elaborado con fines educativos y de autoayuda para la comunidad de El Ciclo Roto. Basado en el Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ-9), de dominio público para uso clínico y educativo.