

2025
03

더 행복한 건강 생활

운동과 건강

봄맞이 운동을 위한
워밍업

건강 정보

흔하게 발견되는 갑상선 결절
혹시 암일까

노인 건강

당뇨병 전 단계에서
돌아서기



대한보건협회



품질 · 서비스 · 연구
(재)서울의과학연구소
Seoul Clinical Laboratories



건강생활실천 빠를수록 좋다

문창진 전 보건복지부 차관 · 경희대학교 의과대학 특임교수

55세의 나이에 고인이 되신 아버지는 골격이 크고 강한 체력을 타고 나신 분이였다. 청년들과 팔씨름을 해도 진 적이 없었다. 담배와 술을 즐기신 분으로, 밤새 술을 마시는 일이 허다했다. 그러나 술에 장사 없다는 말처럼 어느 날 집을 나서다가 뇌졸중으로 쓰러지신 후 반신마비가 되셨다. 자포자기 상태로 3년을 버티다 필자가 군 복무 중이던 1975년에 세상을 뜨셨다. 어머니는 병약하신 분으로 소화제, 진통제, 당뇨약을 달고 사셨고 생계 활동은 불가능한 상태였다. 결국 필자는 22세의 나이에 가장의 멍에를 물려받았다.

군 입대를 위해 신체검사를 받던 날 생각지도 못한 고혈압 진단을 받았다. 현역 판정을 놓고 고민하던 군의관의 표정이 아직도 생생하다. 아무래도 본태성 고혈압 같다는 의사의 말에 “아, 나는 저주받은 몸이구나. 아버지는 왜 내게 이런 것까지 물려주셨을까.” 원망도 했다.

이후 보건복지부에서 직장 생활을 하면서 건강에 관심을 갖게 되었다. 답은 간단했다. 아버지와의 정반대의 길을 걸으면 되는 것이였다. 그러나 금연, 절주, 건강한 식습관 등 다 아는 내용이지만 실천은 왜 그렇게 힘든지 결국 다른 사람들과 어울리며 술 담배를 즐기는 생활에 젖어들었다. 국민 건강을 행기는 보건복지부에 근무하면서 정작 내 건강은 챙기지 않았다. 실천 의지가 약했던 탓이다.

그러던 중 내게 위기가 닥쳐왔다. 정책홍보관리실장으로 재직 시 출근 준비 중인 필자가 비틀거리는 것을 아내가 발견하고 종합병원 응급실로 달려갔다. 천우신조로 골든타임을 놓치지 않아 큰 손상 없이 퇴원했다. 뇌경색을 겪은 후에야 시늉만 하던 건강관리를 제대로 해야겠다는 결심을 하게 되었다. 술은 어떤 자리든 한두 잔 이내로 그치고 매일 6천 보 이상 걸었다. 실내자전거를 타고 탄력밴드를 이용한 스트레칭도 꾸준히 하고 있다. 고혈압은 신기하게 정상으로 돌아왔고, 당뇨도 아슬아슬하지만 아직 정상 범위를 크게 벗어나지 않았다. 고지혈증만은 도저히 조절이 안 되어 약을 복용하고 있다.

세계 최초로 건강증진(health promotion)이란 용어를 사용한 캐나다 보건부장관 마크 라론드는 생물학적 요인, 생활습관, 환경, 의료 등 여러 ‘건강 결정 요인’ 중 건강에 기여도가 가장 높은 것은 생활습관으로, 의료와 달리 큰돈이 드는 것도 아니라고 했다. 대한민국 헌법은 제36조 3항에서 “모든 국민은 보건에 관하여 국가의 보호를 받는다.”라고 규정하고 있지만 국가는 열심히 도와줄 뿐 건강에 대한 최종 책임은 본인의 것이다. 건강한 생활습관이 삶의 질의 알파이자 오메가이다. 필자는 이걸 깨닫는 데 오랜 시간이 걸렸고 뒤늦게 실천하고 있지만 건강생활실천은 빠를수록 좋다.

명사의 한마디
건강생활실천, 빠를수록 좋다

- 02 운동과 건강
봄맞이 운동을 위한 워밍업
- 06 음식과 영양
봄 향기 가득한 달래 소고기 주먹밥
- 08 건강 정보
흔하게 발견되는 갑상선 결절, 혹시 암일까
- 10 소아청소년 건강
성조숙증, 우리 아이에게도 해당될까
- 12 여성 건강
여성 청결제 효과 있나
- 14 구강 건강
유방암 치료 시 알아 두어야 할 치아 관리
- 16 노인 건강
당뇨병 전 단계에서 돌아서기
- 18 인체의 신비
우리 몸의 화학공장인 ‘간’, 어떤 역할을 할까
- 20 신성식의 헬스픽
도수치료·임플란트 저렴한 곳 찾으려면
- 22 알고 먹는 약
봄철 알레르기와 항히스타민제
- 24 반려동물
공공주택과 공공장소에서의 펫티켓
- 26 건강 이슈
알아 두면 유용한 식품인증마크
- 28 감염병과 인문학
속독·속필은 자랑할 만한 일인가
- 30 걷기 좋은 길
한강의 봄, 선유도공원
- 31 김희룡의 건강 카툰
장수의 비밀, 사소하지만 강력한 습관
- 32 협회 소식
대한보건협회 前 경남지부장 김장락 교수 신간 출판
2025년도 보건의날 기념, 제50회 보건학종합학술대회 행사 안내



• 스위스, 뵐겐 언덕

2025년 03월호

월간 《더 행복한 건강생활》
등록번호 성북, 라00082
발행처 대한보건협회
후원 (재)서울의과학연구소
주소 서울시 성북구 보문로 121, 3F
전화 02-921-9520~1
팩스 02-921-2035
홈페이지 www.kpha.or.kr
발행인 전병율
편집위원장 오재석
편집위원 김연수·박기수·신성식·오한진·전상일·조하연
기획·총괄 정례현·방형애·유제영·강혜원
편집·디자인 (주)샘터사 02-763-8961

《더 행복한 건강생활》의 모든 저작물은 저작권법의 보호를 받으므로 무단 전재와 무단 복제를 금지하며, 게재된 글은 필자 개인의 의견으로 대한보건협회의 공식 입장이 아님을 밝힙니다.

봄맞이 운동을 위한 워밍업

서울대학교 체육교육과 스포츠의학실



춡고 길었던 겨울이 지나고 따뜻한 봄이 오고 있다. 이 시기가 움츠려 있던 몸을 깨우고 야외 활동량을 늘리기에 좋은 때이다. 하지만 욕심과 무리한 동작은 금물이다. 건강하게 운동을 하기 위해서는 몸을 충분히 풀어 주어야 한다.

워밍업이 중요한 이유

운동을 시작하기 전 5~10분 정도 하는 워밍업은 단순한 준비 운동을 넘어, 신체가 운동에 적응할 수 있도록 돕는 필수 과정이다. 특히 봄철 운동을 시작할 때는 몸의 근육과 관절을 미리 움직여 부드럽게 풀어 주는 것이 중요하다. 워밍업을 효과적으로 하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있다.

1. 근육과 관절 사용 준비

겨울 동안 활동량이 줄어든 상태에서 갑자기 운동을 시작하면 근육과 관절이 충분히 풀리지 않아 부상 위험이 높아질 수 있다. 워밍업을 통해 근육을 점진적으로 활성화하고 관절의 가동 범위를 넓히면 갑작스럽게 움직여서 생기는 부상을 예방할 수 있다. 또한 근육이 충분히 따뜻해지면 운동 중 발생할 수 있는 염좌나 근육 경직 위험을 줄인다.



2. 혈액순환 촉진 및 신진대사 활성화

워밍업을 하면 혈액순환이 잘되어 근육에 산소와 영양 공급이 원활해진다. 이는 근육의 에너지 대사를 활성화하고, 지구력을 높이며, 운동 중 피로를 덜 느끼게 하는 데 도움이 된다. 또한 체온이 점진적으로 상승하면서 관절과 근육이 부드러워지고, 운동 중 신체가 보다 효율적으로 움직이도록 한다. 특히 유산소 운동을 할 때 체력 유지와 운동 지속력 향상에 매우 효과적이다.



3. 심폐 기능 강화 및 호흡 조절


갑작스럽게 강도 높은 운동을 하면 심장과 폐에 부담이 가고 호흡이 가빠질 수 있다. 하지만 워밍업을 통해 심박수를 점진적으로 높이면 심폐 기능이 활성화되어 신체가 운동 강도에 적응할 수 있는 시간을 확보할 수 있다. 이는 심장의 부담을 줄여 주고 운동 중 호흡 조절을 보다 원활하게 해 더욱 효율적인 운동을 할 수 있도록 돕는다.



효과적인 워밍업 방법


1. 가벼운 유산소 운동

운동 전 가볍게 점핑잭, 제자리 걷기 또는 가볍게 뛰기를 3~5분 정도 실시하면 체내 산소 공급량이 증가하고 운동 지속력이 향상되는 장점이 있다. 이때 너무 빠른 속도로 진행하기보다는 천천히 몸을 깨우는 것이 포인트다.



점핑잭

- ① 몸에 힘을 주지 않고 반듯하게 선 자세에서 시선은 정면을 향한다.
- ② 발을 양옆으로 벌리고 팔을 머리 위로 들어 올리면서 가볍게 뛴다.



제자리 걷기

- ① 제자리에 서서 건듯이 무릎을 번갈아 들어 올린다.
- ② 무릎은 최대한 올리되 힘이 들면 적당한 선에서 그쳐도 괜찮다. 익숙해지면 조금씩 높이가 올라간다.

2. 전신 스트레칭


운동 전에 주요 근육군을 골고루 움직여 풀어 주는 것이 좋다. 목에서부터 발끝까지 부드럽게 이완하는 스트레칭을 하면 근육의 긴장을 완화하고 가동 범위를 넓힐 수 있다.

• 정적 스트레칭(Static Stretching)과 동적 스트레칭(Dynamic stretching)

정적 스트레칭은 풀어 주고자 하는 근육을 특정 자세에서 일정 시간 동안 유지하는 스트레칭이다. 주로 운동 후 근육을 이완시키고 유연성을 증가시키는 데 효과적이다. 동적 스트레칭은 관절을 움직여 근육을 반복적으로 신장시키는 스트레칭이다. 운동 전에 실시하면 근육을 활성화하고 관절 가동 범위를 증가시켜 부상 예방에 도움이 된다. 운동 전에는 동적 스트레칭을 중심으로 몸을 활성화하고, 운동 후에는 정적 스트레칭으로 근육을 이완시키는 것이 이상적이다.

다음 그림을 보며 스트레칭을 해 보자. 왼쪽, 오른쪽 좌우 운동이 가능한 경우에는 번갈아 수행한다.

①




양손 엄지손가락으로
턱밑 젖혀 들기

②




한 손으로 서서히
머리 당기기

③



머리 뒤로 깎지를 낀 채
머리 숙이기

④




양손을 깎지 낀 채
최대한 머리 위로 늘리기

⑤



깎지 낀 팔과 함께 몸을
최대한 옆으로 숙이기

⑥



깎지 낀 손을 등 뒤로
뻗은 후 상체 숙이기

⑦




한 팔을 쭉 펴고
다른 팔로 당기기

⑧




팔을 머리 위로 구부리고
다른 팔로 누르기

⑨



무릎을 편 채
상체 숙이기

⑩




한쪽 다리만 구부린 채
상체 숙이기

⑪



양손으로 무릎을 잡고
어깨 비틀기

⑫



한 손으로 발끝을 잡고
당기기

3. 특정 운동에 맞는 준비 운동

운동 유형에 따라 집중해야 할 부위가 다르므로, 아래에 소개하는 운동별 준비 운동을 참고하여 워밍업한다.

- ① 조깅 및 러닝
발목과 무릎을 돌려 주고 가볍게 스쿼트나 런지를 수행한다.
- ② 자전거 타기
허벅지와 엉덩이 근육을 중심으로 다리를 스트레칭하는 동작을 수행한다.
- ③ 등산
허리와 무릎 관절의 유연성을 높이기 위해 몸통 비틀기와 스쿼트를 수행한다.
- ④ 수영
어깨와 팔 근육을 풀어 주기 위해 팔 돌리기, 어깨 회전 운동을 해 주는 것이 좋다. 또한 허리와 다리 유연성을 높이기 위해 몸통을 좌우로 비트는 동작을 추가하면 도움이 된다.
- ⑤ 테니스 및 배드민턴
손목과 팔꿈치의 유연성을 높이기 위해 손목 돌리기, 팔 스트레칭을 포함한다. 발 앞꿈치를 이용해 가볍게 연속해서 뛰며, 빠른 풋워크와 민첩성을 기르는 반동 점프를 통해 하체 반응 속도를 올리면 더 효과적이다.

부상 예방을 위한 주의 사항

1. 운동 강도는 점진적으로 올리기
겨울 동안 운동량이 적었다면 갑자기 무리한 운동을 하기보다 서서히 강도를 높여 가야 한다. 처음에는 최대 능력치의 50~70% 정도로 시작하고, 점차 강도를 높이는 것이 좋다. 운동 후 몸 상태를 확인하면서 무리하지 않아야 한다.
2. 적절한 복장 착용
봄철은 일교차가 크기 때문에 운동 시 체온을 유지할 수 있는 기능성 의류를 착용하고, 외부 활동 시 자외선 차단제와 모자를 준비한다.
3. 운동 후에도 스트레칭
운동 후에는 한 자세를 오래 유지하는 정적 스트레칭을 통해 긴장된 근육을 풀어 주는 것이 좋다. 특히 종아리, 허벅지, 허리 근육을 충분히 이완해 주면 다음 날 근육통을 줄일 수 있다.
4. 수분 보충은 충분히
봄철에는 기온이 올라가면서 땀 배출량이 증가한다. 운동 중간중간 수분을 보충하여 체내 수분 균형을 유지하고 탈수를 예방해야 한다. 특히 카페인이나 포함된 음료보다는 생수나 이온음료를 마시도록 한다.

봄은 신체 활동을 늘리기에 좋은 계절이다. 하지만 처음부터 무리한 동작을 하거나 준비 없이 시작하면 부상이 뒤따른다. 운동 전 적절한 워밍업을 통해 몸을 충분히 풀어 주고, 서서히 운동 강도를 높이는 것이 신체를 보호하는 방법이다. 올바른 워밍업 방법을 익혀 건강하고 활기찬 운동 생활을 시작해 보자.

봄 향기 가득한 달래 소고기 주먹밥

이영인 영양사 · 식생활 연구가



기나긴 겨울잠에서 만물이 깨어나는 이 시기, 잠든 입맛까지 돋우는 상쾌한 봄나물 미식회가 기다려진다. 3월의 어느 설레는 소풍 날엔 달래와 소고기의 영양이 듬뿍 담긴 주먹밥 도시락을 챙겨 보면 어떨까.

알싸한 봄나물의 대표 주자, 달래

달래는 파, 양파, 부추, 마늘과 함께 백합과에 속하는 채소다. 야생 달래는 2월부터 4월이 제철이나, 최근에는 하우스 재배가 보편화되어 계절에 관계없이 시중에서 달래를 찾아볼 수 있다. 달래의 신선한 향과 알싸한 맛을 살리고, 영양소의 손실을 방지하기 위해 생채로 요리에 활용하는 경우가 많다. 특히 한식에서는 간장 양념에 달래를 잘게 다져 넣어 양념장을 만들거나, 무침 혹은 겉절이를 만들어 반찬으로 먹는 활용법이 대표적이다. 국, 찌개, 조림, 볶음 등 가열하는 요리에 맛과 향을 더하는 향채로 넣기도 하며, 달래전이나 달래튀김처럼 별미 요리의 주재료로 쓰기도 한다.

달래의 특 쏘는 매운맛은 알리신이라는 물질에서 기인하는데, 이 성분은 혈중 콜레스테롤 수치 조절과 혈액 응고를 억제해 혈관 질환 예방에 효과가 있는 것으로 알려져 있다. 또한 달래에는 신진대사에 도움이 되는 칼륨, 칼슘, 철분 등 무기질 함량이 높아 겨울에 비해 활동량이 많아지는 봄에 훌륭한 영양소 공급원 역할을 한다. 피로 해소와 춘곤증 극복에 도움이 될 수 있는 비타민B와 비타민C 또한 풍부하게 함유되어 있다.

달래는 잎이 진한 녹색을 띠면서 뿌리가 매끈한 것, 알뿌리가 둥글고 향이 강한 것을 추천한다. 달래는 잎과 줄기가 무르기 쉬워 되도록 구매 후 빠르게 소비하는 것이 좋다. 보관 시 건조하지 않도록 물을 뿌리고 키친타월에 싸 지퍼백이나 밀폐용기에 담은 후 냉장고의 채소칸에 두면 신선 유지 기간이 조금 더 길어질 수 있으니 참고하자.

달래와 소고기로 간편하게 만드는 주먹밥

손에 들고 먹을 수 있도록 밥을 뭉쳐 만든 음식인 주먹밥은 형태가 간편하고 이동하면서 먹기 용이하여 여러 문화권에서 나들이 음식으로 애용한다. 우리나라에서는 주로 고기, 채소 등을 잘게 다져 넣고 양념한 밥을 한 입 크기로 둥글게 만들어 먹는 형태가 일반적이다. 일본의 주먹밥 오니기리는 소금 간을 한 밥 안에 장아찌나 생선조림, 생선구이 등을 넣고 삼각형이나 둥근 모양으로 뭉친 후 김으로 감싸 먹는다. 돼지고기, 오리알 노른자, 밤과 대추 등 속 재료를 찹쌀밥 안에 넣고 삼각형으로 뭉쳐 연잎이나 대나무잎에 싰 후 찜 낸 중국요리 쥬쥬도 일종의 주먹밥이다. 밥과 토마토소스, 치즈, 고기 등을 동그랗게 빚어 빵가루를 묻힌 후 튀기거나 구워 낸 이탈리아의 주먹밥 요리는 아란치니라고 한다.

3월의 레시피에서는 봄 향기가 풍부한 제철 식재료, 달래를 넣은 소고기 주먹밥을 소개한다. 멥쌀에 찰현미를 섞어 식이섬유 함량을 높이고, 밥을 지을 때 다시마를 넣어 감칠맛을 더했다. 밥에

다진 달래와 깨소금만 비벼 주먹밥을 만들어도 신선한 봄 향기를 즐길 수 있지만, 소고기를 넣어 단백질도 보충하고 구수한 맛까지 살렸다. 위장이 약한 사람은 달래의 매운맛이 자극적일 수 있으니 레시피에서 달래 첨가량을 줄여도 좋다. 한편 알리신 성분은 열에 변성되면 매운맛이 약해지니, 소고기가 익어 갈 때쯤 함께 넣어 가열 조리 시간을 늘리는 방법도 추천한다.

이달의 요리

달래 소고기 주먹밥

재료(4인분)

멥쌀 1컵
찰현미 1컵
물 360mL
다시마 1조각(2.5cm x 5cm)
달래 100g
소고기 다짐육 200g

양념장

간장 1큰술
맛술 1작은술
올리고당 1작은술
다진 마늘 1작은술
다진 파 2작은술
참기름 1작은술
후추 조금
토핑(김가루, 통깨, 후리카케 등 선택)



1. 멥쌀과 찰현미를 3~4번 정도 흔들어 씻고 물과 다시마를 넣어 밥을 짓는다.
2. 소고기 다짐육에 양념을 넣고 버무려 달래를 손질하는 동안 잠시 재워 둔다.
3. 달래는 알뿌리 겹질을 벗기고 물에 깨끗이 씻어 잘게 다져서 준비한다.
4. 팬을 중불에 올려 달군 후 양념해 둔 소고기 다짐육을 국물이 줄어들어 고슬고슬해질 때까지 볶는다. 불을 끄고 3의 다져 둔 달래를 넣어 잘 섞는다.
5. 1의 밥과 4의 재료를 볼에 한데 넣어 잘 섞은 후, 손에 밥이 달라붙지 않도록 물을 묻혀 가며 원하는 크기로 뭉쳐 주먹밥을 만든다. 취향에 따라 토핑을 올려 접시에 담는다.



흔하게 발견되는 갑상선 결절 혹시 암일까


이은직 한라의료재단 호르몬건강클리닉 원장 · 내분비내과 전문의

건강검진 중 초음파로 갑상선 결절(종양)이 발견되는 경우는 생각보다 흔하다. '갑상선에 혹이 있다'는 말을 들으면 혹시 암일까 걱정하는 경우가 많지만, 사실 갑상선 결절이 악성(암)일 확률은 전체 결절의 5% 정도에 불과하다. 따라서 중요한 것은 적극적인 검사로 양성인지 악성인지 파악해 대응하는 것이다.

갑상선 결절이란 무엇인가

갑상선 내 세포의 과증식으로 혹이 생기는 경우를 갑상선 결절이라고 한다. 성인의 약 5%에서 발견되며, 나이가 들수록 발생 빈도가 증가하고 여성에게서 3~4배 더 많이 나타난다. 결절은 원인과 특성에 따라 과증식성 결절, 콜로이드 결절, 염증성 결절, 낭성 결절 그리고 암이 포함되는 종양성 결절로 나뉜다. 이 중 과증식성 결절은 요오드 결핍 등과 같이 갑상선 세포의 증식을 유도하는 환경인자가 관여하는 것으로 알려져 있지만 대부분 원인이 확실하지 않다.

대다수 결절은 서서히 자라고 초반에는 크기가 작기 때문에 바로 증상이 나타나지 않기도 하나, 크기가 커져서 육안으로 보일 정도가 되면 식도나 기도를 압박해 불편감을 유발할 수 있다. 간혹 결절 내로 출혈이 발생하면 결절이 갑자기 커지면서 심한 통증을 동반하기도 한다. 그러나 일반적으로 결절의 크기가 크더라도 자각 증상이 없는 경우가 많다.



• 갑상선 검사

악성 여부 판단 위해 적극적인 검사 필수

갑상선 결절이 확인되면 추가로 정밀 검사가 필요하다. 갑상선 상태를 알아보기 위해서는 주로 혈액 검사, 갑상선 초음파 검사, 세침흡인 세포 검사 등을 진행한다.

■ 혈액 검사

갑상선 결절 환자는 대부분 갑상선 기능이 정상이지만, 드물게 갑상선 기능 항진증이 동반될 수 있어 갑상선 호르몬 수치를 측정한다. 갑상선 수질암 가족력이 있는 경우 혈액 검사로 암 표지자인 혈청 칼시토닌을 측정하기도 한다.

■ 갑상선 초음파 검사

결절의 크기와 형태를 평가하는 데 유용한 검사다. 물혹인지 덩어리를 이루고 있는지 분명히 확인하는 것이 가능하며, 정기적인 추적 관찰을 통해 크기 및 모양 변화를 살필 수 있다. 그러나 초음파 검사만으로는 암을 진단할 수 없으므로 악성이 의심되는 경우 조직 검사를 통해 확인한다.

■ 세침흡인 세포 검사

결절이 양성인지 악성인지 판별하는 검사로, 가는 바늘을 이용해 결절에서 세포를 채취한 후 현미경으로 암세포 존재 유무를 확인한다. 90% 이상의 높은 정확도를 보이며, 시술 과정에서 마취가 필요 없고, 합병증이나 통증이 거의 없어 비교적 간편하고 안전하다. 단, 결절의 상태나 크기에 따라 검사에 필요한 세포량을 충분히 얻지 못할 수 있어 필요시 재검사를 해야 할 수도 있다.

갑상선 결절을 암으로 의심할 수 있는 경우


양성 갑상선 결절의 경우 초음파 검사와 혈액 검사로 경과를 지켜볼 수 있다. 그러나 악성 소견인 경우에는 수술적 절제가 필요하며, 이후 재발 여부를 면밀히 추적·관찰해야 한다. 또한 세침흡인 세포 검사에서 양성이어도 초음파 검사에서 악성 가능성이 있다면 6개월 내 재검사를 시행하거나, 조금 크기가 큰 바늘을 사용하여 조직 검사를 시행해야 한다.

다음과 같은 경우에는 악성 가능성을 고려할 수 있다.

• 악성 가능성이 의심되는 경우

- 1. 가족 중에 갑상선암 병력이 있는 경우
- 2. 두경부에 방사선 치료를 받은 경우
- 3. 결절의 크기가 커져 통증이 생기며, 목이 쉬고 연하곤란과 호흡곤란이 있는 경우
- 4. 결절이 딱딱하게 고정되어 있거나 임파절이 커져 있는 경우
- 5. 20세 이하 또는 60세 이상에서 결절이 급속히 자란 경우
- 6. 초음파 검사에서 결절이 ① 저음영 ② 상하로 길쭉한 모양 ③ 불규칙한 경계 ④ 내부에 석회화 음영이 있는 경우

갑상선암은 초기에 발견하면 예후가 좋은 경우가 많다. 따라서 특별한 증상이 없더라도, 갑상선암 유병률이 높아지는 30대 중반부터는 정기적으로 초음파 검사를 하는 것이 좋다. 특히 가족력 등 위험 요인이 있는 경우에는 특히 신경을 써서 조기 발견과 예방에 신경을 써야 한다.



• 갑상선 초음파 검사상 악성 의심 소견:
저음영, 불규칙한 경계, 상하로 길쭉한 모양, 석회화 음영




성조숙증 우리 아이에게도 해당될까

송경철 연세대학교 의과대학 · 강남세브란스병원 소아청소년과 진료교수

성조숙증이란 무엇인가

우리 아이가 또래보다 유난히 빨리 크고 있다면, 부모로서는 반가우면서도 한편으로 “혹시 성조숙증은 아닐까?” 이런 걱정이 들 수 있다. 성조숙증이란 2차 성징이 또래보다 조기에 나타나는 경우를 말한다. 일반적으로 여아는 만 8세 이전, 남아는 만 9세 이전에 사춘기 징후(여아: 유방 발달, 남아: 고환 크기 증가 등)가 나타날 때 성조숙증을 의심할 수 있다.

우리나라에서 성조숙증의 유병률은 해마다 증가하는 추세다. 건강보험심사평가원 데이터를 분석한 한 연구에 따르면 최근에는 여아에서 10만 명당 약 2468명, 남아에서 10만 명당 약 153명까지 증가했다. 이는 소아청소년 비만을 증가 및 적극적인 성조숙증 진단과 관련이 있을 것으로 추정된다.



출처 PLoS One. 2023 Mar 22;18(3):e0283510

• 성조숙증 증상(Precocious Puberty)

여아: 유방 발달
남아: 고환 크기 증가
급속한 키 성장
체취 변화
여드름 및 피부 변화

원인과 영향

성조숙증의 원인은 다양하다. 가장 흔한 것은 중추성 성조숙증(Central Precocious Puberty)으로, 뇌에서 성호르몬을 조절하는 기능이 조기에 활성화되면서 발생한다. 일부 아이들은 뇌 질환 등의 기질적 원인이 있을 수 있다. 비만도 중요한 위험 인자 중 하나다. 비만한 아이들은 정상 체중인 아이들보다 사춘기나 초경이 더 일찍 시작되는 경향이 있다. 이는 지방 조직에서 성호르몬을 조기에 활성화하는 것과 연관이 있다. 또한 환경호르몬이나 일부 음식이 성조숙증을 유발할 수 있다는 연구도 있으나, 아직 명확한 인과관계는 밝혀지지 않았다.

사춘기가 빨리 시작되면 단기적으로 키가 또래보다 빨리 크지만, 골연령(뼈 나이)이 빨리 진행되어 성장판이 일찍 닫히면서 최종 성인 키가 예상보다 작아질 수 있다. 또 또래보다 빠른 신체 변화 때문에 심리적으로 위축될 가능성이 있으며, 여성의 경우 조기 초경과 관련된 심리사회적 문제 및 부인과적 질환 위험이 증가할 수 있다는 연구 결과도 있다.

성조숙증은 어떻게 진단할까

아이가 성조숙증이 아닌지 의심스러우면 병원에서 전문적인 검사를 통해 진단받을 수 있다. 우선 성장 상태와 2차 성징 여부를 확인하고, 골연령 검사를 통해 뼈 나이를 측정한다. 혈액 검사를 통해 성호르몬 상태를 확인하고, 보다 정밀한 평가가 필요할 경우 성선자극호르몬 자극 검사나 자궁 초음파 혹은 고환 초음파를 시행한다. 중추성 성조숙증으로 진단되면 뇌하수체 MRI를 촬영하여 기질적 원인이 있는지 확인하기도 한다. 이러한 검사 과정을 통해 성조숙증 여부와 진행 속도를 파악하고, 진행이 지속적으로 빠를 것으로 판단될 경우 치료 여부를 결정하게 된다.

치료와 예방법

중추성 성조숙증 치료는 성호르몬 분비를 조절하는 주사(GnRH agonist)를 주기적으로 투여하는 방식이 일반적이다. 1개월에 한 번 투여하는 주사와 3개월에 한 번 투여하는 주사가 있는데, 효과는 비슷한 것으로 알려져 있다. 최근에는 6개월에 한 번 투여하는 주사도 국내 사용이 승인되어 환자의 편의성을 높이고 있다.

성조숙증의 예방을 위해서는 건강한 생활 습관이 중요하며, 특히 비만을 예방하기 위해 균형 잡힌 식사와 규칙적인 운동을 실천해야 한다. 이는 성장을 위해서도 중요한 요소이다.

아이가 또래보다 성장이 빠르다고 해서 무조건 성조숙증을 걱정할 필요는 없다. 또한 성조숙증이 있다고 해서 무조건 치료를 해야 하는 것도 아니다. 하지만 빠른 성장 속도가 지속되거나 사춘기 징후가 조기에 나타난다면 성조숙증 진료 경험이 많은 소아청소년과 전문의에게 진료를 받고 꾸준히 관리를 받는 것이 중요하다. 특별히 소아청소년과 전문의 중에서 소아내분비학을 전공한 소아내분비과 세부전문의에게 진료받을 것을 권한다.

부모의 세심한 관심이 아이의 건강한 성장과 밝은 미래를 이끈다.



여성 청결제 효과 있나


홍유미 차의과학대학교 강남차병원 산부인과 교수

여성 청결제는 치료제가 아니다

“여성 청결제 써야 하나요?”
“여성 청결제 써도 되죠?”
산부인과 의사로서 받는 단골 질문들이다. 의학의 영역 끝에 살짝 걸쳐 있는 꽤나 애매한 질문인데, 사실 자세히 들여다보면 질문에 이미 효용성이나 부작용에 대한 의문이 어느 정도 내포되어 있다. 나는 이런 질문을 ‘의사’에게 하는 분들에게는 “쓸 필요 없다.”고 한마디로 일축한다. 여성 청결제 사용이 치료의 영역이라 여기지 않는 분들은 애초에 의사에게 이런 질문을 하지도 않기 때문이다. 여성 청결제는 치료제가 아니다.
사실 여성 청결제 사용이나 성분과 관련된 의학적 근거를 찾기란 쉽지 않다. 환자가 아닌 건강한 성인 여성을 대상으로 대규모 임상 시험을 진행하는 것이 쉽지가 않을뿐더러 의사들이 관심을 쏟는 영역도 아니기 때문이다. 그나마 최근 진행된 몇 건의 연구도 케이스 발표 수준에 불과하고, 대부분 특정 제품을 생산하는 제조사의 지원을 받아 진행된 연구라 전적으로 신뢰하기도 어렵다. 또 여성 위생, 청결과 관련한 관행은 문화적 차이가 커 어떤 나라에서 어떤 인종을 대상으로 진행한 조사나 연구인지도 꼼꼼히 들여다볼 필요가 있다.

여성 청결제의 진실

2013년 충남대학교 간호대학 안숙희 교수가 여성건강간호학회지에 발표한 ‘중년 여성의 여성 생식기 관련 위생과 질 세척 행위’라는 논문에는 국내 여성의 여성 청결제 사용 현황과 관련한 내용이 있다. 현재 생리를 하고 있는 평균 연령 46.8세인 134명의 평범한 중년 여성들을 대상으로 시행한 설문 조사에서 ‘질 세척을 하고 있다’고 응답한 경우는 75명(55.9%)으로 하고 있지 않다고 답한 경우보다 더 많았다.
질 세척을 하고 있다고 응답한 경우 가장 큰 이유는 ‘개운한 느낌을 위해(61.3%)’였고 그다음이 ‘냄새를 없애려고(18.7%)’였다. 세척액은 물이 대부분(68.0%)이었고, 여성 청결제(13.3%), 비누액(12.0%), 식초액(6.7%) 순이었다. 빈도는 매일 세척하는 경우가 26.7%, 주당 2~3회도 26.7%였다.
종합해 보면 국내 중년 여성의 경우 7.5%가 여성 청결제를 사용한다는 얘기인데, 여성 청결제 제조사에서 진행했던 연구들에서 50~60%로 보고했던 것보다 훨씬 낮은 비율이다. 물론 20~30대에서는 이보다 사용 빈도가 더 높을 수도 있지만, ‘여성 청결제를 사용해 본 경험이 있는 것’과 ‘최초 사용 이후 지속적으로 사용하고 있는 것’은 엄연히 구분해서 보아야 한다.



출처 Ahn, Sukhee, Korean J Women Health Nurs, 19;4 285-294.



질 세척이나 여성 청결제 사용과 관련하여 현재까지 명백하게 밝혀진 건강상 이점은 없다. 오히려 정상적인 질 내 세균총을 변화시켜 선천적인 면역 방어를 약화시키고 감염에 취약하게 만들 수 있다. 이 때문에 일부 제품들이 본래의 질 내 상태를 유지할 수 있는 ‘산성’을 강조하며 질내 미생물군의 균형 유지, 회음부 피부의 수분 유지, 세균성 질염 예방 등의 효과를 내세우고 있지만, 이와 관련한 의학적 근거는 아직까지 부족하다.
2010년 미국 플로리다주립대학교 간호학대학에서는 질 세척이 오히려 골반염증성 질환, 자궁내막증, 성병의 위험 증가와 관련이 있다는 부정적인 견해를 발표하기도 하였고, 시중에는 알레르기 등 기존 증상을 악화시킬 수 있는 성분을 포함하고 있는 제품도 있다. 특별한 증상이 없다면 굳이 여성 청결제 사용에 연연할 필요가 없고, 냄새나는 질 분비물, 회음부 가려움과 같은 부인과적 증상이 있다면 산부인과 전문의의 진료를 먼저 받는 것이 맞다.

외음부 관리 가이드라인

다시 한번 강조하지만 여성 청결제는 치료제가 아니다. 산부인과 의사로서 ‘좋은 점’보다는 무분별한 제품을 과도하게 썼을 때 ‘안 좋은 점’에 초점을 둘 수밖에 없다. 다음은 2011년 영국 산부인과학회(RCOG)에서 발표한 ‘외음부 관리 가이드라인’을 번역한 내용이다. ‘해야 한다’ 보다는 ‘하지 말라’가 주를 이룬다는 점을 명심하면서 참조하기를 바란다.

- 1. 외음부 질환(예: 접촉성 피부염, 외음부질염)이 있는 대부분의 여성은 외음부 피부 관리 및 자극물 회피 방법을 알고 있을 필요가 있다.
- 2. 물로만 세척하면 피부가 건조해지고 가려움증이 악화될 수 있으므로 소량의 비누 대체제와 물을 사용하여 외음부를 세척한다.
- 3. 샤워를 권장하며, 하루에 한 번만 외음부를 세척한다. 과도한 세척은 외음부 증상을 악화시킬 수 있다. 보습제 사용이 도움이 될 수 있다.
- 4. 스펀지나 천을 사용하지 말고 손으로 세척한 뒤 부드러운 수건으로 가볍게 두드려 건조한다.
- 5. 실크나 면으로 된 헐렁한 속옷을 착용하고 몸에 딱 맞는 옷은 피한다. 긴 치마를 속옷 없이 입는 것도 좋다.
- 6. 속옷을 입지 않고 자는 것을 권장한다.
- 7. 섬유 유연제와 생물학적 세제는 피하고, 속옷만 별도로 비생물학적 세제로 세탁하는 것이 좋다.
- 8. 외음부에 비누, 샤워 젤, 스크럽, 거품 목욕제, 데오드란트를 과도하게 사용하지 않는다.
- 9. 일부 일반 의약품 크림(베이비 크림, 기저귀 크림, 티트리 오일, 알로에베라 젤 등)은 자극 물질이 포함된 경우도 있어 사용 전 성분을 확인한다.
- 10. 생리 중이 아닐 때에 팬티 라이너나 생리대를 지속적으로 사용하는 것은 좋지 않다.
- 11. 외음부에 방부제가 들어간 제품을 크림 형태로 바르거나 목욕물에 추가하는 것을 피한다.
- 12. 어두운 염료(검정, 네이비블루)를 사용하여 만든 속옷은 알레르기를 유발할 수 있으므로 새로 장만한 속옷은 반드시 세탁하고, 가급적 흰색 또는 밝은색 속옷을 착용한다.
- 13. 색깔 있는 화장지를 사용하지 않도록 한다.
- 14. 피부를 긁는 버릇이 있는 경우 손톱에 매니큐어를 바르지 않는다.



유방암 치료 시 알아 두어야 할 치아 관리

박원서 연세대학교 치과대학병원 통합진료학과 교수

항암 치료 중인데 치과 치료, 특히 아픈 치아를 발치할 수 있나

치아를 건강하게 유지하는 것이 유방암 치료와 어떤 관련이 있는지 궁금할 수 있지만, 생각보다 치과적인 문제로 불편감을 호소하는 유방암 환자가 적지 않다.

유방암 환자들이 치아 관리를 신경 써야 하는 이유는 항암 치료와 관련이 있기 때문이다. 항암 치료를 진행하게 되면 전신 면역 상태가 저하되고, 평소에는 증상이 없었더라도 만성 질환이 내재되어 있던 치아에 문제가 생긴다. 특히 잇몸병 증상이 심해져서 급성 염증으로 변하는 경우가 있다. 또한 항암 치료 중에 입안의 점막이 헐게 되면 심한 통증을 겪게 될 수 있으며, 음식 섭취가 어려워지고, 구강 내에 병소로 인한 세균이 많은 경우 2차 감염이 발생할 가능성도 있다. 따라서 암 환자는 특히 더 치아 건강을 유지하는 것이 중요하다.

뼈주사를 맞으면 악골괴사가 생긴다던데, 어떤 병인가

또 다른 이유로는 최근 들어 이슈가 된 악골괴사 발생을 들 수 있다. 유방암으로 골 전이가 발생한 경우, 골 전이를 늦추고 통증을 조절하기 위해 사용해야 하는 약물들이 있다. 비스포스포네이트나 데노수맙 등 뼈와 관련된 주사제들은 암 치료 면에서는 매우 좋은 약물이지만, 매우 드물게 치과 치료, 특히 발치를 하게 된 이후 턱뼈에 염증이 지속되는 사례가 보고되고 있다. 최근에는 발치를 하지 않았어도, 뼈 관련 주사제를 맞는 경우 이미 염증이 있는 치아 주변에서 저절로 괴사가 진행되는 경우도 보고되고 있어 주의가 필요하다.

악골괴사 유병률은 국내 5개 종합병원의 공동 연구에서 0.04%로 추산되나 종양 환자에게 골흡수억제제나 혈관신생억제제를 투여하면 유병률이 1.86%까지 높아지는 것으로 나타났다. 하지만 충분히 예방할 수 있는 사안이므로 치과 치료 전, 특히 발치나 임플란트를 하기 전에는 반드시 치과 의사에게 유방암 환자임을 알리고, 골 전이 치료 약물을 투여받았다고 말해야 한다.

유방암 환자가 골다공증이 생기면 악골괴사가 생기나

골다공증 관련 악골괴사도 문제이다. 골 전이가 되지 않은 유방암 환자라 할지라도, 항암 치료 이후, 특히 아로마타아제 억제제를 투여받는 환자인 경우에는 골다공증이 발생할 수 있다. 또한 암과 관련이 없더라도 골다공증을 치료하기 위해 비스포스포네이트나 데노수맙을 투여받을 수 있고, 이런 상황 역시 악골괴사가 발생할 수 있으므로 주의해야 한다. 2008~2018년 사이 골다공증으로 진단을 받고, 경구용 또는 주사용 비스포스포네이트나 데노수맙을 투약한 이력이 있는 환자(50대 이상) 대상 연구에서 치과 치료 경험이 있는 골다공증 투약 환자는 약을 쓰지 않은 골다공증 환자에 비해 약물 관련 악골괴사의 발생이 4.6배 더 높았다. 치과 치료 종류별로 보면 발치가 약물 관련 악골괴사 발생과 상관도가 가장 높았고, 기타 구강악안면외과적 수술, 치주 치료의 순으로 상관도가 나타났다.

악골괴사를 예방하려면 어떻게 해야 할까


항암 치료 시 악골괴사 등 여러 치과적 문제점을 예방하기 위해서는, 평소에 치아 건강을 유지하여 발치 가능성을 미연에 방지하는 것이 가장 좋은 방법이다. 치아를 발치하게 되는 질환은 크게 충치(치아우식증)와 풍치(잇몸병, 치주염)로 나눌 수 있는데 모두 세균에 의해서 발생하는 질환이다. 충치는 치아 상부(저작 면), 치아와 치아 사이(인접면), 그리고 뿌리에 발생하는 충치로 나눈다.

저작면과 인접면에 발생하는 충치는 주로 어렸을 때부터 20대까지 발생하고, 뿌리에 발생하는 치아는 50대 이후에 주로 발생한다. 충치는 진행 정도에 따라 간단한 치료로 마무리할 수 있는 초기 충치부터, 신경 치료를 해야 하는 충치, 발치를 해야 할 정도로 진행된 충치 등으로 나눌 수 있다. 극심한 통증으로 “이가 아파서 잠을 잘 못 잤다.”, “차가운 음식이나 뜨거운 음식을 먹을 때 이가 아프다.” 같은 경험이 있는 사람들은 대부분 충치로 고생하는 경우다.

이에 비해 잇몸병(풍치)은 급성 증상이 아닌 만성 증상을 보이는 경우가 많다. 초기 잇몸 질환인 경우 평소에는 크게 불편한 것이 없는데, 양치질할 때 피가 나거나, 잇몸이 부어 있거나, 입냄새가 조금 나는 정도이고, 심한 통증을 유발하지는 않는다. 그러나 이 상태에서 방치하게 되면 치아가 흔들리거나, 씹을 때 아픈 증상이 나타나고, 잇몸이 심하게 붓고 고름이 나오는 중등도 이상의 치주염으로 진행된다.

잇몸병은 30~40대부터 구강 위생 관리, 정기적인 스케일링 등 관리를 받지 않으면 계속 진행되고, 결국 치아를 받치는 뼈(치조골)가 녹게 되면 발치를 해야 하는 안타까운 경우로 이어진다. “나는 어렸을 때부터 충치 하나 없는 튼튼한 치아를 가지고 있다.”고 자만하던 사람도 치주 질환을 방치하게 되면 풍치로 인해 발치하게 되는 경우를 흔히 볼 수 있다. 충치가 하나도 없는 상태라도 마찬가지다.

• 악골괴사를 유발할 수 있는 뼈주사제 성분 예: 비스포스포네이트, 데노수맙



악골괴사를 유발할 수 있는 주사제제는 주의해서 사용해야 한다. 그러나 악골괴사가 두려워 해당 약물을 무단으로 중단하는 것은 골 전이를 악화시킬 수 있으므로, 종양 치료 주치의와 치과 의사 간의 다학제적 접근을 통해 득과 실을 따져서 진행해야 한다. 악골괴사를 예방하기 위해서는 구강 위생 관리가 매우 중요하다.

유방암 치료 시 치아 건강의 중요성을 잘 알게 되었다면 본인의 치아 상태를 정확히 파악할 필요가 있다. 충치와 풍치 모두 적절한 구강 위생 관리와 주기적인 치과 검진으로 병의 진행을 늦출 수 있으므로, 정기적인 치과 방문과 스케일링, 평소 양치질 습관이 매우 중요하다. 구강 위생 관리 외에도 단단한 음식을 자주 먹는 경우 치아가 파절될 수 있고, 심한 경우 발치하게 될 수 있으므로 가급적이면 딱딱한 음식은 피해야 한다.

본인의 치아 건강 상태를 확인하고, 꾸준히 관리하는 것이 유방암을 이겨 내고, 건강한 치아와 뼈를 평생 동안 유지할 수 있는 지름길임을 꼭 기억하시기 바란다.



당뇨병 전 단계에서 돌아서기

정희원 서울아산병원 노년내과 임상조교수

‘혈당 스파이크’라는 말이 유행이다. 혈당을 관리해 준다는 제품들도 많이 보인다. 하지만 이들 제품은 직접적인 치료제가 아닌 영양제여서 혈당 관리를 하기는 어렵다. 혈당 관리 열풍은 당뇨병이 급증하는 추세와도 무관하지 않다. 대한당뇨병학회에 따르면 국내 당뇨병 환자 수는 600만 명, 당뇨 전 단계는 1500만 명에 달한다.

당뇨의 원인과 종류

당뇨란 인슐린의 분비 부족이나 작용 저하로 혈당(혈액 내 포도당) 수치가 정상 범위를 벗어난 상태가 유지되는 만성 대사질환이다. 혈당은 혈액 중에 포함되어 있는 포도당을 의미하는데, 혈당이 높으면 소변으로 포도당이 배출된다. 밥이나 면 등 탄수화물이 주성분인 음식을 먹으면 위에서 대사 과정을 거쳐 포도당이 되고, 포도당은 혈액으로 흡수된다. 핏속의 포도당을 쓰려면 인슐린 호르몬이 필요하다. 이때 인슐린이 부족하거나 제대로 기능하지 못하면, 포도당은 제대로 쓰이지 못하고 소변 등으로 배출된다. 인슐린의 양상에 따라 당뇨병을 나눌 수 있다. 대체로, 인슐린이 부족하면 1형 당뇨병, 제대로 기능하지 못하면 2형 당뇨병이라고 한다.

최근 2형 당뇨병이 주목받고 있는데, 2형 당뇨병의 발병은 생활 습관과 밀접한 관련이 있다. 혈당 스파이크를 유발하는 생활 습관에 빠져 있으면 2형 당뇨병에 걸리기 쉽다. 혈당 스파이크란 혈당이 갑자기 치솟았다가 도로 꺼지는 것이다.

필자는 ‘정제 곡물과 단순당’을 피하라고 말한다. 이런 음식들이 혈당을 급격하게 올리는 주범이기 때문이다. 정제 곡물은 도정을 하여 겨(기울)와 배아를 제거한 상태의 곡물이다. 겨와 배아가 제거된 정제 곡물은 소화가 쉬워서 위에서 포도당으로 변환되는 속도가 빨라 혈당을 급격히 치솟게 만든다. 정제 곡물로 만든 음식에는 흰쌀밥, 국수, 빵 등이 있다. 우리 주변에서 흔히 볼 수 있

는 음식들이다. 또한 과당 같은 단순당이 들어 있는 음료수도 피하는 것이 좋다.

당뇨병 전 단계의 주범, 혈당 스파이크

우리 몸은 급격한 변화를 좋아하지 않는다. 혈당이 갑자기 치솟는 것은 화재가 발생한 것과 같다. 인슐린이 소방수 역할을 맡는다. 체장은 혈당의 급격한 상승을 감지하고 인슐린을 분비한다. 인슐린의 활약으로 혈당은 빠르게 정상 범위로 돌아온다.

문제는 혈당 스파이크가 자주 일어날 때다. 이렇게 되면 체장이 혹사당한 끝에 ‘지치고’ 그 결과 인슐린 저항성이 생긴다. 인슐린 저항성은 인슐린이 제 기능을 하지 못하는 상태이다. 전과 같은 수준으로 혈당을 조절하려면 인슐린이 더 필요하다. 더 많은 인슐린을 분비하는 과정에서 체장은 또 혹사를 당한다. 악순환이다.

인슐린 저항성이 심해지면 당뇨병 직전 상태인 당뇨병 전 단계가 될 수 있다. 여기서 어떻게 하느냐에 따라 당뇨병으로 진행되느냐 아니냐가 갈린다. 매년 당뇨병 전 단계 상태인 사람의 8% 정도가 당뇨병으로 진행된다고 한다. 당뇨병 전 단계는 공복혈당, 경구 포도당 내성 검사 2시간째의 혈당, 당화혈색소 등을 기준으로 진단할 수 있다. 이때 공복혈당이 높은 경우를 공복혈당장애, 경구 포도당 내성 검사 2시간째의 혈당이 높으면 내당능장애라고 한다. 당뇨병 전 단계 상태라도 별 증상이 없는 경우가 많으므로, 40세 이상이면 혈당 검사를 받아 보는 것이 좋다(오른쪽 페이지 ‘당뇨병 진단 기준’ 참고).

당뇨병 전 단계 진단이 내려졌을 때 환자의 반응은 크게 두 가지로 나뉜다. 첫째, 불안감에 휩싸인다. 혈당에 좋다는 제품을 구매하는 등 이것저것 한다. 물론 특별한 효과를 보기는 어렵다. 둘째, 안심한다. ‘아직 당뇨는 아니다. 어차피 당뇨에 걸린다면 지금 즐겨 두는 게 좋지 않을까?’ 어떻게 보면 천하태평형이다.

• 당뇨병 진단 기준



공복 혈장 포도당 농도		
100mg/dL 미만	100~125mg/dL	126mg/dL
정상	공복혈당장애	당뇨병
경구 포도당 내성 검사 2시간째 혈장 포도당 농도		
140mg/dL 미만	140~199mg/dL	200mg/dL
정상	내당능장애	당뇨병
당화혈색소		
5.7% 미만	5.7~6.4%	6.5% 이상
정상	당뇨병 전 단계	당뇨병

의사로서 더 우려되는 반응은 두 번째다. 당뇨병 전 단계에서 당뇨병으로 전이되는 것은 생각보다 빠르며, 당뇨병 전 단계 그 자체로도 건강에 해롭다.

당뇨병 전 단계인 사람들은 대부분 인슐린 저항성이 있다. 앞서 말한 것처럼 인슐린 저항성이 높으면 인슐린이 더 많이 필요하다. 이렇게 되면 혈중 인슐린 수치가 높아지는데, 이는 체지방 축적과 체내 염증을 불러온다. 지방이 쌓이는 부위에 따라 복부 비만, 지방간, 심혈관계 질환 등이 생기게 된다. 술 한 방울 마시지 않는 사람이 간에 문제가 생겼다면 대부분 인슐린 저항성 때문이다. 거기다 쌓인 지방과 염증은 인슐린 저항성을 악화시킨다. 인슐린 분비 능력 자체도 떨어질 수 있다. 체장 세포가 혹사를 당하

다 못해 사멸하기 때문이다. 정신 건강에도 문제가 생길 수 있는데, 스탠퍼드 대학교의 연구에 따르면 인슐린 저항성이 높은 사람의 우울증 발병률이 그렇지 않은 사람보다 2배 이상 높았다.

당뇨병 전 단계에서 다시 정상 범위로 돌아서려면 생활 습관 개선이 필요하다. 미국과 핀란드에서 행한 대규모 임상시험 결과, 생활 습관 개선이 실제로도 효과가 있는 것으로 나타났다. 생활 습관 개선을 한 사람들은 그렇지 않은 사람들에 비해 2형 당뇨병으로 발전하는 비율이 약 58% 감소했다. 이는 작은 노력만으로도 건강상 이점을 얻을 수 있음을 시사한다.

미국과 핀란드, 두 나라 임상시험에서 실시한 전략은 다음과 같다.

	체중 조절	열량 섭취	식이 지방량	신체 활동
미국	7% 이상 감소	1200~1800kcal (체중에 따름)	전체 열량의 25% 이하	적어도 150분 이상(1주일)
핀란드	5% 이상 감소	식이섬유 섭취: 1000kcal에 15g 이상	전체 열량의 30% 이하 (포화지방은 10% 이하)	30분 이상의 중강도 운동(하루)

지방이 핵심 키워드다. 지방 섭취를 제한하여 더 이상의 축적을 막고, 이미 쌓인 것들은 신체 활동으로 태워야 한다. 신체 활동을 하면 혈액 속의 포도당을 연료로 쓰게 되므로 혈당을 낮추는 데도 도움이 된다. 운동 중에서는 근력 운동을, 신체 부위로는 근육이 많은 하체 위주로 하는 것이 좋다. 근육은 인슐린에 반응하여 혈당을 흡수하고 소모하는 역할을 하기 때문이다.

혹시 당뇨병 전 단계 진단을 받고 낙심한 분이 계신가? 그럴 필요 없다. 당뇨병 전 단계에 어떻게 대처하느냐에 따라 건강해지는 기회가 될 수 있다. 전화위복이라는 말이 들어맞는 상황이 아닐까 싶다. 당뇨병 전 단계에 너무 겁먹지도, 너무 가볍게 여기지도 말고 지혜롭게 헤쳐 나가시길 기원한다.




우리 몸의 화학공장인 ‘간’ 어떤 역할을 할까

오한진 을지대학교 의과대학 가정의학과 교수

간은 폐나 콩팥 등과 달리 쌍이 아닌 딱 하나만 존재하는 기관이다. 따라서 손상이 심하면 대체할 수 없기 때문에 미리미리 관리하는 것이 중요하다. 간의 상태는 혈액 검사를 통해 쉽게 알 수 있어서, 조금만 관심을 기울여도 금주 등 생활 습관 개선으로 간 건강을 지킬 수 있다.

간이 하는 기능

간은 먹어서 섭취한 음식을 대사하여 생명을 유지하고 성장하는 데 필요한 형태의 에너지와 화학 물질로 전환하는 기능을 한다. 탄수화물은 위장관에서 포도당으로 분해된 후 간에서 바로 에너지로 전환되며, 남은 포도당은 저장되었다가 필요시 이용할 수 있어서 에너지의 효율적 이용과 정상적인 혈당을 유지한다. 단백질은 위와 장에서 아미노산으로 분해된 후 간에서 인체에 이용 가능한 단백질 형태로 다시 바뀌어 공급되며, 남은 물질은 요소로 바뀌어 소변으로 배설된다.



우리 몸의 화학공장인 간은 쉴 틈 없이 대사 작용을 한다.

간은 대부분의 지방을 소화하고, 지용성 비타민의 흡수를 돕는 담즙을 분비한다. 음주나 흡연, 대기오염 물질 등 인체로 유입되는 거의 모든 독소를 해독해 체외로 배출되도록 전환하며, 치료를 위해 복용한 의약품이 약효를 내도록 돕고, 제 기능을 다한 물질은 몸 밖으로 배설하는 기능을 한다. 간 조직이 심하게 손상되어 신체 각 부분에서 만들어진 각종 대사 물질을 걸러 내지 못하면 이 대사 물질이 독소로 작용하면서 인체 곳곳에 퍼져 간성 혼수가 나타날 수 있다.


몸에 유입되는 물질은 간을 통과할까

우리 몸으로 들어오는 모든 물질은 간을 거쳐 알맞은 형태로 전환되어 흡수되거나, 나쁜 독성 물질일 경우에는 걸러져 체외로 배출된다. 섭취한 모든 물질은 간을 거치면서 간에 영향을 주기 때문에 ‘무엇을 먹느냐’ 하는 문제는 간 건강과 생명 유지 관점에서 정말 중요하다.

위와 장을 지나면서 영양소를 흡수한 혈액이 간으로 들어가면 간은 이 영양소를 인체가 이용할 수 있는 성분으로 바꾸는데, 인체가 음식 등을 먹고 마시는 과정을 통해 들어온 성분들은 대부분 간에서 정제되고 해독되어 쓰이게 된다. 즉 우리 몸으로 들어

오는 것은 모두 간의 대사 과정을 통해서만 제 기능을 하거나 해독되기 때문에 섭취한 모든 물질은 간에 영향을 끼친다고 볼 수 있다. 따라서 당뇨병 환자의 식이요법만큼 중요하게 다뤄지는 것이 바로 간 기능 장애 환자의 식이요법이다.

술도 당연히 간에서 해독한다. 간은 인체에서 유일한 알코올 해독 기관이다. 사람마다 알코올 처리 능력이 조금씩 다르지만 간은 일정 시간에 일정량의 알코올만을 처리할 수 있다. 따라서 그 범위를 벗어난 지나친 음주는 간세포를 파괴하고 그 자리에 지방을 축적해 지방간을 만들고, 염증을 유발해 간염을, 더 나아가 손상을 초래해 간경변 또는 간암을 유발한다.



간이 나빠지면 어떤 증상이 나타날까

간이 나빠지면 쉽게 피로해지고 일에 의욕이 없어지며, 매사에 권태감이 온다. 묵직한 두통도 자주 느끼게 되고 때로는 머리 전체가 빠개질 것 같은 통증으로 발현되기도 한다. 머리로 피가 솟구쳐 꽉 차 있는 듯한 통증, 가슴이 울렁거리고 구역질 나는 통증, 땅속 깊이 끌려들어 가는 것 같은 느낌 역시 나타난다. 어깨나 목이 빠근하고, 잠을 많이 자도 수면 부족을 느끼며, 눈이 피로하고 시력이 저하된다.

이 밖에도 소화불량과 가슴이 답답하거나 배에 가스가 차고 구역질과 변비가 나타나며, 술에 빨리 취하고, 대변이 황갈색이 아닌 잿빛에 가깝게 된다. 소변은 누렇게 지린내가 많이 나며 거품이 많이 난다. 얼굴에 기미가 끼고 실핏줄이 보이며 두드러기나

피부 가려움증이 발생한다. 빈혈, 탈모 현상도 나타난다. 감기에도 자주 걸리며 코, 잇몸, 항문 등에 피가 날 때도 있고, 정신이 멍하며 기억력과 집중력이 떨어진다. 하찮은 일에 신경질을 내기도 하고 팔다리 시림과 저림, 귀울림이 생길 수도 있다. 더 심해지면 간경변이나 간암으로 발전하고 심장과 신장에 무리를 주어 고혈압, 당뇨 등이 나타난다.

간은 인체의 화학공장이라 불릴 정도로 많은 일을 한다. 이 간에 문제가 발생하면 대체할 다른 기관이 없기 때문에 매우 중요하다. 하지만 간 기능의 80퍼센트 이상이 망가져야 증상이 나타나기 때문에 미리 알아차리기가 쉽지 않다. 건강한 식생활과 운동 습관, 금주가 필요하다.



도수치료·임플란트 저렴한 곳 찾으려면

신성식 중앙일보 복지전문기자·논설위원

한국 건강보험은 적은 비용으로 좋은 효과를 낸다. 미국의 버락 오바마 전 대통령이 부러워했을 정도이다. 그러나 치명적인 약점은 진료비의 65% 정도만 보장한다는 점이다. 나머지는 환자가 부담한다. 건강보험이 되는 급여 진료비의 법정 본인부담금(대개 20~60%)과 건보가 적용되지 않는 비급여 진료비이다. 비급여 진료비는 병원·의원별로 천차만별이다. 실손보험에 가입했더라도 다 해결하지 못한다.

백내장 다초점렌즈 3배 차이

정부 조사 결과를 보면 의원급 의료기관에서 많이 하는 비급여 진료는 폐렴구균 치료와 대상포진 예방접종, 치과위원의 레진 충전과 크라운, 한의원의 경혈약침술과 추나요법 등이다. 의원보다 규모가 큰 병원급에서는 1인실 병실료, 도수치료가 있다. 게다가 가격 편차가 심하다. 도수치료는 중간 정도에 해당하는 비용이 10만 원, 최고가 28만 원이다. 백내장 시술에 쓰이는 다초점렌즈는 3.1배 차이 난다. 하이푸시술·비밸브 재건술·하지정맥류 수술 등도 가격 차이가 큰 편이다.

비급여 진료는 급여 진료보다 의학적 필요성이 매우 낮다. 그래서 건강보험을 적용하지 않는다. 그렇긴 하지만 완전히 필요 없는 건 아니어서 비급여 형태로 허용돼 있다. 비급여 진료 비용은 병원이 정하기 나름이다. 정부가 관여하지 않는다. 대만 같은 나라는 정부가 상한선을 정해 주는데, 한국은 자유 시장에 맡겨져 있다.

심평원이 623개 비급여 공개

의료기관에 가기 전에 비용을 미리 알 수 있으면 선택에 도움이 된다. 건강보험심사평가원 홈페이지를 활용하면 된다. 홈페이지에 '비급여 진료비 정보' 탭을 클릭하면 된다. 여기에는 의원급 의료기관 6만 6552개, 이보다 큰 의료기관 4010개의 비급여 정보가 들어 있다(2024년 6월 기준). 국내 의료기관의 97%이니 거의 다라고 봐도 무방하다. 진료 행위, 치료 재료, 각종 증명서 수수료 등 623개 항목의 비용을 담았다.

도수치료의 예를 보자. '비급여 진료비 정보' 탭을 누르면 메뉴 바에 '비급여 진료비용 정보'가 나온다. 병원이나 의원의 이름을 입력하면 세부 정보가 나온다. 이름을 모르면 지역으로 검색할 수 있다. 가령 서울 중구에 있는 의원급의 도수치료를 검색하면 38개 의원이 나온다. '세부'를 누르면 도수치료 비용이 나온다. 서울 중구의 의원급 의료기관의 도수치료 중간 금액이 표기돼 있어 비교할 수 있다.

• 비급여 진료비 항목

상급병실료, 검체·병리 검사료, 기능검사료, 내시경·천자 및 생검료, 초음파, 영상진단 및 방사선 치료료, MRI, 주사료, 물리치료, 정신요법료, 처치 및 수술료, 모발이식술료, 시력교정술료, 치과, 한방 등



접종·라식·모발이식도 공개

몇 개 의원의 도수치료비를 한눈에 비교할 수도 있다. 검색 조건을 '서울 중구+의원+도수치료'로 하면 38개 의원 리스트가 나오는데, 원하는 곳을 찍어서 '선택 결과 담기-담은 결과 확인'을 클릭하면 된다. 10개 의원을 찍었다면 도수치료 최저 금액과 최고 금액이 죽 나온다. 필자가 임의로 해 보니 쉽게 비교할 수 있게 돼 있다.

예방접종을 맞을 때도 유용하게 활용할 수 있다. 가령 대상포진 백신이라면 주사약의 종류에 따라 가격이 죽 나온다. 같은 약을 비교해서 선택하면 된다.

라식·모발이식 수술 같은 비교적 고가의 행위도 비교할 수 있다. 2025년 3월 현재, 서울 중구 기준으로 라식 수술을 검색해 보면 세 군데 의원이 나와 있는데, 시술비가 120만 원, 139만 원, 200만 원으로 차이가 있다. 이 외 수도·수막구균·독감·사람유두종바이러스감염증(HPV백신)·일본뇌염·폐렴구균 등 다양한 백신의 가격을 비교해서 선택하면 된다.

성기능장애평가·영유아발달검사·수면리듬양상검사 등의 각종 기능 검사료도 알 수 있다. 상급종합병원의 MRI 검사비 같은 것도 같은 방식으로 비교할 수 있다. 척추·머리 등 부위별로 자세히 나와 있다.

치과위원과 병원의 진료는 거의 대부분이 비급여이다. 광중합형 복합 레진 충전, 치석 제거, 금·레진·세라믹을 사용하는 충전 치료뿐만 아니라 임플란트 시술비를 비교해서 확인할 수 있다.

검색한 의료기관 '기관 정보'를 누르면 주소·지도·전화번호 같은 기본 정보가 나온다. 또 의사 수, 전문 과목별 의사 수, CT·초음파 진단기 등의 장비 현황 등이 나온다. 우울증 외래진료 평가 등급, 난임시술 평가 결과도 볼 수 있다. '더보기' 탭을 누르면 고혈압·당뇨병·천식 등의 진료의 질 평가 정보가 나온다.

심평원 앱으로 편리하게 이용

건강보험심사평가원 모바일 앱(건강e음)에서도 찾을 수 있다. 방법은 PC 방식과 같다.

의료법에 따라 의료기관은 비급여 진료비를 알리게 돼 있다. 병원 홈페이지에 게시하거나 책자·인쇄물·메뉴판·벽보 형태로 알려야 한다. 또 의료기관이 비급여 진료를 하려면 의사·간호사 등이 치료 계획을 세울 때나 처방할 때 환자에게 사전에 설명해야 한다. 비급여 항목, 예상 비용, 비급여 진료의 필요성 등을 설명한다. 비슷한 항목의 급여 진료가 있으면 장단점을 비교해서 설명하게 돼 있다. 다만 수술·수혈·전신마취 등이 지체돼 환자 생명이 위협해질 수 있는 경우에는 진료 후에도 가능하다. 설명 의무를 위반하면 시정 명령을 받게 된다.



봄철 알레르기 항히스타민제

김성환 서울대학교병원 약제부 의약정보파트장



봄이 오면 따뜻한 날씨와 함께 꽃가루, 미세먼지 때문에 재채기, 콧물, 코막힘, 눈 가려움 등으로 고생하는 사람들이 늘어난다. 항히스타민제는 이런 증상을 완화시키는 데 효과적인 치료제이다.

알레르기 유발 물질, 알레르겐

알레르겐은 면역 체계가 과민 반응을 일으키는 물질을 말한다. 일반적으로는 무해하지만, 특정한 사람들에게는 위해 요소로 작용한다. 알레르겐에 노출되면 면역 체계가 이를 위협적인 요소로 인식하고 히스타민 등의 화학 물질을 분비하여 알레르기 증상을 유발한다. 음식(우유, 계란, 땅콩, 해산물 등)과 꽃가루, 집먼지진드기, 반려동물의 털과 비듬, 곰팡이 포자, 바퀴벌레 분비물 등이 대표적인 알레르겐이다.

항히스타민제의 올바른 사용법과 주의 사항

알레르기 반응은 면역계가 특정 물질(알레르겐)에 과민하게 반응하면서 발생하는 염증 반응이다. 정상적인 면역계는 몸에 해로운 병원체에만 대응해 방어하지만, 알레르기 환자의 면역계는 병원체가 아닌 꽃가루나 먼지에도 과민 반응을 보인다. 이 과정에서 면역세포인 비만세포(Mast Cell)가 활성화되며, 히스타민을 비롯한 염증 매개 물질을 분비한다.

히스타민은 혈관을 확장시키고 점막을 부풀게 하여 코막힘, 콧물, 재채기 등의 증상을 유발한다. 또한 신경을 자극하여 가려움증과 통증을 일으키기도 한다. 이러한 면역 반응이 코에서 발생하

면 알레르기 비염, 피부에서 발생하면 두드러기, 기관지에서 발생하면 천식으로 이어질 수 있다.

항히스타민제(Antihistamines)는 알레르기 반응을 유발하는 히스타민의 작용을 차단하여 증상을 완화하는 약물이다. 계절성 알레르기 비염뿐 아니라 피부 가려움증, 두드러기, 알레르기성 결막염 치료 등에 쓰인다.

항히스타민제는 1세대와 2세대로 나뉜다. 1세대 항히스타민제는 약효가 빠르게 나타나지만 약효 지속 시간이 짧아 여러 번 투여해야 한다. 반면 체내 반감기는 길어서 졸음이나 기억력 저하 등 중추신경계에 대한 작용은 지속되는 경향이 있다. 따라서 운전이나 집중이 필요한 작업을 할 때 위험이 따르므로 특별히 주의해야 한다. 또한 항콜린성 효과로 인해 구강 건조, 변비 등의 부작용이 발생할 수 있다.

2세대 항히스타민제는 혈액-뇌 장벽을 통과하지 않아 졸음 등 중추신경계 부작용이 적고 약효가 오래 지속되어 하루 한 번 복용으로도 증상이 완화된다. 하지만 개인에 따라서는 졸음이 발생할 수 있으므로 역시 주의가 필요하다.

대다수의 항히스타민제는 임부, 수유부 및 6세 미만 소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다. 따라서 임부나 6세 미만 소아가 항히스타민제 복용이 필요할 경우, 전문가와 상의 후 적절한 의약품을 추천받아 복용하도록 한다. 또한 일부 성분은 모유를 통해 전달될 수 있으므로 수유 중인 여성은 항히스타민제 복용을 피하는 것이 좋다.

항히스타민제 중복 복용 주의

항히스타민제는 장기간 사용 시 내성이 나타나 효과가 감소할 수 있으며, 변비 및 소화 장애, 구강 건조와 갈증 등 부작용은 심해질 수 있으므로 알레르기 증상 완화 목적으로 단기간 사용하고 장기 복용은 피하는 것이 좋다. 또한 간이나 신장 기능이 저하된 환자는 부작용이 심해질 수 있으므로 복용 전 반드시 의료진과 상담해야 한다.

구분	대표적인 약물	특징
1세대 항히스타민제	클로르페니라민(chlorpheniramine) 디펜히드라민(diphenhydramine) 히드록시진(hydroxyzine)	효과 빠르고 강함 지속시간 짧음 졸음 부작용이 심함
2세대 항히스타민제	세티리진(cetirizine) 로라타딘(loratadine) 레보세티리진(levocetirizine) 펙소페나딘(fexofenadine)	약효 지속시간이 길고 졸음 부작용이 적음

일반 감기약에도 항히스타민제가 포함된 경우가 있어 함께 복용하면 부작용이 증가할 수 있다. 항히스타민제는 공통적으로 히스타민 수용체(H1)를 막는 기전으로 작동하고, 두 가지 또는 그 이상의 약제를 복용해도 효과가 비례해서 증가한다는 뚜렷한 근거가 없다. 또 과량 사용 시 중추신경계 억제 및 녹내장, 전립선 비대 등 부작용이 증가할 수 있으므로, 먹고 있는 감기약 성분을 잘 확인하여 두 가지 이상의 약을 같이 복용하지 말아야 한다.

한편 항히스타민제만으로 증상 조절이 충분하지 않을 경우, 국소 적용이 가능한 스테로이드 비강문무제제나 안약 등을 추가하는 것이 효과적일 수 있으므로 전문가와 상담을 하는 것이 좋다. 항히스타민제를 항우울제 등 중추신경 억제 약물이나 알코올 등과 함께 섭취할 경우 진정 작용이 심해질 수 있으므로, 역시 병용하는 것은 피해야 한다. 또 어지러움, 구강 건조, 위장 장애, 두통, 심박수 변화 등이 나타날 수 있는데, 심한 경우 즉시 복용을 중단하고 전문가와 상담한다.

음식과의 상호 작용 및 보관 방법

2세대 항히스타민제 중 펙소페나딘의 경우 음식과 상호 작용이 큰 것으로 보고되어 있다. 자몽, 오렌지, 사과주스 등 과일주스는 위산도에 영향을 주어 약 흡수를 방해하고 약효를 저하시키므로 펙소페나딘 복용 전후로 먹지 않도록 주의한다.

보관 방법도 알아 두자. 항히스타민제는 직사광선을 피하고 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 하는 것은 상식이지만, 감각 잊기 쉬우니 주의하자. 다른 용기에 바꾸어 보관하는 것은 사고의 원인이 되며, 약효 유지에도 바람직하지 않으므로 원래의 용기에 그대로 담아 사용한다. 유통 기한이 지난 약물은 가까운 약국의 ‘폐의약품 수거함’에 버려 환경 오염을 방지해야 한다.

항히스타민제는 올바르게 사용하면 봄철 알레르기 증상을 효과적으로 완화할 수 있다. 본인에게 맞는 약물을 선택하고, 사용 시 주의 사항을 잘 지켜 건강한 봄을 보내시기 바란다.

공공주택과 공공장소에서의 펫티켓



이후장 경상국립대학교 수의과대학 교수

반려동물을 키울 때 지켜야 할 예절

최근 반려동물 양육 가구 증가로 아파트와 같은 공공주택과 공원 등 공공장소에서의 ‘펫티켓’ 실천이 더욱 중요해졌다. 펫티켓은 ‘반려동물(pet)’과 ‘에티켓(etiquette)’의 합성어로, 반려동물과 함께할 때 지켜야 하는 공공 예절을 뜻하는 말이다. 반려인과 비반려인이 서로를 존중하며, 공공장소에서 안전하고 쾌적하게 공존하기 위해 필요한 행동 수칙을 포함한다.

반려인의 법률적 의무

「공동주택관리법(제20조)」에서, 공동주택 거주자는 공동생활에 필요한 질서 준수 의무를 규정하고 있으며, ‘공동주택관리법 시행령(제19조 2항)’ 관리 규약 준칙에서는 반려동물 사육 시 관리 주체의 동의를 받도록 하고 있다. 또한 과도한 반려동물 소음은 민원 대상이며 지자체 규정에 따라 과태료가 부과될 수도 있으나, 「소음·진동 관리법」에서 소음은 “사람의 활동으로 인하여 발생하는 강한 소리”라고 규정돼 있어 반려동물이 내는 소리는 법적으로 규제할 근거가 없다.

한편 소음 유발 요건과 상관없이 ‘동물보호법 시행령’에 따라 반려견은 의무 등록 대상이며, 미등록 시 1차 20만 원, 2차 40만 원, 3차 60만 원의 과태료가 부과된다. 또한 「동물보호법」에서는 공공장소에서 반려견에 목줄을 착용시키지 않을 경우 과태료를 부과한다고 명시하고 있다. 또 「도로교통법」 제39조 제5항에 따르면 모든 차의 운전자는 영유아나 동물을 안고 운전 장치를 조작하거나 운전석 주위에 물건을 싣는 등 안전에 지장을 줄 수 있는 우려가 있는 상태로 운전해서는 안 된다고 규정하고 있어서, 반려동물을 안고 운전하는 것 역시 불법이다.

공공주택에서의 펫티켓

• 반려동물 소음

반려동물이 내는 소음은 이웃 갈등의 주요 원인이 되고 있으며, 점차적으로 증가하는 추세이다. KB금융그룹의 ‘2021년 한국반려동물 보고서’에 따르면, 반려동물을 양육하며 타인과 분쟁을 경험한 반려인이 절반을 넘었고, 그중 소음으로 인한 분쟁이 30.8%로 가장 많았다고 한다. 따라서 충분한 운동과 놀이를 통해 반려견의 스트레스를 해소해 줄 필요가 있으며, 심할 경우에는 짖음 방지 교육을 하는 것이 좋다.



• 공용공간에서의 주의

엘리베이터나 복도 등 공용 공간에서는 반려견을 직접 안거나 목줄의 목덜미 부분 또는 가슴줄의 손잡이 부분을 짧게 잡는 등 반려동물이 이동할 수 없도록 하여 이웃 주민들에게 위협감을 주지 않도록 주의해야 한다.

• 배설물 처리

간혹 반려견의 배변 봉투가 설치되어 있는 공공주택도 있지만 대부분 그렇지 않기 때문에 미리 준비해 반려견이 아파트 단지나 단지 밖에서 배변하는 경우 배변을 즉시 수거하고 산책하는 것이 중요하다.

공공장소에서의 펫티켓

사실상 모든 반려동물이 마찬가지이지만, 특히 「동물보호법」에서는 사람을 공격해 상해를 입힐 수 있는 가능성이 있는 맹견은 입마개를 해야 한다고 규정하고 있다. 입마개가 필수인 맹견은 도사견, 아메리칸 핏불테리어, 아메리칸 스탠퍼드셔 테리어, 스탠퍼드셔 불테리어, 로트와일러 등 5종이다.

이 밖에도 다음과 같은 공공 예절을 준수해야 한다.

• 동물등록 및 인식표 착용

동물보호법에 따라 생후 2개월 이상의 반려견은 내장형 전자칩, 외장형 무선장치, 등록인식표 중 하나를 선택하여 동물병원 등에서 등록해야 한다. 동물등록은 유기 또는 잃어버리는 반려동물 증가가 사회적 문제로 이어지는 것을 방지하고자 시행하고 있는 제도이다. 반려견과 외출 시에는 주인의 이름, 연락처, 동물등록번호 등이 표시된 인식표를 착용하는 것이 좋다. 반려견과 야외 활동 중에는 잠깐 사이에도 예측 불허의 상황이 초래되기 쉬우므로, 반려견 인식표를 착용하여 이러한 상황에 대비할 필요가 있다.

• 목줄 착용

공공장소에서 반려견의 목줄 착용은 모두의 안전을 위해 필수이다. 산책 시 자칫하면 반려견을 잃어버리는 사태가 발생할 수 있고, 반려견을 무서워하는 사람들이 존재할 수 있기 때문에 안전 조치의 일환으로 목줄을 착용시켜야 한다.

• 배설물 처리

공공주택과 마찬가지로 공원이나 산책로 등 같은 공공장소에서도 반려견의 배설물은 바로 배변 봉투에 담아 바로 처리해야 한다. 반려동물의 배설물을 바로 처리하지 않으면 악취가 날 뿐 아니라 벌레가 꼬이게 되고, 미관상으로도 좋지 않으므로 뒤처리를 깔끔하게 할 필요가 있다.

함께 만드는 반려동물 문화

펫티켓은 단순한 예절의 범위를 넘어 현재는 법으로 제정하고 있으며, 공공장소에서 반려동물의 행동을 규제할 뿐 아니라 예절을 준수하도록 많은 캠페인이 진행되고 있다. 펫티켓은 단순한 규칙이 아닌 공동체에 대한 존중의 표현이다. 법과 예절을 함께 실천함으로써 반려인과 비반려인 모두가 행복한 사회를 만들 수 있다. 펫티켓 실천을 통해 반려동물과 사람들이 함께 어우러지는 건강한 공동체 문화를 만들어 가도록 하자.

알아 두면 유용한 식품인증마크

방형애 대한보건협회 기획실장



식품 포장에는 제품의 품질을 보증하는 다양한 인증마크가 있다. 대부분 간단한 도안 형태로 표시되어 있는데, 조금만 관심을 기울이면 쉽게 찾을 수 있다. 인증마크는 식품의 원료, 생산, 제조, 유통의 전 과정뿐만 아니라 생산 이전 단계의 토양 관리와 농약 사용 등에 관한 여러 정보를 담고 있다.

식품안전관리인증 기준(HACCP, 해썹)

HACCP 마크가 있는 식품은 믿고 먹을 수 있을 만큼 위생적인 환경에서 제조된 식품이라고 볼 수 있다. 미국 항공우주국 나사(NASA)에서 우주식량을 만들 때 위생 공정으로 적용했던 것인데, 현재는 국제적으로 확립된 식품안전관리로 일반화되었다. 위해 요소 분석(Hazard Analysis)과 중요 관리점(Critical Control Point)을 뜻하는 HACCP는 식품의 원재료부터 제조, 가공, 유통, 조리 단계까지 모든 과정에서 발생할 수 있는 위해 요소를 분석하고 중요한 위해를 예방하고 제거해 식품의 안전성을 확보한 위생 관리 시스템을 인증하는 제도이다.

도축장, 집유장, 농장, 사료제조업체는 농림축산식품부에서 말고, 제조가공업과 판매영업장은 식약처에서 관리한다. 특히 '안전관리통합인증' 황금색 마크는 가축의 사육 단계부터 축산물의 처리, 가공, 유통, 판매의 모든 과정에서 HACCP 인증이 적용되었을 때만 받을 수 있다. 즉 농장에서 식탁까지 안전성이 더 강화된 제품임을 보증하는 표시이다. 스마트HACCP은 해썹과 관련한 데이터 수집, 관리, 분석 등이 자동화되어 실시간 모니터링과 개선 조치가 가능한 시스템에서 생산된 제품을 의미한다.

농산물우수관리(GAP, 갱)

농산물을 고를 때 안전성을 확보하기 위한 제도이다. 일부 채소, 과일에서 농약이 과다 검출 되거나 김치에서 발생한 기생충란 사건 등으로 농산물 안전에 대한 우려가 급증해 국내 농산물에 대한 안전성 강화 차원에서 2006년부터 GAP(Good Agricultural Practices) 인증을 시행하고 있다. 농산물은 재배, 수확, 포장, 유통, 판매 등의 과정에서 각종 농약, 유해 미생물과 중금속 등에 노출될 수 있는데, 이를 종합적으로 관리해 기준에 부합한 농산물과 농가만 해당 마크를 받을 수 있다. 즉 최종 농산물에 위해 요소가 없거나 기준치 이하로 관리된 농산물임을 인증하는 제도다. 특히 농산물에 잔류할 수 있는 농약, 중금속, 잔류성 유기 오염 물질 또는 유해 생물만 관리하는 것이 아니라 작물이 재배되는 농경지 및 농업용수 등의 농업 환경까지 관리한다. 토양 오염으로 인한 중금속이나 수경재배용수 등의 안전성을 확인하고 싶으면 GAP 인증 제품을 고르면 된다.



친환경농산물(유기농, 무농약)

친환경 농산물은 합성 농약, 화학 비료, 항생제 및 항균제를 사용하지 않거나, 사용을 최소화한 농산물을 보증하는 마크로 엄격한 인증을 거쳐야 한다. 국가별로 유기농 인증 기준과 표시는 다르다. 예를 들어 미국농무부(USDA) 유기농 인증을 받은 제품은 정부 간 협약에 의해 우리나라에서도 모두 유기농으로 판매가 가능하다.

우리나라의 유기농(또는 유기농산물)은 최소 3년 동안 합성 농약이나 화학 비료를 사용하지 않고 오직 퇴비와 같은 유기질 비료만을 사용한 토양에서 재배된 농산물을 인증하는 것이다. 무농약 인증은 합성 농약은 전혀 쓰지 않았지만 화학 비료를 권장량의 1/3 이하 소량만 사용한 농산물이다. 친환경 농산물은 생산 과정에서 병충해를 입기 쉽고 세균 등의 미생물 오염으로 인한 식중독 위험이 있으므로 꼼꼼히 세척해서 섭취해야 한다. 수입 유기농산물은 현지에서 유기농으로 재배됐어도 유통 과정에서 보존제 등을 썼을 수도 있다.



친환경축산물(무항생제, 유기축산물)

우유나 버터, 고기, 계란 등을 고를 때 유용하다. 축산식품의 무항생제 인증마크는 항생제, 합성 항균제, 생산성 촉진을 위한 성장 촉진제나 호르몬제가 포함되지 않은 사료로 사육된 축산물에 부여되는 인증이다. 먹이는 사료에 따라 유기 축산물, 무항생제 축산물로 나뉜다. 가축에게 사료까지 유기농을 먹인 경우는 유기 축산물로 인증을 받을 수 있다. 이 인증은 2007년부터 운영되고 있으며, 소비자들에게 더 안전한 축산물을 선택할 수 있는 기준을 제공한다.



유기가공식품

유기가공식품은 유기농산물, 유기축산물을 재료로 하여 제조·가공한 식품을 말한다. 유기가공식품을 만들기 위해서 가공 과정에서도 합성 첨가물을 사용하지 않았음을 보증한다. 인증마크가 없어도 95% 이상 유기농 원료를 사용한 가공식품은 제품명에 '유기'라고 표시할 수 있다. 하지만 원료가 유기농이라도 제조 과정에서 식품 첨가물을 사용하는 제품도 있으므로, 포장 뒷면에 표기된 식품 첨가물을 확인해야 한다.



기타 식품 관련 인증

'동물복지'나 '동물복지 축산농장'은 동물을 협소한 공간 대신 쾌적한 환경에서 높은 수준의 동물 복지 기준에 따라 인도적으로 사육하는 환경을 갖춘 사육장을 국가에서 인증하는 제도이다. 예를 들어 계란의 난각번호를 보면 사육 환경을 알 수 있는데, 마지막 숫자가 1번은 방사 사육, 2번은 축사나 개방형 케이지 내 사육, 3번은 개선된 케이지 내 사육, 4번은 기존의 좁은 케이지 내 사육을 나타낸다. 계란 외에 돼지, 육계, 소(한우·육우·젖소), 염소, 오리 농장에 대해서도 인증을 한다. 또한 '지리적 표시' 인증마크는 농수산물 및 가공품의 명성, 품질 등의 특징이 오랜 기간 특정 지역의 지리적 특성에 근거하거나 관련이 있는 경우, 그 지역에서 생산된 특산품임을 보증한다. 이천쌀, 보성녹차 등이 있다.

이처럼 식품 안전을 위한 여러 인증 제도가 있지만 실제로 인증마크를 받은 식품도 식중독이나 이물 등의 문제가 발생해 신뢰를 떨어뜨리기도 한다. 하지만 먹거리에 대한 안전성을 염두에 두고 식품을 고를 때는 인증마크를 기준으로 삼으면 최소한의 안전이나 위생을 보장받을 수 있다.

속독·속필은 자랑할 만한 일인가

정명교 문학평론가·연세대학교 명예교수



예전에 어느 대기업 총수가 “세상은 넓고 할 일은 많다.”라는 말을 유행시킨 적이 있다. 이 말투를 빌려서 “책은 많고 읽을 시간은 없다.”라는 한탄의 뉘즈리를 중얼거리곤 했었다. 요즘 세대도 그런지 모르겠으나 필자의 세대까지는 책을 소장하는 걸 주식 사 모으는 것보다 더 좋아했었고, 서재를 넘어 거실에까지, 심지어 안방에까지 책을 쌓아 놓고 살기 일쑤였다. 내 친구 고 홍정선 교수는 넘치는 책을 관리하고자 아파트를 따로 구입하기도 하였다.

그렇다고 이 많은 책을 다 읽을 수는 없었다. 손에서 책이 떨어지지 않았다고 빠기는 오만을 감히 부려 보기도 했지만, 실상 가진 책의 1할도 읽지 못했다는 것이 정직한 토로일 것이다. 그러는 동안에 내내 강박적으로 집착하는 건 읽지 못한 책에 대한 미안함이었고, 그것들을 한꺼번에 읽어 내기 위해 필요한 속독에 대한 갈망이었다. ‘대각선 읽기’를 비롯해, 이른바 속독법 책에서 가르치는 별의별 수법들을 활용해 봤지만 효과는 별무였다. 두꺼운 장편소설을 한두 시간 만에 읽었다고 자랑하는 사람이 간혹 주변에서 으스스대면 한없이 부럽기만 했다.

필자의 경험으로 판단컨대 속독의 능력을 가진 독자는 두 부류로 대별된다.

하나는 결론을 미리 정해 놓고 읽은 사람들이다. 그런 독자는 대체로 자신이 읽고 싶은 것만 찾아 읽는다. 재빨리 페이지를 넘기면서 마음에 맞는 내용이 있으면 밑줄을 치고 그렇지 않은 것들은 바로 외면한다. 밑줄

은 나중에 다양한 용도로 활용된다. 이런 독서는 매우 실용적이다. 그러나 이런 독서는 독자의 인격을 드높이지 않는다. 그를 항상 그 자리에 머물게 하면서 자기에 대한 자랑을 무성케 하고 처세술을 발달시킨다. 그런 활용법의 하나가 속독을 속필로 전환하는 것이다. 재빨리 읽은 걸 재빨리 요약해서 아직 안 읽은 사람들에게 일종의 해답과 교훈을 베풀고 만족을 느낀다. 은혜를 입은 독자는 정답을 얻었으니, 그 책을 읽을 필요를 결코 느끼지 않게 된다.

한편 어렸을 때부터 독서를 일상화해 온 사람들이 있다. 이런 독자들은 축적된 교양이 광범위한 배경을 이루면서 지금 읽는 책의 문장들에 곧바로 의미의 전류를 부여한다. 빨리 읽는 게 자연스러운 것이다. 필자의 스승인 고 김현 선생님의 속독은 필자가 직접 경이롭게 목격한 바 있다. 두꺼운 안경을 쓴 눈을 책에 바투 붙이고 페이지들을 5초 간격으로 쓱쓱 넘기시는 걸 보았었다. 너무 신기해서 여쭈어보았다. 선생님의 대답이 바로 그랬다. 어렸을 때부터 책을 닥치는 대로 읽다 보니 저절로 그렇게 되었다는 것이었다.

하지만 김현 선생님은 곰곰이 음미해 볼 필요가 있는 책들은 아주 느리게 읽을 걸 권유하시곤 했었다. 가령 그이는 이렇게 썼다.

내가 그 재미를 많이 없애 버렸을 이 책은 천천히 느릿느릿 게으르게 읽어야 한다. 그래야 이 책의 진짜 맛을 완전히 맛볼 수가 있다. 이 책은 한 페이지쯤 읽다가 한두 시간 꿈꾸고, 다시 한 페이지쯤 읽다가 한두 시간 꿈꾸는 식으로 읽어야 할 책이다. 이 책에서 지식을 찾아서는 안 된다. 이 책에서는 즐거움을 찾아야 한다.

-『몽상의 시학』 역자 후기

김현 선생의 몽상형 글 읽기는 책의 핵심에 대한 정확한 포착과 그를 바탕으로 한 창의적인 글쓰기로 이어졌다. 가령 청년기의 화제작이었던 「김춘수와 시적 변용」은 다음과 같은 문장으로 시작한다.

김춘수는 서성거리고 있다. 그것이 그의 매력이다. 그는 끊임없이 여기저기를 기웃거린다. 이렇게 한곳에 정착하지 않고 서성거리고 있다는 점에서 그는 생성의 시인이다

대학생 시절, “김춘수는 서성거리고 있다.”라는 알송달송하면서도 호기심에 몸 달게 만드는 이 첫마디에서 비평의 매력을 물씬 느꼈다(필자 말고도 비평가 한순미도 비슷한 고백을 했었다). 그리고 이는 단순히 멋진 표현에 머무는 게 아니었다. 그 표현은 김춘수가 “생성의 시인”이라는 파악에 근거한 것으로, 6.25의 폐허 위에서 다시 태어났으나 모든 것이 빈한했던 한국인의 절실한 ‘탐구’의 자세를 선명히 가리키는 것이다.

책을 꼼꼼히 천천히 읽어야 하는 가장 중요한 이유는 책에는 정답이 없다는 의미심장한 책의 본성에 연결된다. 책은 답을 가르치는 도구가 아니다. 책의 가장 중요한 기능은 세계에 대한 질문을 일으키는 것이다. 책의 내용은 마중물 같은 것이다. 그 물이 더 큰 물에 대한 호기심을 불러일으키면, 독자는 세상을 제 나름으로 가능하고 그 세상을 향한 탐구를 개시한다. 그는 자신에게 영감을 준 책을 보닛 안에 넣고 탐구의 여정을 떠난다. 혹은 독자는 궁금증을 확장시키기 위해 다른 책을 향해 손을 뻗게도 된다.

그러니 적게 읽더라도 책의 밀도를 진하게 흡입하는 것이 좋은 태도다. 그것이 책에 창조적으로 감염되는 방식이다. 물론 그것은 못 읽은 책에 대한 조갈증을 해결하지는 못한다. 필자는 아주 오랜 세월이 지나서야 그 문제는 다른 차원에서 해결해야 한다는 깨달음을 얻었다. 그건 속독·속필과는 무관한 것이다.

한강의 봄 선유도공원

©사진제공(신영내)-서울의 공원

서울 한강 위에 떠 있는 작은 섬, 선유도공원은 걷기 좋은 길을 따라 자연과 조화를 이루는 특별한 공간이다. 과거 정수장이었던 이곳은 재생 건축을 통해 아름다운 공원으로 탈바꿈하였으며, 역사와 자연이 공존하는 매력을 품고 있다.

공원의 산책로는 한강을 따라 이어지는 데크길과 초록빛으로 둘러싸인 오솔길이 조화를 이루어, 걷는 내내 색다른 풍경을 선사한다. 특히 '수질정화원'과 '시간의 정원'을 지나며 옛 정수장의 흔적을 감상할 수 있고, '수생식물원'에서는 다양한 수생식물이 만들어 내는 고요한 분위기를 느낄 수 있다.

한강을 배경으로 펼쳐진 '전망데크'에 오르면 강변 풍경이 한눈에 들어오며, 해 질 무렵이면 노을이 물든 강물 위로 파스한 빛이 퍼지는 장관을 만날 수 있다. 공원의 곳곳에는 쉼터와 벤치가 마련되어 있어 천천히 걸다 쉬어 가기에 좋다.

선유도공원으로 가는 방법은 여러 가지가 있지만 추천하고 싶은 코스는 서울 지하철 2호선 당산역을 이용하는 것이다. 당산역 4번 출구로 나가면 한강까지 기하학적으로 조성된 데크길이 있는데, 국회의사당을 비롯해 여의도 원경을 즐기면서 걷기 좋다. 다만 데크가 끝나는 곳에서 공원까지 가는 길이 살짝 복잡하니 앱 지도를 이용하자.

선유도공원은 계절마다 다른 매력을 뽐내지만 봄날의 생동감이 잘 느껴지는 곳이다. 누구나 부담 없이 걸을 수 있는 길이 조성되어 있어 도심 속에서 자연을 만끽하기에 안성맞춤이다. 조용한 산책을 즐기거나 사진을 남기기에 좋은 이곳에서 계절 속으로 걸음을 내디뎌 보는 것은 어떨까.




장수의 비밀 사소하지만 강력한 습관

김희룡 일러스트 작가

사람들이 장수하는 마을을 자세히 들여다보면, 지역도 인종도 종교도 제각각이다. 그런데 공통적으로 비슷한 점이 있다. 섬유질 위주의 식단, 배가 부르지 않을 정도의 소식, 일상에서 부지런히 몸을 움직이는 것, 낙천적인 성격과 신앙, 가족이나 주변과 잘 어울리는 것 등등이다. 사소한 요소들이지만, 일상에서 실천하면 건강과 장수에 유익하다.



세계 최고의 장수촌 5곳(블루존)에 사는 사람들의 공통된 습관



식사는 섬유질이 많은 통곡물과 과채류, 견과류




스트레스는 장수의 적,
낙천적인 사람이 평균 11~15% 더 장수



일상 속 자연스러운 운동



외로움은 우울증과 불안 유발,
심혈관계 질환 위험률 30%↑



- 서울특별시 영등포구 선유로 343
- 서울의 공원
- 02-2631-9367

대한보건협회 前 경남지부장 김장락 교수 신간 출판
30년 예방의학 교수가 알려 주는 우리 시대 건강 이야기



대한보건협회 경남지부장과 대한예방의학회 회장 등을 역임한 김장락 교수(경상국립대학교 의과대학)가 정년 퇴임을 앞두고 예방의학자의 시각에서 건강에 관한 이야기를 담은 『건강한 삶 행복한 사회』를 발간했다. 이 책은 개인이 건강하게 오래 살기 위해 무엇이 필요한지 밝히고, 다 함께 건강하고 행복한 사회를 만들기 위해 국가가 나아갈 방향을 제안한다.

• 김장락 지음 | 한국지식문화원 | 24,000원

2025년도 보건의날 기념
제50회 보건학종합학술대회 행사 안내

행사 일시: 2025년 5월 15일(목) ~ 5월 16일(금)
행사 장소: aT센터(서울 서초구 강남대로 27)
등록 기간: 2025년 3월 1일(토) ~ 5월 9일(금)
학생연구경연 및 포스터발표 초록 접수: 2025년 3월 1일(토) ~ 4월 16일(수)
참여 학회: 전국공공보건의료지원단 및 11개 회원 학회

• 1일차 프로그램: 5월 15일(목)

장소	그랜드홀 (501)	창조룸- I (401)	창조룸- II (402)	세계로룸- I (301)	세계로룸- II (302)	세계로룸-III(303)
시간						
09:00~12:00	전국공공보건 의료지원단 (09:00~17:00)	등록 및 포스터 게시				
13:00~14:00		개회식 (창조룸- I 401)				
14:00~17:00		학생연구경연 발표 (14:00~17:00)	전국공공보건의료지원단 (12:00~14:00) 포스터 발표 심사위원회 (14:00~17:00)	한국일차보건 의료학회 (14:00~16:30)	대한검역학회 (14:00~17:00)	대한금연학회 (13:00~17:00)

• 2일차 프로그램: 5월 16일(금)

장소	그랜드홀 (501)	창조룸-Ⅰ (401)	창조룸-Ⅱ (402)	세계로룸-Ⅰ (301)	세계로룸-Ⅱ (302)	세계로룸-Ⅲ(303)	미래로룸-Ⅰ (304)
시간							
09:00~10:00	등록						
10:00~12:00		전국공공보건 의료지원단 (09:00~12:00)	포스터 발표 및 학생연구경연 시상식 (10:00~12:00)	한국학교·지역 보건교육학회 (09:30~13:00)	보건의료 산업학회 (10:00~16:00)	한국보건 사회학회 (10:00~12:00)	
13:00~17:00	한국역학회 (14:00~17:00)	한국보건교육 건강증진학회 (13:00~17:00)	국제보건 의료학회 (12:30~17:00)	한국보건 간호학회 (13:00~17:00)			알코올과 건강행동학회 (14:00~17:00)
17:00	폐 회						

회원 가입 및 기부·후원 안내

대한보건협회의 국민건강증진 활동을 위해
회원으로 가입해 주신 분과 기부자님께
매달 《더 행복한 건강생활》을 우편으로 보내 드립니다.

회비안내

- 일반 정회원
입회비 1만 원 | 연회비 3만 원
- 학생 회원
입회비 1만 원 | 연회비 1만 원
- 학생 회원은 학부·석사·박사생 포함 | 입회비는 협회 처음 가입 시 1회만 납부
- 건강생활 회원
연회비 10만 원
- 건강생활 회원께는 <종합건강검진> 비용 할인 혜택을 드립니다.
- 평생 회원
45세 이하 70만 원 | 46세~65세 50만 원 | 66세 이상 30만 원
- 회비 납부 계좌
신한은행 140-009-956012(예금주: 대한보건협회)

기부·후원 안내

▪ 회관건립기금 또는 협회 고유목적사업(학술대회 개최 등)을 위해
기부·후원을 희망하시는 분은 아래 이메일 또는 전화로 연락 주십시오.

✉ kpha0125@daum.net ☎ 02-921-9520

상대의 마음을 여는 최고의 기술,
누구를 대하더라도 자신의 윗사람처럼 대하라.

- 괴테 -



《더 행복한 건강생활》
QR코드를 통해
웹진으로 즐겨 보세요.