


Chương 1. HÀM SỐ NHIỀU BIẾN SỐ



Bài 1. Khái niệm cơ bản

Bài 2. Đạo hàm riêng – Vi phân

Bài 3. Cực trị của hàm hai biến số

Chương 1. HÀM SỐ NHIỀU BIẾN SỐ



Bài 1. Khái niệm cơ bản



1.1. Các định nghĩa


1.2. Giới hạn của hàm hai biến số

1.3. Hàm số liên tục

Bài 1. Khái niệm cơ bản

1.1. Các định nghĩa


a) Miền phẳng



Bài 1. Khái niệm cơ bản


Điểm trong

Điểm ngoài



Bài 1. Khái niệm cơ bản


Miền đóng



$$\bar{D} = D \cup \partial D$$

Bài 1. Khái niệm cơ bản


Miền mở



$$D = \bar{D} \setminus \partial D$$


Bài 1. Khái niệm cơ bản

Miền đa liên




Bài 1. Khái niệm cơ bản

Miền liên thông




Bài 1. Khái niệm cơ bản

Miền không liên thông




Bài 1. Khái niệm cơ bản

b) lân cận của một điểm trong mặt phẳng



$$M \in S(M_0, \epsilon) \Leftrightarrow d(M, M_0) < \epsilon$$

Bài 1. Khái niệm cơ bản



$$M(x, y) \in H(M_0, \epsilon) \Leftrightarrow \begin{cases} |x - x_0| < \epsilon \\ |y - y_0| < \epsilon \end{cases}$$

Bài 1. Khái niệm cơ bản

d) Hàm số hai biến số

$$f : D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$


$$(x, y) \in D \mapsto z = f(x, y) \in \mathbb{R}.$$

- Tập $D \subset \mathbb{R}^2$ được gọi là miền xác định (MXĐ) của hàm số $f(x, y)$, ký hiệu là D_f .

$$D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) \in \mathbb{R}\}$$


Bài 1. Khái niệm cơ bản

- $z = f(x, y)$ được gọi là giá trị của hàm số tại (x, y) .



Bài 1. Khái niệm cơ bản

Đồ thị của hàm số $z = f(x, y)$



$$S = \{(x, y, f(M)) \mid M(x, y) \in D\}$$

Bài 1. Khái niệm cơ bản

VD 1

- Hàm số $f(x, y) = 3x^2y - \cos xy$ có $D_f = \mathbb{R}^2$.
- Hàm số $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ có MXĐ là hình tròn đóng tâm $O(0; 0)$, bán kính $R = 2$.

$$\begin{aligned} \text{Vì } M(x, y) \in D_z &\Leftrightarrow 4 - x^2 - y^2 \geq 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 + y^2 \leq 4. \end{aligned}$$


Bài 1. Khái niệm cơ bản

- Hàm số $z = \ln(4 - x^2 - y^2)$ có MXĐ là hình tròn mở tâm $O(0; 0)$, bán kính $R = 2$.

$$\begin{aligned} \text{Vì } M(x, y) \in D_z &\Leftrightarrow 4 - x^2 - y^2 > 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 + y^2 < 4. \end{aligned}$$

Bài 1. Khái niệm cơ bản


- Hàm số $z = f(x, y) = \ln(2x + y - 3)$ có MXĐ là nửa mp mở có biên $d : 2x + y - 3 = 0$, không chứa O .



Bài 1. Khái niệm cơ bản

1.2. Giới hạn của hàm số hai biến số

a) Điểm tụ



VD. $O(0, 0)$ là điểm tụ của dãy điểm $M_n \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2} \right)$.

Bài 1. Khái niệm cơ bản

b) Định nghĩa giới hạn kép (giới hạn bội)

- Điểm $M_0(x_0, y_0)$ được gọi là giới hạn của dãy điểm $M_n(x_n, y_n)$, $n = 1, 2, \dots$ nếu $M_0(x_0, y_0)$ là điểm tụ **duy nhất** của dãy.

Ký hiệu là:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = M_0 \text{ hay } M_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} M_0.$$

Bài 1. Khái niệm cơ bản


- Hàm số $f(x, y)$ có giới hạn là $L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ khi

$$M_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} M_0 \text{ nếu } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n, y_n) = L.$$


$$\text{Ký hiệu là } L = \lim_{M \rightarrow M_0} f(M)$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y).$$

Bài 1. Khái niệm cơ bản



Bài 1. Khái niệm cơ bản



Bài 1. Khái niệm cơ bản

VD 2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} \frac{2x^2y - 3x - 1}{xy^2 + 3} = -\frac{3}{2}.$

2.3 Một số phương pháp tìm giới hạn hàm hai biến

Phương pháp 1: Đặt ẩn phụ, đưa về tính giới hạn hàm một biến


Ví dụ 2.3.1. Tính giới hạn $l = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{4 - \sqrt{xy + 16}}$.

Đặt $t = xy$. Khi $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ thì $t \rightarrow 0$. Do đó

$$l = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{4 - \sqrt{t + 16}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(4 + \sqrt{t + 16})}{(4 - \sqrt{t + 16})(4 + \sqrt{t + 16})} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(4 + \sqrt{t + 16})}{-t} = -8.$$

Bài 1. Khái niệm cơ bản

Nhận xét



Bài 1. Khái niệm cơ bản

VD 4. Tìm $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$.

Giải. Đặt $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, ta có:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\sin r^2}{r^2} = 1.$$

2.3 Một số phương pháp tìm giới hạn hàm hai biến

Phương pháp 2: Sử dụng giới hạn kẹp bằng cách đánh giá bất đẳng thức

Định lí 2.3.1 (Giới hạn kẹp). *Giả sử $f(x, y)$, $g(x, y)$ và $h(x, y)$ xác định trong lân cận V của điểm (x_0, y_0) thỏa mãn hai điều kiện*

1. $h(x, y) \leq f(x, y) \leq g(x, y)$ với mọi (x, y) thuộc lân cận V .

2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} h(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x, y) = l.$

Khi đó

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = l.$$

Bài 1. Khái niệm cơ bản

VD 3. Tìm $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$, $f(x,y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$.

Giải.

$$0 \leq |f(x,y)| = \frac{|xy|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{|xy|}{\sqrt{y^2}} = |x| \xrightarrow[y \rightarrow 0]{x \rightarrow 0} 0.$$

$$\text{Vậy } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0.$$

Ví dụ 2.3.2. Tính giới hạn $l = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}$.

Với $(x, y) \neq (0, 0)$, ta có

$$0 \leq \left| \frac{xy^2}{x^2 + y^2} \right| \leq \left| \frac{xy^2}{y^2} \right| = |x|.$$

Mặt khác $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x| = 0$, do đó $l = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} = 0$.

2.3 Một số phương pháp tìm giới hạn hàm hai biến

Phương pháp 3: Chứng minh hàm không tồn tại giới hạn

Ví dụ 2.3.3. Xét hàm hai biến xác định bởi

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}; \quad (x, y) \neq (0, 0)$$

Hai dãy $u_k = (\frac{1}{k}, \frac{1}{k}) \rightarrow (0, 0)$ và $v_k = (\frac{2}{k}, \frac{1}{k}) \rightarrow (0, 0)$ khi $k \rightarrow \infty$, nhưng ta có

$$f(u_k) = f\left(\frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right) = \frac{\frac{1}{k^2}}{\frac{1}{k^2} + \frac{1}{k^2}} = \frac{1}{2} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2}$$

$$f(v_k) = f\left(\frac{2}{k}, \frac{1}{k}\right) = \frac{\frac{2}{k^2}}{\frac{4}{k^2} + \frac{1}{k^2}} = \frac{2}{5} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \frac{2}{5}$$

Vậy hàm f không tồn tại giới hạn khi $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.

Bài 1. Khái niệm cơ bản

VD 5. Cho hàm số $f(x, y) = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$.

Chúng tỏ rằng $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ không tồn tại.

Giải. Đặt $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, ta có:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2 \sin 2\varphi}{r^2} = \sin 2\varphi.$$

Do giới hạn phụ thuộc vào φ nên không duy nhất.

Vậy $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ không tồn tại.

Bài 1. Khái niệm cơ bản

c) Giới hạn lặp

Giới hạn theo từng biến khi dãy điểm $M_n(x_n, y_n)$ dần đến M_0 của $f(x, y)$ được gọi là **giới hạn lặp**.

- Khi $x \rightarrow x_0$ trước, $y \rightarrow y_0$ sau thì ta viết

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$$

- Khi $y \rightarrow y_0$ trước, $x \rightarrow x_0$ sau thì ta viết

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$$

Giới hạn lặp

Ví dụ:

$$\text{Xét hàm số } z=f(x,y)=\frac{\sin x(\cos y+1)}{1+x^2+y^2}.$$

Tìm $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x,y)$ và $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x,y)$.

$\forall y \neq 0$ ta có $\lim_{x \rightarrow 0} f(x,y) = 0$, suy ra $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x,y) = 0$.

Mặt khác $\forall x \neq 0$, $\lim_{y \rightarrow 0} f(x,y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin x(\cos y+1)}{1+x^2+y^2} = \frac{2\sin x}{1+x^2}$ suy ra:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin x}{1+x^2} = 0.$$

Ta thấy trong trường hợp này hai giới hạn lặp tồn tại và bằng nhau.

Bài 1. Khái niệm cơ bản

VD 6. Xét hàm số $f(x, y) = \frac{\sin x^2 - \sin y^2}{x^2 + y^2}$.

Ta có:

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-\sin y^2}{y^2} = -1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{x^2} = 1.$$

$$\text{Vậy } \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) \neq \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y).$$

Quan hệ giữa giới hạn theo tập hợp các biến và các giới hạn lặp

Định lý 2.5.1. Cho hàm $z = f(x, y)$ xác định trên tập hợp D và (x_0, y_0) là điểm tụ của D . Giả sử tồn tại giới hạn $l = \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$. Khi đó nếu tồn tại giới hạn lặp nào của hàm số tại (x_0, y_0) thì giới hạn đó cũng bằng l .

Chú ý

- Nếu $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) \neq \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ thì không tồn tại $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$.
- Sự tồn tại giới hạn lặp **không kéo theo** sự tồn tại của giới hạn bội.

Quan hệ giữa giới hạn theo tập hợp các biến và các giới hạn lặp

Ví dụ Xét hàm số $f(x,y) = \frac{x-y}{x+y}$.

Ta thấy $\lim_{x \rightarrow 0} f(x,y) = -1 \Rightarrow \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x,y) = -1$ và $\lim_{y \rightarrow 0} f(x,y) = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x,y) = 1$.

Bây giờ ta xét giới hạn $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$.

Trước hết ta thấy $(x_n, y_n) = (\frac{1}{n}, 0) \rightarrow (0, 0)$ khi $n \rightarrow +\infty$ thì $f(\frac{1}{n}, 0) \rightarrow 1$ khi $n \rightarrow +\infty$.

Mặt khác dãy $(x'_n, y'_n) = (0, \frac{1}{n}) \rightarrow (0, 0)$ khi $n \rightarrow +\infty$, nhưng $f(0, \frac{1}{n}) \rightarrow -1$. Vậy giới hạn theo tập hợp các biến $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ không tồn tại.

Quan hệ giữa giới hạn theo tập hợp các biến và các giới hạn lặp

Ví dụ Cho hàm $f(x,y)=(x+y)\sin\frac{1}{xy}$.

Do $\forall x,y \neq 0, 0 \leq \left| (x+y)\sin\frac{1}{xy} \right| \leq |x+y| \leq |x|+|y| \rightarrow 0$ khi $(x,y) \rightarrow (0,0)$.

Suy ra $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)=0$. Tuy nhiên dễ dàng thấy rằng cả hai giới hạn lặp đều không tồn tại.

Bài 1. Khái niệm cơ bản

1.3. Hàm số liên tục

- Hàm số $f(x, y)$ liên tục tại $M_0(x_0, y_0) \in D \subset \mathbb{R}^2$ nếu

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

- Hàm số $f(x, y)$ liên tục trên tập $D \subset \mathbb{R}^2$ nếu nó liên tục tại mọi điểm thuộc D .

Bài 1. Khái niệm cơ bản

Chú ý

Hàm số $f(x, y)$ liên tục trên miền đóng ***giới nội*** D thì nó đạt giá trị lớn nhất (max) và nhỏ nhất (min) trên D .

Bài 1. Khái niệm cơ bản

VD 7. Xét sự liên tục của $f(x, y) = \frac{\sin x^2 - \sin y^2}{x^2 + y^2}$.

Giải

- Với $(x, y) \neq (0, 0)$ thì hàm số $f(x, y)$ xác định nên liên tục.
- Tại $(0, 0)$ thì $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ không tồn tại.

Vậy hàm số $f(x, y)$ liên tục trên $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Ví dụ 3.1.1. Xét tính liên tục của hàm số

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} & \text{nếu } x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & \text{nếu } x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

Hàm số $f(x, y)$ liên tục tại mọi $(x, y) \neq (0, 0)$ vì hàm số này là thương của hai hàm số liên tục và mẫu số khác 0. Do đó ta chỉ cần xét tính liên tục tại điểm $(0, 0)$. Theo Ví dụ 2.3.2, ta có

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} = 0 = f(0, 0).$$

Vậy hàm số $f(x, y)$ liên tục tại $(0, 0)$, do đó hàm số đã cho liên tục.

Ví dụ 3.1.2: Trong \mathbb{R}^2 xét hàm số $f(x,y)$ được xác định bởi:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|xy|}}{x^2 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & , (x,y) = (0,0) \end{cases}.$$

Ta thấy dãy $(x_n, y_n) = (\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) \rightarrow (0,0)$ khi $n \rightarrow +\infty$ nhưng $f(x_n, y_n) = \frac{n}{2} \rightarrow +\infty$ khi $n \rightarrow +\infty$. Vậy hàm số không liên tục tại điểm $(0,0)$.
