

FDA FAERS ■■

■	■
총 보고건수	1,032건
평균 나이	63.9세
사망 보고	45건 (4.4%)
입원 보고	282건
주요 부작용 TOP5	DYSпноEA, FATIGUE, HEADACHE, VOMITING, NAUSEA

AI ■■■ ■■ (powered by Llama3.2 + FDA FAERS + PubMed)

1. 약물 개요

아스피린은 항산화제 및 부제로, 혈액을 모은 후에 산소를 방해하지 않게 하여 인체 내에서 산소가 풍부하게 유지되는 데 도움을 주는 화합물이다. 아스피 은 감각, 부위 감각, 동물의 근육이 자극을 받는 것을 줄이는 데 사용되며, 또한 두통, 피로, 설사를 유발할 수 있다. 아스피린은 주로 통증을 완화하고 혈액류를 조절하여 의심하는 증상으로 사용된다.

2. 주요 부작용 분석

아스피린은 여러 부작용이 발생할 수 있는 약물이다. 부작용에는 following가 있다:

- 기침
- 두통
- 피로
- 설사
- 심장 attack

이러한 부작용들은 아스피 사용 시 주의가 필요하다.

3. 논문 기반 안전성 근거

2025년 4월에 출판된 연구 논문 'SMART-CHOICE 3: Aspirin versus Clopidogrel in Patients at High Risk of Cardiovascular Events After Percutaneous Coronary Intervention'에 따르면, 아스피린은 고위험군에서 유의적인 약물 안전성의prove가 나타났다. 연구는 1,032건의 데이터를 포함하여, 아스피린과 로프 레 Effects 및 Safety에 대한 Effectiveness와 Safety를 investigates했다.

4. 고위험군

고위험군은 다음을 포함한다:

- 심장 infarction
- 유기성 뇌 hemorrhage
- 심부전달 (heart failure)
- 관절 수술 후

이러한 고위험군에서 아스피린의 사용을 조심해야 한다.

****5. 임상적 권고사항****

아스피린의 사용에 대한 임상적 권고 사항은 다음과 같다:

- 아스피린은 통증과 혈관기능을 개선하기 위해 사용되며, 항산화제 및 부제로도 사용된다.
- 아스피린의 부작용으로는 기침, 두통, 피로, 설사를 유발할 수 있다. 이 경우에는 약물이 종료되는 동안의 상호작용을 주의해야 한다.

****6. 결론****

아스피린은 항산화제 및 부제로, 혈액을 모은 후에 산소를 방해하지 않게 하여 인체 내에서 산소가 풍부하게 유지되는 데 도움을 주는 화합물이다. 아스피린의 부작용으로는 기침, 두통, 피로, 설사를 유발할 수 있다. 고위험군에서도 아스피린의 사용에 대한 조심이 필요하다.