

서울 N성형외과의원

서울특별시 강남구 OO대로 000, N빌딩 5층 · 대표전화 02-000-0000

문서번호 N외과-안내-2026-0417

배부일 2026. 08. 03.

수술 후 주의사항 안내문

비성형술(윤비술) 환자용 · 본 안내문은 수술일(당일)을 0일차 기준으로 작성되었습니다

성명	사도 유이	등록번호	NR-2608-0417	수술일	2026. 08. 03.
수술명	비성형술(윤비술) — 실리콘 보형물 삽입 및 자가진피 비주 연장술				

본 안내문은 수술 후 회복 과정에서 지켜야 할 사항을 안내하기 위해 작성되었습니다. 안내된 일정과 관계없이 출혈이 멈추지 않거나, 고열, 심한 통증, 호흡곤란 등의 증상이 있는 경우 즉시 본 원으로 연락하거나 응급실을 방문하시기 바랍니다. (12번 항목 참조)

1. 절개부 소독 및 상처 관리

실밥 제거 전까지(수술 후 1~7일) 멸균거즈에 생리식염수를 적셔 소독 후 항생제 연고를 도포합니다. 1~2일 간격으로 시행하며, 코 안쪽은 생리식염수로 세척하되 코를 풀거나 세계 흡입하지 않습니다(수술 후 3주까지, 1일 3회 권장). 부목 제거 후(수술 후 8일)부터 3주간은 취침 시 압박 테이핑을 유지합니다.

2. 부기·멍 관리

수술 후 3일까지 냉찜질(1일 4회)을 시행하고, 4일째부터 10일째까지는 미지근한 온찜질(1일 2회)로 전환합니다. 4일 이후 찜질은 뜨겁지 않은 온도를 유지합니다.

3. 수면 자세

수술 후 4주간은 머리를 심장보다 높게(상체 45도) 유지하고 취침하며, 옆으로 눕거나 엎드려 자지 않습니다. 부기 조절과 보형물 위치 유지에 직결되는 항목이므로 각별히 주의합니다.

4. 세안·샤워·화장

수술 후 0~7일	금지	부목 부위 세안 금지 — 물티슈로만 닦을 것
수술 후 8일~	가능	비주 실밥 제거 다음날부터 코 부위 세수 및 기초화장 가능
수술 후 14일~	가능	색조화장 가능 (클렌징 시 문지르지 않을 것)

5. 운동 및 일상 활동

수술 후 1일~	가능	가벼운 일상생활 및 짧은 보행 (혈전 예방 목적, 1일 3회 권장)
수술 후 0~14일	금지	운동 금지 — 혈압 상승 시 부기·출혈 재발 위험
수술 후 15~28일	주의	가벼운 산책, 스트레칭까지만 가능
수술 후 29일~	가능	일반 운동 가능. 단, 접촉 스포츠는 90일 이후 권장

6. 음주·흡연

수술 후 4주간 음주 및 흡연을 금합니다. 특히 흡연은 니코틴에 의한 모세혈관 수축으로 이식 조직의 혈류 공급을 저해하여 상처 치유를 현저히 지연시키므로 반드시 준수합니다.

7. 안경 착용 / 코 마사지·코팩

수술 후 0~28일	금지	안경·선글라스 착용 금지 (콧대 압박)
수술 후 29~60일	주의	짧은 시간만 착용, 코반침 자극 발생 시 즉시 제거
수술 후 61일~	가능	일반 착용 권장
수술 후 0~56일	금지	코 마사지 및 코팩 금지
수술 후 57일~	가능	세게 누르지 않는 범위에서 가능

8. 코 풀기 및 재채기

수술 후 4주간 코를 풀지 않습니다. 재채기가 나올 경우 입을 벌린 상태로 하며, 콧속이 답답한 경우 생리식염수로 세척하여 흘려보냅니다.

9. 항공기 탑승 (귀국 항공편 포함)

수술 후 0~10일	금지	기내 기압 변화로 인한 출혈 위험 — 탑승 금지
수술 후 11~21일	주의	탑승 가능하나 기내 수분 섭취 및 2시간 간격 기내 보행 필수
수술 후 22일~	가능	제한 없음

환자가 제출한 귀국 예정일: 2026. 08. 17. (수술 후 14일) — 상기 "주의" 구간에 해당하므로 사전 안내가 시행됨.

10. 사우나·온천

수술 후 0~28일	금지	고온 노출 시 혈관 확장으로 인한 부기 재발
수술 후 29~90일	주의	짧은 시간, 미지근한 온도로만 이용
수술 후 91일~	가능	제한 없음

11. 복약 안내

구분	복용기간	용법
항생제 (세프카렘피복실)	수술 후 0~5일 (6일분)	1일 3회, 식후 30분, 처방 기간 전체 복용
소염진통제 (록소프로펜)	수술 후 0~5일 (6일분)	1일 3회, 식후
지혈·항염효소제 (트라넥삼산)	수술 후 0~5일 (6일분)	1일 3회, 식후
위장관보호제 (레바미피드)	수술 후 0~5일 (6일분)	1일 3회, 식후
돌발통증 시 (아세트아미노펜)	수술 후 0~3일 (필요 시)	통증 심할 때, 최대 1일 4회 (4시간 간격)

상세 성분·용량은 처방전(환자 보관용 사본)을 참고하십시오.

12. 내원 일정 및 경과 이벤트

경과일	내용	구분
수술 후 5일	부목 제거	내원 필요
수술 후 7일	비주 실밥 제거	내원 필요
수술 후 30일	경과 진찰	원격 진료 가능
수술 후 120일	회복 프로그램 종료 기준일	-

응급 연락처 안내 — 지혈되지 않는 출혈, 38.5℃ 이상의 고열, 급격한 통증 악화, 시야 이상, 호흡곤란이 있는 경우 안내된 일정과 관계없이 즉시 아래로 연락하거나 가까운 응급실을 방문하십시오.

본원 국제진료팀 02-000-0000 (평일 09:00~18:00) · 야간·주말 응급 연락처 02-000-0002

교육 시행자(간호사) 서명

환자 확인 서명

본 문서는 데모/프로토타입 목적의 샘플 서식입니다. 실제 의료기관이 발급한 공식 안내문이 아니며, 실제 처방·일정은 담당 의료진의 진료 기록을 우선합니다.