

一、 单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

CBBCA BDBCB

二、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. 3

2. $\left(1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)^T$

3. -5

4. $\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$

5. 2

三、计算题（共 55 分）

1. （15 分）

解：该二次型对应的对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ （1 分），

由 $|A - \lambda E| = 0$ 求得特征值 $\lambda_1 = 8, \lambda_2 = \lambda_3 = -1$.（2 分）

7. (1) 当 $\lambda_1 = 8$ 时，解方程 $(A - 8E)x = 0$,

$$A - 8E = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 4 \\ 2 & -8 & 2 \\ 4 & 2 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

解得基础解系 $\eta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ，单位化得 $p_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = -1$ 时，解方程 $(A + E)x = 0$,

$$A + E = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

解得基础解系 $\eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$. 将 η_2, η_3 正交化得

$$\xi_2 = \eta_2, \quad \xi_3 = \eta_3 - \frac{[\eta_3, \xi_2]}{[\xi_2, \xi_2]} \xi_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 2 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

将 ξ_2, ξ_3 单位化得

$$p_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad p_3 = \frac{\sqrt{2}}{3} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 2 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

因此正交矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

(2) 利用(1)中的正交矩阵 P , 作正交变换 $x = Py$, 则二次型化为 $f = 8y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

2. (12 分)

解: (1) 设 A 的属于特征值 3 的特征向量为

$$\alpha_3 = (x_1, x_2, x_3)^T.$$

因为实对称矩阵属于不同特征值的特征向量相互正交, 所以有

$$\alpha_1^T \alpha_3 = 0 \quad \text{和} \quad \alpha_2^T \alpha_3 = 0.$$

即 x_1, x_2, x_3 是齐次线性方程组 2分

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

的非零解, 解上述方程组, 得其基础解系为 $(1, 0, 1)^T$. 因此 A 的属于特征值 3 的特征向量为

2分 $k(1, 0, 1)^T$, k 为任意非零常数.

(2) 令 $P = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 则有 1分

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad \text{即} \quad A = P \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} P^{-1}. \quad \text{1分}$$

由于

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad \text{4分}$$

所以

$$A = P \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} P^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 13 & -2 & 5 \\ -2 & 10 & 2 \\ 5 & 2 & 13 \end{bmatrix}. \quad \text{2分}$$

(2) 解法 2: 先把各特征向量单位化 (3 分)

$$p_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad p_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad p_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

再得到正交矩阵 $P = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & 1 & \sqrt{3} \\ -\sqrt{2} & -2 & 0 \\ \sqrt{2} & -1 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$ (1 分),

利用 $P^{-1} = P^T = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & -\sqrt{2} & \sqrt{2} \\ 1 & -2 & -1 \\ \sqrt{3} & 0 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$ (1 分),

又 $\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ (1 分),

可得 $A = P\Lambda P^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 13 & -2 & 5 \\ -2 & 10 & 2 \\ 5 & 2 & 13 \end{pmatrix}$. (2 分)

3. (8 分)

$$\text{解: } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 7 & 2 \\ 4 & 2 & 14 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (3 \text{ 分})$$

向量组的秩为 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$, (1 分)

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 为一个极大线性无关组 (2 分), 且 $\alpha_3 = 3\alpha_1 + \alpha_2$. (2 分)

或者 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 为一个极大线性无关组 (2 分), 且 $\alpha_2 = -3\alpha_1 + \alpha_3$. (2 分)

4. (10 分)

$$\text{解: } \tilde{A} = (A|b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & m+2 & 4 & n+2 \\ 3 & 5 & 1 & m+8 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & m+1 & 0 & n-1 \\ 0 & 0 & 0 & m+1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (3 \text{ 分})$$

当 $m \neq -1$ 时, 方程组有唯一解; (1 分)

当 $m = -1, n \neq 1$ 时, 方程组无解; (1 分)

当 $m = -1, n = 1$ 时, 方程组有无穷多解, (1 分) 此时通解为

$$\mathbf{x} = (0, 1, 0, 0)^T + k_1(-2, 1, 1, 0)^T + k_2(1, -2, 0, 1)^T, k_1, k_2 \text{ 为任意常数. (4 分)}$$

5. (10 分)

$$\text{解: 由 } |A| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & a \\ 0 & a & 3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 3 & a \\ a & 3 \end{vmatrix} = 2(9 - a^2) = 1 \times 2 \times 5, \text{ 得 } a^2 = 4, a = 2. \quad (3 \text{ 分})$$

$$\lambda E - A = \begin{pmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 3 & -2 \\ 0 & -2 & \lambda - 3 \end{pmatrix}.$$

对于 $\lambda_1 = 1$, 解 $(\lambda E - A)x = 0$:

$$\lambda E - A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = -x_3 \\ x_3 = x_3 \end{cases}, \text{ 取 } p_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad (2 \text{ 分})$$

对于 $\lambda_2 = 2$, 解 $(\lambda E - A)x = 0$:

$$\lambda E - A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} x_1 = x_1 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}, \text{ 取 } p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad (2 \text{ 分})$$

对于 $\lambda_3 = 5$, 解 $(\lambda E - A)x = 0$:

$$\lambda E - A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = x_3 \\ x_3 = x_3 \end{cases}, \text{取 } p_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{令 } P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1 \text{ 分}), \text{ 则 } P \text{ 是可逆矩阵, 使 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

四、 证明题 (每题 5 分, 共 10 分)

1. 设 A 为 n 阶正交矩阵, 且 $|A| = -1$, 证明: $-E - A$ 不可逆。

证: $A^T A = E$,

$$|-E - A| = |-A^T A - A| = |-A^T - E||A| = -|(-A - E)^T| = -|-A - E|,$$

$$|-E - A| = 0,$$

所以 $-E - A$ 不可逆。

2. 设矩阵 A 为 n 阶正定矩阵, 证明: $|A + E| > 1$ 。

证法一 因为 $A + E$ 的特征值为 $\lambda_1 + 1, \lambda_2 + 1, \dots, \lambda_n + 1$. 则由 $\lambda_i > 0$, 知 $\lambda_i + 1 > 1$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 所以

$$|A + E| = (\lambda_1 + 1)(\lambda_2 + 1) \cdots (\lambda_n + 1) > 1.$$

证法二 由 A 正定知 A 必对称, 故存在正交阵 Q , 使得

$$A = Q\Lambda Q^T = Q \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} Q^T,$$

因此

$$\begin{aligned} |A + E| &= |Q\Lambda Q^T + E| = |Q\Lambda Q^T + QQ^T| \\ &= |Q| |A + E| |Q^T| = |A + E| \\ &= (\lambda_1 + 1)(\lambda_2 + 1) \cdots (\lambda_n + 1) > 1. \end{aligned}$$