

初等矩阵

初等矩阵由单位矩阵做一次初等变换得到：

- $E(i, j)$: 单位矩阵做 i, j 两行（列）互换
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$
- $E(i(k))$: 单位矩阵做第 i 行（列）乘 $k (\neq 0)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- $E(i, j(k))$: 单位矩阵做第 i 行加上第 j 行乘 k （第 j 列加上第 i 列乘 k ）

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

初等矩阵乘法效果

• $E(i, j)$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_3 & b_3 & c_3 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & c_1 & b_1 \\ a_2 & c_2 & b_2 \\ a_3 & c_3 & b_3 \end{bmatrix}$$

• $E(i(k))$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ 2a_2 & 2b_2 & 2c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & 2b_1 & c_1 \\ a_2 & 2b_2 & c_2 \\ a_3 & 2b_3 & c_3 \end{bmatrix}$$

• $E(i, j(k))$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 + 3a_3 & b_2 + 3b_3 & c_2 + 3c_3 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 + 3b_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 + 3b_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 + 3b_3 \end{bmatrix}$$

初等矩阵与初等变换

矩阵做一次初等变换等同于和一个初等矩阵相乘，左乘行变换，右乘列变换

思考

- 初等矩阵的行列式等于多少？初等矩阵的逆矩阵是什么？
- 利用初等矩阵解释矩阵变换的次序重要性
- 利用初等矩阵解释行列式最重要的三条性质

给定一个方阵 \mathbf{A} ，经过若干次初等变换化为等价标准形，即有

$$\mathbf{P}_k \mathbf{P}_{k-1} \cdots \mathbf{P}_2 \mathbf{P}_1 \mathbf{A} \mathbf{Q}_1 \mathbf{Q}_2 \cdots \mathbf{Q}_l = \begin{bmatrix} \mathbf{E}_r & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{bmatrix}$$

两边取行列式，可得：可逆矩阵的标准形是单位矩阵。于是，

$$\mathbf{P}_k \mathbf{P}_{k-1} \cdots \mathbf{P}_2 \mathbf{P}_1 \mathbf{A} = (\mathbf{Q}_1 \mathbf{Q}_2 \cdots \mathbf{Q}_l)^{-1}$$

进而，

$$\mathbf{Q}_1 \mathbf{Q}_2 \cdots \mathbf{Q}_l \mathbf{P}_k \mathbf{P}_{k-1} \cdots \mathbf{P}_2 \mathbf{P}_1 \mathbf{A} = \mathbf{E}$$

因此，

- 可逆矩阵的行最简形矩阵是单位矩阵
- 可逆矩阵可分解为有限个初等矩阵乘积

例 (1.6.6)

设 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$, 求 \mathbf{A}^{-1} , 并将 \mathbf{A} 表示为初等矩阵的乘积

解:

$$\begin{aligned} [\mathbf{A}, \mathbf{E}] &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

由于 $E(1,3(-2))E(1,2(-1))E(3(-1))E(3,2(-1))E(3,1(-3))E(2,1(-2))A = E$, 因此

$$A = E(2,1(2))E(3,1(3))E(3,2(1))E(3(-1))E(1,2(1))E(1,3(2))$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

解:

$$\begin{aligned} [A, E] &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & -2 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & -4 & 3 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & -3 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

由于 $\mathbf{E}(1,3)\mathbf{E}(2,1(-2))\mathbf{E}(3,1(1))\mathbf{E}(3,2(-1))\mathbf{E}(2,3(-2))\mathbf{E}(1,3(-1))\mathbf{E}(3,2(-1))\mathbf{A} = \mathbf{E}$, 因此

$$\mathbf{A} = \mathbf{E}(3,2(1))\mathbf{E}(1,3(1))\mathbf{E}(2,3(2))\mathbf{E}(3,2(1))\mathbf{E}(3,1(-1))\mathbf{E}(2,1(2))\mathbf{E}(1,3)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

LU分解

$$\begin{aligned} \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 6 \\ 2 & -3 & 5 & 0 & -1 & -7 \\ -4 & 6 & -8 & 3 & 1 & 2 \\ -8 & 12 & -15 & 7 & 1 & 3 \end{bmatrix} & \xrightarrow{\begin{matrix} r_2+r_1 \\ r_3-2r_1 \\ r_4-4r_1 \end{matrix}} \begin{bmatrix} -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & -21 \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{r_4-r_2} \begin{bmatrix} -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 & -20 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_4-2r_3} \begin{bmatrix} -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{U} \end{aligned}$$

则

$$\mathbf{E}(4, 3(-2))\mathbf{E}(4, 2(-1))\mathbf{E}(4, 1(-4))\mathbf{E}(3, 1(-2))\mathbf{E}(2, 1(1))\mathbf{A} = \mathbf{L}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{U}$$

$$L = E(2, 1(-1))E(3, 1(2))E(4, 1(4))E(4, 2(1))E(4, 3(2))$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

因此

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

第59页练习1.6:

A4, B2, B3