

Tính toán bất phương trình

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Inequality để giải bất phương trình bậc 2, 3, hoặc 4.

Quy trình chung để thực hiện tính toán bất phương trình


Ví dụ 1: Để giải $x^2 + 2x - 3 \geq 0$

1. Nhấn  , chọn biểu tượng ứng dụng Inequality, sau đó nhấn .

- Thao tác này sẽ hiển thị menu số bậc.



2. Chọn $[ax^2+bx+c]$, sau đó nhấn .




3. Trên menu xuất hiện, chọn kiểu và hướng cho dấu của bất phương trình ($>$, $<$, $\geq$, $\leq$).

- Ở đây chúng ta muốn giải $x^2 + 2x - 3 \geq 0$, chọn $[ax^2+bx+c \geq 0]$ và sau đó nhấn **(OK)**.


4. Trên Bộ soạn thảo hệ số xuất hiện, nhập các giá trị hệ số.

1 **(EXE)** 2 **(EXE)** **(↑)** **(-)** **(-)** 3 **(EXE)**



5. Nhấn **(EXE)**.

- Thao tác này sẽ hiển thị nghiệm.




- Để trở về Bộ soạn thảo hệ số trong khi nghiệm được hiển thị, nhấn **(←)**, **(AC)**, hoặc **(EXE)**.
- Thao tác nhấn **(←)** trong khi Bộ soạn thảo hệ số hiển thị sẽ làm trở về menu ở bước 2.

- Thao tác nhấn  trong khi menu ở bước 2 hiển thị sẽ làm trở về menu số bậc.

Lưu ý

- Các nghiệm được hiển thị như trong màn hình dưới đây khi không chọn MathI/MathO cho cài đặt Input/Output trên menu SETTINGS.



- "No Solution" xuất hiện trên màn hình nghiệm khi bất phương trình vô nghiệm (chẳng hạn như $x^2 < 0$).
- "All Real Numbers" xuất hiện trên màn hình nghiệm khi nghiệm của bất phương trình đều là số (chẳng hạn như $x^2 \geq 0$).