

- 问题：选取变换矩阵 Φ ，使得降维后的新向量在最小均方差条件下接近原来的向量 \mathbf{x}

对于 $\mathbf{x} = \sum_{j=1}^n a_j \boldsymbol{\varphi}_j$ ，现仅取 m 项，对略去的系数项用预先选定的常数 b 代替，此时对 \mathbf{x} 的估计值为：

$$\hat{\mathbf{x}} = \sum_{j=1}^m a_j \boldsymbol{\varphi}_j + \sum_{j=m+1}^n b \boldsymbol{\varphi}_j$$

则产生的误差为：

$$\Delta \mathbf{x} = \mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}} = \sum_{j=m+1}^n (a_j - b) \boldsymbol{\varphi}_j$$

则 $\Delta \mathbf{x}$ 的均方误差为：

$$\overline{\varepsilon^2} = E\{\|\Delta \mathbf{x}\|^2\} = \sum_{j=m+1}^n \{E(a_j - b)^2\}$$

要使 $\overline{\varepsilon^2}$ 最小，对 b 的选择应满足：

$$\frac{\partial}{\partial b} [E(a_j - b)^2] = \frac{\partial}{\partial b} [E(a_j^2 - 2a_j b + b^2)] = -2[E(a_j) - b] = 0$$

因此， $b = E[a_j]$ ，即对省略掉的 a 中的分量，应使用它们的数学期望来代替，此时的误差为：

$$\begin{aligned} \overline{\varepsilon^2} &= \sum_{j=m+1}^n E[(a_j - E\{a_j\})^2] = \sum_{j=m+1}^n \boldsymbol{\varphi}_j^T E[(\mathbf{x} - E\{\mathbf{x}\})(\mathbf{x} - E\{\mathbf{x}\})^T] \boldsymbol{\varphi}_j \\ &= \sum_{j=m+1}^n \boldsymbol{\varphi}_j^T \mathbf{C}_x \boldsymbol{\varphi}_j \end{aligned}$$

其中， \mathbf{C}_x 为 \mathbf{x} 的协方差矩阵， $\{\boldsymbol{\varphi}_j\}$ 是正交向量，由拉格朗日法可导出 $\boldsymbol{\varphi}_j$ 为 \mathbf{C}_x 的特征值。

设 λ_j 为 \mathbf{C}_x 的第 j 个特征值， $\boldsymbol{\varphi}_j$ 是与 λ_j 对应的特征向量，则

$$\mathbf{C}_x \boldsymbol{\varphi}_j = \lambda_j \boldsymbol{\varphi}_j$$

由于

$$\boldsymbol{\varphi}_j^T \boldsymbol{\varphi}_j = 1$$

从而

$$\boldsymbol{\varphi}_j^T \mathbf{C}_x \boldsymbol{\varphi}_j = \lambda_j$$

因此

$$\overline{\varepsilon^2} = \sum_{j=m+1}^n \boldsymbol{\varphi}_j^T \mathbf{C}_x \boldsymbol{\varphi}_j = \sum_{j=m+1}^n \lambda_j$$

由此可以看出， λ_j 值越小，误差也越小。