Tiro oblicuo: ecuaciones y trayectoria

Prof. Lamaita · octubre 2026

Deducciones por componentes, geometría, integración y eliminación del tiempo; práctica con Tracker.

Material elaborado por Prof. Lamaita, 2026. Licencia CC BY-NC-SA 4.0.

Un movimiento, dos componentes

Modelamos una pelota como partícula, con campo gravitatorio uniforme y sin aire. Elegimos x horizontal, y positivo hacia arriba y lanzamiento en $t = 0$. En ejemplos y ejercicios usá $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$ y medí el ángulo inicial θ desde la horizontal positiva hacia arriba. Para rapidez inicial v_0:

$$v_{0x} = v_0 \cos\theta, \qquad v_{0y} = v_0 \sin\theta.$$

La gravedad no tiene componente horizontal: $a_x = 0$, $a_y = -g$. El tiempo es el mismo para ambos movimientos; no se resuelven como dos lanzamientos independientes con relojes diferentes.

Recorrido intuitivo: MRU más MRUV

El avance horizontal es uniforme y el vertical tiene aceleración constante:

$$\boxed{x = x_0 + v_0 \cos\theta\, t},$$

$$\boxed{y = y_0 + v_0 \sin\theta\, t - \frac{1}{2} g t^2}.$$


Las velocidades son $v_x = v_0 \cos\theta$ y $v_y = v_0 \sin\theta - gt$. En la cima solo se anula la componente vertical: si $v_{0x} \neq 0$, la pelota sigue moviéndose.

Deducción de la parábola

Si $v_0 \cos\theta \neq 0$, despejamos $t = (x - x_0)/(v_0 \cos\theta)$ y sustituimos en $y(t)$:

$$\boxed{y - y_0 = (x - x_0)\tan\theta - \frac{g(x - x_0)^2}{2 v_0^2 \cos^2\theta}}.$$

Es una función cuadrática de x, por eso la trayectoria ideal es parabólica. Si el lanzamiento es vertical, no se puede hacer ese despeje: x permanece constante.



Trayectoria parabólica ilustrativa y componentes de velocidad.

Elaboración para Introducción a la Física. Modelos ilustrativos; no son mediciones experimentales.

Altura, tiempo y alcance

Con componente vertical inicial positiva, la cima ocurre cuando $v_y = 0$:

$$t_c = \frac{v_0 \sin\theta}{g}, \qquad H = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}.$$

Si aterriza a la misma altura, resolvemos $y - y_0 = 0$ y descartamos la raíz inicial:

$$T = \frac{2 v_0 \sin\theta}{g}.$$

Entonces $R = v_{0x} T$, y usando $2\sin\theta\cos\theta = \sin 2\theta$:

$$\boxed{R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}}.$$

Para $0 < \theta < 90°$, rapidez fija y alturas inicial y final iguales, el máximo alcance se da a $45°$ porque $\sin 2\theta \leq 1$. Si cambia la altura final o hay aire, esa conclusión no se aplica automáticamente.

Profundización analítica

Integramos las componentes de $d\vec{v}/dt = (0, -g)$ y luego las de $d\vec{r}/dt = \vec{v}$, usando las condiciones iniciales. Obtenemos exactamente las ecuaciones horarias anteriores.

La derivada de la trayectoria es:

$$\frac{dy}{dx} = \tan\theta - \frac{g(x - x_0)}{v_0^2 \cos^2\theta} = \frac{v_y}{v_x}.$$

Al anularla se recupera la posición horizontal de la cima. La segunda derivada es negativa y constante en este modelo. Para optimizar el alcance:

$$\frac{dR}{d\theta} = \frac{2 v_0^2}{g} \cos 2\theta = 0.$$

En el intervalo considerado resulta $\theta = \pi/4$, y la segunda derivada es negativa. Los ángulos se expresan en radianes al derivar funciones trigonométricas.

Ejemplo resuelto

Una pelota se lanza con rapidez $v_0 = 10\,\mathrm{m/s}$ y ángulo $\theta = 30^\circ$ sobre la horizontal; aterriza al mismo nivel del lanzamiento. **Calculá las componentes iniciales de velocidad, el tiempo de vuelo, la altura máxima ganada y el alcance horizontal**, bajo el modelo ideal de esta nota. Sus componentes iniciales son $(5\sqrt{3}, 5)\,\mathrm{m/s}$; $T = 1\,\mathrm{s}$, $H = 1{,}25\,\mathrm{m}$ y $R = 5\sqrt{3} \approx 8{,}66\,\mathrm{m}$.

Experiencia y Tracker

Filmá una pelota de costado con cámara fija y referencia de longitud en el plano del movimiento. Calibrá la escala y seguí su centro. Compará $x(t)$ con una recta y $y(t)$ con una parábola. Si ajustás $y = A + Bt + Ct^2$, interpretá $y_0 = A$, $v_{0y} = B$ y $a_y = 2C$, incluyendo unidades.

El ajuste evalúa el modelo; no mide una fuerza directamente ni obliga a que salga g exacto. Revisá escala, intervalo temporal, perspectiva y resistencia del aire. Conservá video, marcas originales y residuales. Consultá la guía de Tracker y la experiencia de movimiento.

Ejercicios

1. En $t = 0$ se lanza una pelota horizontalmente con rapidez $5\,\mathrm{m/s}$ desde una altura de $20\,\mathrm{m}$ sobre un suelo horizontal. Hallá el tiempo hasta el impacto y la distancia horizontal desde el punto de lanzamiento hasta el impacto.
2. Una pelota se lanza a $20\,\mathrm{m/s}$ formando 45° sobre la horizontal y aterriza al mismo nivel. Hallá su alcance horizontal y la altura máxima ganada respecto del lanzamiento.
3. Compará dos lanzamientos con la misma rapidez inicial no nula: uno a 30° y otro a 60° sobre la horizontal, ambos con llegada al nivel de partida. Determiná si tienen igual alcance y calculá las razones H_{60}/H_{30} y T_{60}/T_{30}. No necesitás conocer el valor de la rapidez inicial.

▼ **Resultados**

1. $t = 2\,\mathrm{s}$ y $R = 10\,\mathrm{m}$.
2. $R = 40\,\mathrm{m}$ y $H = 10\,\mathrm{m}$.
3. Tienen igual alcance. $H_{60}/H_{30} = 3$ y $T_{60}/T_{30} = \sqrt{3}$; no tienen igual altura máxima ni tiempo de vuelo.