# Calorimetría y balances térmicos

Prof. Lamaita · octubre 2026

*Origen de $Q = mc\Delta T$, capacidad calorífica, mezcla ideal y cambios de fase.*

Material elaborado por Prof. Lamaita, 2026. Licencia CC BY-NC-SA 4.0.

## Qué relacionamos

En un proceso definido, aportar energía por calor puede aumentar temperatura, cambiar de fase o producir otros cambios. No siempre hay una subida de temperatura.

## Recorrido intuitivo: masa, material y temperatura

Si no hay cambio de fase y el calor específico se mantiene aproximadamente constante, una masa mayor requiere proporcionalmente más energía para el mismo cambio de temperatura. Para una misma masa, un cambio de temperatura doble requiere el doble de energía en ese modelo:

$$\boxed{Q = mc(T_f - T_i)}.$$

El calor específico $c$ depende del material y de las condiciones del proceso. Sus unidades son $\mathrm{J/(kg\,K)}$. Si $Q$ se define positivo hacia el cuerpo, calentarlo da $Q > 0$ y enfriarlo da $Q < 0$ en este modelo.

## Profundización analítica: de la definición a la ecuación

Para un proceso especificado, definimos capacidad calorífica $C = \delta Q/dT$ y capacidad específica $c = C/m$. El símbolo $\delta Q$ recuerda que calor es transferencia y depende del proceso, no una función de estado almacenada.

Entonces:

$$\delta Q = mc(T)\,dT.$$

Integrando:

$$\boxed{Q = m\int_{T_i}^{T_f} c(T)\,dT}.$$

Si $c$ es constante, sale de la integral y obtenemos $Q = mc\Delta T$. Es una consecuencia de esa aproximación, no una ecuación universal para cualquier proceso. Para gases se distingue capacidad a presión constante de capacidad a volumen constante.

En un gráfico $c(T)$, el área multiplicada por masa da $Q$ para el proceso correspondiente. En un gráfico $Q$ frente a $T$ con $c$ constante, la pendiente es $mc$.

## Mezcla ideal: deducir la temperatura final

Si dos cuerpos intercambian solo calor entre ellos, sin pérdidas ni cambios de fase y sin capacidad calorífica relevante del recipiente:

$$Q_1 + Q_2 = 0.$$

Con calores específicos constantes:

$$m_1c_1(T_f - T_1) + m_2c_2(T_f - T_2) = 0.$$

Agrupamos $T_f$ y despejamos:

$$\boxed{T_f = \frac{m_1c_1T_1 + m_2c_2T_2}{m_1c_1 + m_2c_2}}.$$

Es una media ponderada por capacidades caloríficas. Solo es el promedio simple cuando ambas capacidades son iguales. Si el recipiente absorbe energía, hay que sumar su término.

## Ejemplo resuelto

Se mezclan idealmente $0{,}20\,\mathrm{kg}$ de agua a $80\,^\circ\mathrm{C}$ y $0{,}30\,\mathrm{kg}$ a $20\,^\circ\mathrm{C}$, suponiendo el mismo $c$ constante. El conjunto no intercambia energía con el exterior y la capacidad calorífica del recipiente es despreciable; no hay cambios de fase. **¿Cuál es la temperatura final de equilibrio?** Usamos el balance de calor de ambas masas:

$$T_f = \frac{0{,}20(80) + 0{,}30(20)}{0{,}50} = 44\,^\circ\mathrm{C}.$$

La temperatura final queda entre las iniciales. No se usa 50 °C por promediar temperaturas sin considerar las masas.

## Cambio de fase

Durante una transición ideal a temperatura y presión constantes, puede intercambiarse energía sin cambiar $T$. Se usa $Q = mL$, con $L$ calor latente específico del proceso. No se aplica $mc\Delta T$ a ese tramo para concluir que el calor es cero.

Si hay calentamiento, transición y nuevo calentamiento, se suman los tres aportes con sus datos y condiciones. Las magnitudes $c$ y $L$ no son iguales ni tienen las mismas unidades.

## Ejercicios

Usá $c = 4200\,\mathrm{J/(kg\,K)}$ como aproximación para el agua. En los ejercicios 1–3, suponé calor específico constante, ausencia de cambios de fase y de trabajo mecánico apreciable. En la mez-

cla, despreciá pérdidas al exterior y capacidad calorífica del recipiente.

1. ¿Qué calor recibe $0{,}50\,\mathrm{kg}$ de agua al subir $10\,\mathrm{K}$?
2. Un cuerpo de masa $2\,\mathrm{kg}$ y calor específico $c = 500\,\mathrm{J/(kg\,K)}$ recibe $3000\,\mathrm{J}$ por calor. Bajo las hipótesis indicadas, calculá el aumento de su temperatura en K.
3. Se ponen en contacto dos masas iguales de la misma sustancia, inicialmente a $10\,^{\circ}\mathrm{C}$ y $50\,^{\circ}\mathrm{C}$, dentro del recipiente ideal descrito. Calculá la temperatura final de equilibrio y explicá por qué no hace falta conocer el valor numérico de las masas.
4. Una muestra de masa $0{,}10\,\mathrm{kg}$ está a su temperatura de fusión. Su calor latente específico de fusión es $L_f = 200\,\mathrm{kJ/kg}$. Calculá el calor necesario para fundirla por completo a presión constante, sin elevar la temperatura y sin pérdidas al entorno.

▼ **Resultados**

1. $21\,000\,\mathrm{J}$.
2. $3\,\mathrm{K}$.
3. $30\,^{\circ}\mathrm{C}$ bajo las hipótesis indicadas.
4. $20\,\mathrm{kJ}$.