Arrastre (Drag)

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · junio 2026

Fuerza de arrastre, ecuación de drag, coeficiente de arrastre y velocidad terminal.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

Fuente: Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 354–357. Consultar el original (PDF).

Movimiento respecto del fluido

El **arrastre** es la componente de la fuerza que un fluido ejerce en sentido opuesto al movimiento relativo del cuerpo respecto de ese fluido. El fluido puede ser aire, agua u otro líquido o gas.

La velocidad relevante es:

$$\vec{v}_{\text{rel}} = \vec{v}_{\text{cuerpo}} - \vec{v}_{\text{fluido}}$$

Una bandera o un cartel quietos respecto del suelo pueden recibir arrastre si sopla viento. Un cuerpo que se mueve junto con el fluido puede tener velocidad relativa pequeña aunque ambos se desplacen respecto de la habitación.

> **Nota de adaptación** · En revisión
>
> **Origen del pasaje:** Frase abreviada del original y del resumen anterior. Consultar Bigler, p. 296.
>
> «Un objeto en reposo no produce arrastre» requiere especificar reposo respecto del fluido. La formulación sin ese marco puede ser engañosa. Además, arrastre, sustentación y empuje hidrostático son contribuciones distintas: ausencia de arrastre no implica ausencia de toda fuerza del fluido.

Modelo de arrastre cuadrático

Para las condiciones en que se usa ese modelo, el módulo se expresa como:

$$F_D = \frac{1}{2}\rho C_D A v_{\text{rel}}^2$$

Símbolo	Qué representa	Unidad SI
ρ	Densidad del fluido	kg/m³
v_{rel}	Rapidez relativa	m/s
A	Área frontal de referencia	m²
C_D	Coeficiente de arrastre para esa área y condición	Sin unidad
F_D	Módulo de la fuerza de arrastre	N

En una dimensión, la expresión con signo puede escribirse:

$$F_{D,x} = -\frac{1}{2}\rho C_D A\, v_{\text{rel},x}|v_{\text{rel},x}|$$

Así la fuerza cambia de sentido cuando cambia el movimiento relativo. Escribir simplemente «menos rapidez al cuadrado» daría el sentido incorrecto si el cuerpo se mueve en el eje negativo.

Área frontal y orientación



Área frontal: silueta proyectada sobre un plano.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 355. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

El área frontal es la silueta proyectada perpendicularmente al flujo. No es toda la superficie de la piel ni la suma de áreas que se superponen en esa vista. Cambiar de postura puede

cambiar tanto el área como el coeficiente.


A coeficiente, área y densidad constantes, duplicar la rapidez multiplica por cuatro el arrastre. Duplicar el área duplica la fuerza en ese modelo. La masa del cuerpo no aparece explícitamente en esta fórmula, pero sí en la aceleración producida por la fuerza y en otros balances, como el de caída vertical.

Ejemplo propio de cálculo, no medición: con $\rho = 1{,}2$ kg/m³, $C_D = 1{,}0$, $A = 0{,}50$ m² y rapidez relativa de 10 m/s:

$$F_D = \tfrac{1}{2}(1{,}2)(1{,}0)(0{,}50)(10)^2 = 30 \text{ N}$$

A 20 m/s serían 120 N si se mantienen las demás hipótesis.

Coeficientes: datos de referencia, no constantes universales



Formas y coeficientes de arrastre orientativos.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 356. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Se conserva la figura del original con sus valores orientativos y direcciones de flujo. Para comparar dos coeficientes hay que usar la misma convención de área y condiciones comparables. El coeficiente depende de forma, orientación y régimen de flujo; no es solo una etiqueta fija de un objeto.

Nota de adaptación · En revisión

Origen del pasaje: Explicación del original: gotas de lluvia y formas aerodinámicas. Consultar Bigler, p. 356.


No se conserva como explicación general que las gotas de lluvia tengan forma de cuerpo aerodinámico alargado de mínima resistencia. Su forma depende del tamaño y del balance entre tensión superficial y fuerzas del aire; las grandes pueden achatarse por debajo y deformarse. La figura de formas se usa para comparar cuerpos idealizados, no para identificar la forma real de toda gota. Contraste: NASA, Anatomy of a Raindrop.

Número de Reynolds y límites del modelo

El número de Reynolds compara efectos inerciales y viscosos para una longitud característica L:

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho v_{\mathrm{rel}} L}{\eta}$$

Aquí η es viscosidad dinámica, en Pa·s; no es el coeficiente de fricción sólido μ_s o μ_k. Reynolds no tiene unidad.



Representaciones de flujo laminar y turbulento.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 357. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

La figura representa cualitativamente flujo organizado y flujo turbulento. No establece un umbral único válido para cualquier geometría. En ciertos regímenes de muy bajo Reynolds, el arrastre se aproxima mejor mediante una relación lineal con la rapidez; tomar C_D constante y concluir siempre $F_D \propto v^2$ sería inadecuado.

Nota de adaptación · En revisión

Origen del pasaje: Generalizaciones del original sobre flujo y viscosidad. Consultar Bigler, p. 357.

Los valores de Reynolds usados para clasificar flujo en conductos no se trasladan directamente a cualquier cuerpo en un fluido. Tampoco se adopta una ley universal según la cual la viscosidad de todo fluido newtoniano disminuye al subir la temperatura. El régimen, la geometría y las propiedades del fluido deben identificarse antes de elegir el modelo. Contraste: NASA, factores que afectan el arrastre y arrastre de una esfera.

Velocidad terminal: desarrollo adicional de la adaptación

Para un objeto que cae verticalmente respecto de aire quieto, sin empuje apreciable, a coeficiente y área constantes, una rapidez terminal satisface equilibrio entre peso y arrastre:

$$mg = \frac{1}{2}\rho C_D A v_t^2$$

$$v_t = \sqrt{\frac{2mg}{\rho C_D A}}$$

La aceleración tiende a cero, pero la velocidad no es cero. Si el empuje es relevante, el balance cambia a $mg - E = F_D$. Si cambian la postura o el régimen, también cambia la predicción. Este desarrollo se agrega para conectar el apartado con los diagramas de paracaidistas de p. 311; no se presenta como un ejercicio numérico resuelto en pp. 354–357.

Comparaciones experimentales propuestas

El original propone comparar objetos de formas distintas y observar la influencia del aire. Registrá masa, forma, área de referencia y condiciones: cambiar simultáneamente varios factores no permite atribuir cualquier diferencia a uno solo.

Corrección de la adaptación anterior: no se afirma que un papel arrugado y una pelota de golf tengan masas similares sin medirlas. Para una experiencia propia puede compararse una hoja extendida y luego arrugada: la masa prácticamente se conserva, pero cambian la forma y el área. No se inventan tiempos de caída; se miden y se informa la incertidumbre correspondiente.