# MRU: ecuación horaria, gráficos y encuentros

Prof. Lamaita · octubre 2026

*Deducciones por proporcionalidad, área e integración de velocidad constante.*

Material elaborado por Prof. Lamaita, 2026. Licencia CC BY-NC-SA 4.0.

## Modelo y condiciones

En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad vectorial es constante. La trayectoria es recta y la aceleración cero. Definí eje, origen y tiempo inicial $t_0$; una velocidad negativa indica avance hacia valores decrecientes del eje.

## Recorrido intuitivo: de la definición a la ecuación

Si en intervalos iguales ocurren desplazamientos iguales, la razón $v = \Delta x/\Delta t$ es constante. Multiplicando por el tiempo:

$$\Delta x = v\Delta t.$$


Como $\Delta x = x - x_0$ y $\Delta t = t - t_0$:

$$\boxed{x(t) = x_0 + v(t - t_0)}.$$

No hace falta salir del origen ni empezar el reloj en cero. Si elegimos $t_0 = 0$, queda $x = x_0 + vt$. La ordenada inicial representa posición, no velocidad.

## Deducción gráfica

El gráfico $v(t)$ es horizontal. Su área con signo entre $t_0$ y $t$ es el rectángulo $v(t - t_0)$, que representa desplazamiento. Por eso se suma a $x_0$. La pendiente del gráfico $x(t)$ es $v$ y la del gráfico $v(t)$ es cero.




*MRU ilustrativo: posición lineal y velocidad constante.*

Elaboración para Introducción a la Física. Modelos ilustrativos; no son mediciones experimentales.

## Profundización analítica

La definición instantánea es $dx/dt = v$ constante. Integramos entre condiciones conocidas:

$$\int_{x_0}^{x(t)} dx' = \int_{t_0}^{t} v\, dt'.$$

El resultado es $x(t) - x_0 = v(t - t_0)$. La constante de integración queda determinada por $x(t_0) = x_0$. Derivando la ecuación obtenida se recupera $dx/dt = v$ y $d^2x/dt^2 = 0$.

Si la velocidad cambia por tramos, se integra o calcula cada área por separado y se conserva la posición final como condición inicial del tramo siguiente. Usar una única velocidad constante sin comprobarlo cambia el modelo.

## Encuentro de dos móviles

Usá la misma referencia y el mismo reloj. Si $x_A = x_{A0} + v_A t$ y $x_B = x_{B0} + v_B t$, se encuentran cuando sus posiciones coinciden:

$$x_{A0} + v_A t = x_{B0} + v_B t.$$

Si $v_A \neq v_B$:

$$t = \frac{x_{B0} - x_{A0}}{v_A - v_B}.$$

Revisá si el resultado pertenece al intervalo físico considerado. Un tiempo negativo describe un encuentro anterior al inicio, no uno futuro. Si las velocidades son iguales, no habrá encuentro salvo que ya compartan posición.

## Ejemplo resuelto

A sale de $x = 0$ a $3\,\mathrm{m/s}$; B parte simultáneamente de $x = 20\,\mathrm{m}$ a $-2\,\mathrm{m/s}$. Igualamos $3t = 20 - 2t$, obtenemos $t = 4\,\mathrm{s}$ y $x = 12\,\mathrm{m}$.

Si B empieza dos segundos después, su ecuación durante su movimiento es $x_B = 20 - 2(t - 2)$, válida desde $t = 2\,\mathrm{s}$. No se omite el retraso ni se usa esa ecuación antes de la salida.

## Ejercicios

1. Un móvil parte de $x_0 = 5\,\mathrm{m}$ con $v = -2\,\mathrm{m/s}$. Hallá posición y distancia recorrida a los $4\,\mathrm{s}$.
2. Dos móviles salen simultáneamente desde $0$ y $100\,\mathrm{m}$, a $8$ y $-2\,\mathrm{m/s}$. Hallá encuentro.
3. Un objeto recorre $6\,\mathrm{m}$ a $2\,\mathrm{m/s}$ y otros $6\,\mathrm{m}$ a $3\,\mathrm{m/s}$. ¿Su rapidez media es $2{,}5\,\mathrm{m/s}$?

▼ **Resultados**

1. $x = -3\,\mathrm{m}$; distancia $8\,\mathrm{m}$.
2. $t = 10\,\mathrm{s}$, $x = 80\,\mathrm{m}$.
3. Tarda $3 + 2 = 5\,\mathrm{s}$: rapidez media $12/5 = 2{,}4\,\mathrm{m/s}$. El promedio simple de rapideces requiere tiempos iguales, no distancias iguales.