UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

ÁLGEBRA LINEAR

LISTA DE RESULTADOS

LEONARDO SUAREZ

Porto Alegre, RS
17 de setembro de 2025

Conteúdo

1 Espaços Vetoriais **3**
- 1.1 $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{C}^n$ . . . 3
- 1.2 Definição de Espaço Vetorial . . . 3
- 1.3 Subespaços . . . 4

2 Espaços Vetoriais de Dimensão Finita **4**
- 2.1 Span e Independência Linear . . . 4
- 2.2 Bases . . . 5
- 2.3 Dimensão . . . 5

3 Transformações Lineares **6**
- 3.1 Espaços Vetoriais de Transformaçõess Lineares . . . 6
- 3.2 Espaço Nulo e Imagem . . . 7
- 3.3 Matrizes . . . 7
- 3.4 Invertibilidade e Isomorfismos . . . 9
- 3.5 Produtos e Quocientes de Espaços Vetoriais . . . 11
- 3.6 Dualidade . . . 11

4 Polinômios **11**

5 Autovalores e Autovetores **11**
- 5.1 Subespaços Invariantes . . . 11
- 5.2 O Polinômio Mínimo . . . 11
- 5.3 Matrizes Triangular-Superiores . . . 11
- 5.4 Operadores Diagonalizáveis . . . 11
- 5.5 Operadores Comutantes . . . 11

6 Espaços com Produto Interno **11**
- 6.1 Produtos Internos e Normas . . . 11
- 6.2 Bases Ortonormais . . . 11
- 6.3 Complementos Ortogonais e Problemas de Minimização . . . 11

7 Operadores em Espaços com Produto Interno **11**
- 7.1 Operadores Autoadjuntos e Operadores Normais . . . 11
- 7.2 Teorema Espectral . . . 11
- 7.3 Operadores Positivos . . . 11
- 7.4 Isometrias, Operadores Unitários e Fatoração Matricial . . . 11
- 7.5 Decomposição em Valores Singulares . . . 11
- 7.6 Consequências de Valores Singulares . . . 11

8 Operadores em Espaços Vetoriais Complexos **11**

9 Álgebra Multilinear e Determinantes **11**

1 Espaços Vetoriais

1.1 $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{C}^n$

Proposição 1.1. *(propriedades da aritmética complexa)*

(a) **comutatividade** $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ *e* $\alpha\beta = \beta\alpha \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}$

(b) **associatividade** $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$ *e* $(\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma) \quad \forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$

(c) **identidades** $\alpha + 0 = \alpha$ *e* $\alpha 1 = \alpha \quad \forall \alpha \in \mathbb{C}$

(d) **inverso aditivo** $\forall \alpha \in \mathbb{C}\ \exists! \beta \in \mathbb{C} : \alpha + \beta = 0$.

(e) **inverso multiplicativo** $\forall \alpha \in \mathbb{C}, \alpha \neq 0\ \exists! \beta \in \mathbb{C} : \alpha\beta = 1$.

(f) **distributividade** $\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma \quad \forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$

Definição 1.2. Suponha que n seja um inteiro não-negativo. Uma *lista* de *tamanho* n é uma coleção ordenada de n elementos (que podem ser números, outras listas, ou outros objetos mais abstratos). Duas listas são iguais sse têm o mesmo tamanho e os mesmos elementos na mesma ordem.

Definição 1.3. A *soma* em $\mathbb{F}^n$ é definida somando as coordenadas correspondentes:

$$(x_1, \ldots, x_n) + (y_1, \ldots, y_n) = (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n).$$

Proposição 1.4. *(comutatividade da soma em $\mathbb{F}^n$) Para todo $x, y \in \mathbb{F}^n$, $x + y = y + x$.*

Definição 1.5. Para todo $x \in \mathbb{F}^n$, o *inverso aditivo* de x é o vetor $-x \in \mathbb{F}^n$ tal que $x + (-x) = 0$. Explicitamente, se $x = (x_1, \ldots, x_n)$, então $-x = (-x_1, \ldots, -x_n)$.

Definição 1.6. O *produto* de um número λ e um vetor em $\mathbb{F}^n$ é computado multiplicando cada coordenada do vetor por λ:

$$\lambda(x_1, \ldots, x_n) = (\lambda x_1, \ldots, \lambda x_n);$$

onde $\lambda \in \mathbb{F}$ e $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{F}^n$.

Definição 1.7. Uma *soma* em um conjunto V é uma função que associa um elemento $u + v \in V$ a cada par de elementos $u, v \in V$. Um *produto por escalar* em V é uma função que associa um elemento $\lambda v \in V$ a cada escalar $\lambda \in \mathbb{F}$ e cada elemento $v \in V$.

1.2 Definição de Espaço Vetorial

Definição 1.8. Um *espaço vetorial* é um conjunto V munido com as operações de soma e produto por escalar que satisfaz as seguintes propriedades.

(A1) **comutatividade** $u + v = v + u$, para todo $u, v \in V$.

(A2) **associatividade** $(u + v) + w = u + (v + w)$, para todo $u, v, w \in V$.

(A3) **identidade aditiva** Existe $0 \in V$ tal que $v + 0 = v$, para todo $v \in V$.

(A4) **inverso aditivo** Para todo $v \in V$ existe $-v \in V$ tal que $v + (-v) = 0$.

(A5) **identidade multiplicativa** $1v = v$, para todo $v \in V$, onde 1 é o elemento identidade em $\mathbb{F}$.

(A6) **distributividade** $a(u+v) = au + av$ e $(a+b)v = av + bv$, para todo $a, b \in \mathbb{F}$ e todo $u, v \in V$.

Proposição 1.9. *Um espaço vetorial possui identidade aditiva única.*

Proposição 1.10. *Todo elemento de um espaço vetorial possui inverso aditivo único.*

Proposição 1.11. $0v = 0$ *e* $a0 = 0$*, para todo* $a \in \mathbb{F}$ *e todo* $v \in V$*.*

Proposição 1.12. $(-1)v = -v$*, para todo* $v \in V$*.*

1.3 Subespaços

Definição 1.13. Um subconjunto U de um espaço vetorial V é dito um *subespaço* de V se U é um espaço vetorial com as mesmas operações de soma e produto por escalar definidas em V.

Proposição 1.14. *(condições para subespaço) Um subconjunto* U *de um espaço vetorial* V *é um subespaço de* V *sse os seguintes três itens são satisfeitos.*

- $0 \in U$*.*
- *Se* $u, v \in U$*, então* $u + v \in U$*.*
- *Se* $u \in U$ *e* $a \in \mathbb{F}$*, então* $au \in U$*.*

Definição 1.15. Suponha que $V_1, \ldots, V_m$ são subespaços de V. A *soma* $V_1 + \cdots + V_m$ é o conjunto de todas as somas possíveis de elementos de $V_1, \ldots, V_m$, isto é,

$$V_1 + \cdots + V_m = \{v_1 + \cdots + v_m : v_1 \in V_1, \ldots, v_m \in V_m\}.$$

Proposição 1.16. *Se* $V_1, \ldots, V_m$ *são subespaços de* V*, então* $V_1 + \cdots + V_m$ *é o menor subespaço de* V *que contém* $V_1, \ldots, V_m$*.*

Definição 1.17. Sejam $V_1, \ldots, V_m$ subespaços de V. A soma $V_1 + \cdots + V_m$ é dita *direta* se todo $v \in V_1 + \cdots + V_m$ pode ser escrito de maneira única como $v = v_1 + \cdots + v_m$, onde $v_k \in V_k$. Se a soma é direta, escrevemos $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_m$.

Proposição 1.18. *(condição para soma direta) Suponha que* $V_1, \ldots, V_m$ *são subespaços de* V*. Então* $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_m$ *sse a única maneira de escrever* 0 *como* $0 = v_1 + \cdots + v_m$*, onde* $v_k \in V_k$ *para cada* k*, é com* $v_1 = \cdots = v_m = 0$*.*

Proposição 1.19. *Sejam* U *e* W *subespaços de* V*. Então*

$$U + W \text{ é soma direta} \iff U \cap W = \{0\}.$$

2 Espaços Vetoriais de Dimensão Finita

2.1 Span e Independência Linear

Proposição 2.1. *(span é o menor subespaço que contém todos os vetores) O span de uma lista de vetores em* V *é o menor subespaço de* V *que contém todos os vetores da lista.*

Definição 2.2. Um espaço vetorial V é dito de *dimensão finita* se existe uma lista finita de vetores em V que gera V. Caso contrário, V é dito de *dimensão infinita*.

Definição 2.3. Uma lista $v_1, \ldots, v_n$ de vetores em V é dita *linearmente independente* se a única escolha de escalares $a_1, \ldots, a_n$ em $\mathbb{F}$ que satisfaz

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_n v_n = 0 \tag{1}$$

é $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$. Caso contrário, a lista é dita *linearmente dependente*. A lista vazia é dita linearmente independente.

Lema 2.4. *(lema de dependência linear) Suponha que $v_1, \ldots, v_n$ é linearmente dependente em V. Então existe $j \in \{1, \ldots, n\}$ tal que*

$$v_j \in span(v_1, \ldots, v_{j-1}). \tag{2}$$

Ainda, se j satisfaz a condição acima e o j-ésimo vetor for removido da lista, então o span dos vetores restantes é igual a $span(v_1, \ldots, v_n)$.

Proposição 2.5. *Em um espaço vetorial V de dimensão finita, o tamanho de qualquer lista linearmente independente é menor ou igual ao tamanho de qualquer lista geradora.*

Proposição 2.6. *Todo subespaço de um espaço vetorial de dimensão finita é de dimensão finita.*

2.2 Bases

Definição 2.7. Uma *base* de um espaço vetorial V é uma lista de vetores $v_1, \ldots, v_n$ em V que é linearmente independente e gera V.

Proposição 2.8. *(critério para base) Uma lista de vetores $v_1, \ldots, v_n$ em um V é uma base de V sse todo vetor em V pode ser escrito de maneira única como uma combinação linear de $v_1, \ldots, v_n$, isto é,*

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_n v_n, \tag{3}$$

onde $a_1, \ldots, a_n$ são escalares em $\mathbb{F}$.

Proposição 2.9. *Toda lista geradora em um espaço vetorial pode ser reduzida a uma base do espaço vetorial.*

Proposição 2.10. *Toda lista linearmente independente em um espaço vetorial de dimensão finita pode ser estendida a uma base do espaço vetorial.*

Proposição 2.11. *Suponha que V seja um espaço vetorial de dimensão finita e U é um subespaço de V. Então existe um subespaço W de V tal que $V = U \oplus W$.*

2.3 Dimensão

Proposição 2.12. *(o tamanho da base não depende da base) Se V é um espaço vetorial de dimensão finita, então todas as bases de V têm o mesmo tamanho.*

Definição 2.13. A *dimensão* de um espaço vetorial V de dimensão finita é o tamanho de qualquer base de V.

Proposição 2.14. *Se V é um espaço vetorial de dimensão finita e U é um subespaço de V, então* $\dim(U) \leq \dim(V)$.

Proposição 2.15. *Se V é um espaço vetorial de dimensão finita, então toda lista linearmente independente de vetores em V com tamanho igual a* $\dim(V)$ *é uma base de V.*

Corolário 2.16. *Se V é um espaço vetorial de dimensão finita, então todo subespaço U de V com* $\dim(U) = \dim(V)$ *é igual a V.*

Proposição 2.17. *Se V é um espaço vetorial de dimensão finita, então toda lista geradora de vetores em V com tamanho igual a* $\dim(V)$ *é uma base de V.*

Proposição 2.18. *(dimensão de soma) Se V_1 e V_2 são subespaços de um espaço vetorial de dimensão finita V, então*

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2) - \dim(V_1 \cap V_2). \tag{4}$$

3 Transformações Lineares

3.1 Espaços Vetoriais de Transformaçõess Lineares

Definição 3.1. Uma transformação linear de V em W é uma função $T : V \to W$ com as seguintes propriedades.

1. $T(u + v) = T(u) + T(v)$, para todo $u, v \in V$. *(aditividade)*
2. $T(\lambda u) = \lambda T(u)$, para todo $u \in V$ e todo escalar $\lambda \in \mathbb{F}$. *(homogeneidade)*

Lema 3.2. *Suponha que $v_1, \ldots, v_n$ é uma base de V e $w_1, \ldots, w_n \in W$. Então existe uma única transformação linear $T : V \to W$ tal que $T(v_k) = w_k$, para $k = 1, \ldots, n$.*

Definição 3.3. Suponha $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. A *soma* $S + T$ e o *produto por escalar* λT são as transformações lineares de V em W definidas por

$$(S + T)(v) = S(v) + T(v) \quad \text{e} \quad (\lambda T)(v) = \lambda(T(v)),$$

para todo $v \in V$.

Corolário 3.4. *Com as operações de soma e produto escalar definidas acima, $\mathcal{L}(V, W)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{F}$.*

Definição 3.5. Se $T \in \mathcal{L}(U, V)$ e $S \in \mathcal{L}(V, W)$, então o *produto* ST é a transformação linear de U em W definida por

$$(ST)(u) = S(T(u)),$$

para todo $u \in U$.

Proposição 3.6. *(propriedades algébricas do produto de transformações lineares)*

- $(T_1T_2)\,T_3 = T_1\,(T_2T_3)$ *sempre que T_1, T_2, T_3 são transformações lineares tais que os produtos são definidos.* (associatividade)
- $T_1I = IT_1 = T_1$ *sempre que $T_1 \in \mathcal{L}(V, W)$, onde o primeiro I é a identidade em V e o segundo I é a identidade em W.* (elemento neutro)
- $(S_1 + S_2)\,T = S_1T + S_2T$ *e* $S\,(T_1 + T_2) = ST_1 + ST_2$, *sempre que* $T, T_1, T_2 \in \mathcal{L}(U, V)$ *e* $S, S_1, S_2 \in \mathcal{L}(V, W)$. (distributividade)

Corolário 3.7. *Suponha que T seja uma transformação linear de V em W. Então $T(0) = 0$.*

3.2 Espaço Nulo e Imagem

Definição 3.8. Para $T \in \mathcal{L}(V, W)$, o *espaço nulo* de T é o subconjunto de V definido por

$$\mathcal{N}(T) = \{v \in V : T(v) = 0\}.$$

Proposição 3.9. *Seja $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Então $\mathcal{N}(T)$ é um subespaço de V.*

Definição 3.10. Uma função $T : V \to W$ é *injetora* se $T(v_1) = T(v_2)$ implica $v_1 = v_2$, para todo $v_1, v_2 \in V$.

Proposição 3.11. *Seja $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Então T é injetora se e somente se $\mathcal{N}(T) = \{0\}$.*

Definição 3.12. Para $T \in \mathcal{L}(V, W)$, a *imagem* de T é o subconjunto de W definido por

$$\mathrm{Im}(T) = \{T(v) : v \in V\}.$$

Proposição 3.13. *Seja $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Então $\mathrm{Im}(T)$ é um subespaço de W.*

Definição 3.14. Uma função $T : V \to W$ é *sobrejetora* se para todo $w \in W$ existe $v \in V$ tal que $T(v) = w$.

Teorema 3.15. *(teorema fundamental das transformações lineares) Suponha que V seja um espaço vetorial de dimensão finita e que $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Então $\mathrm{Im}(T)$ é de dimensão finita e*

$$\dim V = \dim \mathcal{N}(T) + \dim \mathrm{Im}(T). \tag{5}$$

Corolário 3.16. *Suponha que V e W são espaços vetoriais de dimensão finita com $\dim V > \dim W$. Então nenhuma transformação linear de V em W é injetora.*

Corolário 3.17. *Suponha que V e W são espaços vetoriais de dimensão finita com $\dim V < \dim W$. Então nenhuma transformação linear de V em W é sobrejetora.*

3.3 Matrizes

Definição 3.18. Suponha que m e n são inteiros não-negativos. Uma *matriz* m por n é uma tabela retangular de elementos de $\mathbb{F}$ com m linhas e n colunas:

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} & A_{m2} & \cdots & A_{mn} \end{bmatrix},$$

onde $A_{jk} \in \mathbb{F}$ é o elemento na j-ésima linha e k-ésima coluna de A.

Definição 3.19. (matriz de uma transformação linear) Suponha que $T \in \mathcal{L}(V, W)$ e que $v_1, \ldots, v_n$ é uma base de V e $w_1, \ldots, w_m$ é uma base de W. A *matriz* de T com respeito a essas bases é a matriz $\mathcal{M}(T)$ de tamanho m por n cujas entradas A_{jk} são definidas por

$$T(v_k) = A_{1k}w_1 + \cdots + A_{mk}w_m.$$

Definição 3.20. A *soma de duas matrizes de mesmo tamanho* é a matriz obtida somando as entradas correspondentes:

$$A + B = \begin{bmatrix} A_{11} + B_{11} & A_{12} + B_{12} & \cdots & A_{1n} + B_{1n} \\ A_{21} + B_{21} & A_{22} + B_{22} & \cdots & A_{2n} + B_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} + B_{m1} & A_{m2} + B_{m2} & \cdots & A_{mn} + B_{mn} \end{bmatrix}.$$

Proposição 3.21. *(matriz da soma de transformações lineares) Sejam $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$. Então $\mathcal{M}(S+T) = \mathcal{M}(S) + \mathcal{M}(T)$.*

Definição 3.22. O produto de uma matriz por um escalar é a matriz obtida multiplicando cada entrada da matriz pelo escalar:

$$\lambda A = \begin{bmatrix} \lambda A_{11} & \lambda A_{12} & \cdots & \lambda A_{1n} \\ \lambda A_{21} & \lambda A_{22} & \cdots & \lambda A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda A_{m1} & \lambda A_{m2} & \cdots & \lambda A_{mn} \end{bmatrix}.$$

Proposição 3.23. *(matriz do produto por escalar de uma transformação linear) Sejam $T \in \mathcal{L}(V, W)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. Então $\mathcal{M}(\lambda T) = \lambda \mathcal{M}(T)$.*

Proposição 3.24. (dim $\mathbb{F}^{m,n} = mn$) *Suponha que m e n sejam inteiros positivos. Com as operações de soma e produto por escalar definidas acima, $\mathbb{F}^{m,n}$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{F}$ com dimensão mn.*

Definição 3.25. (multiplicação de matrizes) Sejam A uma matriz m por n e B uma matriz n por p. O *produto* AB é a matriz m por p cujas entradas são definidas por

$$(AB)_{jk} = \sum_{r=1}^{n} A_{jr} B_{rk}.$$

Proposição 3.26. *(matriz do produto de transformações lineares) Sejam $T \in \mathcal{L}(U, V)$ e $S \in \mathcal{L}(V, W)$. Então $\mathcal{M}(ST) = \mathcal{M}(S)\mathcal{M}(T)$.*

Proposição 3.27. *(entrada do produto de matrizes é igual ao produto de vetores linha por coluna) Sejam A uma matriz m por n e B uma matriz n por p. Então a entrada (j, k) de AB é igual ao produto do j-ésimo vetor linha de A pelo k-ésimo vetor coluna de B:*

$$(AB)_{jk} = A_{j.} B_{.k},$$

se $1 \leq j \leq m$ e $1 \leq k \leq p$.

Proposição 3.28. *(coluna do produto de matrizes é igual ao produto da matriz pela coluna) Sejam A uma matriz m por n e B uma matriz n por p. Então a k-ésima coluna de AB é igual ao produto de A pela k-ésima coluna de B:*

$$(AB)_{.k} = AB_{.k},$$

se $1 \leq k \leq p$.

Corolário 3.29. *(combinação linear de colunas) Sejam A uma matriz m por n e b uma matriz n por 1. Então o produto Ab é uma combinação linear das colunas de A com os coeficientes dados pelas entradas de b:*

$$Ab = b_1 A_{.1} + b_2 A_{.2} + \cdots + b_n A_{.n}.$$

Corolário 3.30. *(multiplicação de matrizes como combinação linear de colunas) Suponha que C é uma matriz m por c e R é uma matriz c por n.*

(a) *Se $k \in \{1, \ldots, n\}$, então a k-ésima coluna de CR é uma combinação linear das colunas de C com os coeficientes dados pelas entradas da k-ésima coluna de R.*

(b) *Se $j \in \{1, \ldots, m\}$, então a j-ésima linha de CR é uma combinação linear das linhas de R com os coeficientes dados pelas entradas da j-ésima linha de C.*

Definição 3.31. Seja A uma matriz m por n. O *posto* de A, denotado por $\text{rank}(A)$, é a dimensão do span das colunas de A em $\mathbb{F}^{m1}$. O *posto transposto* de A, denotado por $\text{rank}(A^t)$, é a dimensão do span das linhas de A em $\mathbb{F}^{1n}$.

Definição 3.32. A transposta de uma matriz A, denotada por A^t, é a matriz obtida trocando as linhas por colunas, isto é, a entrada (j,k) de A^t é a entrada (k,j) de A:

$$(A^t)_{jk} = A_{kj}.$$

Proposição 3.33. *(fatoração coluna-linha) Seja A uma matriz m por n com entradas em $\mathbb{F}$ e posto $c \geq 1$. Então existem uma matriz C m por c e uma matriz R c por n, ambas com entradas em $\mathbb{F}$, tais que $A = CR$.*

Proposição 3.34. *(posto é igual ao posto transposto) Se A é uma matriz com entradas em $\mathbb{F}$, então* $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^t)$.

3.4 Invertibilidade e Isomorfismos

Definição 3.35. Uma transformação linear $T \in \mathcal{L}(V,W)$ é dita *invertível* se existe uma transformação linear $S \in \mathcal{L}(W,V)$ tal que ST é igual ao operador identidade em V e TS é igual ao operador identidade em W. Uma transformação linear $S \in \mathcal{L}(W,V)$ que satisfaz $ST = I$ e $TS = I$ é dita a *inversa* de T.

Proposição 3.36. *Uma transformação linear invertível tem uma única inversa. Se $T \in \mathcal{L}(V,W)$ é invertível, então $T^{-1} \in \mathcal{L}(W,V)$ é o único elemento de $\mathcal{L}(W,V)$ tal que $T^{-1}T = I$ e $TT^{-1} = I$.*

Proposição 3.37. *Uma transformação linear é invertível sse é bijetora.*

Proposição 3.38. *Sejam V e W espaços vetoriais de dimensão finita e que $\dim V = \dim W$. Então uma transformação linear $T \in \mathcal{L}(V,W)$ é invertível sse T é injetora sse T é sobrejetora.*

Proposição 3.39. *Sejam V e W espaços vetoriais de dimensão finita, $\dim V = \dim W$, $S \in \mathcal{V}, \mathcal{W}$ e $T \in \mathcal{L}(W,U)$. Então $ST = I$ sse $TS = I$.*

Definição 3.40. Um *isomorfismo* é uma transformação linear invertível. Se existe um isomorfismo de V em W, então V e W são ditos *isomorfos*.

Proposição 3.41. *Dois espaços vetoriais de dimensão finita são isomorfos sse têm a mesma dimensão.*

Proposição 3.42. *Suponha $v_1, \ldots, v_n$ é uma base de V e $w_1, \ldots, w_n$ é base de W. Então $\mathcal{M}$ é um isomorfismo de $\mathcal{L}(V,W)$ em $\mathbb{F}^{m,n}$.*

Corolário 3.43. *Sejam V e W espaços vetoriais de dimensão finita. Então $\mathcal{L}(V,W)$ é de dimensão finita e*

$$\dim \mathcal{L}(V,W) = (\dim V)(\dim W).$$

Definição 3.44. Seja $v \in V$ e $v_1, \ldots, v_n$ uma base de V. A *matriz de* v com respeito a essa base é a matriz n por 1 definida por

$$\mathcal{M}(v) = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix},$$

onde $v = b_1 v_1 + b_2 v_2 + \cdots + b_n v_n$.

Corolário 3.45. *Suponha $T \in \mathcal{L}(V, W)$ e $v_1, \ldots, v_n$ é uma base de V e $w_1, \ldots, w_m$ é uma base de W. Seja $1 \leq k \leq n$. Então a k-ésima coluna de $\mathcal{M}(T)$ é igual a $\mathcal{M}(T(v_k))$.*

Proposição 3.46. *Suponha $T \in \mathcal{L}(V, W)$, $v_1, \ldots, v_n$ é uma base de V e $w_1, \ldots, w_m$ é uma base de W. Se $v \in V$, então*

$$\mathcal{M}(T(v)) = \mathcal{M}(T)\mathcal{M}(v).$$

3.5 Produtos e Quocientes de Espaços Vetoriais

3.6 Dualidade

4 Polinômios

5 Autovalores e Autovetores

5.1 Subespaços Invariantes

5.2 O Polinômio Mínimo

5.3 Matrizes Triangular-Superiores

5.4 Operadores Diagonalizáveis

5.5 Operadores Comutantes

6 Espaços com Produto Interno

6.1 Produtos Internos e Normas

6.2 Bases Ortonormais

6.3 Complementos Ortogonais e Problemas de Minimização

7 Operadores em Espaços com Produto Interno

7.1 Operadores Autoadjuntos e Operadores Normais

7.2 Teorema Espectral

7.3 Operadores Positivos

7.4 Isometrias, Operadores Unitários e Fatoração Matricial

7.5 Decomposição em Valores Singulares

7.6 Consequências de Valores Singulares

8 Operadores em Espaços Vetoriais Complexos

9 Álgebra Multilinear e Determinantes